

50088/A

J. L. M. P.

713
1876

Cont 37
C. 48

L. XXVII

18/5

AS Plumbe

PHARMACOPŒIA PRACTICA:

SIVE

Præscriptorum Syndrome,

IN QUA

Tres PRÆSCRIPTORUM ferè Chiliades,
Morbis omnibus tam internis quam
externis accommodatorum, in Classes
digeruntur:

Quæ excerpuntur,

- I. Ex Variis Authoribus.
- II. Ex Pharmacopœiâ LONDINENSIS.
- III. Ex Pharmacopœiâ BATÆANA.
- IV. Ex Pharmacopœiâ FULLERI.
- V. Ex Præscriptis Vulgari in usu apud ce-
leberrimum ac nuperum JOHANNEM
RADCLIFFIUM, M. D.

Quibus accesserunt

SCHOLIA AC OBSERVATIONES,

Quæ Remediorum energias explicant: Unà cum
INDICE Rerum locupletissimo.

Operâ EDVARDI STROTHER, M. D.

LONDINI:

Ez

Impensis CAROLI RIVINGTON, ad Insigne Bibliorum ac
Coronæ in Cœmeterio D. Pauli, MDCCXIX.

HISTORICAL
MEDICAL

48558

ERRATA.

PAG. 2. lin. 9. leg. 3. l. 28. del. m. p. 7. l. 7. l. *colicas diuturnas*.
p. 10. l. 17. l. *quumprimum*. p. 11. l. 12. l. *nominata*. p. 28. l. 14.
l. *post alterantia*. p. 35. l. 31. l. *isthinc*. p. 38. l. 8. l. *istos*. p. 39. l. 37.
d. tum. l. 38. d. eam. p. 110. l. 2. l. *ut per opiata*. l. 5. l. *reperian-*
tur. p. 43. l. 28. l. *quumprimum*. p. 45. l. 32. l. *se denuo* p. 47.
l. 3. d. ij. p. 49. l. 34. l. *acutorum*. p. 51. l. 14. l. *immutare*. p. 55.
l. 12. l. *illum*. p. 58. l. 13. l. *propinare*. l. *aromatica*, *stomachica*. p. 70.
l. 12. d. hi. p. 76. l. 11. l. *haud temere*. p. 94. l. 16. l. *amolita*. p. 96.
l. 26. l. *climati*. p. 116. l. 15. l. *que*. l. 13. l. *est cur fluxus*. 164. l.
14. l. *Errhina*. p. 168. l. ult. l. *secta*. p. 173. l. 9. l. *pedis*. l. 20. l.
qui. p. 178. l. 7. l. *ad partes*, *que*. p. 195. l. 10. l. *impactos*. p. 213.
l. 24. d. hi. p. 214. l. 6. l. *maximè*. l. 17. l. *quamplurimos*. p. 216 l.
26. l. *infestantes tollimus*. p. 217. l. 32. l. *detecla*. p. 232. l. 39. *pro w*
l. *ay*. p. 239. l. 39. l. *Tolutan*. p. 255. l. 38. l. *Pitcairniunqque asserere*.
p. 358. l. 5. l. *propulsis*. p. 261. l. 34. l. *admixtis*. p. 264. l. 20.
l. *propinabit*. p. 271. l. 10. *pro ejus* l. *Lympha*. p. 277. l. 36. l. *nul-*
lum secernunt. p. 279. l. 31. l. *asservatos*. p. 233. l. 31. l. *quod*. p.
284. l. 17. l. *subtrahit haustus hic*. p. 287. l. 15 l. *suffercuntur*. p. 288.
l. 53. l. *congruant*. p. 330. l. 5. l. *occubituros*. p. 335. l. 38. l. *Sovo*.
p. 371. l. 24. leg. *sapiat*. l. 26. d. *iri*. p. 390. l. 3. l. *ei*. p. 392.
l. 37. l. *illatura*. p. 394. l. 12. l. *tendant, quin paralyses*. p. 400. l. 13.
l. *exploraverunt*. p. 404 l. 5. d. *ante vel*. p. 414. l. 4. l. *plethora ge-*
neralis ac individua. p. 432. l. 2. l. *innatantes*. p. 435. l. 18. l. *voto*
cederet. p. 440. l. 4. l. *lapidi* l. *Scurhus* pro *Schirhus*, &c. *passura ante*
iii legatur *Supinum in um*.





PRÆFATIO

AD

LECTORES.



NOBIS, Lectores benevoli, nonnulla, tam de hocce instituto nostro, quàm de malevolâ ac deviâ quorundam politeiâ, perstringere animus est; ut Tirones, medicinæ syrtēs effugiant; & ut humano generi usui sint.

Quantumvis remediorum ac præscriptorum turbam huic libello inseruimus; fore tamen ambigimus, quinimò formidamus, ne quidpiam sit periculi, ut Tirones de præscriptorum delectu etiamnum in sententias ancipites distrabantur: Quisquis autem instituti nostri rationes conficere volet, resciscat ipse, oportet; nos opusculum hocce non eò typis mandâsse, ut præscriptorum cumulum tantummodo in lucem proferremus, verum ut eorundem genium & energias unicè illustraremus; Nam ea Pharmacopœiis nostris Britannicis præscriptorum perquam elegantium auctoritatem inest, quæ morbis cunctis abigendis satis erit. Quocirca ut brevi vobis scribendi rationes exhibeamus; nusquam comptas medicamentorum classes adhuc comperimus, neque quisquam ea, pro eorum principiis, uspiam hætenus probè

A 2

ordinavit;

ordinavit; hinc provenit, ut nosmet ad inceptum hocce, Tironum gratiâ, accinxerimus; cavendo interim, ut monita praxi utilia subnecteremus; cuique vero, simul ac primum ipsi libet, ultrâ progredi integrum sit: Quod authores usque adhuc medicamenta in classes non probè digesserint, ex hoc patet, quod simplicia subinde in Cephalicorum censum ascribantur, quæ illa ipsa inter Hysterica, Stomachica, Pectoralia, imo Arthritica denuo recensentur. Quid est, cur medicamentorum classes ab organis, non autem operandi modulo petuntur? Methodus hæc aded certè rudis & cæca est, ut hoc Tironum animos maximè suspensos teneat; ut pro ipsis etiam nodos stringat; quâ de causâ, nempe, fieret, ut remedium capiti proficuum, utero etiam vel vitio vel commodo verteretur: Ubi vero paulisper causæ attentius immorati sunt; hoc facile in mentes eorum incidit, quod illud de uno & eodem nomine organo vel morbo huic atque illi subsidio veniat: Quod Cortex v. g. peruvianus sit simul cephalicus, hystericus, & pectoralis; quod causæ, cur iste sit aded multiformis, sunt huiusmodi; cephalalgia, nempe, periodicæ propterea adest, quod Periodo finem imponat; asthma hystérico manus etiam præbet auxiliares, ex eo, quod paroxysmis seu exacerbationibus, Periodo ortis, coronidem addat; quod hæmoptysi præsertim exhinc opem ferat, quoniam temperiei febrili periodicæ præstò est; quamobrem ubicunque medicamenta organo cuivis accommodari feruntur, haud secus certè membro huic auxilio sunt, quàm quia causam morbi, huic infidentis

sidentis organo, præcidunt: Non igitur pro organis, sed causis ordinandæ sunt medicamento-
rum classes: Qui secus enim faxit, ea ipsa
medicamenta necnon eorundem energias etiam at-
que etiam repetat, ac recenseat, necesse erit:
Nos itaque eorum ordines ex operandi modulo &
principiis, ex quibus componuntur, prorsus de-
signavimus, & anxie in curam hanc incubuimus,
ut nec vires nec monita ad nauseam usque, imò
vel paulum modò, inculcarentur.

Medicamenta in totidem quidem membra dis-
pertivimus, quot Tironum animos abundè satia-
bunt; ex quibus plura istis minùs desiderari con-
stabit: Quando autem medicamenta quædam in
attenuantium censum hic ascripta sunt, quæ alias
etiam adhæc proprietates sibi adsciscunt; ista
tum ex qualitate potiori meritò nomen adipiscun-
tur suum: Quoties itaque chalybs præscriptum,
ex attenuantibus conflatum, ingreditur; quan-
tumvis chalybs stypticitate polleat, sanguis in gy-
rum pro attenuantium more nihilo seciùs flecte-
tur: Hinc licet fibras propter stypticitatem con-
stringat, corruget, roborétve chalybs, offas ta-
men denuò tantoperè tenuabit, ut attenuans jure
etiamnum nuncupetur: Quod enim ad particu-
las ipsius stypticas attinet, cùm eæ certò certius
sub idem tempus insuper agant; necesse erit, me-
dicamentum hoc proptereà mixtum audiat:
Quantum autem ad proprietates medicamento-
rum singularium individuas, eæ alibi fusius ex-
hibendæ sunt: Tantum enim abest, ut citra me-
dicamentorum proprietates singulas, probè notas,
morbis medeamur, præstat morborum signa quam

remedia nescire; nam materia medica Mystis Apollineis pluris est, quàm vel ipsa morborum diagnosi; quoniam remediis perperam introsumptis, misellis perniciem indubitanter comparamus; cum nonnulli eò pervenerint peritiæ, ut licet morbi species ipsis delite scat, ii tamen sine magno labore, causarum signis detectis, morbos, herculeos dictos, penitus eradicare queunt: Nos certè haud præterit, quam magnum paradoxon vobiscum communicavimus: Ast nimis volumus, hâc de re nobiscum disceptarent ij, qui in contrarias eunt partes. Advertendum igitur est, quod medicamenta vires suas vel in sanguine, vel fibris, vel superfluis impendant: Sanguis, spiritus, & reliqua fluida vel funduntur vel congelantur; vel particule eorundem acriores obtunduntur; vel demum iis adjicimus quid, vel ab iis aliquid subtrahitur. Fibræ vel contrahuntur ac indurantur, vel relaxantur ac emolliuntur; vel absumptæ in statum pristinum restituuntur, vel tandem aliquid eis adjectum abrasitur. Superflua quæ hominibus insunt corpora eximenda sunt; Calculi v. g. Lumbrici, & Extranea meatus emollientibus ac lubricantibus, stimulantibus; amaris aliisque anthelminticis; vel tandem mechanismo auferuntur. Nemo, remediorum energiis ipsi patefactis, aliud actu facilius reperiet, quam ut, causis, sede ac vehementia morbi probè cognitis, necnon utrum sit iste primarius, secundarius, sympathicus, criticus, an symptomaticus, illum, nisi si maximum naturæ faceffat negotium, vel radices egerit altiores, sine labore depellat.

Multa, imo perplurima, de medicamentorum proprie-

proprietatibus adhuc memoranda supersunt, quæ simul curiosa & utilia sunt; quando autem libri hujus molem ista quam maximè adaugerent; ea igitur in aliud differemus tempus: Penus reliquus omnem in re medicâ obscuritatem tollet, neque ulla dubitandi causa vel ansa posthâc supererit: Nisi quæ ex facili possit enodari: Cùm desiderata verò longior magis clara facturus est dies; Tirones flagitamus, ut hujus opusculi gratiam paulisper nobis faciant, dum experimenta iterum atque sæpius exegimus: Deinde cogitata nostra ipsis impertire nobis erit volupe.

Si penes Medicorum quenquam arcana adsint, ii ista uni ex classibus hîc numeratis certè possunt adjicere; & ideo vires eorum longè expeditius nunc, quam adhuc enarrare valebunt; nam remedia classe probè notâ, ipsius energia istis ultrâ delitescere nequit: Quando igitur haud pote est, ut remedia specifica, Arcana nuncupata, non his aliquâ classibus ascribantur, Tirones id propter medicinam posthâc non ex accidenti, sed rectâ ratione exercebunt.

Cùm scholia simul & observationes præscriptis subnectuntur, ubi medicamentorum, ad classem istam attinentium, vires non satis in scholiis enarrantur, inopia ista in observationibus abundè compensatur; nam id, quod de alio sentimus, de aliis proferre fas erit. Quantum ad eximii viri Radcliffii, in Corollariis, præscripta, licet incompta, trita, nugatoria, incongrua, & ab instituto longè aliena ab aliis dedecorentur, alii tamen illa meritò non contemptui habent.

Nolumus Lectores fidem nostram ex eo suspen-

Etiam habeant, quòd contradictoria proferre videamur; quanquam enim paginâ vicesimâ asseruerimus, quòd acida vomitionem ab antimonialibus excitatam compefcant, deinde paulò infrà, ex Barchuysen, ea ipsa vomitionem magis proritare adverterimus; notandum tamen est acidi pauxillum luctam cum antimonio inire, cum ejusdem plurimum, antimonii sulphura adeo congelare, obtundere & hebetare certum sit, ut ultrà stimulare nequeant. Uti fusiùs in Prælectionibus explicabimus.

Istud incessit cacoethes, ut scribendi nullus sit finis; cum alii autem prius libros componant, quàm experienciâ propriâ edocti sint, in eis jure merito auram captandi popularem suspicio residet; neque authoribus his fidem omninò tribuamus, cùm Thesis ac Theoriis commentitiis aut fabulis probabilibus nulla adjungenda sit fides: Alii verò longo rerum usu instructi, quæ ipsimet experti sunt, in lucem proferunt: In iis igitur animi magnitudinem inflectamus, in horum verò delictis paululùm cæcutiamus: Nam ii nil certi medicinæ adjiciunt; hi verò mentes medicorum vacillantes stabiliunt: Ii horis succisivis volvendi sunt: Hi verò quotidie seriò legantur & pervolvantur.

Ea est quorundam sciolorum aut inscitia aut pervicacia, ut toti sint in formulis, non remedii specie, variandis; perperam autem famæ consuletis vestræ, quoties vel inanibus istis, imò ineptis, fastûs punctulis vel versutiâ nitimini; cum hæc flagitium indecorum, ille ineptiam insulsam & absurdam sapiat: Fastus itaque hujusmodi

jusmodi à vobis procul amoveatur; estote simul urbani & cauti, palumborum simplicitatem, simul ac colubrorum astutiam æmulamini. Siquando autem cum viris hujusmodi abjectis inimicitias egeritis, vobis certare istis non operæ videtur pretium; nam ubi fides istis unquam adjicitur, ad famam vestram nictu, nutu, imo vel obtutu brevius ac tutius, quam jurgiis itur; quando enim ii dicta vel intellectu haud consequuntur, vel ea saltem insidiosè carpunt; certamen, quod jure inire debent, metus vel inscitia dirimit; syco-phantæ hujusmodi, dummodò nobilium animis præsumunt, ad certamen provocandi sunt, bellum istis, oblata facultate, inferte strenuum: Consuetudini enim ob lucrum malefaciunt; veritatem existimationi mactant: Ut quisquam autem de causâ decretoriè statueret, & à tramite recto non defletheret unquam; veritas & existimatio simul adsint, oportet: Cæterum, uti quod profertur auditorum indoli accommodandum est, ac sicut ii nobis pro existimationis, quam in nos collocârunt, non veritatis modulo, fidem adhibent: Ita veritas non rarò consiliis iniquis deditur, ac proinde comes necnon politioris disciplinæ rudes allucinationi facilè obnoxii evadunt. Exhinc proveniet, ut novi quotannis & insueti morbi à protervis hujusmodi sciolis in medio esse ferantur; ut mendendi intentiones identidem pro viri hujus famosioris, si placet, ingenio varientur, ac, pro eo ut delirat is, plectantur ægroti; ut portenti aliquid naturam corripuisse simuletur; ut natura sibimet tantummodò, non verò turbæ se revelet; ut, infimi subsellii ministri ad vel horum primas tenentium

nentium imperium ingratiis accedant, oporteat. Quanta nunc pericula faciundo fit strages! quot neci per necessitudinis simulationem prius occubaturi sunt, quàm veram expiscentur methodum? Ast apage falsas hujusmodi honoris umbras! Istiusmodi multitudinis venentur plausus; medicinam, vel ad artium viliorum pretium usque, minuant; methodi pro ipsorum arbitrio vel inolefcant vel exolefcant, per bonæ voluntatis medicos liceat; siquidem autem natura usque sibi constat, neque delirat unquam; fieri non potest, ut illa non uniformiter agat; ut non idem cras ac nudiustertius ageret, quod hodie fecerit; ex quo palam est, morbos istos, novos dictos, non aliud esse, atque symptomatum quàm maximè vulgarium congeries alias atque alias; cum ea però à causis fixis initium faciant, causis istis utique methodus unicè aptanda erit: Quanquam igitur ista in infinitum serè variarent, quod inter medicamenta composita apertè fieri demonstravimus; medici tamen sagaciores nequaquam omnino confunduntur; quin uti causarum signa pathognomonica facile perspecta habent, ita veras methodos statim conspiciantur, ut remedia idonea ætutùm seligant: Non igitur hi, quando ex signis apodicticis indicationes suas omninò petunt, ut ex professò ii, alienis sapiunt periculis.

Judicium quod circa evacuantia jampridem^a amplexi sumus, ^bhìc de integro emisimus; olim enim catharsi leni subindè instituendæ, in variolis, emenso inflammationis stadio, graphicè con-

^a Critic. Februm p. 140, ad 143. Ed. 1. p. 142, ad 145. Ed. 2. ^b P. 90, 91.

suluimus; quam sententiam medici celebriores non ita pridem etiam acceperunt, & dilucidè illustrarunt. Ut autem praxis hæc istis malè cesserit, non videmus; quanquam ij ab authore, quinimo Professore, paulò acerbius reprehendantur, quòd neque tot insignia, cladem profitentia, unquam ante suffixa fuerint, quam ut methodus hæc invaluerit: Qui enim fieri potest, ut praxis rationi ac experientiæ maximè consentanea infausstò istis cesserit? Nam fieri non potest, ut tanti viri catharsin institerint, quum venæ sectio, epispastica, Ἐπιστά, vel aliæ evacuationes ostensæ fuerunt: Methodus equidem hæc adeo firmo stabit talo, ut debitè instituta quamplurimum proderit: Hisce igitur medicis, praxi huic indulgentibus, propterea congratulamur; quòd, cum candore agendo, famæ suæ consuluerint.

Nondum opusculum hocce ferè aggressus sum, quum catarrho contumacissimo, phthisin minitante, adeò fui inquietatus, ut noctes per menses aliquot insomnes fermè traduxerim; nil itaque mirum est, prælo, bibliopolâ vehementer instante, interim in librum insudante, si mendæ tot mihi, præ valetudine adversâ, exciderint; quot excidissent, ac si prælo non interfuissem; quamobrem Lectores obsecro benevolos, ut sphalmata graviora dictum in modum calamo prius emendare, quam librum pervolvere dignentur; de levioribus autem, quæso, ista æquo ferant animo.

His prælibatis properandum est ad Proœmium.

DE EVACUANTIBUS,

PARS PRIMA.

Proœmium.



E evacuationibus etiam quædam præfari nobis animus est, ut quæ sumus infra dicturi meliusculè capiantur; quocirca,
1. Evacuaciones in universales, particulares & locales distribuuntur. *Universales* eæ sunt, quæ humores multivarios ex quâvis corporis parte, vel remotissimâ, revocant, præcipuè verò ex parte, cui medicamentum evacuans insidet; hinc erit, quòd emetica humores à ventriculo & visceribus circumpositis præcipuè, at adhæc vel à testibus ipsismet derivent; quod emetica fortiora, sæpius iterata, Hernias *Αφροδιτοκίλας*, *humorales* per improprium dictas, sensim defodiant: Emetica igitur & Cathartica sunt evacuantia universalia, ex eo quod præter ventriculum & canalem intestinalem, etiam alias partes longè diffitas comprimant & plectant. *Particulares* eæ sunt, quæ humores à partibus quibus adhibentur, eliminant, ut & à partibus conterminis revellunt; ea sunt Ptarmica, Apophlegmatismi & similia. *Locales* eæ nuncupantur, quæ humores extra vasa effluos, exhauriunt & educunt, quæque vel medicamentorum vel instrumentorum ope conficiuntur.

2. Ordo Evacuaciones instituendi hic est, ut primùm universales præcedant, ut particulares ac locales deinde ponè subeant.

3. Evacuaciones universales non morbis, qui sunt minùs loco-meabiles, profunt.

4. Humorum eliminandorum quantitatem ex humorum, motuum, ac virium modulo, conjunctim vel seorsim, plerunque metimur.

5. Evacuacionum species ex symptomatum congerie, non medentis delirio, petuntur.

6. Medicamenta, evacuantia humoris exhauriendi qualitatibus omninò repugnent.

Pharma-



Pharmacopœia Practica.

C A P. I.

E M E T I C A.

Fortiora.



ESSENT. Antimon. Emetic. $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}j$. in vehiculo.

R Nitri Antimoniat. $\mathfrak{d}j$. ad $\mathfrak{z}j$. in vehiculo quovis.

R Tartar. Emetic. gr. ij. v. x. in vehiculo.

R Regal. Antimon. gr. ij. iij. in substantiâ; ad $\mathfrak{z}ij$. iij. in infuso.

R Vitri Antimon. gr. i. iij. in substantiâ; ad $\mathfrak{z}ij$. iij. in infuso.

R Sapæ vomitoriæ gutt. v. vin. liliorum convallium $\mathfrak{z}j$. m. f. Emeticum.

R Sulphur. Antimon. gr. vj. Crem. Tart. $\mathfrak{d}\beta$. syr. flor. Pæon. conserv. ejusd. ā $\mathfrak{z}j$. m. f. Bolus vomitorius.

R Tarrar. Emetic. gr. i. β . Tart. Vitriolat. gr. iij. Pulv. Rad. Jalapp. gr. vj. m. f. pulvis.

B

R Mercur.

- ℞ Mercur. vitæ gr. iij. ad vj. in pulpâ pomi.
 ℞ Vin. Emetic. ℥jβ. oxymell. Scillit. ℥j. m. f. potio.
 ℞ Fol. Afar. recent. No. ix. vin. alb. ℥iiij. infundantur
 per horas sex; exprimatur liquor, pro haustu E-
 metico.
 ℞ Turpet. mineral. gr. ij. ad vj. Conf. Lujul. q. f. m.
 f. Bolus Emeticus.
 ℞ Tinctur. Emetic. Boylean. gr. 5. 6. Conserv. Borag.
 ℥j. m. f. Bolus (sit hunc in modum, ℞ Antimon.
 crud. Sp. Sal. ā. ℥ij. ponantur in Retortam vitream,
 in balneo arenæ destillentur, ad ficcitatem; filtretur
 liquor; qui est *tinctura hac Emetica*.)
 Quidam vel *mercurium* ipsum *sublimatum* in substan-
 tiâ exhibere, alii in aquâ fontanâ solutum propinare au-
 dent; ii verò omnes temeritatis eximie jure merito
 arguuntur.

Leniora.

- ℞ Sal. Vitriol. ℔j. 3β. Syr. Croc. ℥j. Aq. Cinnamon.
 ℥jβ. m. f. Potio Emetica.
 ℞ Pulv. Radic. Hypocacuan. ℔j. 3β. ℥j. Syr. Balsam. q.
 f. m. f. Bolus Emeticus.
 Pulveris hujus Indici apud medicos hodiernos adeo
 increbuit usus, cunctisque eorum intentionibus tam
 plenè satisfacit, ut jam quibusvis aliis longè antecellere
 dicatur, palmamque cæteris adeo præripuit ut, aliis
 neglectis, solus ferè adhibeatur.
 ℞ Tinctur. Rad. Hypocacuan. cum Vin. Hispanico fact.
 ℥j. ij. vel q. f. m. f. Potio Emetica.
 ℞ Rad. Raphan. 3β. Sem. Atriplic. 3vj. Fic. concisor.
 No. ij. Contus. coq. in aquâ ad ℥iv. colaturæ add.
 oxymel. Scillitic. ℥ij. m. f. haustus Emeticus.
 ℞ Succ. Cort. median. Sambuc. recenter express. ℥j.
 Syr. violar. 3β m. f. Potio Emetica.
 ℞ Oxymel. Scillitic. ℥iiij. Aq. Raphan. C. ℥ij. m. f. Po-
 tio Emetica.
 ℞ Vin. Scillitic. ℥ij. oxymel. Scillit. ℥jβ. m. f. haustus.

SCHOLIA.

Lectores benevolos minutiis quisquiliisve, in hocce
 libello, haud inturbare volo; methodum enim vero
 pr

pro meâ parte, perspicuam admodum rectæque rationi consonam, quâ ipsis innotescat quænam medicamenta, quæque cautelæ inter usum eorum, adhibenda sunt, breviter ipsis describere mihi animus est; ut tyrones, quorum gratiâ scribo, clarè, tanquam in speculo, perspiciant, *quid* in morbis, totius in medicinæ ambitu, agendum, & *quo modo* in eis procedendum sit.

Emetica ergo quæcunque, per impetum, abdominis musculis impressum, ut & ventriculi compressionem constrictionemque, vasa adeo elidunt, & proindè fluida complexa in vascula succedanea & connexa æquè promovent protruduntque, ut sanguinis in gyrum rotatio non inde mediocriter evehatur; hinc fit, ut in motu ipsius testudineo hosce in fines conducant, viz. ut vasorum elasticitas redintegretur, ut motûs circularis vigor restauretur, ut stagnationes, in arteriis evanescentibus frequentiores, præcaveantur, & denique ut præsentaneæ amoveantur.

Pleuritide decumbentibus persæpe evenire solet, ut pars inflammata pure scateat, in apostema abeat; quod si pus Bronchias versus prorumperet, easque multum inferciret, ægroti, dictum factum, in suffocationis periculum venirent; quod ut præcaveatur, medici munus est, misturam aliquam leniter Emeticam in promptu habere, quâ confestim devoratâ, puris è Bronchiis exantlatio maturiùs inde provocetur; cujus portiuncula residua postmodum per bechica facile amandari, & uti aliis apostematibus solenne est, deinceps ulcus per medicamenta balsamica, absque multo negotio, sanari potest. Alibi verò vobis demonstrare conabor, quâ pulmonum ulcera plerunque insanabilia habeantur, cum tamen organi istius apostemata, imo vel *Vomicas*, brevi tempore curari viderimus.

Uso comparatum est, *venena* feliciter eò expelli, quò intromitti norunt practici; hinc siqui medicamenta quævis *deleteria* deglutiverint, Emeticum, justâ dosi exhibitum, particulas è ventriculo venenosas in totum evocabit; hanc ergo ob causam *Emetia* eatenus protrahatur, quoad *nausea*, *dolor*, *morsusque* ventriculi, ut & *veneni* assumpti *odor saporque* naturalis, penitus evanescant, uti *Sennertus*, *Mercurialis*, & *Sylvius* rite

observaverint; postea aliquanto *antidota* exhibeantur *specifica*, de quibus fusius in proprio loco differemus.

In morbis chronicis, ventriculus saburræ viscidæ alteriusve sarcinâ opprimitur, vasa totius habitûs laxantur, sanguis segniter admodum in orbem pellitur (si minus in cursu suo alicubi interpellatur) viscerumque canaliculi variis obstructionibus referciuntur; tali in statu, Emetico propinato, ventriculus, intestina, pulmones, hepar, cæteraque viscera omnia tantopere quatuntur; ut secretiones, deinceps, naturæ exemplar, exactè imitentur; vasa capillaria enim ex hoc deobstruuntur, liquoribus ferè stagnantibus motus reconciliatur; & hinc fluida adeò attenuantur, ut facilius & expeditius, à volatilibus, aliisque medicamentis reserantibus postea sumendis, defodiantur impedimenta.

Lienteria Vomitoria prodesse mihi usu compertum est; quoniam uti saburrâ mucosâ intestina oblinentem evacuant; eandemque, vasorum lacteorum orificia co-operientem, excutiunt, hîc enim tantummodo de fluidis vitiose affectis sermo est, ita remedia aperientia coagulum residuum faciliè fundent; posthæc chylus vasa chylifera intrabit, ægrotique hunc in modum pristinam valetudinem recolligent; obstructiones autem hujusmodi maturè resistantur, quoniam secus, experto credite, atrophias hydropesve confestim introducunt.

Ubi ventriculus Aquæ onere tantum non obruitur, uti ferè submersis usu venit; methodus expeditior, illis sublevandi, alia non invenitur, quam ut Emeticum lene ægrotis propinetur, & ij per calces suspendantur; his ita confectis, non ventriculus duntaxat quin etiam bronchiæ sarcinâ sibi sat molestâ, extrudent; posthæc, remedia cardiaca, & reficientia introsumentur ad spiritus refocillandos, & ad circulationis ferè extinctæ cursum renovandum; porro frictiones usurpentur universales; cum hæc fecerint, nihilo vero minus ægroti mortem oppetant, officio functi sunt medici.

Cerebrum materiâ lentâ & subsistente, oppleri, omnes, in morbis soporosis, iisque affinibus, viz. lethargis, comatibus, apoplexiis, paralytibus aliisque id genus, unanimiter conveniunt; his in morbis, Emetica vasa concutiunt, sanguinem impetu quodam circum-

rotari cogunt, impedimentum quodcunque amoliuntur; & ita remediis motum invigorantibus, postea administrandis, viam sternunt; cujusmodi sunt salia volatilia, stimulantiaque cujusvis speciei, epispastica viz. &c. Danda tamen est opera, ne ægroti, quibus talia adhibentur, repletionem prius obruantur universali; quoniam in hoc rerum statu, vis impellens, sanguini impressa, vasa disrumperet; adeoque ægrotantes infausis diruerentur.

Impetus qui aliis visceribus virtute Emeticorum imprimitur, pulmonibus itidem usque communicatur; ubicunque igitur bronchiarum parietes pituitâ glutinosâ, ipsis firmiter adhærescente, obducuntur; quæque bechicis, vulgò hunc in finem assumptis, haud abundè satis excutitur; Emetico facile, cum eventu prospero, exantlari potest; quoniam vasa, viscera, pulmonesque ab hujusmodi conatu, jugiter emunguntur; *Sydenhamius*, *Æsculapius* nostras, hâc, ut opinor, de causâ, equitationi in phthisi (asthmaticâ?) jampridem consuluit: ita enim quovis equi succussu organum hocce valide quatitur, & materia, usquequaque glandularum orificiis agglutinata, exhinc facile dimittitur; hoc dudum practicis adeo indubitanter innotuit; ut pariter gonorrhœâ virulentâ mulctatis, Emetico forti, ex *turpeto minerali mercuriove precipitato viridi*, propinato, liquamen corruptum aliquandiu copiosius rapidiusque jugiter indè effluere solenne sit.

In febribus intermittentibus non solum faburra in ventriculo hospitans, illinc facili marte per Emetica elutriatur; quin etiam particulæ sanguinis viscidæ inde comminuuntur, attenuantur, perque vasa capillaria propelluntur; & inde corticis peruviani administrationi via sternitur; quoad exhibendi *occasionem*, detur Emeticum horâ unâ vel alterâ ante paroxysmi accessionem; quoniam impetus, quem imprimit, commotioque, quam in humoribus ciet, paroxysmum proximè sequentem prohibere valent; saltem eum cito finire cogunt. Exploratum habemus, Emetica febres intermittentes absque corticis peruviani ope sæpius profugâsse; præsertim ubi materia morbifica haud multum abundare deprehensa fuerit; hinc paroxysmo septimo vel octavo

Febres hæc rarò supersunt, ni altius radices egerint; tum absque Emetico præmissò, haud auferri possunt.

In scorbuto vel malo hypochondriaco, ubi sanguis ut & ventriculi intestinorumque canalis saburrâ biliosâ, limosâ, acidâve scaturiunt; utriusque penus ab Emetico plenè exhaurietur, hoc vero notandum est, quod quandoquidem Emeticum sanguinis acidi limosique circuitum accelerare patet; idcirco biliosis haud adeo prodest; quoniam globulos sanguineos nimium comminuit, sanguinique jam nimis accelerato calcaria addit; hinc fit, ut temperamenta, *acida* dicta, Emetica fortiora sat bene ferant, cum biliosa & calida, talia possulent, qualia ventriculi parietes bilioso humore solummodo expedient.

Alicubi observavi Emetica abdomen inter vomendum, multum comprimere; & proinde quicquid uteris, intra se, complectitur, æquo tantoque conatu, ac si manibus fieret, exprimitur; hinc fit, ut si secundina diutius, quam par sit, retineretur, eò feliciter tum exhibentur, quò ista efficaciter elidatur; idem porro de *fœtu* mortuo perhibendum est, cujus retentio intempestiva febres puerperas, pestes sororum dictas, aliosque id genus morbos periculosos certissime introducere valeat; hoc autem artificio os uteri internum musculorum coarctationi infantisque ponderi, eorum scilicet viribus unitis, facile cedit; infansque mortuus exinde eventu felici deturbabitur.

Humores admodum acres in ventriculi intestinorumve cavitatibus hospitantes, ipsorumque parietibus firmiter adhærentes, sensationes permolestas sæpius suscitasse novimus; quibus ita, in partibus membranosis nervosisque, productis, ut vel ipsemet contactus spasmos inducere valeat; in convulsiones, epilepsias, aliæque id genus *νοσήματα* facili marte conjiciuntur ægroti; rebus sic se habentibus, uti *opiata* spirituum tumultum motumque turbulentum frequenter amovere experti sumus, ita Emetica etiam, materiam acrem sæpius abstulisse comperimus; quibus causis conjunctis & proximis ita feliciter expeditis, symptomata omnia deinceps sponte cedent. Quid tum posthæc reliquum est, nisi ut in usu anti-acrium simulque opiatorum diutius persi-

stant ægrotantes, quibus, quæ velint consequantur ?

Uti suprà materiam qualemcunque è communi ventriculi intestinorumque canali evacuabilem esse suggesti, ita saburra cujusvis speciei, ructus, nauseas, flatus, borborygmósve excitans, per Emetica opportunè exantlari potest (modo scitè tamen exhibeantur próque re natâ repetantur;) hinc *colica* diuturnæ & inveterascentes, medelâ earum multifariâ at incassum molitâ, Emeticis sæpius cedere novimus; quoniam hoc modo, eorum sc. efficacîâ & impetu, glandulæ muco suo morbo orantur; quæ cathartorum energiæ cedere recusabant; inde est, quod humor noxius penitus excutatur, exprimatur; quem nodum, cum attigerint medici, quod reliquum est, catharticis lenibus, remediisque carminantibus facile compleri potest; symptoma hocce mulieribus obstructionibus laborantibus virisque hypochondriacis non infrequens est.

Ascites laborantibus vasa lymphatica, saltem venæ, in vasa succedanea, arterias sc. non rectâ sanguinem propellunt; hinc hydatides vel in immensum quandoque expansæ, frequentius occurrunt; quæ quotidie augescentes vascula teneriora adeo distendunt, ut tandem ea diffringant; indeque liquor qualiscunque in cavitates non potest non effundi; uti ruptura hæcce haud facile refarcitur, ita confirmatus tandem nascitur ascites, qui reverà à medicamentis catharticis haud multum emolumenti recipit; ejusmodi enim remedia intestinorum glandulas irritando, arteriolasque emulgendo, humores exinde solummodo exhauriunt; hinc ridiculum sane est asseverare, massam depravatam, in cavitate subsistentem, per ea posse exantlari; sæpius equidem, Emetica, cathartica, diaphoretica, diuretica quibusdam hydropicis apprimè profuisse compertum est; hoc vero præsertim fit, ex eo quod vasorum liquores pene stagnantes, in motum denuò cieantur; unde fit, ut glandulas ventriculi, intestinorum, cutis, renûmve subeant fluida, easque irritent & emulgeant; imo vero quandam novi mulierem hydropicam, mole prægrandem, quæ, à lapsu, confestim exinde urinæ affatim excrevit, imo quæ congios septem intra horas 24 æquavit; deliquia huic (infortunio?) succedentia, à vino

Hispanico,

Hispanico, Gelatinâ C. C. cum confectione alchemi. simul mistis maximoperè allevabantur; & ita morbo, per annum integrum, liberabatur; procul omni dubio serum hoc in casu, propriè non extra vasa effundebatur, quin potiùs in cysti quadam continebatur; cujus ramus aliquis renes versus respiciebat: & uti Ganglion à percussione validâ, quâ humores intra tendines subsistentes in vasa remeare coguntur, sæpius subsidere vidimus; ita compressio hæcce, à casu, fortuita, obstructionem eam tantoperè amovit; ut cataractis demum indè referatis, fieri aliter non potuit, quin evacuatio isthæc, semel inchoata, in cursu suo ad tempus perseveraverit. Dominam aliam insignem, ascite laborantem, novi, quæ jugiter, à partu, serosi humoris quantitatem sat copiosam ex utero ejicere solebat, ex quâ abdominis tumor multum subsedit; hodiè verò, cum propter ætatem paulo provectiorem, ultra imprægnari desierit, morbus hicce magnoperè increbuit: cujus phænomeni causam si paululum indagemus, nobis, uteri structuram diligenter perquirentibus, facile patebit: iter enim ex omni parte, nisi quâ *tuba* illi inferuntur *fallopiana*, pro aquarum exitu usque adeo interclusum reperiemus, ut nusquam nisi per eas, in uterum vaginamque, humor iste exire, evacuari, poterit. Hinc hydropes inter initia vel augmenta Emetico facile eludi queunt, ex eo quod obstructions omnino recentes remedii impetu facillimè referentur; quæ tamen, cum radices egerint altiores, minimè removeri possint: brevi igitur, in ascite confirmato, paludem in abdominis cavitate subsistentem nec Emetica nec cathartica exhaurire valent: inter initia quidem obstructions, in arteriis evanescentibus productæ, denuo per Emetica in motum concitari queunt, horumque vasorum *rixis*, à tensione nimia inducta, hunc in modum præcavetur; cæterum si progressu temporis firmatus sit morbus, hoc est, si vasa disrupta sint, serumque exhinc in abdominis cavitate expuatur, Emetica exinde liquorem nunquam depromere queunt; omnimodâ enim compressione, ut vobis videbitur, usurpatâ, vasa omnino nusquam liquores hosce de integro recipient.

Ubicunque vomitioni proclives sunt ægroti, naturâ monstrante viam, eam promovere studeamus; hinc in cholera morbo, ubi humorum biliosorum acriumque copia adest, vomitionem, aquâ pulli, fero lactis, aquâ hordei similibusque leniter pergere faciamus; ventriculo hunc in modum luculenter lavato; decocto albo, haustibus attemperantibus cum & laudano opiato mistis utamur, usque dum cessaverit evacuatio: hoc autem, eâ duntaxat lege, intelligendum est, ut si maturius accersamur; quoniam si evacuatio hæc eo usque duraverit, donec spiritus pene fuerint extincti; nil ulterius agendum restat, nisi ut cardiaca cum opiatis simul exhibeantur; his nimirum de causis, ut spiritus refocillentur & ut irritatio pacetur.

In deliriis citra febrim, melancholiâ scilicet, & quibusdam aliis desipientiis, Emetica multum, etiam repetita, prosunt; primum quoniam fomitem è ventriculo exhauriunt; deinde quia motum sanguinis progressivum magnoperè intendunt; nam in deliriis hisce melancholicis fomitem ut plurimum & primitus in stomacho intestinisque tenuibus hospitari compertum est; qui vasa lactea intrando, massam sanguineam omniâque secreta corrumpendo, succos nutritios primum congelat, deinde subsistere cogit; his ita se habentibus, accescunt stagnando liquores, adeoque viscera quam maximè lancinant; & symptomata varia pro organi functionisque modulo inducunt. Exempli gratiâ, *ventriculum*, a dyspepsiâ, diarrhœâ, vomitione colicoque dolore, lædi percipiemus; *pulmones*, ab asthmatibus, tussibus, expiratione vel inspiratione læsis, multum incommodari noscemus; *cor*, pulsu variato, se ægrotare manifestabit; *lienem*, à dolore gravativo in hypochondrio sinistro aliisque signis, obicem sanguinis motui circulari poni demonstrantibus, laborare facile augurabimur; *cerebrum* denique, à deliriis, convulsionibus, paralytibus aliisque id genus symptomatibus, motum vel sensum ferientibus, affici patebit: in maniâ verò præcipuè conducunt, ex eo quod spiritus (præsertim ubi frequentius, uti solenne est, repetantur) apprimè deprimunt & exhauriunt; ideoque morbi hujus sanatio ut plurimum vel medicis quibus *Μακροδοχία* curæ sunt,

sunt, vel etiam empiricis solis, consultò permittitur.

Bilem in corporis habitu scaturientem tutò feliciterque evacuare licet; inde est, quod Emeticum assumptum (lene autem sit) vesicæ felleæ penum exprimat; unde portio quæ superest, perexigua, haud ita multo post facillimè *κᾶρα* eximi poterit; si igitur cephalalgia biliosâ quisquam ægrotet, quamvis tum sanguis paulo rapidius circumgyretur, vel etiam fibræ perinde ac membranæ corrugentur, tamen Emetica hoc in casu magno sunt usui, ex eo quod causâ morbi mediata prius amotâ, proxima deinceps facili marte auferetur.

Eruptiones nusquam apparent, nisi ubi circulationi, in vasis minutulis, particulæ lentæ impedimento sunt; quippe sanguine ex ordine moto, vascula minora, quæ recipiunt fluida, ex æquo remeare sinunt; nec tum tubercula pustulæve nascentur ulla; quamprimum vero arteriæ minores officio suo, sanguinis nimirum ad extrema pulsioni, defint; tum sanguis reliquus, à retro premens, cutim immane quantum inflabit, & efflorescentiæ, eruptiones, pustulæve, pro humoris peccantis more, in aprium proferentur. Quandoquidem igitur Emetica gyrum sanguinis invigorant, lentorémque omnimodum attenuant, sanguis exinde placide circumagetur, similibusque symptomatum curationis fundamenta jacentur; hisce deinde præmissis, aquæ benedictæ compositæ usu ad tempus, proculdubio, evanescent; modo subinde catharticum exhibeatur lene; & modo unguentum ex mercurio præcipitato albo cum unguento pomato misto unâ mane & vespere pustulis illinantur; sic enim pustulas faciei, vel pessimi moris, disparere novimus.

Vomitiones criticæ, sinantur, imo promoveantur; quoniam dum criticæ persistent, quod noxium, corpori inutile, totoque genere, præter naturam est, expellitur; ventriculo demum, abundè satis exhausto, opiata exhibeantur.

Quicquid suprâ, de secundinarum expulsionem protulimus, id omne de partu difficili verum esse pronunciamus; Emetica ergo hâc de causâ in eo magnopere conducunt; eâ tamen lege, ut postura infantis exitui idonea

idonea sit, scilicet modo caput pedesve meatui orificioque se primum in conspectum prodant.

Emeticis assuefacti, vomitionibus diuturnis vexati, ea facillimè perferre valent; ideoque quandocunque in hujusmodi ægrotis indicantur; sine ullâ dubitatione exhiberi possunt.

Profluvia ventris ab Emeticis maximè adjuvantur; *Riverius* ut & *Nich. Piso* in intestinorum difficultate, seu Dysenteriâ, Emeticis consulunt, modo ventriculus canalisque intestinalis humorum saburrâ oppleantur; & modernus iste *Helvetius*, *Parisiensis*, radicis *ipocacuanha* usum (*biquinuli* ab Indis nominati) in dysenteriarum curâ feliciter introduxit; qui humores à parte affectâ efficaciter adeo revellit, ut deinceps, sanguinis missione jugiter præmissâ, facile curari possit; huncque in modum, ni intestina graviter afficiantur; (scilicet, ni adsint tormina horrenda, ni carunculæ, cum sanguinis jacturâ maximâ, excernantur, & denique ni febris admodum æstuet) quam expeditissimè sanetur.

Qui victu lauto indeque mucro acri ventriculum onerârunt, à frigore suscepto, tussi vehementi sæpius vexantur; hujusmodi catarrhi phthises ut plurimum minantur, præcipuè vero si juvenibus eveniant. Emeticum maturiùs aliquantulum in his requiritur, ut fomes è ventriculo exhauriatur, evocetur (*V^æ. Sⁿe.* prius sæpius pro re natâ celebratâ,) deinde cathartica, cum opiatistis mista, noctu (horâ nimirum decubitûs) per vices aliquot adhibita, perinde ac pectoralia uno eodemque momento propinata, curam perfectè absolvent.

Eximius ille practicus *Baglivius*, in febribus syncopalibus, singultuosis, vertiginosisque Emetica collaudat; hisce in casibus anxietudines, inquietudines, agitationesque queruntur ægroti; veruntamen, nisi hujusmodi symptomata ab humoribus intra ventriculum hospitantibus originem ducant, quippe phænomena prænominata sunt admodum ambigua, falli haud arduum erit.

Tournefortius, insignis botanicus, in temperamentis humidis pinguibusve, Emetica deprædicat; quandoquidem istiusmodi pituitâ maximè abundant; Emetica non quantitatem tantummodo evacuant, quin etiam alliotti-

corum

corum vices gerunt, quippè quæ motum circularem, torpidum admodum, de integro invigorant.

Quandocunque pus in phthysicorum bronchiis, citrà vero expectorationem, respiratione difficili tum inde stipatam, fluctuare liquet; Emeticum lene, puris expectorationem provocando, suffocationes ab ejusdem retentione productas iri, multum adjuvat: danda tamen est opera, ne vomitionis nixu hæmoptœen inferamus: unde consulatis, quæ dicuntur supra de pleuritide.

Quibuscunque pustularum inflammationûmve maturationem retardare animus est; aliud necesse non est, quam ut Emeticum propinetur; hinc in bubonibus, in pustulis variolarum maturescentibus, ni à gravi quovis symptomate, suffocatione, cæterisque id genus requirantur, cautè admodum evitentur Emetica.

Mihi quidem videtur paroxysmos accessionesque arthritica, non modò à victu malæ indolis magnoperè intendi, quin sæpius etiam hinc revertere; exindè est, ut eis opimi opibusque beati, quam quibus res est Augusta domi, gravius & asperius vexentur; quoniam humores quos divites quiete cumulant, pauperes motu exhalant; hinc in proverbium cessit, arthritidem otio primordii sui acceptum referre; hincque est quod practicus ille felix Joh. Jac. Waldschmidius, eò Emetica in arthriticis repetitim administrari vellet, quò repletio, à victu otioque inducta, plurimùm exhaustiretur. Ridiculum sanè est, ut circumforanei adeo de medicamentis suis, si diis placeat, specificis garrire audeant, ut arthritidem iis cum ex integro depellere polliceantur! quandoquidem nec Emetica, nec cathartica nec amara nec quævis alia ejusmodi specifica nobis hucusque patefacta, & vel nimium deprædicata, hunc in finem, hilum, quod sciam, unquam profecerunt: ast, ut verum fateamur, quandoquidem accessiones arthriticæ eam ad morbos chronicos, quam sudores critici ad febres, habeant rationem; ita pleròque morbos diuturnos vel sanat arthritis, vel saltem eis nullo antevertit negotio: siquis reverà viri expertissimi Dni. Dris. G. Musgravii tractatûs de arthritide consulat, assertioni huic nostræ fidem longè faciliùs adhibebit.

Hippocrates, medicorum princeps, Emetica in symptomatibus sequentibus indicari rectè affirmavit, ait enim, ^a *Non febricitanti appetitus dejectus & oris ventriculi morsus & tenebriosa vertigo, & os amarefcens, sursum purgante opus esse indicant. Aphor. 17. Sect. 4.* Ejusmodi enim symptomata saburram aliquam in ventriculo latitare planè denotant; gulæque canalis expeditior longè est via, quâ ista faciliùs evocetur; unicòque Emetico plus tum, quam cathartico quolibet cunquè, vel decies iterato, efficiemus: Idem Hippocrates, *Aphor. 6. Sect. 4.* inquit, ^b *Graciles & facilè vomentes sursum purgandi, vitantes hyemem; & Aphor. 18. Sect. 4.* ^c *Supra septum transversum dolores sursum purgante opus esse indicant.* Effata hujus authoris divini summam igitur recapitulemur; symptomata, ventriculum laborare denotantia, purgatione, eaque *ἀνω* factâ, evacuari requirunt; manifestò verò canalem huncce hisce laborare evincitur, quandoquidem hæc sunt organi hujus *idiopathicè* laborantis signa pathognomonica.

Quicumque facilè vomunt, Emetica jejunè devorent; quippe ventriculus contentis vacuus per medicamenti acrimoniam ocyùs vellicatur; humoresque inde confestim abluuntur. Qui verò, è contra, non sine labore vomunt, Emetica non priùs devorent, quàm lautè aliquantulum pransi fuerint; propterea quod edulia Emetici aciem obtundant, & obvolvunt; hinc posthæc ventriculus sarcinam suam nullo negotio evomere observabitur.

Febricitantium ventriculi, ex usu fructuum horæorum frequentiori, humorum crudorum copiâ impensè onerantur; ventriculosque istiusmodi ægrotorum, hæc e causâ laborantium, (ut patet à vomitione, nausæâ, uctibus, distensione, anxietudine, similibusque) Emetico exonerare apprimè convenit; quoniam sic in poterum vomitibus, diarrhœis, aliisque ejusmodi, humo-

^a Ἀπυρέτω ἐόντι, ὅποισιν ἔχει καρδιοσμός, ἔχει σποτόδινον, ἔχει στόμα πικρόμελον, ἀνω φαρμακείας δεῖσθαι σημαίνει.

^b Τὰς ἰσχυρὰς ἔχει θιμῆας ἀνω φαρμακείαν, ὑποσελλομένης χειμῶνα.

^c Τὰ ὑπὲρ τὴν φρενῶν ὀδυνήματα ἐκίσα καθαίρεισθαι δύνανται, ἀνω φαρμακείας δεῖσθαι σημαίνει.

rum putrilaginem denotantibus, maturius occurritur; quibus sic se habentibus, spirituum oppressio tunc passim obvia feliciter evitari queat; quippe palam est, chylum illicò cum sanguine confundi, hinc fit, ut vel febris *ardens*, (*Καὶὸ* dicta,) vel *maligna* (*Κενώδης*) inde introducantur; hincque phrenitides, hæmorrhagias, convulsiones, deliria hæctica, vel similia, certò certius subsecutura, præveniri reperimus; quoniam febribus vexatos vel spirituum oppressione vel eorum penuriâ jugiter emori pronunciamus.

Herodotus æquè ac *Mercurialis* ad valetudinem firmam perennandam, Emeticum, in menses singulos, propinari volunt: Fatemur equidem, quòd regioni nostræ consilium hocce penitus accommodari experiamur; ex eo quòd ingluvies, apud nos paulò usitatior, id obnixè efflagitet: Hinc practico quodam felicissimo per quadriennium familiarissimè usus sum, qui vel à minimâ liquorum intemperantiâ, misturâ, ex aquâ tepidâ cum olei pauxillo, sarcinam extemplò remeare coegit; vitâque exindè, ad annum octogesimum usque adeò sanam protraxit, ut senectute reverà viridi jure merito continuò potiri diceretur.

Juxta tritum illud adagium, *nil prodest, quod, non ledere possit, idem*: Hinc quandoquidem de commodis ab Emeticorum usu hætenùs verba fecerimus; reliquum est, ut paulò accuratiùs damna ab iis, subinde illata, etiam advertamus: Plethorici igitur eâ de causâ Emetica prospero eventu haud omninò ferunt; quòd, cum istiusmodi vasa humoribus scaturiant vitiosis, impetum ab Emetico impressum haud adeò impunè tolerant, quin vel sanguinis effusiones horrendæ, vel obstructions obstinatæ exindè fatalitèr eveniant: Hinc fit, ut in hæmoptœe rarò aut nunquàm in usum vocentur; quoniam vas jamdudum apertum penitus disrumpetur; & idcirco sanguis in totum effunderetur: Si excipias tamen, ubi ægroti præ bronchiarum oppletionem (à sanguine, in eas extravasato, introductâ) in vitæ discrimen adducuntur; hoc enim in casu, Emeticum lenè, citra tamen ulterioris vasis disruptionis periculum, apprimè conducere poterit; quale nimirum in empyemate jamjam rupturo medici usurpant; sit sc. oxymel,

fit

fit aqua cardui, fit infusum thea (*singlo*) vel similia; quorum tamen in usu diutius, quam par est, nullatenus persistendum est; quumprimùm enim bronchiæ deplentur, deinceps ab ulteriori Emetici usu desistendum est.

In linguæ paralyfi *Forestus P. j. p. 428.* Emetica vituperat; cujus causam non subjungit; ast, si conjectare liceat, sententia nostra hæc est; obstructio in paris quinti ramo per concussionem adeò validam altiùs longè infigitur, saltem nervus in dilacerationis discrimen adducitur; si nervus idcirco dilaceretur, paralyfis indè orta, nunquam deinceps auferri potest; remque sic se habere ideò suspicamur, quia quandoquidèm lingua, inter vomendum, magnoperè elongatur, ab eâque obstructione unà relaxatur; ab elongatione ulteriori vel ad dilacerationem usque protenditur; vel enim Emeticum nervo humores irrecuperabiliter impingit, vel illum immane quantum relaxat, imo sæpe sæpiùs dilacerat.

Imbecillis infantulifve rarò propinentur; ii enim, cum vel spirituum inopiâ infauστâ laborent, vel nervis potantur fragilibus, facilè à conatu tanto diruerentur.

Graviter vulneratis, duplici de causâ, obsunt Emetica, primùm quoniam sanguinis massam paulò rapidiùs circumagitant, deinde quippè unitioni impedimento sunt; uti enim vulnera, quamdiù membrum vulneratum continuò movetur, persanari nequeunt, ita pariter Emetica, sanguinem in vasa validiùs impingentia, unionem omninò disgregant.

In vomitu *symptomatico*, sic se res habet, humores, in ventriculi plicis hospitantes, fibras ejus membranceas admodum irritant; nervi porrò sæpiùs contracti, ac convulsivos ventriculi partiumque propin quarum motus producentes, vomitionem cient; quæ ideò *symptomatica* appellatur, quia ægrotantes nil indè commodi percipiunt: Emetico hìc propinato, humores isti ejiciuntur, causa adeò evelletur, ut remedia deinceps alterantia faciliùs prodesse valeant: Ut plurimùm tamen parùm proficiunt; quoniam humores potiùs aliò derivari debent, *antispasmi* enim moliminibus, à naturâ alienis, apprimè accommodatur; deinceps misturas anti-emeticas, ex *syrupo limonum*, *sale absinthii*, *opiòque*, cum aquis quibusdam destillatis, maritatis, propinare condu-

cit: In malo tamen hypochondriaco, chalybeata eò subindè exhibeantur, ut lentor, aciditas, humorésve hisce analogi, penitus auferantur.

In herniâ intestinali, *enteroceles* dictâ, ubi intestinum *ileon* in scrotum descendit, ex eo nimirum, quòd peritonæi duplicatura aliquantulum relaxetur; uti necesse est, ii à motu omnimodo abstineant, ita etiam Emetica tum sedulo evitentur; quoniam cum motum abdominis compressivum, quo intestina in scrotum deciderant, admodum adaugeant; gangrænam, inflammationi succedeaneam, mortemque indè inferremus, & acceleraremus; undè manifestò liquet Emetica haud esse in enterocèle proficua: Quamvis igitur authores nonnulli eorum, hoc in casu, usui nominatim consilere haud dubitant; nequaquam tamen iis assentiri possumus; à posturâ enim supinâ & reclinatâ, natibus capite elatioribus, tegulâque calefactâ soleis diutius admotâ eam reponi felici eventu jamdudum novimus: Posturam tamen unam, citra topica (ex herbis discutientibus, cum lino neto, lactéque conflatis, coctisque) sæpè huic oneri omnino imparem fuisse comperimus.

Pulmones, utpotè laxi & teneri valdè, medicamenta validiora, propter impetum nimis violentum eis exindè impressum, haud facilè ferunt; hinc fit, ut commotio, quâ sanguis circuire cogitur, vascula dilaceret, hæmoptoésque simul ac ulcera ibidem inferat; quæ, propter motum, quo gaudent pulmones, perpetuum, rarò aut nunquam ferruminantur. In morbis etiam eorundem inflammatoriis maximoperè obsunt, quoniam quieti, isto tempore perquam necessariæ, admodum opponuntur; quamobrem Emetica in pleuritide propinare praxis malè instituta est; quandoquidem dolores pleuræ exindè magnoperè & intendi comperimus, & symptomata deindè fatalia utplurimum inferri observavimus; ex eo quòd particulæ lentæ in vasorum conicorum vertex validius exinde impellantur, hinc est, quòd *Ru-landus* minus ignoscendus sit; qui etiam à tyronibus nec imitandus, nec à senioribus propugnandus est; si tamen excipiamus pleuritides malè judicatas, & in empyemata statim migraturas, uti fusiùs jam suprà demonstravimus.

Emetica,

Emetica, quidem in utero gerentibus quandoque ostenduntur; ut ut cautè admodùm hâc in re procedendum est, quoniam quotidianus docet usus, abortum certò certius indè promoveri; hinc *abundans*, hoc in casu, *cautela non nocet*.

Emeticorum usum in sanguinis vomitu tyronibus interdicere supervacaneum esse ducimus; quippe in eo, sequentia, V. Snc. pro re natâ præmissâ, primùm solummodo conveniunt; *Bolus* sc. *armena*, *terra sigillata*, *terra lemnia*, *sanguis draconis*, *saccharum saturni*, *spiritus aceti*, *spiritus vitrioli*, *conserva rosarum*, *cynobati* & similia, in haustus, electuaria, pilulâsve redacta, exhibeantur; deinde lenientia saburram è ventriculo putridam (vasè imprimis clauso) elutriare valent; quòd si vomitus hicce ab humoribus, magnâ ex parte causticis vasâque erodentibus, ortum ducat, tum porrò lactea, aquæ martiatæ, pulveres testacei & istiusmodi attemperantia sedulò simul exhibeantur.

Uti Emetico ventriculi tunicas dilacerare periculosum est, ita, pari ratione, scirrhus polypove pyloro adnascentibus, ab Emetico propinato quosdam vitam cum morte commutâsse novimus; hâc nimirum de causâ, quoniam ulcusculum, inde natum, nunquam deinceps sanari poterat: Præstantius igitur quandoque est, ut medicè vivant quàm miserè moriantur ægroti.

Quandoquidem hystericæ jure merito imbecilles habeantur, idcirco Emetica, hoc in casu, quidam evitare consulunt; quòd si in ejusmodi morbo manifestò indicentur, etiamsi multùm invaluerit morbus, Emeticum lene, experientiâ duce, propinare licet.

Usus solus docet, quinam Emetica ægrè tolerant; si igitur à morbo indicentur, laborantibus tamen, ob spirituum inopiam, contra-indicentur; tum ab eis omnino temperare satius ducimus; quorsum enim, ut morbum auferamus, ægrotos trucidabimus?

Etiamsi motum antiperistalticum moderni quidam obnixè renuant, nihilo vero minus, veluti ventriculus, inter vomendum, validè satis (uti sanioribus videtur medicis) à musculis abdominalibus comprimitur; indeque fit, ut liquores, in eo contenti, manifestò exprimantur; sic haud ineptè affirmamus, fibras ventriculi

nervosas adeò vehementer exinde corrugari, ut motus earum peristalticus inde non solum resistatur, verum etiam jure merito inverti censeatur. Quandocunque igitur alvi obstructio, ex motus peristaltici segnitie, obvenit, Emetica maximè obesse observantur; hunc enim in modum passionem iliacam, quæ non aliud est quàm colica paulò obstinatio, introduceremus; hoc igitur in casu, enemate fortiori (eò injecto, ut fæces primum amoveantur,) præmissio, Emeticum deinceps multum prodesse advertitur.

Humores in Anginâ, in Laryngem, Pharyngem, musculosque, istis in locis, insertos, decumbentes, deglutitionis respirationisque in eis læsorum causa sunt; & quanto plus tumor inde augefcit, tantò magis in periculum veniunt ægroti; Emetica igitur Anginæ propterea valdè obfunt, quòd sanguinis motus progressivus exindè multum intendatur; ac ita obstructioni jam ortæ impedimentum validius superaddendo, suffocationi porrò ansam præberemus.

Oculorum morbis nocent Emetica, quoniam humores, jam subsistentes, copiosius ibidem accumularentur, quam organum adeo delicatum ferre quiret; hinc suffusiones, sanguinis in eos effusiones, hypopya & hujusmodi incommoda certò certius succederent.

Cùm Emetica in phthisi hi laudent, illi vituperent: controversiam hanc paucis verbis illustrare conabimur. Phthises enimvero aliæ hæreditariæ, aliæ vero accidentales sunt; ægroti, parentibus infirmis admodum orti, temperamento itidem plerumque delicato morbisque parentalibus, quicquid alii contra sentiant, obnoxio gaudent; si igitur phthisi decumbentes, hâc de causâ, gravi & immani certè, laborent, Emetica adeo non prosunt, ut ejusmodi ægrotis maximoperè obfint; quoniam cùm pulmones eorum ab humorum acrimoniâ valde erodantur, & tantum non consumantur, Emeticorum efficaciam fatalem haud facilè effugiunt; ubi vero temperamenta adsunt saniora (sanguinis balsamici copiâ, fibrisque firmis & rigidis gaudentia,) ubi ea ab aëris injuriâ oritur, & ubi ventriculus viscidâ repletur saburrâ; quum equidem res sic se habet, tussisq; tum quosdam corripit; Emeticum ejusmodi catarrho tan-

topere

toperè opitulatur, ut V. Sⁿe. præmissâ, facilè deinceps sanari queat: Cavete tamen, ne hæc de phthisi confirmatâ dicta intelligatis; quoniam uti sæpius in organis inflammatis suprà Emetica obesse observavimus, ita nec hic incommodis ejusmodi remediis consulere audemus.

Febri hecticæ vel temperamento istiusmodi obnoxii Emetica ægrè ferunt; nam si sanguinem jam nimium excandescens, ulterius vehementiùsque agitaremus, præ additamento gravi malorum cumulum augeremus; exinde enim sanguinis acrimoniam eveheremus, spiritùsque penitus exhauriremus.

Etiamsi *Hippocrates*, uti suprà observavimus, sursum graciles purgari jubet; hoc tamen haud perinde intelligi debet, ac si diceret, graciles idcirco sursum purgandi sunt, quòd graciles sint; hoc ridiculum sanè vel ipsis tyronibus, ni fallamur, videbitur; vult igitur ejusmodi homines Emetica cum tolerantia tantummodo perferre; *occafio* verò & *tolerantia* nullam habent inter se cognationem; nisi igitur gracilium ventriculi muco aliâve humorum copia redundant, Emetica, pro suarum virium modulo fibras erodentia damnum certò certius inferent.

Ii, quorum pectus male conformatur, Emetica hisce de causis tolerare nequeunt; primùm quia hujusmodi structura nullo negotio per medicamentum paulò asperius distorqueri possit; deinde quoniam, exiguo nimis thorace, sanguis, ab Emetico devorato, eò in motu suo intenderetur, ut vascula delicatiora diffringerentur, uti aliquoties, alienis periculis, experti sumus. *Tournefortius* & *Ettmullerus*, etiam hæc in re, ex omni parte, nobiscum conveniunt.

In *Catarrho suffocativo*, sanguis pulmones versùs, cursu concitato, rapitur, laborantesque hujus copia tantum non obruuntur; hoc in casu, phlebotomia idcirco iteratò celebranda est, quòd influxus sanguinis copiosior inde præcaveatur, & eodem tempore effervescencia compescatur; Emetica igitur hoc in morbo periculum eà minantur, quia utrumque adaugent; quam ergo authores quidam, iique moderni, usui eorum nunc consulere audeant, hi tamen omnino non

audiendi

audiendi sunt; ratio enim & experientia quotidiana praxi huic palàm adversantur.

In gravidis à primo ad tertium usque mensem, Emetica lenia, si manifestò indicentur, administrari tutò queunt; à quarto verò ad nonum usque, omnino non adhibentur: Quoniam uti præ mole infantis indies auctiori compressio quævis facilè deprehenditur, ità abortûs periculum minatur.

Joh. Jac. Waldschimidius in vomitione nimiâ, ab Emetico propinato ortâ, spiritûs vini cochlear unum dari jubet; hoc verò parùm in hujusmodi anacatharsi, ab antimonialibus excitatâ, citra salis culinaris vel alterius cujusvis acidi tantillum, valere reperietur; quippe, hoc modo, antimonii partes sulphureæ eò exinde figuntur, ut irritatio molesta, ab hujusmodi particulis orta, facilè deinceps demulceatur: Simili modo, *Walleus method. medend. p. 50.* Particulas *Gutta Gamba* vel etiam *mercurii vitæ* aculeatas à crystallo martis tantopere obvolvi, ac obtundi affirmat, ut vomitio posthac omnino præcaveatur.

Dekkerus, scitè admodum, *antimoniata*, ante usum eorum filtrare jubet: Alioquin enim particulæ eorum graviores & duriores, vino intimiùs permistæ, vehementius & diutiùs, quam par est, vellicarent.

Ettmullerus liquoris assumpti solummodò, non verò antimonii quantitatem respicere vult; Vomitionem enim non magis à scrupulo antimonii, quàm granis ejusdem sex infusis, promoveri asserit; hinc fit, ut vinum Emeticum, in quo croci metallorum grana sex infunduntur, perinde vomitionem cieat, ac si scrupulus ejusdem vino inderetur.

J. Conr. Barchuysen, in Pharmacop. Synopt. rectè observat, quòd si *antimoniata* eò in liquore infundi vellemus, ut lenta sanguinis crasis inde comminuatur, cavendum esse, nè aut liquores hi acecant, aut acida quævis eis adjiciantur; quoniam vomitiones dehinc horrendæ subsequerentur.

Et si Emeticum lene vomitionem, nisi pharyngem paululùm titillemus, haud omnino cieret, at instrumentum *Rumfæi*, ex osse cetaceo confectum & vel in ipsum ventriculum detrusum, cum *Pechlino* magnoperè

vitupe-

vituperamus; quippe quorum ventriculi vulnus periclitaremur, quandoquidem pluma, una, rem æque abfolvet?

Iis aquam tepidam vel cardui, infusumve ex thea (fi velimus ut vomant) copiosâ manu exhibeamus, quibus Emetica officinalia, experientiâ duce, detrimento sunt; quippe hoc modo vomitionem, diutiùs, atque velimus, omnino non protrahemus.

Willisus ut & *Ettmullerus* jampridem plus uno Emetico quam cathartico, vel decies iterato, jugiter effici observârunt: Hoc igitur exinde, vice versâ, jure merito concludi potest; plus, nimirum, damni ab uno Emetico, quàm commodi à catharticiis plurimis, nobis inferri patet; seriò igitur caveamus, ne Emetica priùs exhibeantur, quam palam indicentur.

Et si tempus Emetica exhibendi opportunius, pomeridianum sit; sub horam, nimirum, à prandio quartam quintamvé, at, quod hâc de re suprâ protulimus, in memoriâ teneatis necesse est: Hinc cautelas *Mayernij cap. de Epilepsiâ* memoratas, coram vobis sistere nobis animus est. His nimirum Emetica pleno propinentur ventriculo, qui ægrè illa ferunt; ast jejuno, qui facilè tolerare valent.

Quandoquidem Emetica, perexiguâ dosi assumpta, deorsum tendunt, uti observat *Ettmullerus*; palàm idcirco est, evacuantia remedia *secundùm majus ac minus* ab invicem solummodo differre: Hinc fit, ut Emetici dosis parcior, per anum tantum humores deturbet; quod si minor adhuc ejusdem quantitas cuipiam porrigatur, præbeatúrve; vel diaphoresin, vel diuresin, prout dosis augetur vel minuitur, promoveri comperitum est; exhinc, liquido patet, quare irritationem necessariò debere omni evacuationi (sive à naturæ sive morbi molimine ea procedat) jugiter præcedere affirmamus.

Si Emeticum propinatum minus voto responderit; ne damnum inde ventriculo vel intestinis, uti haud infrequens est, inferre valeat; catharticiis lenibus ex cassâ & istiusmodi remediis, vel etiam enematibus anum versus confestim trahantur humores.

Denique ij, quorum thorax capax & amplus, ventriculus firmus, caputque bene formatum, Emetica solum

lūm ferre valent : è contra verò his, quorum thorax angustior, scapulæ elatæ, ventriculi debiliores & capita minora sunt, malè cedunt ; summatim igitur in symptomatibus sequentibus palam indicantur ; ubi nimirum adsunt aurium tinnitus, vertigo, capitis dolor, ac nausea in *febris* ; ubi in pancreate, vesicâ felleâ aliisve visceribus ventriculo conterminis, obstructions adsunt : Ubi revulsiones per ipsum ventriculum derivantes perficiendæ sunt ; ubi denique appetitus dejectus, nausea, hypochondriorum tensiones gravativæ, & vomendi nixus ægrotos vexant, Emetica propinare nulli dubitamus.

Corollarium.

Haustus Emeticus.

℞ Oxymell. Scillitic. Vin. Scillitic. Syr. de Præssio ā
℥ij. m. cap. Cochl. ij. mane quotidie.

Potio Emetica.

℞ Vin. Scillitic. ℥ij. Aq. Card. bened. ℥j. m. pro Vomitorio, (hodie) horâ quartâ vel quintâ pomeridian. sumend. superbibendo prælargos Haustus Aquæ Carduatæ.

OBSERVATIONES.

Potiones hujusmodi Emeticæ (quarum prior, nī quantitas augeatur, Emetici nomen haud meretur) ægrotis hydrope decumbentibus accommodari quibusdam idcirco videntur ; quod ventriculo irritato, portio quædam misturæ statim cum sanguine confundatur, indeque haud ita multò post glandulæ renales officio usque adeo fungantur suo, ut cum *scilla* particulis salino-volatilebus, acetum vero acido-salinis gaudere concedantur ; sal *emixum* exinde resultans, sali muriatico animali haud omninò dissimile sit : Vereor tamen, ne plurimum, vel inde, sperari non poterit ; quòd si Emetica hujusmodi devorata ventriculum tranent, certò fere certius per anum deturbantur ; hinc concludere licet, quod, si vel *κᾶτω* vel *ἄνω* ferantur humores, pauxillum misturæ supererit, quæ ad renes posthac appellere valuerit : nisi si ex quorundam sententiâ ductus quosdam nondum

dum usque, quod scimus, adhuc detectos, à ventriculi fundo per omentum expansos, rectaque ad renes vesicamve tendentes concedere velimus: At malumus, ut hypothesis hujusmodi omnimoda è medicinâ penitus à vobis exulet. Verum quidem est, ita ut plurimum fieri, ut aquæ nimirum *spadane*, julapium diateffaron, & ejusmodi liquores haud citius fere propinentur, quàm è vesicâ detrudantur; quinetiam multum, inter urinam pallidam, mulieribus hystericis passim obviam, urinamque compotatorum stramineam, interesse fatemur; hysteriarum enim urinam ex sale quovis alcalico, ei instillato, extemplo subsidere compertum est, quod bibulorum urinis, experiëntiâ duce, haud usuvenire solet: exhinc quidam sententiam prædictam, ex virorum hypotheticorum more, pro viribus propugnârunt; quandoquidem verò liquores alii aliis vasa longè altiùs penetrare observantur: Et siquidem effectus ij ab acie medicamenti liquidò pendere videntur, eadem acuties, quæ motum peristalticum ciere valeat, vasa etiam reliqua adeò vellicare possit, ut vel serum multò rapidiùs inde exprimatur; quod nec saturiori unquam colore imbui, nec à liquore quovis, ob feri copiam, alcalico, in fundum præcipitari potest.

Asthmati humido Emerica multum emolumenti afferre compertum est, exindè quòd horum adjumento viscera apprimè quatiantur, & quòd pituita hunc in modum pulmonum bronchiis firmiter adhærens, faciliùs inde excuti possit; uti illa eodem etiam artificio ventriculorum muco liberare suo simùl observantur.

CAP. II.

CATHARTICA.

Fortiora.



Tereb. Cypr. ℥ij. Jalap. resinof. Merc. d. ā. gr. xxij. m. f. pil. n^o. 24. cap^t. vj.

℞ Gum. ammon. ℥j. Merc. d. ℥ij. Diagryd. gr. xij. m. f. pil. n^o. xvj. pro quatuor dosibus.

℞ Pulv. rad. Jalap. gr. xij. Refin. Jalap. gr. vj. Tartar. vitriolat. ℥β. Merc. d. gr. x. Pulv. Succin. gr. vj. ol. Caryophyll. gr^{tt}. iij. Conf. flor. anthos ℥j m. f. Bolus.

℞ Merc. dulc. gr. xij. Refin. Jalap. gr. vj. Pulv. oc. Cancror. ℥β. Tinc. Castor. q. f. m. f. Pilulæ n^o. vj. deaurentur.

℞ Refin. Jalap. in Vitell. ovi solut. gr. xv. Aq. Mellif. ℥iv. Syr. de Spin. Cervin. ℥β. Tinct. Castor. gr^{tt}. xv. Aq. Mirab. ℥β. m. f. potio.

℞ Gutt. Gamb. Diagryd. ā gr. iij. Merc. d. ℥β. Crem. Tartar. ℥β. Syr. è Rhamn. Cathartic. q. f. m. f. Bolus.

℞ Troch. Alhand. M. P. Coch. min. Extract. Agaric. ā gr. viij. Merc. dulc. gr. xv. ol. Caryoph. q. f. m. f. pil. n^o. vj. deaurentur.

℞ Rad. Jalap. Hermodactyl. Mechoacan. Turbith. Scammon. ā. ℥β. rad. Hellebor. nig. & alb. ā ℥j. Sem. Cartham. ℥ij. Cinnam. ℥β. Caryoph. ℥β. Sp. Vin. ℥ij. m. digerantur. Dosis liquoris filtrati ℥β; hanc Tincturam G. Horstius in arthritide magnoperè deprecatur.

℞ Fæcul. aron. gr. xv. Gutt. Gamb. gr. ix. Conf. Rosar. vitriolat. q. f. m. f. Bolus cum regimine sumendus.

℞ Extract. Rhei. ℥j Refin. Scammon. gr. iv. Troch. alhand. gr. iij. ol. Caryoph. gr^{tt}. vj. m. f. pilul. n^o. vj. deaurentur.

℞ Aloës

- ℞ Aloës optim. gr. xv. Troch. alhand. gr. iv. Merc. dulc. gr. xvj. ol. Cinnam. gtt. ij. m. f. pilul. n^o. vj. deaurentur.
- ℞ Resin. Scammon. Jalap. ā. gr. vj. Merc. d. gr. xij. succ. Glycyrrhiz. ℥ss. ol. Lign. Guaiac. q. f. m. f. pil. n^o. v.
- ℞ M. P. Lucis maj. aloe rosat. pil. Coch. min. ā. ℥ss. Diagryd. pulver. Troch. Alhand. a. gr. j. m. f. pil. n^o. vj. deaurentur.
- ℞ M. Pil. foetidat. ℥j. Troch. Alhand. gr. vj. ol. Sabin. q. f. m. f. Pilulæ n^o. iv. deaurentur.
- ℞ M. P. Mastichin. ℥ij. Scammon. Sulphurat. Troch. Alhand. ā. gr. iv. Extract. absinth. ℥j. Tinct. Sal. Tartar. q. f. m. f. Pilul. n^o. xv. pro duabus vel tribus vicibus.
- ℞ M. P. Tartar. Quercet. ℥j. Resin. Jalap. gr. x. Extract. agaric. gr. v. Sal. Vol. Oleos. gtt. x. ol. Caryoph. q. f. m. f. Pil. n^o. vi.
- ℞ Gum. Sagapen. cum Acet. mund. & inspiss. gr. x. Troch. Alhand. gr. vj. Merc. dulc. gr. xv. m. f. Pil. n^o. v.
- ℞ Extract. Catholic. gr. xij. Merc. dulc. ℥ss. Resin. Jalap. gr. ij. Extract. Troch. Alhand. gr. j. m. f. cum Elix. prop. sine Acid. q. f. Pilul. n^o. vj.
- ℞ Extract. Elleb. nig. Merc. dulc. ā. ℥ss. Extract. Colocynth. gr. j. c. f. q. Succ. Cydon. f. Pil.
- ℞ P. aloephang. ℥ss. Scammon. Sulphurat. gr. ij. Troch. Alhand. gr. jss. Tinct. Sal. Tartar. q. f. f. Pilulæ.
- ℞ M. P. ex duobus gr. xxv. in Aq. Theriacal. ℥ij. Solut. Syr. de Rhamno Cathartic. ℥ss. m. f. Potio.

Leniora.

- ℞ Pulp. Cass. recenter Extract. ℥ss. Tamarind. ℥ij. Fol. Senn. ā. Stipitib. mundat. ℥ss. Crem. Tartar. ℥j. Sal. mirab. Glauber. ℥ss. Syr. ē flor. Persicor. q. f. m. f. Electuarium molle, cujus sumatur magnitudo nucis juglandis hora decubitūs.
- ℞ Fol. Senn. S. S. ℥ij. Summit. Centaur. min. mss. flor. Bellid. p. ij. flaved. aurant. Crem. Tartar. ā. ℥j. Pasfular. minor. exacinat. ℥ss. Incis. ponantur in vino,

D

capiat

capiat haustum mane, in prandio, vel coenâ.

℞ Rhei elect. ʒij. Sal. Tartar. gr. xv. Aq. Cichor. ʒvj. stent in Arenâ per noctem; coletur pro usu, vocatur *Tinctura Rhei Willisiana*.

℞ Tamarind. ʒß. Fol. Senn. Alex. ʒij. Rhei Elect. ʒjß. coq. in Aq. font. in Colatur. ʒiiij. Solv. Mann. Calabrin. Syr. è Ros. Solutiv. ā. ʒj. m. f. Potio.

℞ M. P. aloephangin. ʒß. Pulv. Succin. gr. iij. ol. Caryophyll. gtt. ij. m. f. Pilul. n^o. vj.

℞ Elect. de Tamarind. cum Senn. ʒj. Rad. Jalap. gr. xij. Syr. è. Ros. Solutiv. ʒiv. Ol. Caryoph. gtt. ij. m. f. Bolus.

℞ Aq. Hord. mundat. ℥j. Cass. recenter extract. ʒj. Tamarind. ʒß. Syr. è Ros. Solutiv. ʒß. Aq. Cinnam. ʒiß. m. Potio gradatim haurienda.

℞ Rhei Elect. ʒiß. Cinnam. Pulv. ʒj. macerentur in Aq. Cinnam. Hord. in Colatur. ʒiiij. dissolv. Electuar. è Succ. Rosarum ʒiß. m. f. Potio cum regime modico fumenda.

℞ Tinctur. Rhabarbar. ʒj. Tinctur. Hier. ʒiiij. Syr. è. Flor. Persicor. vel è Succo Rosar. pallidar. ʒj. m. f. Potio.

℞ Mann. optim. ʒj Pulp. Cass. recenter extract. ʒiiij. solvantur in Aq. Lact. Alexiter. ʒiiij. Colatur. add. Aq. Pæon. Comp. ʒß. m. f. Potio.

℞ Decoct. Senn. Gereon. ʒij. Mann. Calabrin. ʒß. Cremor. Tartar. ʒj. m. f. Potio tepidiusculè exhibenda.

℞ Fol. Senn. S. stip. ʒiiij. Sem. anis. contus. ʒj. Sal. Tartar. ʒj. infundantur in Aq. Card. bened. q. s. stent in loco tepido per diem, Colatur. ʒiiij. add. Aq. Cinnam. ʒß. Syr. de Pom. purgant. ʒß. m. f. Potio.

℞ Rad. Helen. Raphan. Rustican. recent. Polypod. ā. ʒvj. Fol. Absinth. Agrimon. Centaur. min. ā. m. j. Flor. Anthos. Genist. ā. p. iij. Cortic. Tamarisc. Fraxin. ā. ʒß. Fol. Senn. S. Stipit. ʒj. Rad. Helleb. nig. ppt. ʒvj. Rhabarb. Elect. Agaric. albissimi ā. ʒß. Sal. Tartar. ʒß. Zedoar. Zinzib. Cinnam. ā. ʒj. Passular. Minor. ʒiß. Incisa & contusa infundantur in vino. Etmulserus infusum hoc in malo Hypochondriaco multum laudat.

- ℞ M. P. Aloephangin. ℥j. Resin. Jalap. gr. iij. Gumm. Ammon. Sal. Succin. ā. gr. iv. Ol. Juniper. gtt. i. m. f. Pilul. n^o. vj.
- ℞ Extract. Rud. ℥j. Sal. Armon. Vol. gr. vj. Ol. Mac. Still. gtt. n^o. ij. m. f. Pil. n^o. vj.
- ℞ Rhei Elect. ʒiβ. Myrobalan. Citrin. ʒβ. Tamarind. ʒβ. infund. in Aq. Card. bened. q. f. expressioni add. Rhabarb. Pulv. ʒβ. Syr. è Ros. ʒj. Scammon. gr. iv. m. f. Potio.
- ℞ Electuar. Diaprun. ʒj. dissolv. in Aq. Lact. Alex. ʒj. Cinnam. h. ʒiβ. m. f. Haustus.
- ℞ Fol. Senn. ʒiij. Agaric. Trochiscat. ʒj. Sem. anis. ℥j. Cremor. Tartar. ℥j. decoquantur in Aq. Hord. q. f. Colaturæ add. Elect. Diaprun. ʒij. m. f. Haustus mane jejuno ventriculo sumendus.
- ℞ Extract. Rhabarb. gr. xvj. Resin. Scammon. gr. iv. Ol. Carvi gtt. ij. m. f. Pilulæ n^o. iv.
- ℞ Spec. Diaturbith. cum Rhabarb. ʒβ. Cremor. Tartar. ℥j. Scammon. Pulv. gr. x. Aq. Cichor. ʒiβ. Syr. de Cichoreo cum Rhabarb. ʒvj. m. f. Potio mane exhibenda. *Craanen* in febribus intermittentibus hanc collaudat potionem.

SCHOLIA.

Medicamenta Cathartica, modo indicationes rectè moliamur, neutiquam exhiberi reperiemus, quin humores copiâ peccantes exinde deturbandi sint; sive ejusmodi verò serosi, sive biliosi, sive salini acidive sint, hæc de re in paragraphis sequentibus fusius aliquantò differemus.

In morbis idcirco contumacibus, quibus medicamenta alterantia, diutius licet exhibita, parum profuerunt, Cathartica hæc subindè, pro medici arbitrio, administrata, plerunque ægrotis magno sunt usui: quamvis interdum fit, ut obstructions in arterias evanescentes tantò impingantur, quantò humores subsistentes posthàc Catharticorum viribus, vel maturius exhibitorum, haud omnino cedere observantur: quippè isto tempore humores sunt solitò viscidiores; quia etiam tum magnoperè impinguntur; & demum quoniam arteriolæ, ob effervescentiam liquorum nimirum jam nimis eve-

Etiam, qui eas distendunt, humoribusque, haud facile tranantibus, opplent, fluida sua contenta non omnino propellere valent; quo in casu, impactio humorum quovis revera momento augefcit; motus vero progressivus in horas exinde magis impeditur. Hinc fluida medicamentis attenuantibus sat abunde semper prius comminuantur, quam Cathartica exhibeantur: plus dein unico remedio Cathartico, quam vel decies antea repetito, efficiemus: quoniam hoc apud medicos solenne est, ut à medicamentis lenioribus prudenter incipiant, hisque incassum aliquandiu attentatis, tandem ad fortiora gradatim properent: siquidem igitur gradu solummodo alterantia à Catharticis diffidere fateamur; alterantia diutius & incassum exhibita, à fortioribus, Catharticis nimirum, obstructions paululum obstinationes posthac, certius exinde defodiuntur.

Quotidiana nobis experientia testatur, quæ sæpius fieri solet, ut quæ in victu, primum odio habuerimus, deinceps, cum eis nimirum sensim consuefcamus, tandem consuetudinis istius vi, ultro requirantur; quæ alioqui fit, ut errhinis, peto, coffea aliisque hujusmodi remediis & liquoribus consuetudo naturam ad amissum æmuletur? Imò vero quibusdam edulia, quæ prius oderint, eò quandoque posthac cordi sunt, quò nihil deinceps impensius mirentur. Idiosyncrasie causam hætenus nemo, quod scimus, nobis satis unquam patefecit; emanationes à corpore in corpus vagantes garrire, sanè ineptum est; cum hujusmodi corpuscula, fac ita esse, individuis quibusdam naturis solummodo adversari compertum sit: exhinc verò palam est, quæ fit, ut remediis Catharticis assuefacti, commodius ea, quam ii, quibus medicamenta id genus desueverunt, perferre valeant.

Morbos somnolentos, paralyfes aliaque hujusmodi *νσθήματα* copiam feri pituitosi vapidique, cerebrum inundantis, pro causâ agnoscenza, Catharticis sæpe sæpius amolimus: quod si unâ stimulantia medicamenta exterius adhibeamus, cujusmodi sunt epispastica, setacea, cauteria, enemata acriora, epispastica perpetua, spiritus vini, in quo herbæ volatiles infunduntur; tum remediis attenuantibus, quâcunque formulâ, introsump-

ptis (semine nimirum sinapios, summitatibus lavendulæ vel rorismarini, cortice vel ligno Guaiaci, &c.) facilius deinceps sanantur.

Quandoquidem pforæ, scabiei, impetiginis alteriusve hujusmodi eruptionis causam in feri sinu latitare manifestum sit; Cathartica idcirco procul omni dubio usui ejusmodi laborantibus erunt; quippe quæ particulas salinas eruptionibus hisce ansam præbentes, foras amandabunt; quia quemadmodum falsedo nitro-salina, vel armoniacalis sanguini eò proficua sit, quò liquores secernendi, per irritationem glandulis leniter impressam, promptius secedant, & quo sanguinis crasis debita exactius conservetur; sic si falsedo seu in acredinem evecta, seu copiâ peccans, glomeratim fibris adnascatur, eruptionesque hujusmodi producat, quæ scabierum nomine apud medicos vulgò gaudere solent; Cathartica tum serum acre deturbando, diluentia porro tepidiuscule sæpius introsumpta, salium contactum dissociando profunt; & quæ salis speciem, nobis experientiâ duce patefactam, commutant, felicius deinceps voto respondebunt; exhinc eruptioni ulteriori facile obviam ibimus; ita ut lotiones posthac vitriolicæ rem nullo absolvant negotio. Eximius ille perinde philosophus ac medicus *T. Craanen* salis saporem omnino non percipi recte observat, modo salis solummodo drachma magnæ aquæ fontanæ quantitati injiciatur, imo sal istud ab argento in spiritu nitri soluto, aquæ instillato, tantummodo nobis tum patefiet: exinde concludere licet diluentia statui cuivis salino admodum esse proficua; porro ego in eâsum sententiâ, elephantiasis, quæ radices altiores nondum egerint, facili marte sanari posse, dummodo remedia diluentia tepidiuscule exhiberentur; adagium enim apud chymicos tritum est; *salia non salire; quamdiù sicca*; inde inferri potest, salia ni diluta, contactum ambire, dein paulo post coalescere & cohærere; quæ vero à fluidi copiâ vel calore modico dissociata, nequaquam deinceps accumulari queant; hincque cohæfiones, eruptiones aliaque ejusmodi postea efficaciter antevertuntur.

Sudores nocturni, vel à victûs copiâ vel à sanguinis acrimoniâ exordium plerumque sumunt; in utrovis

casu, Cathartica magno erunt usui; eo ut humorum onus foras ablegetur; si victus lautior hujusmodi sudoribus ansam præbuerit, rem jejuniis unâ cum Catharticis penitus absolvemus; sin acrimonia in causâ sit, alterantia etiam specifica eò exhiberi debent, quò salia ejusmodi melius obvolvuntur; quæ, jam à lecti calore fusa, glandulas inter perspirandum immane quantum irritant, sudoresque exinde fluentes copiosius, quam par est, emulgent.

Anni tempus purgandi occasiones plurimum quandoque nobis indigitat; hinc fit, ut, vere, sol calore suo blando fluida, hyeme fere subsistentia, circumgyrare cogat; ut exinde ea magnopere turgescant, & vasa sua adeo tendant, ut rixeos periculum sæpius inde subire soleant; Cathartica idcirco his emolumento erunt, quòd humores foras amandando, plenitudini sæpius exhinc nascenti, facile obviam ire poterint.

Qui valetudine gaudent inconcussâ, medicamentorum impetus vel etiam paulo vehementiores flocci pendunt; hinc fit, ut ejusmodi homines ab aeris inclementiâ raro aut nunquam se malè habeant; quæ infirmiores tamen in Catarrhos febresve confestim præcipientes daret: hinc evenire solet, ut eos Cathartica paulo fortiora ne vel minimum quidem perturbent; quod si, dosis justò minor eis exhibeatur, hoc vobis ii confestim vitio vertent, & vosmet ignorantix strenuè exhinc argui percipietis.

Februm intermittentium accessiones, quam citissime stadia sua percurrerent, nisi si humorum copiâ ægrorum vasa valdè scaturirent; tum enim, paroxysmo uno vel altero elapso laborantes ejusmodi pristinam valetudinem, jam amissam recuperarent; ægrotis autem hunc in modum decumbentibus haud necesse erit, omnino præscribamus: ii vero quorum corpora humorum redundantia suffercuntur, haud ita facile evadunt: hi à Catharticis, affatim administratis, humorum sarcinâ prius liberentur, quàm corticem peruvianum eis exhibere moliamur: quippe si vasa humorum copiâ aliquando exinaniantur, cortex hicce deinceps exhibitus, tametsi fluidorum residuum comminueret, exinde tamen vasorum rixis, asthma, aliaque ejusmodi, vel ab in-

tumescentiâ orta, ægrotos impunè laceffunt. Jamdudum vobis observavimus, Cathartica intermissionis die eò exhiberi quò intumescencia bifaria, tam à paroxysmo nimirum quam à motu intestino, Cathartici causâ illata, quam efficacissime avertatur.

Acrimonia idcirco partes solidas impensius dilaniat, quòd eâ sanguis redundet; ulcera continuo nascuntur à sanguine hunc in modum depravato: quibuscunque autem ulcera externa sanare animus est; primum per remedia Cathartica pauxillam salium corrosivorum portionem subtrahere conentur, deinde medicamenta testacea, cinnabarina, & saturnina unâ cum radicibus chinæ, sarsæque, rasuris cornu cervini, eboris, aliisque ejusmodi aquæ calcis ope in decocta conflatis, eò introsumantur, quò acrimonia hæcce caustica, ibidem dominans, obvolvatur; quo peracto, ulcera, vel cacoe-thea, per unguentum Basilicon oleo Terebinthinæ distemperatum primum commodè detergeri & mundificari queunt; dein per linimentum arcæi cum unguento diapompholygos mistum incarnari possunt; tandemque per unguentum de minio seu amalgamata, ex mercurio cum plumbo conflata, ad cicatricem concinnam perducere valent; & non video, quin simili modo pulmonum ulcera, modo benigna sint per suffitum ex cinnabari, myrrhâ, mastichéque mistis facillimè persanari possint.

Hippocrates in Aphorismo 36^{to} Sectionis 5^{tæ} purgantium, in mensibus decoloratis, usum autoritate suâ munit; τὰ κατὰ μὲν αἵμα κατὰ πόσιν δὲ αἵμα σημαίνει - nec equidem sine causâ; evacuationes enim hujusmodi non nisi à sanguine vitio produci agnoscimus; qui ob seri vapidi redundantiam, vasorumque inde opple-tionem, cuncta periodi impedimenta adeo summovet; ut in tempore opportuno arteriolæ dehiscant uterinæ, mensesque, cum circulo tamen in linteamentis circum-circa pallido, inde prodeant: cum vasa sat abundè pur-gantibus depleverimus, tum diuretica, unâ cum chaly-beatis commissa, eò exhibenda sunt, quò residuum cor-rigatur, expeditiusque evacuetur; & tandem quò fibræ laxiores commodius inde firmentur.

Ubi bilis, pituita vel quævis sanguinis temperies, five segnior five paulò evectior, vasa sufferciat; ibi evacuationes, præsentis sanguinis vitio idoneæ, remediis allioticis omnimodis, ut fieri assolet, præcedere debent; imprimis vero humores in ventriculo & intestinis hospitantes constanter eliminandi sunt.

Quandocunque ductus five hepaticus five cysticus five communis maximopere obturatur; purgantia, per impetum, quem fibris intestinorum imprimere valent, mæandros obstructos quam efficacissimè referabunt: hunc enim in modum mucus, ductus choledochi parietibus, aliquâ ex parte, adnascens, admodum emulgeri potest; huiusque ita confectis, quæ supersunt impedimenta, coagula nimirum cohæsionesque exinde orta, à salium volatilium fixorumve intus exhibitorum efficacità facillime auferri queant; huiusmodi autem sunt salia volatilia è cornu cervino, è sale armoniaco, sal volatile oleosum; salia fixa absinthii, cardui benedicti, genistæ; millepedes, centaurium, marrubium album, radices rubiæ tinctorum & similia.

Alibi salia scorbutica, si *Ballonium* sequamur, mineralia vel metallica ut plurimum esse observavimus; quæ magnâ in copiâ in sanguine fluitant; eventusque inde horrendos ibidem introducunt; salia ejusmodi alcalina seu acida plerumque esse faciamus; medicamentis evacuationariis idcirco cedent, quòd serum, quibus innatant, cedere in dies reperimus; observatu verò dignum est, quod acida haud tam facile quàm salia alterius cujusvis speciei expulsiōni huic obediant; neque eorum evacuationem usque amoliri experimur, quoad præparantia, ostensa, ritè præmittantur. Sed utcunque se res habeat, siquidem humores istos salinos medicamentis stimulantibus exhauriri patet, hi igitur citius aut serius exantlandi sunt; atque redundantia hunc in modum primum detractâ, alterantia dein specifica posthac exhibenda sunt; sali nempe fixo alcalico, acida adversari reperiuntur; uti, è contra, alcalina acido austero acerbore, contrariari nôrunt omnes: etiam vel ipsi acido corrosivo; cum hoc delectu verò, quod chalybeata magis sulphurea acido austero, quæ eadem sulphure orbata, sal martis, nimirum, aquæ martiatæ, *acidula dictæ*,

dictæ, unâ cum pulveribus testaceis, sali acido corrosivo melius accommodari comperiantur.

Asthmata raro aut nunquam homines adoriuntur, quin ut plurimum vel à sanguine viscoso vel à feri copiâ introducuntur; quæ, subsistendo, vasa pulmonaria admodum opplent: ejusmodi onus partim remediis purgantibus, partim verò epispasticis, partim denique bechicis incidentibus maximopere levatur; quibus, nempe, humores viscosi, juxta, bronchiis agglutinati, atque in arteriis pulmonariis contenti, quam expeditissime eliminantur; organo hoc, ita particulis suis lentis, quâ extus, quâ intus, liberato; respiratio fit exinde multo liberior: remedia vero ejusmodi sunt *serum sinapium Bateanum*, *syrupus balsamicus*, *syrupus terebinthina*, *flores benzoini*, *sal succini*, & similia; quorum usum tamen omnino prohibemus, dummodo vel ephemera quævis adsit periodica, vel temperies febrilis laborantes infestet.

Tamet si sanguinem morbo venereo laborantium particulis salino-corrosivis scatere palam sit, nullum tamen, quod scimus, symptoma à lue introduci fertur, quin à scorbuto, ultra modum evecto, unum idemque vexet ægros; tantum igitur abest, ut inter se diffideant, ut *caries*, *exostoses*, *gummata*, *tophos*, *nodos* & alia ejusmodi, perinde à salibus scorbuticis (etiam in iis, quibus morbi venerei nulla potuit incidere suspicio) atque à lue exoriri vidimus: idcirco remedia evacuantia, luis venereæ gratiâ usurpata, scorbuto juxta profunt: neque tantopere pertimescendum est, ut ut *Lissero Hartmannové* contradicere videamur; quippe illi mercurialium usum in scorbuto vetant, in lue vero collaudant: ast observatu dignum est, quandam dari luis speciem, cui mercurialia nihilo minus obesse observantur, quam scorbuto à particulis salino-sulphureis orto: quodcumque igitur mercurialium usum, hisce in morbis, infortunia sequuntur ulla, ea non tam regiminis incuriæ, quam medicorum inscitiae vitio vertamus: remediis evacuatoriis primùm exhibitis, liquorum decocta deindè, quibus *Mexerei* summitates quidam recentiores admiscuerunt, posthac administrentur; horum enim remediorum adminiculo, sanguis magnopere

rè

rè vitiatus, omnium malorum radix, à cunctâ labe ex-hinc purgabitur; quoad symptomata verò, inde oriunda, ea ex industriâ, hoc in loco, silentio præterire malumus.

In *mensum suppressione*, Cathartica remediis referantibus viam reverà idcirco parant, quòd primum humores lentos ex corpore foràs amandant: & quòd deindè vasa plurimum à motu intestino, Cathartici causâ illato, usque eo distendi observentur; ut aperientibus posthac exhibitis res minimo absolvatur negotio: hic autem non de coalescentiâ loquor inmedicabili.

Plerisque, accessionibus arthriticis nimium obnoxiiis, *tinctura sacra* usum, nec infausstò sanè, eò præscriptissimus, quòd paroxysmo acerbiori proximè insecuturo, quem à ventriculi distensione & inflatione certo fere certius præfagimus, commodiùs obviam iremus: hunc quippe in modum fomes paulo abundantior usque adeo exhauriebatur, ut accessio proxime futura longe mitior exindè fiebat. Observandum etiam est, declinante arthritidis accessione, (quando nimirum membro arthritide vexato, squammæ supervenire cernuntur, inflammatione tum prius evanidâ, urinâque sedimentum unâ laudabile præcipitante,) purgantia ea certius indicari, quâ particulæ coctæ, à sanguine deciduæ, & quodammodo sejunctæ, commodius in fundum abripi poterint; quæ vel minimo secus infortunio, sive à potu sive ab aëre inducto, accessionem, aliam longe fortasse graviolem in medium denuò proferre valerent.

Purgantia in appetitu ab humore cujusvis fere speciei, dejecto, ut plurimum idcirco prodesse notantur, quod saburram depravatam juxtâ exonerent, atque remediis alterativis viam sternant: nollem vero vos me perinde intelligatis, ac si aut de anorexiâ, ex spirituum penuriâ natâ, sermonem haberem; (quæ sive nutrimento facile coctu, sive remediis cardiacis specificis solummodo amoveri potest;) aut de *istâ*, quæ, ab aciditate, acido esurino genuinoque dissonâ, totoque, ut aiunt, cœlo distante, ortum ducit; quoniam in statu ejusmodi præternaturali, alcalina primum exhibenda sunt, dein sursum vel deorsum saburra heterogenea posthac penitus eliminanda est.

Purgantia

Purgantia uni hydropis speciei apprimè quidem & aptè satis accommodari compertum est; quippe quæ fluida hic tam copiâ quam quiete peccantia foras abigere valeant; quandoquidem vero hydropes longè ab invicem justâ de causâ, differre opinemur; unicæ, ni multum fallamur, speciei ea tantummodo conferre reperiemus; quod paulo fufius nunc à nobis demonstrandum superest: in hydrope, cui nomen *ascites*, liquores extra vasa in abdominis cavitatem copiosius diffluere percipiuntur; nec his est unquam, quod scimus, ullus posthac regressui locus: medicamenta purgantia idcirco hic cùm inutilia tum periculosa, ut liquido patet, reperiuntur: *inutilia*, inquam, ob causam supra memoratam; *periculosa* insuper, ex eo quod remedia Cathartica ex voto operantia, sanguinem eodem porrò momento vehementius fundere experti loquamur: humoribus exhinc tantopere fufis atque adeo ultra limites sibi consuetos immane quantum expansis; fieri non potest, quin liquores, à vase rupto in abdominis spatia longe copiosius deinceps effluant; mirandum igitur omnino non est abdomen exinde tanto tendi, quanto illud liquamina sua haud diutius, experto credite, continere possit, quin protinus impedimentis cunctis ita tandem amotis, deinde ea, cataractarum more, omnino profilire cernantur. *Hydropi epiploico*, remedia Cathartica nequaquam conferre certum est,

Afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas.

Ut primum enim vasa rumpuntur lymphatica, liquoresque gelatinosi exinde in omenti cellulas effunduntur; ne medicamenta purgantia, neu alia quævis cuiusvis speciei isthic deinceps unquam evocare queunt. Hæc tam in ovarii hydrope, quam in isto, intra peritonæi duplicaturam contento, verissima sunt: heu idcirco miseros! quibus vel ipsi medici longanimitatem solam, pro remedio, atque adeò pro asylo, commendatam habent.

Ast manifesto vobis, cum de paracentesi in proprio capitulo verba faciamus, demonstrare conabimur; ægrotos, hydropibus ejusmodi laborantes, solummodo
exinde

exinde exonerari posse; sub hydropum initiis quidem, dummodo maturius aliquantulum exhauriantur humores, eorum residua minimo deinceps negotio emendari, in circulum cogi queunt; sin vas aliquod, ex infortunio, rumpatur; non prius firma eis redibit valetudo, quam remedia porro styptica eò diutius intus sumantur, quò vasculum illud de integro reconsolidetur.

Quandocunque alvus vel subsistat, vel segnius, quam par est, officio fungatur suo; remedia tum Cathartica, stimulando, irritando, vellicando, motum peristalticum, solito inertiozem, non mediocriter inde concitare jugiter observantur: hunc in modum, ubi febres, colicis doloribus idcirco stipantur, quòd à fœcibus induratis, intestinorum plicis firmiter adhærentibus, frequentius inducantur; Cathartica ibi lenia, admodum erunt proficua; verumtamen, si adhæsiō isthæc sit causa doloris unica, lenioribus istis remediis oleosa medicamenta eò præmittantur, quò irritationi huic, arte creatæ, promptius aliquantulo cedant: infra vero luculenter vobis ostendemus, quâ remedia Cathartica doloribus quibusdam colicis damnum inferre observantur.

Foresto §. 22. *Obs.* 44. in *Scholio*, Cathartica in intestinorum difficultate, vulgo dysenteriâ, male jamdudum audiêrunt, inquit enim, *Non debent ad partem læsam excrementa trahi,—— quia stultum est vacuationem supra vacuationem moliri*; hinc fit, ut hunc in modum afflictis, emetica præmagnis præconiis ipse ibidem efferat; humores enim aliò derivare, quam per partes morbo cruciatus amandare mallet; quandoquidem partes tum læsæ humorum sarcinâ nimis valdè obruerentur.

Ecce *Foresti* argumentum! tametsi emetica (& recentiores hic præ cæteris cunctis radicem *ipocacuanæ* laudibus efferunt) dysenteriis ob causas modo nominatas multum prodesse libenter ipsi assentiamur: tamen, si rem penitus trutinemus, Cathartica solummodo lenia, & ea quæ mucum intestinorum tunicis hærentem tantum abradunt, in morbo hocce idcirco usurpantur; quòd ne commotio quævis vel minima exinde cieatur, neu motus intestinorum circumvolutans vel vix concitior

tatior inde excitetur; quibus ideo aliud non agimus quam chirurgi in ulceribus suis, gossipio nimirum faniem leniter abstergendo, jugiter agunt. Exemplum igitur hoc in intestinorum juxta ac externis ulceribus pares gerere vices constanter observamus. Scite admodum eam ob rem *Sydenhamius* nostras rheum in dysenteriiis, venæ sectione præmissâ, prius exhibet, quam opiata propinantur; nos etiam hoc tempore idem semper faustoque administramus; quæ deinceps exhibentur, cujusmodi sunt testacea, balsamica, obvolventia, styptica, certius posthac effectus suos reverà fortientur.

Vertigines à muco in ventriculi plicis hospitante sæpenuerò originem ducunt suam; humores enim morâ suâ ibidem diutinâ fiunt admodum acres, & sæpius in bullas intumescere solent; huncque in modum sensationem perquam molestant tunicæ ventriculi membranaceæ haud rarò impertiunt; qui nervis dein opticis itidem communicati, vertiginem introducere observantur: quæ cum irritatione istâ in ventriculo productâ aliquam quidem habere rationem mihi videtur; mucus autem hujusmodi juxta emeticis atque Catharticis quam expeditissime eliminari potest.

Asthma illud quod à *Waldschmidio* stomachale vulgò appellatur, à nihilo magis quam à ventriculi flatibus pendere pro certo habemus; qui diaphragma tendendo, repellendo, illud adeo sursum premunt, ut vel thoracis amplitudinem exinde valde minuant; quandoquidem vero causa hæc sit potius, pulmonum respectu, sympathica uti loqui amant medici quam secundaria; idcirco in hujus curâ, non eò collimemus, quò læsioni solummodo imaginariæ obviam eamus; ventriculo enim affatim exantlato, asthma dein fere sponte cessare observatur; demptâ enim causâ morbi proximâ, & ipse morbus sæpius è vestigio cessat; si pulmones quidem, alternatim etiam laborare percipiamus; quandoquidem ægroti tum multum pituitæ interdum expuere cernuntur, unde & titillatio & tussis tunc evenire solent; symptomatibus hisce per bechica donea temporius porrò occurramus.

Cathartica in febre syncopali *Baglivius* multum laudat, quod tamen cum grano salis intelligi reverà debet; verum quidem est; si materiem morbidam, membranas irritantem, nauseam inducentem, anxietudinesque excitantem, ventriculum onerare sciamus; ea medicamenta Cathartica, quæ febris natura ferre valet, ab hospite hujusmodi, naturæ perquam molesto, sat idonee ægrotos ista expedire possunt; ubi vero deliquia, à spirituum inopiâ laborantibus inducta, febrique mali moris cum diris etiam symptomatibus comitata, supervenire cernuntur; facinus magis temerarium nemo omnium mortalium unquam perpetrare poterit quam spiritus prius nimio plus debellatos, Catharticis omnino profligare.

Nos experientiâ, iteratò repetitâ, freti, Cathartica in infantulis, accessionibus convulsivis correptis, commendata vobis habemus; sæpenumero enim remedia, vulgo antispasmodica nuncupata, vel parum usque profecisse comperimus, donec Catharticum prius lene, teneræ huic ætati aptè accommodatum, repetitum exhibeatur: & uti stomachus idiopathice & primario, hoc in casu, affligi videtur, ita inde incipere moliamur, unde morbus expeditius auferri possit. Hinc infusi, ex senna rheoque conflati, dosi unicâ vel & alterâ, ad bidui triduive distantiam primùm adhibitâ, misturas, ex aquis rutæ, pulegii, melissæ, menthæ, pæoniæ compositæ, ex spiritûs cornu cervi guttis aliquot, syrupoque de meconio edulcoratas, felici postea cum eventu, frequenter administravimus. Quandam novi mulierculam, quæ semel guttas tres liquoris menstrui cum aquâ pulegii misti, infanti bimulo, posteaque eundem liquorem in eâdem quantitate in vino canarino, aliis frustra attentatis, iterum, faustò satis, adhibuit: longè verò à nobis absit, ut methodos non modo affectatas, quin porro perniciosas, vos prosequi omnino velimus; quippe si eximium authorem *Stalpartium Vanderwiel* in volumine secundo, observatione vero undevigesimâ, inspicere lubeat, hujusmodi liquamen duci cuidam, ab amasiâ administratum, deliria, aliâque symptomata horrenda dudum intulisse observabimus.

In *melancholiâ*, intestinorum, sanguinis, spirituumque fluida saburræ segnis, inertis, acidæque onere plerunque obrui compertum est; istaque in cujusvis arteriolæ vel evanescentis canaliculis sæpiusculè subsistere cernuntur; hoc in statu, remedia præparantia & alterativa, omni ex parte specifica, primùm diutius eà exhibeantur, quia acidum hocce heterogeneous omnino demoliendo, deliria inde orta, facile ablegari experimur; Cathartica postea propinata humorum nimidè plus æque cohærentium ac redundantium stagnum quam efficacissime foris derivabunt.

Mesenterii obstructionibus Cathartica ut plurimum eò magis prodesse nôrunt omnes, quo impetus à remediis ejusmodi drastice mesenterio (intestinorum appendiculo) impressi, ei facilius impertiuntur; ideoque impedimenta ejusdem, expeditius exinde referari plerunque observantur.

Cum revulsiones & derivationes in anginâ pituitosâ, œdematosâ, apprimè necessariæ comperiantur; Cathartica, eam ob rem, humores è capite, *secundum rectitudinem* ut aiunt, derivantia, portionem materiæ à sanguine morbificæ quâ amandant, quâ ulteriori illuc humorum affluxui, ex quo eos aliorsum ferri contingat, impedimento sunt; quâ porrò remediis discutientibus optatum denique finem paulò feliciter attingere conceditur.

In febribus mali moris, in quibus spiritus multum exhauriri cernimus, tametsi humores ritè & perfectè coqui dicantur, naturam tamen officio suo, expulsionem nimirum, si placeat, veneni, segniter nimis fungi sæpe compertum habuimus; Cathartica lenia prudenter hic adhibita multum sane profecisse novimus: nobis enim sæpenumero evenire solebat; febrem dies, & quod excurrit, viginti quatuor durantem & urinâ unâ coctâ comitatam, quando nimirum natura ne vel quicquam per sedes, sudoresve huc usque ejicere moliebatur, neque humores vel cerebrum adhuc oppetebant, tum ab hujusmodi remediis paulo lenioribus eam ut plurimum auferri observavimus; rebus enim sic se habentibus, remedium leniens, ex senna rheoque confectum, intra biduum perque vices adhuc duas tresve iteratum, laborantibus

borantibus ejusmodi propinando, febrem in totum adeo in posterum abegimus, ut opiata, noctu, à Cathartico, & remedia cardiaca, diu, aliquantisper exhibita, sanguinis effervescentiam primum depulimus, humorumque reliquias minimo deinceps negotio amandavimus.

In morbi cujusvis inflammatorii, pleuritidis nempe, rheumatismi, cæterorumque id genus, declinatione; Cathartica lenia, laborantibus hujusmodi idcirco apprimè prodesse nōrunt medici, quòd & humores in isto stadio spontè subsidere jugiter observantur, & quòd inflammationis vigor isto tempore plerunque compescatur; etiam porrò quod humores jam sui juris facti, nec vasorum canaliculis diutius impacti, Cathartici propinati stimulo usque eò cedere reperimus, ut ii facilius è corpore deinceps extrudi possint.

Hippocrates Aphor. 1. Sect. 4. Remedia lenientia, vel in ipsis fœminis utero gerentibus, à mense nimirum quarto ad septimum usque, administrare non veretur, dummodo à symptomate quovis ea indicari palam sit; Τὰς, inquit, κύβητας φαρμακῶν, ὡς ἐργᾶ τελέσμενα, καὶ ἄλλαι ἐπὶ τὰ μηνῶν ἥσπον ὅ τὰς τὰ ὅ νήπια, καὶ πρεσβύτερα ὀυλαβέεισθαι χρεόν. Quippe infantem firmiter hoc tempore per placentam utero matris hædere manifesto patet: non itidem vero, primis & ultimis gravidationis mensibus: porro, quicumque serio secum perpendit, quid per *pharmaca* olim voluit *Hippocrates*, lenientia, nostro sæculo administrata, nullus deinceps adhibere dubitabit.

Idem divinus senex; occasionem lenia ministrandi Cathartica duplicem nobis in aphorismis indigitavit; primum tum ea indicari asserit, cum *humores turgescant*; deinde, cum ii *impetum faciant* (ὀργῶντες, καὶ ὀρεῶντες;) humores tum *turgere* reputantur, cum adsint indicia plenitudinis manifesta in visceribus, in sanguine, alibive; *impetum* vero faciunt, quando confuso per vasa feruntur cursu; huc illuc, adeo furiose & impetuose vagari sentiantur; ut laborantes inde multum & eo agitare, vellicare, laceßere, conterere diutinè perseverent, quò nec tum dormire, nec quiescere, nec vel procumbere, cum ullâ delectatione vel jucunditate,

prius

prius valeant, quam istam humorum redundantiam, quoad ejus fieri potest, sat abundè depleverimus.

Idem *Hippocrates*, Aphorismo vigesimo, Sectione quartâ, ait, Ἀπυρέτοιςιν ἔσονται, καὶ ῥίγησιν, καὶ γενά-
των βάρεσιν, καὶ ὀσφύϊν ἄλγημα, κάτω φαρμακείης δέειξ
σημαίνε. *Non febricitantibus, si fiat tormen, & genuum
gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse
indicat.* Quorum omnium symptomatum causam pau-
cis, quoad possumus, verbis extemplo dilucidabimus:
organum, quod scimus, nullum morbo vexatur aliquo,
qui vel ab humorum quantitate vel ab eorundem qua-
litate vel tandem à corporibus superfluis ortum non
ducat suum; quandoquidem vero quisque sibi indul-
gere, quoad fieri potest, obnixè meditetur; idcirco
morbi à copiae absumptione, à qualitate, vel à super-
fluis, in corpore humano oriundi, ne vel minimam cum
morbis à quantitate auctâ natis rationem habere viden-
tur. Hinc fit, ut quodocunque humores partem ullam
adoriri contingat; partem istam plenitudine eorum par-
ticulari adeo oppleri patet, ut eam plene obrui exinde
periculum sit; ni medici evacuationem aptam, & mor-
bo præsentī idoneam maturius aliquanto moliantur.

Tametsi Cathartica rheumatismis cæterisque morbis
inflammatoriis, in declinationis stadio utilia perquam
esse supra observavimus; jam tamen ratione prorsus
inversâ remedia ejusmodi aliquando multum his obesse
affirmamus, dum nimirum inflammationis vigor per-
sistat, effervescentia recens inceperit, sanguinis etiam
mistura plus nimio turbata, nec vel minimum quidem
tunc ad subsidentiam idonea reperiatur; Cathartica e-
nim, quandoquidem si non eam confusionem, quam
morbi id genus plerumque producere sueverint, parem
tamen fermè cieverint; ea, nullo modo quidem antea
conducere comperiemus, quam hujusmodi commotio
propemodum defervere advertatur; huic, quod scimus,
sententiæ, medici ad unum fere omnes unanimiter
subscribunt.

Omnis quidem evacuatio juxtâ spiritus exhaurit, ac
humores exturbat; quemadmodum vero necesse sit,
humores quandoque solum, haud vero spiritus, elician-
tur; eam ob rem Cathartica fortiora imbecilliores haud

ferre valent; seniores itaque jure merito debiles exinde reputantur, quod spiritus eorum, semel pulsi, difficillime refarciri queunt; infantes itidem remediis ejusmodi evacuatoriis prorsus idcirco abstineant; quod quacunque indicatione ostendi videantur, spirituum etiamnum conservatio morbi depulsioni adeò præponderat, ut, istis semel everfis, morbus semper in deterius vergat, morsque extemplo præ foribus ut plurimum adstet.

In quavis viscerum labe, nimium nempe radicâtâ, cujusmodi sunt ulcera & similia, Cathartica ideo periculosa sunt, quod & ulcus admodum irritent, acrimoniam nimirum augendo; & hecticam eò intendant, quo sanguinis excandescentiam inde magnopere cieant; hinc cruribus œdematosis, ab ejusmodi tabe inductis, maximo detrimento plerunque idcirco sunt, quòd vires præsertim admodum prosternant; tumores autem id genus, raro aut nunquam superveniunt, quin, cum ægroti paulo post, eheu! ad plura abituri sint; cum enim spiritus eorum, à morbo diuturniori, fermè exhauriantur, tum sanguinis motus usque adeo tardatur, ut fibræ apprime exinde laxentur, quòd sanguinis moles, fibrarum retropellentium oscillationi, nunc parum obediât; qui idcirco deinceps in crurum fibris ut plurimum omnino subsisteret; nisi quod à posturâ horizonti parallelâ, lectique calore adjutus, adeo denuo fundatur, ut rursus, ad tempus, in motum cieatur.

Quam ob causam remedia purgantia vasa dehiscere cogunt, alicubi quidem advertimus; quod ea nimirum in fluidis effervescentiam concitare, atque adeo orificia, contactum prius ambientia, apprime distrahere compertum sit; Cathartica idcirco tum administrare, cum lochia fluant, sane empiricum esset; inter puerperium igitur remedia ejusmodi prorsus evitanda sunt; quod hic de lochiis protulimus, id omne de *Varicibus* etiam internis intelligi volumus; dummodo præsertim ad intestina respiciant; optandum quidem est nos penes fuisse æque varices ac aneurismata explorare; at cum hâc de re nondum nobis constet, quem in remediis delectum ideo habeamus, incerti etiamnum hæremus. Hisce morbis laborantes nunquam non inopinâ morte

enecari certi sumus; quendam revera novimus ita laborantem, qui, à remedii Cathartici exhibitione, eà administrati, quia dolor *colicam simulabat*, repente exindè, vitam cum morte commutavit.

Quum acidum in sanguinis sinu delitescere, & ita morbum hystericum, stagnationes aliosque id genus morbos inde ortos ibidem producere advertatur, tum Cathartica non prius propinentur, quam præparantia diutius aliquantum administrentur; sæpius enim eò accessiones hypochondriacas hystericasque vel à mannâ solâ in quibusdam cieri experti sumus, quod tantulum idcunque sit remedii cujuscvis Cathartici, hujusmodi laborantes haud ferre valent.

Quandoquidem macilenti spirituum copiâ haud nimis ut plurimum onusti sint; idcirco necesse non est, remediis ii Catharticis omninò fatigentur; uti pinguioribus itidem ea quam optime ferre recusant, quoniam longè exinde languidiores fiunt; ex eo quod fluidis magnopere extrusis, vasa vi suâ elasticâ semet contrahere nitantur; quâ autem ratione parietes eorum propiùs invicem accedunt, spirituum emporium, omni suo penu quem intra tubulos suos complectitur, eâ proportionem spoliatur: siquidem vero spiritus quo parciore sunt, eo in orbem tardiores rotantur; exinde fit, ut seu macilentos seu pingues deorsum movere lubet, spiritus eorum suprà deturbantur, atque instaurari queunt.

In *pneumo-pleuritide*, quamprimum inflammatio eò usque fit evecta, quò in apostema semel abierit; cum deinceps sputum è pulmonibus excreatum magno decumbentibus fit emolumento; temerarium sane, ea remedia administrare foret, quæ huic anacatharsi è directo adversarentur; quandoquidem remedia, pectoralia dicta, paulò calidiora, seu quæ leniter irritant, hic idcirco profunt, quod pulmones à materiâ suâ purulentâ promptiùs expediant; Cathartica autem ideo vehementer ægrotis ejusmodi damno sunt, quod humores, jam à pulmonibus criticè extrusos, incautè aliò derivent: argumentum hoc eo magis exinde stabilitur, quòd si pleuritidè laborantes diarrhœa paulo magis immodica

modica infestare contingeret, in discrimen extremum exhinc ægri plerunque venire solent.

Quemadmodum in morbis quâ acutis quâ continuis, ita pariter in febribus, commotio ista præternaturalis, eo tempore solennis, uti tam praxis quotidiana, quam ratio recta nobis patefaciunt, maximopere remediis proprie Catharticis adeo adversatur; ut in ægrotis ejusmodi medicorum turba jugiter ea prohibere soleant.

Paulo fusius supra differuimus, quâ ratione remedia Cathartica in sanguinis profluviiis adhibita nocere possunt; quamobrem rectè cum *Wendelino* inferre licet, quod Cathartica nimirum in fluxu mensium immodico perquam perniciofa sint; utcunque se res habeat, fluxus ejusmodi perinde à seroso sanguinis statu ac à laxo corporis habitu interdum oriri cernimus; unde fit, ut ita laborantibus *rheum* prudenter, intervallis nempe debitis, exhibitum, pariter humores exhaurit, ac fibras unâ corroborat.

Tussis sicca, à pulmonum *tuberculis* ortæ, & tam spirandi, quam in utrovis latere decumbendi difficultate stipatæ, Cathartica idcirco male omninò ferunt; utpote quæ, in tuberculis ejusmodi, inflammationi porro promptum parant aditum; commotio enim, per vim Cathartici illata, reipsa inflammatoria est, quandoquidem ut in eâ sanguis paulò rapidiùs in gyrum rapitur; ita Cathartica, fibras etiam vasorum nimio plus vellendo, particulasque acriores exinde sanguinis massæ communicando, fluida in arterias evanescentes deinceps longè altius impingunt.

Authores diarrhœas idcirco diuturnas esse rectè advertunt, quod fibræ, magnâ ex parte, intestinales aliæve in istis locis uspiam sitæ, plurimùm lædantur; quandoquidem igitur ejusmodi diarrhœæ parum emolumenti, à quavis remedii specie, plerunque capiant, (cum hic remedia sint solum palliativa;) ita à Catharticis certo fere certius ideo incommodantur, quia uti rarefactio morbis fixis, atque igitur immedicabilibus, sæpius comitetur, ita Cathartica massam itidem sanguinis plus nimio commovendo eo lædunt, quo rarefactionem hanc nimis intendunt.

Singultus

Singultus ij, qui morborum coronidi sæpiusculè supervenire solent, remedia Cathartica haud prorsus immunè ferunt; exhinc nimirum, quod primum laborantes ejusmodi paulo debiliores sint, deinde quòd à commotione, vi Cathartici illatâ, quam certissime di-ruantur.

Medicamentorum purgantium causâ obstructions non loco-meabiles idcirco vehementer augefcunt, quod imprimis tantum abest ut effervescentia inde orta profit, ut potius obsit; hinc in melancholiâ hypochondriacâ, in paralyfi, in chlorofi diuturnioribus, & in scirrhis confirmatis, ægroti multum inde læduntur.

In dolore ventris fixo, ab intestinorum inflammatione orto, Cathartica adeo non profunt, ut potius plus nimio lædant; quippe actus purgatorius quieti, tum præcipuè necessariæ, omnino repugnat; lenientia vero, ac enemata nihilominus apprime eò conducunt, quòd natura semel saltem in die respondeat; præsertim vero profunt enemata, quippè quæ ex herbis pariter emollientibus atque discutientibus conflata, perinde stimulorum, pro fæcibus extrudendis, atque fotûs, pro phlegmone, vice funguntur.

Dolores ipsi nephritici parum commodi, ut plurimum, à Catharticorum administratione omnino capiunt; cautè quidem pensitandum est, quantum inter eos, lumbaginem, dolorem in musculo, *psoâ* dicto, & colicam interfit; *nephritis* autem, à dolore fixo in regione renali, unâ cum vomituritione perpetuâ detegitur, etiam pedem insuper terræ illidendo augefcit dolor; *Lumbago* exinde patet, quod corpore, vel minimum flexo, in posturam pristinam quam difficillime, præ doloris vehementiâ, denuo laborantes erigere valent; *psoa dolor*, dignoscitur ex situ, & ex eo quod si quando femur retro ducere, vel corpus paululum modo erigere conentur, dolor exinde admodum augebitur: *Colica* demum exinde noscitur, quod de latere in latus repente vagetur dolor, quod à pastu confestim augefcatur, quod denique à flatibus, quâ sursum quâ deorsum exclusis, maximopere sedetur. Dolores autem hi ad unum omnes, modo inflammationis periculum longe absit, Cathartica perferre valent; si excipiat tamen, quod

quod siqui, nimirum, calculo in renibus grandiusculo unquam vexentur, ii à Catharticis reverà eo deteriores exinde fiunt, quod ea inflammationem ex improvviso & inopinatò inferre pro certo habemus; hinc necesse est, axioma expertissimi *Barbetti* in memoriam revocetis, *magnus, nempe, lapis non est movendus.*

Remedia purgantia ab acidis quibuscvis ut plurimum castrari nòrunt omnes; siquando igitur acidi cujusvis signa in ventriculo unquam adfuerint, uti à ructibus acidis palàm fiunt; commotiones immanes, nausæ nempe, vomitiones, inflammationes, aliæve ventriculi laborantis signa à Cathartico, incautè administrato, extemplo germinare solent; hinc ergo, præparantia, humori huic idonea, oculi, nimirum, cancerorum, *Margarita*, spiritus cornu cervini & ejusmodi idcirco præmittantur, ut acidum hoc prius obtundatur quam extrudatur.

Quandoquidem indicationes contradictoriæ simul & semel consistere omnino nequeant; spirituum idcirco exhaustio, eorundemque conservatio unà indicari non possunt; exhinc in deliquiis Cathartica ideo non exhibenda sunt, quod animo linquentes remediis spirituosis cardiacisque, internè & externè adhibitis, prorsus erigendi sint; quem in finem, spiritus salis armoniaci cum calce nimirum vivâ destillatus, quòd effluvia exinde decidua quam cumulatissime nares & membranam pituitariam feriant, pro usu externo idcirco efficacissimus est; pro usu verò interno, sal volatile oleosum in vehiculo quovis idoneo, eo longiùs aliis, quo palato gratius est, omnino antecellit.

Tantum abest ut vomitio profit, ut interdum quam maximè obsit; ubi vomitus ideo symptomaticus unquam adsit, eam adaugere ineptum esset; idcirco hic Cathartica cautè admodum exhibenda sunt.

Tamet si *Martinus Wendelinus* axiome 875, libro 3. Cathartica, tempore brumali vituperet; tamen in climate nostro Anglicano perspirationis insensibilis vices quam optime gerere frequentius certiores facti sumus; dummodo enim, inter operandum, frigidum evitemus aërem, vix quicquam febribus, inde quam sæpissimè natis, commodius occurrere experimur.

Hi quorum corporis flamina adeo flaccescunt, ut vel minima rerum non naturalium immutatio eos in morbi discrimen adducat; ii à Catharticis idcirco abstineant, quòd damnum ab eorum usu, commodo exindè longè præponderet.

Asthmatici, qui præ effervescentiâ frequentiori exacerbationes exinde graves patiuntur, remediis drastice non idcirco fatigentur, quod commotionem eam exinde multum ciebimus, quam obnixè sedare oportet.

Tenesmo seu continuo & inani desidendi desiderio vexati, à Catharticorum itidem usu se ideo temperent, quòd indè fieri non potest, ut propensionem hanc gravem, illam magis provocando, unquam tollere queamus; quinimo partes affectæ externè decoctis, quibus verbascum lacti incoquitur, unguentis, quibus opium inest, perbellè & aliquandiu foveantur; opiatâque internè eo fine exhibeantur, quo, cum dolor mitigetur, tum irritatio perquam molesta sedetur.

Cathartica in quovis sanguinis fluxu perniciofa esse jamdudum advertimus; quamobrem ubi hæmorrhoides unquam immodicè fluere cernamus, ibi Cathartica diligentius evitemus: è contra vero, quandoquidem evacuationem hanc sanguinis criticam, naturæque congruam, hujusmodi remedia quam certissimè promoveant; siquando igitur hicce fluxus, quibusdam tam salubriter, emanans, unquam ex integro fluere desineret; Cathartica, *aloën* præcipuè, eo adhibeamus, quo rursum prodire cogatur.

Qui herniâ intestinali, à conatu vel quovis alio infortunio illatâ, laborare solent, ii tametsi intestina nunc intra abdomen sita sint, tamen Cathartica haud ideò impune ferunt, quòd descensus ut plurimum motui peristaltico paulò concitatori pari fere passu comitemur; idcirco à *fortiori*, si in scroto intestinum aliquando substituerit, Cathartica tum non possunt non ejusmodi ægrotis multum incommodare; quod si processûs diametrum, præ inflammationis vehementiâ, ab intestino unquam obturari contingat, nil præter operationem deinceps conferre potest: at siquidem ea à perpaucis nè promptè neu gnaviter certè peragi poterit: quanto satius esset, ægrotos tantò maturius sibi prospicere,

cere, quam morbos gravissimos incuriosius quidem tam flocci pendere?

In febribus intermittentibus Cathartica non usque conveniunt dum urina cocta dici mereatur; donec urina nimirum, sedimentum æquale, lævum, candidum, & conglobatum in fundum præcipitare cernatur; utpote quæ sanguinis secus misturam, plus nimis jamdudum turbatam, ultrà, quam maximè confunderent; urinam autem eam *crudam* nominamus, quæ, cum aliquantisper, aeri aprico exposita, steterit; fit exinde turbida & lactea (symptomata autem gravia tum insuper ægrotos unà infestare solent;) at quovis febris stadio lenientia, jam in usum vocata, nunquam non conferre practici reperient; huic sententiæ omnino *Sennertus*, l. 2. de *Febribus*, perinde ac *Martinus Wendelinus*, libro 3. *axiomaticæ* 1058. unanimiter acquiescunt; humores, scilicet, turgentes periculosius retineri quam ejici ii audacter affirmant.

Tamet si quorundam temperamenta, remedia Cathartica, quamvis à morbo ostensa, ferre nequeant; tamen hujusmodi non alio modo quam experientiâ solâ nobis unquam patefcunt; quæ natura individualis *idio-syncreasia* nomen à medicorum turbâ promeruit: hujus temperamenti ne causam quidem medici hucusque attigerunt, nedum idcirco rem confestim exosam nisi à *posteriori* etiamnum detegere conceditur: hinc autem fit ut alii ab emplastris, ab opiatis alii, atque alii ab aliis quam maxime quotidie abhorrere cernantur.

Hydopes ii, qui seu phthiseos stadiis extremis, seu viscerum quorumvis labi, seu sanguinis, passim subinde præ lentore suo subsistentis, crasi perquam labefactatæ seu spirituum demum absorptioni potissimum; ii porro, qui ulceribus fistulosis, qui imbecillitati, à ptyalismo vel evacuationibus istiusmodi quibusvis immodicis superinductæ, succedere solent: nequaquam à remediis Catharticis vel minimum sublevari queunt; & uti ne vel anasarcam quidem exinde, ita nedum asciten certè eorum adminiculo auferri volumus.

Hippocrates circa remedia Cathartica sequentes *Aphorismos* nobis exhibet; *Aphor.* 24. *Secl.* 1. ^a *In acutis affectionibus raro, & in principiis, purgante utendum, atque hoc, diligenti prius adhibitâ cautione faciendum.* Etiam *Aphor.* 7. *Secl.* 4. ait, ^b *Difficulter autem vomentes & mediocriter carnosî, deorsum, vitantes æstatem;* ex quibus palam fit, cautelas istas, quas nobis author hic inculcat, de Catharticis, istis temporibus, non vero de lenioribus, nostro sæculo usurpatis, solummodo proferri; porro, nisi pori cutis in Græciâ intestinorum emissariis, ibidem, longe patentiores fuissent; non magis sibi fere cavendum esset à Catharticis tempore æstivo quam brumali; quandoquidem vero, remedia drastica, olim administrata, humores quam impetuosissimè deorsum truserint; inflammationes apud antiquos quam apud nos exinde paulo frequentiores esse potuerint; idem senex, *Aphor.* 9. *Secl.* 2. hæc habet, ^c *Corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet;* exhinc non injuriâ inferre licet, *Hippocratem* procul omni dubio velle, ut remedia præparantia purgantibus omninò præmittantur, quæ lentiori certè præsentaneo prorsus adversari debent. Ast vox *ἔνρρα* sensum quendam, neque etiamnum, quod scimus, à medicis observatum, in se continere videtur; quandoquidem enim necesse est, liquores prius paulo tenuiores fiant, quam placidè, fluviorum more, pervolvere queant; idcirco opinari iniquum non est, euroiæ, saltem rationis prioritate, leptomeriam præcedere debere: seu liquores prius attenuandos esse, quam in orbem expeditè cogi poterint: num verò senex per *ὀργίαν*, circulationem placidam, uti videtur, intelligat, hic non est ulterior diffendi locus.

Sub morborum initiis, eò solum evacuandum est, quò nec morborum auctorum *κρίσις* nec eorum *λύσις* omnino exinde in discrimen venire poterint; quando-

^a Ἐν τοῖσιν ὕεσι πάθεισιν ὀλιγάκις, & ἐν ἀρχῇσι, τῇσι φαρμακείησι χρίεσθαι, & τῷτο, περιεξυκρινέσθαι, ποιεῖν.

^b Τὰς ὃ δυσμείας, & μέσας δυσάγκας, κάτω (φαρμακθεῖν, ἢ) ὑποσπασσάμενος θίγει.

^c Τὰ σώματα χρεῖ, ὅπως ἂν τις βέλῃ καθαίρειν, ἔνρρα ποιεῖν.

quidem vero evacuationum quantitas perinde à symptomatum vehementiâ, causisque evidentibus prægressis, quam à laborantium viribus reverà petenda sit, quia tamen symptomatum vehementia cum ægrorum viribus remedia haud passibus æquis unquam ostendat potioris idcirco indicantis, virium nimirum, primum ac maximè habenda est ratio, symptomatum deinceps curâ haud omnino, quoad fieri potest, interim posthabitâ.

Salia, quæ in scorbuto sanguini præesse percipiuntur indolem vel stypticam vel volatilem, maximam partem, reipsa sapiunt; in utrovis autem statu, alvum permultum constipari experimur; in primo casu, alvum nobis exinde subsistere videtur, quod acida, intra intestinorum canalem hospitantia, primum fibras plurimum constringant, deinde quod eas tanto rigidiores faciant, quanto nec irritationi nec motui per saltico prorsus obedire queat; in altero verò, idcirco minus respondet alvus, quod particulas ibidem fluidiores calor, in sanguine perquam immodicus, statûs ipsius salino-volatilis comes assiduus, quam maximè usque eò exhalet, ut partes residuæ non mediocriter inertescent; exhinc in morbis perinde scorbuticis, quam hypochondriacis, remedia alvum laxantia apprimè conducere reperiuntur.

Quandoquidem remedia laxantia primum quam lenissimè proritando, deinde ne vel minimam exin commotionem ciendo, officio fungantur suo; idcirco hiis, quibus, intestina quam gravissime inflammantur, adminiculo eò sunt, quò alvum quam tutissimè exorare solent.

Ubi alvus aliquandiu officio defuerit suo, ibi per enema injiciatur quam Catharticum exhibeatur; hiis enim in modum portio quædam sarcinæ abundantioris fecum descensui valdè resistentis, penitus amovet doloresque colici, frequentius exinde oriundi, deinceps omnino præcaventur; qui tamen, ni feces motui prius cessissent, certo fere certius obvenirent.

Hoc memoratu certè dignum est, quod quo major opiatorum quantitatem in quovis casu necessario exhibendam esse experiamur, hoc Cathartici, simul n

um atque eodem momento propinati, dosin largiorem administrare cogamur; eâ scilicet de causâ, quod piata sensum longè efficacius obtundant, quam Cathartica eundem irritent; quem tamen etiamnum, ummodo Cathartici dosis aliquantulum augeatur, opiorum energiæ superesse comperiemus.

Catharticum, parte dimidiâ minus, evacuationi deorum sat esse exploratum habemus; si tamen unâ cum eo eu tartarus vitriolatus seu antimonium diaphoreticum, atâ dosi, commisceantur: quî vero monitum hoc vos meliuscule intelligatis, verbo expediamus. Hinc igitur antimonium diaphoreticum in temperamento acido administretur, cum illud acidum quam efficacissime immutari sciamus, Catharticum deinceps voto longe minus respondere comperiemus; hinc fit, ut *Pilula Riveii* (quas sub titulo *Pilul. Hydrotic.* memoratas invenies) felici cum eventu in ejusmodi temperamento operari experiamur: illinc verò tartaro vitriolato in constitutione biliosâ adhibito; bilem licet pariter immutet, c figat, irritationem tamen quandam efficacem promptè revocare reperitur.

Joh. Jac. Waldschmidius, tam catarrhis quam opthalmiis obveniendi causâ, p. 239. & 247. remediis Catharticis, lunâ nimirum decrescente datis, hujusmodi morbos quàm optime omnino præcaveri affirmat; est cum scrupulum hunc, medici licet perspicacissimi, quantum nos perspicimus, nondum etiamnum eximunt; praxi, quanquam duci reverà cæco, plene nobis usque eò assentiendum est: quoad istiusmodi causam tandem aliquando bonis avibus deprehendi poterit.

Quamvis *Etmullerus* alicubi affirmet rheum energiâ suâ Catharticâ idcirco spoliari, quòd cum sale tartari in tincturam conficiatur; hoc tamen virum illum egregium, nullâ propterea experienciâ fretum, protulisse asserimus, quòd vel millies tincturam rhei *Willisianam* ipsi, eventu perquam felici, propinavimus.

Ecquando Cathartica voto medici haud omnino responderint? *D. Nich. Chesneau*, L. Obs. 542. istiusmodi mercurii vivi fumum per anum adeò excipere jubet, ut catharsis exinde certius secutura sit; ait enim, *Exemplo cujusdam chirurgi, qui simili ptisanâ*
F 2 multos

multos curabat, cum alvus non multum flueret, utebar suffitu ex puro Hydrargyro, partibus inferioribus excepto, sedente agrote in sellâ perforatâ; quo pellente humores ad ventrem, longè plures fiebant dejectiones postera die.

Iis Cathartici dosin longe minorem, experti loquimur, propinemus; quibus vel diarrhœa vel quivis alius alvi fluxus graviter incommodat; ex hoc nimirum, quod irritatio semel inchoata quam facillime deinceps procrastinari poterit.

Sydenhamius vel in ipso ascite Cathartica fortiora exhiberi præcipit; intra quatrimum ea repeti jubet: atque hujusmodi propinare usque pergit, quoad integra moles, in abdominis spatiis complexa, penitus illinc exhauriatur; hinc fit, ut seriò affirmet, id genus homines multo magis ab aquarum mole quam ab earundem exhaustionem perpeffuros; exhinc autem manifestum est, quam inanes, in ascite, cautelæ istiusmodi sint, quandoquidem suprà jamdudum demonstravimus, fieri non posse, ut aquæ, in abdomine resistentes, unquam omnino in vasa retro premi poterint: in intestinis equidem œdematosis, ubi viscera, præ jugi in ejusmodi latice immersione, immane quantum inflantur, seu in anasarca universalis, præ fluidis paulo lentius motis, ac usquequaque in vasis evanescentibus subsistentibus, perquam conferre experimur; cum in istis casibus, evacuatio ideo convenire possit, quod humores intra vasorum limites adhuc coerciti, adeo idcirco non effluerunt, ut ii segniter moti solummodo parumper ibidem subsisterint; atque siquid damni Catharticum obiter intulerit, id omne à remediis cardiacis facillè deinceps compensari queat.

Monita sequentia *Hippocrates* seriò nobis inculcat; si quibus, nimirum, aut vomitionem aut fluxum deorsum promovere animus sit; faciamus ut ejusmodi in cubiculo spatia aliquot, deambulando conficiant; sin evacuationes istas sedare velimus, eos quiescere vel & procumbere faciamus.

Quanquam, intentione perperam directâ, remedium Catharticum vobis unquam exhibere contigerit, sed non exinde, nimium reformidetis, quum remedium

vel

vel efficacissimum præstò habeatis; laudanum, nimirum, è vestigio propinatum, hypercatharsin, atque adeò tumultum omnimodum exinde ortum, puncto temporis refringere comperietis.

Siquando vobis infantulorum alvum subducere animus sit, remedium Catharticum eò nutrici soli propinetur, utpote cujus efficacia confestim infanti, lactis muliebris adminiculo, communicatur, quò intestinula, misturâ hâc ab istâ, quæ secundum naturam est, longè alienâ, multum exinde vellicentur, atque adeò tandem exonerentur; huic sententiæ *Sennertus*, c. 31. de *Epilepsiâ*. paritèr ac *Duretus in Holler*. p. 18. unamiter assipulantur.

Si quibus mercurius nimirum, scammonium, elaterium, gutta gamba cæteraque id genus remedia drastica administrantur, idcirco ne foris prodeambulare periclitentur; cum medicamenta ejusmodi, sub idem tempus, quo tumultus in sanguine cieant, perspirationis pondus paritèr impensius adaugeant; quocirca siquidum Cathartici Energia nondum præteriit, foras prodire audeant; si pororum obturationem ab aëris injuriâ sæpè sæpius perpeti deinceps reperiuntur; ex quâ, febris nimis sæpè, præ vaporum exinde retentorum, tam copiâ quam qualitate peccantium, accendi cernitur.

Riverius alicubi Cathartica fortiora in hydropse vituperat; secus idcirco quam *Sydenhamius* nostras ipse opinatur; quandoquidem verò fortiora in morbo hujusmodi perquam gravi haud omninò conferre reperiuntur; multo minus lenioribus istam cedere percipiemus: proinde nulla prorsus id genus remedia *unquam* prodesse experimur; quamobrem *Riverii* sententia, quantum nos etiamnum perspicimus vero quidem propior est.

Hippocrates habet verba sequentia de remediis purgatoriis, ante omnia, nimirum, biliosis, oportet propinare chologogum; pituitosis, phlegmagogum; hydropicis, hydragogum; melancholicis, melanogogon; palam idcirco est senem remedia aliquo sensu *electiva* deprædicare; ast quid per Cathartica nos velimus, fusius infra lectoribus sententiam nostram trademus.

Nos longè secus de temperamentis biliosis & serosis, quam de pituitosis & melancholicis opinamur; hâc præcipuè de causâ, cum priora nimirum alitèr atque posteriora,

steriora, quàm expeditissimè quidem irritationi, à remedio inductæ, obedire comperiantur; uti *Joël compend. art. medic. p. 127.* scitè reverà memorat; vir insuper ille egregius *G. Horstius. p. 360.* corpora sicca quam difficillimè moveri affirmat; quod fortassis exinde fit, ut ex *Etmulleri* sententiâ, cur intestina Cathartico plus hac quam illâ vice promptius obediant, in causâ sunt vel fibrarum sensibilitas vel succorum fluxilitas longè alia atque alia; ex eo fit, ut ii, quorum fibræ sunt perquam insensiles; etiam quorum sanguis particulis salino-acidis redundet, haud facile deorsum unquam moveri queant; eò, quod rigiditas perinde irritationi, præ remedii qualitate pungente illatæ, minus auscultet, atq; aciditas fusioni, præ ejusdem acrimonia, vix vel ne vix omnino cedat.

Quamplurimos dolore gravi cruciatos novimus in quibus remedia Cathartica ex eo parum voto respondebant, quod torsiones in partibus, ab intestinis longè diffitis adeò vehementes fuerint, ut eæ purgantis energiâ inductæ prorsus obtunderentur; quinimo sæpius evenire solet, ut dolor non modo exhinc cieatur quin etiam verò à Cathartico eò magis intendatur, quo citius istiusmodi in sanguinis massam rapiatur; atque id ex hoc fieri patet, quod pulsum, à medicamento purgante primum assumpto, atque deinde, isto parum succedente, quam maximè confestim accelerari percipiamus.

Hoc cum *Lusitano C. 2. obs. 99.* non rarò observavimus, Cathartica nimirum fortiora officio defuisse suo; cum mitiora tamen, vel iisdem exhibita, deinceps ex sententiâ responderint; quod etiam si quibusdam paradoxon videri poterit, id tamen hâc de causâ nempe non alienum exinde putandum, quòd quisquis est, qui secum serio perpendit, quæ in operatione Cathartici evenire solent, nullus deinceps hæsitare poterit, quâ sit ut irritatio paulo vehementior motum peristalticum adeò intendat, ut intestina isti haud promptè satis omnino cedant; siquidem enim sub idem tempus impensius exinde rigescunt eorum fibræ; Fluida inter eorundem parietes tunc amplexa, in massam sanguinis interea continuò repunt; quæ longè aliter in lenientium administratione prorsus contingere solent.

Lusitanus etiam non ineptè quidem practicis consulit, ut, modo remedia minorativa unquam exhiberentur, quæ voto nostro cefferint; tantisper, eo devorato, jejunemus; sin secus, paulo post idcirco nos comedere jubet, quod tam à cibi pondere quam à remedii stimulo, fæcum detrusio multum exinde faveatur, atque adedè magnopere promoveatur; quibus, cum ex animo succedant, nihil ultrà prorsus opus est.

Lapis Lazuli, cum sit remedium paulò asperius, rarius hisce temporibus à medicis, quibus hominum incolumitas studio est, imò vel ne vix equidem præscribitur; siqui tamen hunc administrare velint, illam hi, à salibus suis acutis, priùs, lavando liberare quam propinare meminerint; uti *Forestus*. l. 30. p. 3. ritè monet.

Hoc unà cum *Bartholino* sæpius advertimus, nautas, nimirum, purgantia fortiora ideò perferre; quòd, cum ejusmodi victu salito plerunque vescantur, atque hunc in modum obsoniis impense stimulantibus se jugiter asfuescant, remedia lenitèr tantum purgantia non multo magis quam victus, quo familiaritèr utuntur, stimulare soleant; hinc autem fit ut Cathartica ex voto non operentur, ni fortiora istis propinentur.

Hippocrates nobis alicubi secessus coloratos à Cathartico ex eo laudat, quod humores mali moris deorsum tendere significet.

In *Sanctorii Aphorismo* 48. de *Aere & Aquis* hæc habemus: “ *Qui morbis ab humorum copiâ prodeuntibus*
“ *hyeme vexari sunt soliti, purgandi sunt autumno &*
“ *non vere, reducendique sunt ad pondus, quo fruebantur*
“ *astatis initio. Et Aphor. 49. ibidem, Dum verò*
“ *morbi prodeunt a malâ qualitate, corpora vere & non*
“ *autumno purganda; magis enim æstate, quàm hyeme*
“ *intenditur qualitatis malitia.* Quandoquidem enim perspiratio liberior aëris injuriâ, tempestate autumnali, quamplurimum inhibeatur, idcirco pondus ulterius, copię jamjam nimis auctæ, accumulatum, exhaustionem omnimodam ostendit; è contra vero, si de humorum malitiâ, qualitate, vel acrimoniâ sermo sit; cum hæc, partibus serosis vere ac æstate quam maximè evaporatis, exinde longè evehantur, quòd tunc salia sibi invicem eo propius accedant; idcirco ea remediis Catharticis, quibus
salia

alia reverà promptiùs cedere novimus, prius evocentur quam nimium scatescant.

Monitum *Johannis Gallego de la Serna*, p. 495. hic memoratu dignum est, sic autem inquit; “ Nos verò
 “ dicimus, quod si in cujuscunque febris putridæ prin-
 “ cipio talis copia bilis vel alterius humoris in ventri-
 “ culo & intestinis sit, ut rugitus & clydonas excitet,
 “ simulque dejectiones talis humoris adsint, quod ante
 “ sanguinis missionem, dictos humores purgare cona-
 “ bimur, tum quia talis humoris motus, cum sit ad vias
 “ excretionis, turgentis humoris sapit naturam, ut su-
 “ perius diximus, tum etiam, quia sunt impedimento
 “ sanguinis missioni. Quod quidem præstabimus, non
 “ scammonèa, quamvis sit in paucâ quantitate, sed po-
 “ tius rheubarbaro, vel myrobolanis tostis vel non tostis,
 “ prout urserit necessitas, ut superius diximus, cum de
 “ evacuationibus symptomaticis agebamus. Si verò
 “ nullum sit indicium existentiae in intestinis talis hu-
 “ moris, nulloque modo moveatur, tunc à purgatione
 “ quantumvis levis sit, omninò abstinemus; quemad-
 “ modum idcirco occasione urgente, Catharticum præ-
 “ bet; eâ itidem absente, improbat.

Etiam si humorum *Coctio* evacuationem ostendat, non tamen unicum est purgantis indicans; quandoquidem ab *Horstio* observetur, quod humorum *Qualitas* quandoque maligna, seu acris, adeò exuperet, ut evacuatio non eo usque procrastinetur quoad humores perfectè cocti sint; nec vel qualitas sola, quin etiam verò *impetus* ac *turgentia* inanitionem indicant; uti *partis consideratio* nos etiam perquam hac in re eò dirigere solet, quò revulsio exinde conficiatur; quâ nimirum fit, ut affectio quævis viscus nobile, exempli causâ, statim occupatura, exinde simul feliciter ac efficaciter avertatur. Quod ad coctionem quidem attinet, *Francisc. Piens in tratt. de Febribus*, hæc habet verba, “ materia
 “ cocta purgatione est educenda, non cruda; coctio
 “ tantum fit in statu, cui succedit declinatio, in quan-
 “ tum videtur purgandum; etsi enim morbus solutus
 “ esse videatur, reliquæ tamen permanent, quæ so-
 “ lent facere recidivas; — dicuntque minorativam in
 “ principio convenire posse, eradicativam autem tan-
 “ tum

tum perfecta coctione & absolutâ; — non est semper expectanda perfecta concoctio ad purgandum, sed sufficit qualiscunque, idè licet in principio & augmento quando coctio incipit apparere, Catharsin instituere; uti enim particulæ disproportionatæ coquantur & sequestrantur per partes, ita & per partes evacuantur; id maximè apparet in chronicis febribus & longis, ubi alternis purgare solent medici & præparantibus uti.

Infantulis encoprotica eò in paroxysmis convulsivis exhibeantur quò secessus duos trêve in dies subducamus; quodocunque enim fæces unquam aliquandiù in eorundem intestinis substituerint, plurimum acefcunt, deinde admodum stimulant, ac demum accessiones subinde frequentiores introducere observantur. Temperamentis siccioribus ac calidioribus haustus, potiones, ac liquores istiusmodi; in pituitosis verò, ac humidioribus, pilulæ, boli, & medicamenta sub formâ siccâ deglutiantur; quandoquidem hoc modo pergendo, perinde addimus, quod deest, ac efficaciter stimulamus. Gravidæ, cum foetus primis & ultimis mensibus laxius utero adhæreat, non sunt, mensibus istis, Catharticis omninò laceffendæ — *N. Tulpius l. 4. c. 28.* Quendam distensionibus serosis, lumborum dolore, febre tamen vacuo, laborantem, hunc in modum, sanavit; nimirum, R. Rad. Jalap. ʒj. Diagryd. g. xv. cum Cremor. Tartar. qui pulvis, deorsum humores pellendo, dolorem confestim sustulit. Denique purgantia palam indicantur in sudoribus nocturnis, à victûs copiâ ortis; in humoribus turgentibus, præsertim modo sub idem tempus urina hypostasim aliqualem deponere observetur; & in mensibus decoloratis, eo quod, seri redundantiam eliciendo, perinde massæ sanguineæ λεπτομέγεθας aquosam atque vasorum inde laxitatem penitus abigere advertantur.

Corollarium.

Bolus leniens.

R. Rhabarbar. Opt. Pulv. ʒj. Sal. Absinth. gr. v. Syr. Caryoph.

Caryoph. q. f. m. f. Bolus sumendus primo mane ;
& repetendus semel in septimanâ.

OBSERVATIONES.

Bolus hicce munere leniter equidem tantum fungetur suo ; in alvi fluxu quovis , remediis allioticis tuto præmitti poterit ; cæterum usque adeo lenis est , ut à constitutione quavis , vel tenerrimâ quidem , non solum facile ferri , verum etiam in massam sanguinis prius rapi quam operari possit ; enimvero illum vel in febre pessimi ferme moris , modo ostendatur , propinari quimus ; quandoquidem viro huic egregio , axiomata sequentia maximæ semper , quoad ego perspicio , curæ fuerunt , (quocirca & vel impense laudandus est ,) nimirum , *primum ut natura motus seriò aque animadverteret ac promoveret ; dein ut nil damni egroto inferret suo* ; exinde fortassis est , ut quamvis in ipsius præscriptis , doses remediorum sæpe paulo minores , quam aliis medicis passim obviæ reperiantur ; damnum tamen (si sit ullum) à dosi minori longe facilius quam à solito majori refarciri potest ; cautela autem hujusmodi exinde haud omnino sibi vitio vertatur , quod apud ipsum , de primatum capitibus utplurimum ageretur.

Tinctura Hiera nostra.

Rx Tinctur. Stomachic. Magistral. (sine Mastiche & Spic. Nard.) ℥jß. Aq. Pæon. Comp. ℥j. m. f. Haustus primo mane sumendus cum levi custodiâ.

OBSERVATIONES.

Eximius vir inutilia compositionum ingredientia ubique , ut nobis videtur , à præscriptis suis proscribere conatur ; quâ vero de causâ , *nardum* , cum sit radix aromaticus atque ideo carminans ac stomachicus , hic omittere jubet , vel quam ob rem *mastiche* pariter simul à compositione exularet , mihi revera nondum etiamnum liquet , cùm particulis acribus , amaris , aromaticis , vel foetidis ambæ consent ; quæ omnia energias suas vino facile impertire valent : quare illa certè non aliâ de causâ relegare poterit , quam quod optimatum palatis ingrata fortasse remedia haberentur.

Quando-

Quandoquidem Cathartica caballina nec ægroti ingerere nec medici propinare debeant; idcirco mitiora, hoc ævo, frequentius repetita, fortiorum, priscis sæculis exhibitorum, locum quam optime suppleant; quod si humores serosos hujusmodi remedia deorsum trudent, ac foris amendant, quid ni & in casibus sequentibus prodesse observentur? in morbis, nimirum, soporosis, paralyticis, pituitosisque; in ictero, vertigine, scorbutoque; quin etiam in sudoribus nocturnis, ulceribus, impetigine, mensibus decoloratis, anasarcâ, colicis, tussibus stomachalibus (uti loquitur *Waldschmidtus*,) in infantum convulsionibus, quæ ut plurimum à saburrâ acidâ in ventriculo commorante ortum ducunt; in februm, vel etiam malignarum, declinatione, ac interdum vel in ipso statu, dummodo signa coctionis adsint aliqua, ut usu sæpius comperimus; in rheumatismi itidem declinatione, diebus nempe quatuordecim exactis, (quoniam supra in vigore inflammatorio parum ea conferre demonstravimus;) in pleuritide declinante etiam, (expectoratione, scilicet, sat feliciter emensâ, ægrotisque jamjam reconvalituris;) cæterum in phthisi confirmatâ, (ubi pulmones eroduntur ac ulcerantur,) vel etiam in quovis viscere admodum labefactato, quam maximè obsunt.

Supra differuimus, quâ sit, ut nautæ dosin Cathartici majorem atque alij jugiter exigant; quod reverà, cum primum medicinæ praxin aggredieremur, nobis novum omnino quid, usque videbatur, quoad *Bartholinum* consulendo, scrupulo hocce nos ipse confestim liberabat, cum hoc ipse primus, quod scimus, observaverit.

Brevi corpora sicca, robusta, athletica, obstructa, melancholica, nec Catharticis assuefacta, difficile; at temperamenta his contraria facile purgantur: Cathartica lenia denique ibi exiguntur, ubi coctionis vel impetûs cujusvis signa in sanguine adsunt: sed utcunque aderunt res; hoc vobis solenniter inculcamus, ut caveatis, ne ægrotis, vobis haud omninò cognitis, medicamenta fortiora unquam exhibeatis; quandoquidem peccata omissionis peccatis commissionis leviora jugiter habeantur.

Pilula Encoprotica.

℞ Pil. Stomachic. cum Gumm. Extract. Rudii Spec.
 Diambrae sine odorat. ā ʒβ. cum f. q. Syr. violar.
 m. f. Pilul. minor. quarum Capt. j. horâ decubitûs &
 tres mane, diebus alternis, sine custodiâ, augendo
 vel minuendo Dosis pro ratione operationis.

OBSERVATIONES.

In quatuor pilulis grana circiter quindecim Cathartici continebuntur, quæ idcirco cum ne vel fæces quidem istæ deorsum trudere satis erunt, nedum alvum ciere omninò sufficient; quocirca hæ in ægrotorum temperamenti, quæ quàm facillimè irritationi vel minimæ cuivis cedent, solum omninò propinari debent; quandoquidem humorum quantitatem sat parcam in laborantibus istiusmodi deturbare queunt; abundè quidem sufficit, ut natura, in languentibus & genio minus indulgentibus, semel in die respondeat; quod, egregius vir, ejusmodi remedio solum sanè moliri voluit; ideoque mulieribus hysterica affectione afflictatis maximè conducunt; (quæ adeò ut plurimùm non eunt medio utrinque in nimio nunquam non delinquant, & hinc vel fluxibus vel constipatione, aliisve id genus symptomatibus jugiter afficiantur,) quòd medicamenta paulò asperiora nunquam istis omnino prodesse comperiantur. Summatim ergo, purgantia cujusvis speciei propriè dicta, nec infirmis, senibus, infantibus; nec item febre continuâ laborantibus, fluxibus alvi vel uteri quibuscumque, hysterica vel hypochondriaca affectione decumbentibus; nec pleuriticis; nec tabidis; nec calculo renum, colicis ab inflammatione, acutissimis, vomitionibus diuturnis, delinquentibus, asthmatis paroxysmo nec denique herniis, omninò conferre; quinimo impensius obesse, experimur.

Infusum Catharticum.

℞ Fol. Senn. ʒij. Absinth. rom. p. j. Sem. Coriand. Cardam. ā. ʒj. infunde simul in aq. fontan. ʒiv. f. Colatura, cui adde Syr. è Spin. Cervin. ʒj. m. f. Potio. cum regimine sumenda.

OBSERVATIONES.

Catharticum hoc egregium sane est: in anasarca perinde ac in tumoribus œdematosiſ multum prodeſt: doſes, vel repetitæ, è ſyrupo de ſpinâ cervinâ, ſeu rhamno Cathartico, ſerum à quamplurimis electivè deturbare etiamnum feruntur; ſyrupi hujus efficaciam Sydenhamius reverâ jamdudum in aſcite abigendo apprimè deprædicavit: cæterum ſupra ſat abunde oſtendimus, quî ſit, ut Cathartica morbiſ hujusmodi parum omnino conferant; quandoquidem enim materies iſthæc extra circuitûs metas quàm longiſſime diverſerit, atque ibidem aliquandiu ſubſtiterit: iſthinc denuò, ni multum fallamur, ne vel unquam quidem revocari poteſt; præſertim vero ſiquando aſcites aliquanto diuturnior fuerit: ſin ſecus, cum, nempe, morbus hic recens omnino ſit; nec Cathartica nec Emetica tum equidem prorſus improbamus; utpote cum veſica, quemadmodum *ἀνοπρία* patet, paululum ſolum inverſa, licet exectâ, liquores quoviſ facile tranſudare ſinat; quid ni, & illa ſerum pariter in abdominiſ Cavitatem effuſum, vivo animali, imbibere queat? nulli enim poros viventium defunctorum poruliſ magiſ dehifcere omnino dubitamus: hinc ſiquando ſalia hæc introſumpta ſanguinem virtutibuſ ſuiſ unquam egregiè imprægnaverint, illa tandem, unâ cum Lymphâ iſſdem imbutâ, non poſſunt quin in cavitatem etiam effluant: ejuſmodi remedia tunc ex eò forſan proderunt, quod aquaſ inſuper iſtaſ, ibidem ſtagnanteſ, adeo quoque attenuent, ut veſica particulaſ lymphæ hujus, à ſalium qualitate multum comminutaſ, facilè intra poroſ ſuoſ etiamnum admittat, atque eo aditum ſibi, quoad ejus fieri poteſt, parabit, quo liberius permanare poſſit: quæ tamen in hydrope confirmato haud eò evenire poſſunt; quod, in hoc ultimo caſu, ſerum adeo glutinoſum fiat, veſicæque parieteſ extrinſecoſ uſque eò undique cooperiat, & oblinat, ut nil liquaminis eâ de cauſâ, deinceps illâc permeare poterit: hoc autem cuiviſ in corporum, hydrope confeſtorum, ſeſſione, vel mediocriter verſato, palam ſit. Quamviſ hoc, quod ſci-
mus, præter noſ adhuc nemini videatur, vero tamen

idcirco similis habendum est, quod si res secus se haberet, hoc, ab iis, qui nobiscum haud sentiunt, aptè peti poterit; quid, nimirum, de vaporibus istis, à visceribus continuo defluis, alioqui fieret? nisi quod, hi in laticem tandem conversi per poros vesicæ introspicientes quam facillime transmeent, & hoc modo lymphæ æque ex abdomine per poros ejus, ac urina per ureteres, à renibus, in eam introvehatur ac demum foras eliminetur.

Potio Purgans.

℞ Decoct. Senn. Gereonis ℥iij. Mann. opt. ʒβ. Cremor. Tartar. ʒβ. Aq. Pæon. Comp. ℥iij. m. f. potio mane sumenda, cum levi regimine.

OBSERVATIONES.

Etiam si potio hæc Cathartica lenis admodum sit, nullum tamen illâ remedium, vel in temperamentis omnigenis, accommodatius unquam reperiri potest.

Scholastici prolixius olim egerunt, imò vel lites, futiles quidem, de Catharticis electivis obnixe moverunt. Næ, medicamentum Catharticum quod temperamento cuivis cholagogon esse, id alteri quidem, vel in eodem subjecto, seu phlegmagogon seu melanagogon aliàs fore experimur; cæterum hoc de Catharticis minimè mirum est; quippe quæ interdum alterantium vices, imo vel frequentius, gerere observavimus. Quoties enim Cathartica leniter hos stimulaverint, cum illos, è contra, extra modum equidem fatigaverint? Quinimo quoties hujusmodi remedia hodiè quam optime ex animo, metam attigisse, quæ triduo quatrduove post muneri suo, & in eodem, omnino defuisse novimus? Electionem idcirco solum in irritatione aliâ atque aliâ prorsus consistere asserimus; utpote quæ si lenis admodum fuerit, ductum choledochum tantum; sin fortior sit, intestinorum etiam fibras, glandulasque plus minus stimulare percipiuntur; hinc pro irritationis more, vel bilis, vel pituita, vel serum, vel humores variegati prodire cernuntur.

Cum viscera quævis materiâ pituitosâ serosâve onerentur, oppleantur, potio hæc, maturius exhibita, eam inde

inde revellere ac tandem deinceps foris amandare queat; quocirca remedia id genus lenia cephalalgiiis gravativis, comatibus, lethargis, vertiginibus, paralytibus, convulsionibus, incubis, epilepsiis, tremoribus, catarrhis, memoriæ deperditæ, melancholiæ, plenitudinibus quibusvis uspiam invadentibus, tussibus, asthmatis (in intervallis,) Phthisibus recentibus, peripneumoniis nothis, pleuritidibus, cachexiis, morbis œdematosis, chlorosis, fluori albo & rachitidi nunquam non prodesse reperiuntur; quæ tamen pro ægrorum viribus solis ultra repetenda sunt.

Pilulæ Hydroticæ.

℞. Extract. Rudii ʒij. Resin. Jalap. ʒj. Spec. Diambrae sine odorat. ʒj. Ol. Juniper. gr. iij. cum f. q. Syr. de Spin. cervin. f. pilulæ minores, quarum unam capiat horâ decubitûs, & tres mane, bis vel ter in septimanâ, in Cochl. Julapii vulgaris.

OBSERVATIONES.

Resinis purgantibus oleum juniperi sat idoneè idcirco adjicitur, quòd alioquin intestinorum torsiones, nisi quòd hujusmodi aromatica unâ commisceantur, ut plurimum ciere soleant; quippe quemadmodum particulæ resinosæ intestinorum plicis firmiter adhærent, ita quòd glandulas, ibidem sitas, paulo pertinacius hinc irritant, eò liquores contentos isthinc diutius emulgent; quamobrem haud infrequentius obtingere solet, ut Cathartica resinosa per totum diem non modo torsiones sed etiam secessus promoveant, producant: exinde fit, ut nequaquam seu colicis sive quibusvis viscerum torminibus conducere reperiuntur.

In dyscrasiis autem sanguinis egregias virtutes obtinent; in anasarçâ, nimirum, in quâ intestina perinde interdum ac partes externas multum intumescere nulli dubitamus: in eruptionibus item à scorbuto salino illatis maximopere conferunt, utpote quæ humores serosos (in quibus salia ut plurimum divertunt) deorsum pellant & foris ablegent: in elephantiasi seu leprâ Græcorum, scabie humidâ, gonorrhœis simplici & virulentâ (modo mercurius dulcis eis adjiciatur,) cephalalgiiis frigidis;

& demum, in omnibus iis morbis, in quibus serum redundare percipitur.

Quantumvis mistura hæc morbis supradictis aptè satisfaccommo- detur; ubi tamen hi paulo contumaciores aliquando evaserint; *pilula Riveriana*. sequentes, eas vel longissimè virtutibus antecellunt; quæ sunt.

Rx. Pilul. Ruff. ℥j. Antimon. Diaphor. G. Guaiac. ā. ℥ij. Balf. Peruvian. q. s. m. f. Pilul. Dos. Dj. per 30. dies.

Pilulæ hæc vere & autumnò, potissimùm verò in morbis annuis, exhibendæ sunt; interea tamen providendum est, tam ne, quamdiu capiuntur, frigori omnino se exponant, quam ne hypercatharsin cieant: nam si remedia hæc Cathartica ad tempus, in singulos dies idcirco repetenda sint, quod ægrotorum res illa postulaverint; cavendum omnino nobis est, ne ultra secessus duos tresve ad summum quotidie alvus respondeat; quod eò Catharsis per *Epicrasin* appellatur, quia humores tam simul indè leniter ejiciantur, quam ibidem obtundantur; & methodus Cathartica ejusmodi lenia præscribendi hæc est, ut si hodiè paulo vehementius alvum subduxerint, crastino die prorsus usque omittantur, quoad citra virium jacturam tutò reiterari poterint: & cum unquam postea propinentur, dosis tum paululum minuatur.

Quoad mercurialium usum; cum eorundem administratio hodie quam maximè, vel apud medicastros, invaluerit; idcirco sententiam nostram hac de re breviter proferemus, ac verbo perstringemus: egregius vir, mercurialia rarius exhibuisse, quantâ potuimus diligentiam perquirere, nobis omnino videtur: ut ut se res habuerit, absque eis, nil permagni prorsus agitur; quemadmodum enim morbi quamplurimi à sale metallico, si Ballonio fidem habeamus, originem suam ducant, ita quî ii, nisi à sale id genus, morbo omni ex parte contrario, auferri queant? Hinc fit, ut remedia è mercurio antimoniove conflata morbos hujusmodi quam efficacissimè abigere comperiamus; quem in finem bolus sequens in habitu quadrato apprimè conducit.

Rx Merc. Dulc. g. xv. Antimon. Resuscitat. gr. iv. Con-
serv.

serv. Lujul. q. f. m. f. Bolus, cum regimine, primo mane sumendus.

Tametſi apud Anglos mercurium dulcem, in hauſtuli formâ, propinare nondum in conſuetudinem venerit, illum tamen hunc in modum exhibitum, non ſolum efficaciter verumetiam vehementius quam par eſt, operaturum nulli dubitamus.

Mercurius præcipitatus albus cum mercurio dulci permiſtus, atque ita in pilulas conſectus, remedium eſt contra morbos paulo contumaciores vel efficaciffimum.

Pilula præparantes.

R Calomel. Recent. ſexies ſublim. ʒj. Extract. Gentian. q. f. m. f. Pilul. n^o. ij. ſumendæ horâ ſomni.

Pilula matutine.

R Pilul. Ruſſi, Extract. Rudii ā. ʒß. m. f. Pilul. n^o. iv. mane ſumendæ poſt doſin præſcriptam.

OBSERVATIONES.

Utrum mercurii ſalia ſive ſæpius ſublimando, (quo fit calomelas,) ſeu lavando in aquâ fontanâ, paſſim obtundantur, parum nobis omnino refert; quandoquidem aut in ſanguinis maſſâ, aut in inteſtinis pernoctando, Cathartici propinati viribus, nimirum, unitis, humores vel peſſimi moris mane deturbare valebunt.

Praxis apud medicos hodiernos uſitata ac porro comprobata eſt, ut mercurium dulcem ad grana aliquot, ætati idonea, ſemel quotidie cum conſervâ ſeu extracto quovis in bolum pilulaſve conſectum, per tres quatuorve noctes perſeveranter exhibeant, adeo ut in ſanguinis ſinu pauliſper commorando, humorumque acrimoniam eo demulcendo; deinde quarto die, à primâ doſi emenſo, Cathartico propinato, molem depravatam multo efficacius deinceps extrahent; utpote cum ſanguinis maſſa ex hoc immutetur, facile dein eliminari poterit. Methodus hæc ptyaliſmi vices quam optime gerit; præſertim quando morbus non adeo invaluit, ut ſanguinis maſſa penitus inde corrumpatur: cavete tamen, ne quibuſque mercurium dulcem hunc in modum, nullo nimirum discrimine, exhibeatis, quippe

quem plerisque, unâ vel alterâ dosi ingurgitatâ, ptyalissimum sat molestum excitâsse novimus: exinde est, ut nos jam cum floribus sulphuris mercurium admiscere jugiter assoleamus.

Quandoquidem ne remedia mercurialia neu quævis alia nobis adhuc palam facta asciten unquam abigere valere reperiantur; illa idcirco soli anasarcæ efficaciter opitulari queunt: unde nos *Wallai* sententiæ, qui Cathartica in hydrope, ascite dicto, omnino vetat, prorsus acquiescimus: nam, ut verum fateamur, nil præter paracentesin, si ista tamen, hîc valere poterit. Non possumus non modum paracentesin instituendi novum, ut loqui amant, obiter vobis memorare: quidam, nimirum, liquamen integrum simul & semel eò audacter exhauriunt, quò id, cum sit corrosivum, excrementitium, ac inutile, hæcticas, intestinorum gangrænas, diarrhœas, convulsiones atque alia id genus symptomata inferat, ac mortem exinde certò festinanter urgeat. Parturientes insuper onus, ut aiunt, suum absque injuriâ multâ confestim exuere observantur: siquidem idcirco hinc morbi, illinc vero salus; materiam totam simul exhauriunt. Verum quidem est eximium *Dm. Thouvenot* ejusmodi viris, viam jamdudum quodammodo monstrâsse; utpote qui aquas ad libras viginti, ratione ad vires tamen ægrorum habitâ, sæpissimè extraxerit, hi vero totam aquarum molem, unâ, eliciunt; at quam feliciter, volumus ut ipsimet vobis referre dignentur.

Hippocrates, Aphor. 51. Sect. 2. hæc habet verba, † “ Multum & repente evacuare aut replere, aut
“ calefacere aut frigefacere aut aliter quocunque modo corpus movere, periculosum est, nam etiam om-
“ ne nimium, naturæ est inimicum, quod vero paula-
“ tim fit, tutum est: tum alias, tum si quis ex altero
“ ad alterum transeat. Estò, authori huic eatenus so-

† Τὸ ὡς πολὺ, ἢ ὀλίγως, κενόν, ἢ πληρῆν, ἢ θρῆναιεν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως, ἵκονεν τὸ σῶμα κινεῖν, σφοδρῶν. ἢ γὰρ πᾶν τὸ πρὸς τῇ φύσει πολεμικόν· τὸ δὲ καὶ ὀλίγον, ἀσφδγῆς· ἢ ἄλλως μὴ ἢ τις ἀπὸ ἐτέρας ἐφ' ἑτέραν μεταβαίνει.

lum hâc in re fidem libenter adhibeamus, ut praxi feliciter apud hodiernos attentatæ competere percipiatur; quod si *ἀντὶ τοῦ*, vel ab ipsomet sene, nec ab ipsis nec à nobis, his temporibus, sat esse concedatur; quidni &, quæ ipsimet inauspicato vel quam sæpissime (dempto nimirum uno vel altero,) moliti sint, tam repudiare liceat? Assertio enim hæc, quantum auguramur, non solum haud certa est, quin etiam gratuito profertur: hunc, nimirum, in modum ejusmodi argumentantur; latex in abdominis spatii commorans, cum sit toto genere præter naturam, idcirco quamprimum exhaustendus est. Quamvis autem argumenti seu enthymematis hujus propositio antecedens vera sit; exinde tamen consequentia negatur; quod in enunciatione exhaustio sola ostendatur; cum in illatione verò, pariter exhaustio ac tempus cum quantitate unà indicentur; seu quemadmodum consequentia propositione antecedente magis extensiva sit, idcirco & vitiosa reputatur: siquidem plenitudini evacuatio, viribus autem tempus & quantitas prorsus accommodentur: hinc fit, ut tam aquarum in cavitate moram juxta quam ejusdem exhaustio-nem præproperam mortem ex æquo confestim accerfire comperiamus. Quod ad parturientes spectat, hæc ob fœtum in utero contentum, imo vel mensibus novem emensis, non multo pejus se habere solent, quam si gravidæ non essent; exinde fit, ut, vel inter partum, vires earum quam optime constant; quippe quæ à mensium fluxu toto graviditatis tempore haud prorsus fatigatæ fuerint; quæ porro etiamnum perinde appetant atque nutriantur: quæ longe secus in hydropicis obvenire comperta sunt: eæ enim vero perinde languescunt, male appetunt, maximopere sitiunt, febricitant, ac spirituum inopiâ laborant. Quænam idcirco paritas inter hydropicam ac gravidam, si de evacuatione sermo sit, quæsumus, interesse poterit? Gravidæ nimirum spiritus ac vires posthac quam facillime, ut plurimum, recolligere percipiuntur, quandoquidem sanguinis crasis in graviditate exactè conservetur: quæ ex eo continuo secus in hydropicis evenire solent, quòd spiritus in eis maximoperè absumentur, adeo ut cum abdomen, quod exinde immane quantum undiquaque intumuerit,

intumuerit, in ambitum assuetum denuo, præ spirituum inopiâ, extemplo cogi haud poterit; exinde fit ut haud ita multò post ejusmodi, cheu! à medio tollantur: quod si hydropici quivis paracentesin aliquanto maturius instituerent, longe aliter certò sentiremus.

Pilulæ hæ in cachexiis exinde mira præstare queunt, quod materiæ morbificæ portiunculam efficaciter exhaurire comperiantur; atque ita sanguis reliquus à salibus volatilibus, ab amaris ac chalybeatis facilius deinceps immutari poterit: si contraindicationes tamen excipere velimus. In morbis œdematosis eos humores specificè deturbare experimur.

Incipientibus morbis, pulsus interdum intermittit, atque adeo inæqualis est; tum dubitare ac indagare licet, quanto Cathartica prodesse poterint: hanc autem inæqualitatem, modo rem serio perpendamus, inde oriri comperiemus, quod tam cor quam vasa sanguifera plus justâ sanguinis copiâ onerentur; atque hunc in modum nec cor nec vasa sese rite contrahere possunt, saltem vasa nequeant eâ vi vel impetu sese contrahere, quâ contenta sua uno ictu expellere valeant; atque exhinc fit, ut resistentia à mole unica nascatur, quâ prudenter evacuata pulsus deinceps fit omni ex parte æqualis.

Virium prostratio, sanguinis cacochymici, ad spiritus generandos penitus inepti, soboles perpetua, adeò nos à Catharticis non absterreat, ut ea non idcirco omninò propinemus; quandoquidem Dyscrasiâ, à Cathartico, demptâ, languor ac impotentia, inde orta, confestim evanescunt. Quamobrem istiusmodi imbecillitatem à solâ humorum vitiatorum copiâ pendere palam fit; providendum autem est, ne hoc in casu, evacuationis obtentu, vice morbum auferendi, ægrotum trucidemus; quoniam medicamentum leniens, pro ne natâ iteratum, Cathartici satis idoneè locum tenere compertum est; quod, cum humores per epicrasin, seu sensim sine sensu exhauriat, quos Catharticum vel cum impetu deturbat; hunc in modum causam abigemus, & tam ægrotorum salutis rationem habere, quam famæ nostræ consulere videbimur. Quinimo in languoribus, ex febre ortis, enemata Cartharticorum vicibus quam optimè fungi

fungi sæpius experti sumus: Quemadmodum itaque victus malæ indolis sit cacochymix fons si minus unicus at præcipuus; ii ergo, qui ejusmodi obfoniis vescuntur, Catharticis dictis de causis malè mutantur.

Ii qui ægrotis macie ac tabescentiâ confectis, Cathartica exhibent idcirco maximoperè peccant; quod, siquidem ejusmodi à medicamentis paulò calidioribus tantopere affligantur, Cathartica propinando marcorem ac atrophiam certo ferè certius introducere solent; ut error medicorum quorundam gravis equidem sit, qui cum id genus ægrotorum alvum haud facilè subducere queant, ad scammonium & remedia paulò magis stimulantia confugiant: quandoquidem enim intestinorum siccitas, ex sanguinis *δυσωσία* seu exandescentiâ orta, sit fæcum retentorum causa præcipua; ea à Catharticis ejusmodi sumptis deinceps festinanter augefcit: Hinc fit, ut remedia laxantia, ac diluentia hîc iis longè magis conducant: Quamobrem in temperamentis biliosis, cæterisque, in quibus sanguis multum fervere percipitur, encoprotica, lenientia, aquæ sulphurææ, cassia, oleum amygdalarum recens extractum, jusculum vitulinum, ac hordeacea, quam remedia drastica multo melius voto respondere reperiuntur: Hoc porro notatu dignum; cavendum nimirum est, ne hic aquas nitrosas, aluminosas vel ejusmodi purgantia exhibeamus, quæ à tergo qualitate gaudent astringentia, ex eo quod ab usu eorum alvus deinceps subsistere cogetur.

Medicamenta Cathartica *ἀχρόαις* sive iis, quibus color cutis, pallidus exhibere, haud omninò par est; at longè secus de cachecticis seu *κακoχρόαις*, quorum color est seu plumbeus, seu viridis seu icteritius seu alius quivis variegatus, idcirco opinamur, quod cum prior, nimirum, status, spirituum inopiæ; posterior tamen, cacochymix argumentum sit prorsus apodicticum, ut cacochymia evacuatione, at spirituum penuria refectione, visceribus rei perspectis, omninò indigeant.

Infantuli præterea, idcirco Cathartica haud satis tolerant, quod spiritus eorum sint justo pauciores; & quemadmodum ejusmodi potius languore quam copiâ obrui soleant: Ita morbos eorum, humores ut plurimum potius immutando quam evacuando abigere satius est; nisi

nisi in præcipiti sint ægroti, ac symptoma quodvis immane perquam urserit.

Eam ob rem famulis, labore improbo multatis Cathartica, fortiora saltem, exhibere haud æquum est, quia juxta opus faciendo nimium fatigantur, atque eis rarius assuefacti sunt; quinetiam cum à morbo quovis leviori ejusmodi haud opprimantur, idcirco non raro multum prius extenuantur, quam, ut medicos maturius consulant, persuasos se habere queunt.

Ii, quorum sanguis succis depravatis redundat, quanto magis hi valetudinarii sunt, tanto commodius medicamenta Cathartica sustinent: Utpote quæ portiunculam materiæ morbificæ eò exhauriant, quo vel pauxillum ejus postea supersit; atque hunc in modum sanitatem amissam de integro recipiunt: Cum, in sanis, evacuare, sit humorum nequaquam redundantium neque ullo prorsus modo peccantium perinde deturbatio, ac commotionis etiam supervacaneæ, ac tandem valetudinis adversæ, loco temperamenti justî, introductio.

Quoad Cathartica in Cholera calculum nigrum medici hic ut plurimum injiciunt; quandoquidem si perperam exhibeantur, syncopes ac alia symptomata mala introducere comperiantur.

Cum sanguis particulis purulentis referciatur, tum Cathartica consentanea perquam erunt: quapropter in empyemate, in quo materia purulenta in vasa resorbetur ac remeat, ex quo fit ut hæcticas aliave symptomata mala introducere observetur; Cathartica eò conveniunt, quia reliquæ, in sanguinem vectæ (viribus autem prius propemodum recollectis exinde) ablegari possunt.

Quicumque humorum commotionem cient, nec materiam morbificam sat deturbant, ineptè quidem agunt: quandoquidem tum commotio sanguini superaddetur cum humores demi postulaverint: ut humores, qui quantitate peccare deprehenduntur, repetitis dosibus deturbandi sint.

Pulvis Catharticus.

Rx Calomel. Sexies loti gr. vj. Resin. Jalap. gr. vij.
Sacch.

Sacch. albiss. ℥β. m. f. pulvis mane sumend. cum custodiâ.

OBSERVATIONES.

In Epilepsiâ ac aliis spasmodicis *Wimpineus* eò Catharticis consulit, quo humorum redundantia quævis, sive ex plenitudine purâ sive cacochoymica oriunda, penitus exhauriatur; quin etiam ex *Jacotio* perinervosa fetacea ac aliæ evacuationes, crassi tamen sanguinis præsentaneæ accommodatæ, necessario requiruntur: quemadmodum enim morbi graves ex Plethoræ specie nonnullâ nunquam non oriuntur; ita in morbo quovis immensi jugiter aliquâ ex parte evacuandum est: cum verò humorum cumulum sat minuerimus, pulveres effacei, ex *Gesnero*, in convulsionibus istis exhibeantur; quinimo in temperamentis calidioribus lac asininum ex *Hoffmano* eò propinetur, quia acrimoniam corrosivam, nervos stimulantem, immutare poterit: Tandem autem mithridatium in aquâ lavendulæ administratum, ex *Kufneri* sententiâ, idcirco sanitatem amissam restituet, quod tumultum in ejusmodi morbis reliquum sedare queat: Hinc morbis nervosis, vel convulsivis evacuatio, acrimonie immutatio, ac ἀραιώσις delinitio utramque facient paginam.

Multum timemus, ne evacuationes quævis in pectoris hydrope prorsus inutiles sint; quamobrem parum ut opinamur refert, utrum sequentia à *Lusitano* inferamus an omittamus; Cathartica, nimirum cauteriis, diaphoreticis, & vel paracentesi hoc in casu continuò præmittenda esse; cum hic *Celsi* axiomati solummodò innuamur, *anceps, nempè, remedium præstat quam nullum adhibere.*

Forestus, P. 3. p. m. 269. Herniæ intestinalis cum hydrope junctæ meminit; ibi autem Catharticorum necnon enematum usui unâ consulere nullus dubitat: At tanti viri veniâ, nobis ignoscat, si sententiam hanc nos vel non omninò vel cautè saltem, sequamur. Verùm esto, ut tametsi Cathartica hydropem auferre valeant, (quod jure merito quidem suspicari licet) intestinum tamen procul omni dubio detrudent: Primum idcirco intestinum reducatur, deinde Cathartica tanto prodeunt, quanto illud facilius deinceps subligaculo retineatur,

tur, ac inde impediatur quo minus in posterum decidat: Ubi tamen ileon in scrotum usq; eo descenderit, ut fimbrizæ, peritonæi nimirum productionis, adeò ampliantur, ut ambitus seu diameter ipsius ultra dilatari nequeat; Ibi Cathartica forsân erunt utilia; forsân dicimus; quoniam apertio, modo per hydropen liceat, unice rem ni fallamur in ejusmodi casu perficere potest.

Febres sive anxietudinibus seu deliquorum metu contenti, hepaticæ, Cathartica sæpius ideò postulant, quia istiusmodi effervescentiæ ab humorum plethorâ ut plurimum pendere solent: Utpote qui, cum sint heterogenei, spiritus animales adeò obruere sueverint, ut pulsus fiat exinde inæqualis: Ubi primum humorum onus exhauritur, pulsus in vigorem, in ordinem ac in spatium usitata posthac redire cernitur; tunc simul spiritus multò liberius in gyrum rotantur atque actutum deinde cessant anxietudines eorum permolestæ: Ac deinceps usque eo abundè vacamus, ut ex ordine in febribus his curandis posthac procedere possimus. Medelâ febrium ejusmodi aliquandiu inter initia posthabita, prognosticon fatâle tunc eo certius denunciandum, quò evacuationes seriùs móliti fuerint ægroti. Quamobrem ubi medici aliquanto tardius accersuntur, in fine, nimirum, febrium, cum deliria, comata, vigiliæ, unâ cum festucarum collectione, cæterisque, signis homines è vitâ emigraturos præfagientibus, comitentur; præsertim verò ubi adhæc evacuationes prius tentatæ, præpostere factæ fuerint: Medici hi quanquam gnari admodum, & vel maximè industrii, mendas istiusmodi infastas vix vel ne vix tamen unquam posthac depellere valuerint: Quandoquidem ægroti id genus ut plurimum fatis haud ita multo post concedere soleant: Epispastica unâ cum enematibus sunt spei quidem reliquæ fulcra si non unica at præcipua; & uti hi sæpius exemplo fato fungantur, exinde est, ut aut paulò maturius idcirco semper evacuandum est, aut post, erit occasio calva, *κεῖν ὅς ἐ κερίσῃ.*

G. Fallopius, cum sermonem habeat de Thermissis eas evacuari, si retineantur, hisce verbis inculcat; quæ ideò exscripsi, quia memoratu digna sunt. “ Alterum symptomata frequentissimè succedens in potu aquarum
“ thermalium

thermalium, est quod ipsa aqua retinetur, ita ut nec per secessum, nec per vesicam, nec per vomitum, nec per ullam aliam viam egrediatur; cum igitur hoc accidit primâ die, antequam deveniatis ad aliquid agendum; distinguatis & dignoscatis, in quânam parte retineatur aqua; solet enim aliquando retineri in toto ambitu, in venis scilicet ipsis: Aliquando in intestinis & hypochondriis. Si in intestinis & hypochondriis retineatur, cognoscetis, quia aderit molestia & negotium in illis partibus; aderit etiam tensio gravis, percipientur flatus, intestinorum rugitus, inundatio quædam modò in hâc modò in illâ parte: his signis cognoscitur, quando aqua est retenta in intestinis. Quando autem retenta est in ambitu totius, hoc est in cavitatibus venarum, nullum modò dictorum signorum adest: non gravitas, non tensio, non rugitus, nec ullum aliud: & cum hæc non adsunt; tamen scitis, quod aqua non est reddita, colligatis necessario suppressam esse in toto ambitu, ut ubicunque fuerit retenta, indicatur ejus excretio. Ideò dicamus quo modo faciendum sit, ut excernatur; & primò quando retinetur in intestinis & hypochondriis. Esto igitur quod *Socrates*, exempli causâ, incipiat hodiè bibere aquam & tota retineatur in intestinis, opus est quoque, ut hodie aqua illa evacuetur, alioqui summo opere offenderet partes, & ideò subito mandetis ut injiciatur clyster ex eâdem aquâ, ex quâ bibit, adjunctâ hierâ simplici vel Syrupo rosaceo: Quod si hoc clystere aqua retenta non evacuetur, utamini alio validiori facientes decoctum ex ebulis, ex foliis cucumeris sylvestris, cui decocto addatur hiera vel simplex vel diacolocynthidos & parum olei chamæmelini & factò clystere injiciatur; quo proculdubio educetur major pars aquæ, hoc factò, prandeat *Socrates*: Et à prandio quiescat; vesperi autem injiciatur alter clyster ex eâdem materiâ: Et sic mane subsequente alius, donec tota aqua fuerit evacuata: Et si tota fuisseteducta ex priori clystere, supersedendum est ab injectione aliorum, alterâ die bibit iterum aquam: Quæ si iterum retineatur, educatur eadem ratione, quâ fuiteducta prior, scilicet usu clysterum, & non

“ bibat amplius *Socrates* aquam (alias moraretur) sed
 “ aperiantur rursus viæ, attenuenturque materiæ; ra-
 “ tio enim, qua aqua retinetur in intestinis, est multi-
 “ tudo materiæ mucosæ in ipsis existentis: Qui mucī
 “ mixti cum aquâ obstruunt meatus. Aliquando etiam
 “ retinetur aqua ob magnam ipsius aquæ imbecillitatem:
 “ Sed hoc rarissimè accidit, igitur paretur denuò opti-
 “ mè corpus, attenueturque & detergatur materia illa:
 “ Deinde bibat *Socrates* aquam, quæ si non sit suâ na-
 “ turâ salita, fiat admixto sale cum primis duobus cya-
 “ this, & multos vidi, in quibus retinebatur aqua, quod
 “ factâ secundâ præparatione, aqua penetravit, & tuit
 “ ipsis saluberrima. Sed si aqua retineatur in toto am-
 “ bitu; quid agendum? Cum primâ die videtis ipsam
 “ retineri; non timeatis, nec agatis quicquam, nec
 “ tentetis evacuationem ipsius cum clystere vel aliâ ra-
 “ tione: Quoniam aqua in venis retenta primâ die
 “ nihil lædit: Ideò primâ die quiescatis omnino: Al-
 “ terâ verò die, si non egrediatur; timendum est, &
 “ curandum omni studio, ut evacuetur. Solemus nos,
 “ ne aqua diffundatur per totum habitum corporis,
 “ exhibere primâ die vespertinâ horâ per dimidiam vel
 “ integram horam, ante cœnam, pilulam unam, quæ
 “ purget, proritetque alvum, & præparet corpus ad ex-
 “ cretionem, quæque sit ponderis unius scrupuli: Pi-
 “ lulam autem conficimus vel ex materiâ illâ ex quâ
 “ fiunt pilulæ aloëphanginæ, vel masticinæ; vel capi-
 “ mus rhabarbarum, agaricum, & aloem, æquis por-
 “ tionibus, & facimus pilulam ponderis unius scrupuli,
 “ quam exhibemus horâ dictâ: Et nihil aliud primâ
 “ die molimur: Secundâ autem die, si videritis, quod
 “ tota aqua retinetur; timeatis & sitis, quæso, solliciti
 “ de evacuatione: Præcipuè si retenta aqua esset mul-
 “ ta: Nam vidi plures incidisse in anasarcam, hydropis
 “ speciem: Quia aqua, quando præsertim est potestate
 “ frigida, retenta diù, putrescit & frigefacit totum cor-
 “ pus: Et ideò secundâ die tentanda est evacuatio,
 “ quæ fieri potest vel per intestina vel insensibilitèr vel
 “ per vesicam: Per insensibilem quidem evaporatio-
 “ nem, efficiendo, ut æger sudet, movendo se, aut
 “ ingrediendo balneum calidum: Sed modus iste eva-

“ cuandi

“ cuandi retentam aquam, præterquam quod non est
 “ tutus ratione balnei, est etiam nimis tardus; citius
 “ enim aqua putresceret, quam tota evacuaretur: Si-
 “ militèr evacuatio per lotium est tarda: Unde super-
 “ est tantum evacuatio per intestina, quæ cominenda-
 “ tur; & ipsâ utuntur; quoties offertur occasio, ex-
 “ cellentissimi isti medici Patavini, & nos cum ipsis:
 “ Sed quo medicamento id faciant, credo vos hucus-
 “ que non audivisse; quoniam ipsi secretum tenent:
 “ Nec alibi extra hanc urbem est in usu medicamen-
 “ tum, quo in hoc casu utuntur. Ego autem, quia
 “ vos fratrum, filiorumque loco habeo omnes, & amo;
 “ non possum vobis non communicare ac detegere me-
 “ dicamentum: Quo certè in re hâc inveniri non po-
 “ test præstantius; medicamentum autem est. Capi-
 “ mus unam supradictarum pilularum, & præcipuè
 “ aloephanginam, ponderis unius scrupuli, & addimus
 “ unum vel duo ad plus grana elaterii optimi: Et factâ
 “ pilulâ ex his duobus simul mixtis, ipsam exhibemus
 “ secundâ die, vespertinâ horâ, per dimidium vel in-
 “ tegram horam ante cœnam. Sed animadvertatis, ne
 “ quantitas elaterii excedat duo grana: Quia maximum
 “ est medicamentum; unde hortor vos etiam, ut quan-
 “ do unum vel alterum dumtaxat granum exhibueritis,
 “ non dicatis cuiquam; ne succedens postea aliquid
 “ grave symptoma vobis ascribatur damno & dedeco-
 “ cori; & hæc est fortasse causa, cur medici isti doc-
 “ tissimi nolunt vobis medicamentum communicare:
 “ Tamen, ut dixi, medicamentum est præstantissimum,
 “ & ipso utuntur medici isti, & nos cum ipsis, quoties-
 “ cunque datur occasio, & res feliciter succedit, hoc
 “ igitur medicamento exhibito & evacuata aqua, omit-
 “ tat æger potum aquæ:—Cæterum si non tota aqua
 “ sed aliqua ipsius quantitas vel pars retineretur: Quid
 “ esset agendum? Dico quod si primâ & secundâ die
 “ retineretur aliqua portio; non esset timendum, nec
 “ abstinendum à potu: Sed si tertiâ die adhuc retine-
 “ retur; exhibeatis unam pilularum dictarum sine ela-
 “ terio: Si verò & quartâ etiam die retineretur, exhi-
 “ beatis pilulam cum elaterio, & omittatur omninò
 “ aquæ potus. C. II. *Aquar. Thermal. Pot. in tractat.*

de Balneis, p. m. 54. b. &c. Item Franc. Blondel. c. 12. de congruo potationis usu, p. 219, &c.—“ Si verò in corpore diutius maneat, & iis natura defatigetur, potationi valedicendum est, & aqua potata vel clysteribus vel laxativo medicamento expellenda. Scriptores nostrates eidem de *Thermis* sententiæ unanimiter subscribunt: quippe quæ si in ventriculo, in vasis, vel in ambitu uspiam moram faciant, vel retineantur; sedem, atque adeo centrum, impediunt, symptomata ex improvise instantia palam indignant: monitum vero hujusmodi temerè nihilominus idcirco amplectamini, quod *Thermarum* potatio non continuò eò solum præscribatur, quò molem evacuemus; quin etiam, ut humores quoque interdum immutemus: quum procul omni dubio in corpore, in habitu, & in ambitu immorari debent. At manum de tabulâ tollamus, quandoquidem de his paulò fufius infra verba faciemus.

In incubo, cibus, præ pastu, nimis copiose horâ decubitûs ingesto, necnon præ supinâ in somno posturâ, arteriæ *Aortæ* trunco descendenti usque eò incumbit, ut sanguis pleno ad terminos inferiores rivo propelli prorsus nequeat; quamobrem parum abest, quin integrâ sanguinis mole cerebrum exinde obruatur; qua fit, ut nervi, ac præcipue pneumonici ita comprimantur, ut ponderis, (sanguinis nimirum in cursu suo, præ nervis contractis pressi) quod nobis incumbit, sensu, querentium turba tantum non opperiantur: hac porrò de causâ, in sententiâ nostrâ magis idcirco firmamur, quod laborantes vel expergefacti, torpidi & veternosi etiamnum permaneant; hoc in casu, tam causæ evidentes evitandæ quam viscera è sarcinâ suâ deinde liberanda sunt.

Ufu comparatum est quod purgantia, cum sanguine commista, particulas ejus multum expandant; quemadmodum autem expansio hujusmodi, vasa dehiscere coereret; ita periculum ea administrandi in hæmorrhagiis narium haud comprehensu difficile est, ut hætenus dictum fuit.

Pleuritidi cæterisque morbis inflammatoriis Cathartica quam maximè exinde obsunt, quod aucto motu intestino, augetur & inflammatio; quo fit, ut humores

res tandem eo usque in partibus accumuluntur, ut ægroti vel in gangrænæ ipsius periculum indè conjiciantur. Ut ut verò, non omnes pleuræ dolores, pleuritides censerì debent; quandoquidem plurimos novimus, quorum pori à frigoris susceptione adeo obturati fuerint, ut serum in musculis thoracis, citra tamen sitim, calorem, vel febrim, aliquandiu steterit; hoc in casu V. Snc. perinde ac Cathar. præmissis, hujusmodi dolores misturæ (ex antimonio diaphoretico, laudano liquido aquis destillatis, saccharo edulcoratis) horâ somni exhibitæ, actutum cessisse novimus; ac methodum hanc in quamplurimis in pleuritide nothâ cum eventu prospero iteratò experti sumus.

Quandoquidem asthmatis exacerbationes tam à sanguinis tumultu quam commotio itidem hæc ab asthma te ab invicem pendeant; Cathartica ideo in ipsâmet accessione prohibentur, quia motum hunc rarefactivum multum adaugent; uti vero lenientia, saburram intestinale leniter deturbando, nec progressivum nec intestinum sanguinis motum immutant; respiratio haud ita multo post exinde aliquanto liberior fiet, quod plenæ inspirationis impedimenta, in intestinis quam sæpissimè divertentia vel quadantenus vel penitus inde auferantur.

Mercurialia eruptiones paulò contumaciôres quam efficacissimè evacuare & emendare usu comperimus: num vero mercurialia latens in se contineant acidum, nescimus quidem; id enim haud aliâ de causâ affirmare audemus, quam quod ubi ferrum sub mercurii cumulo aliquandiu sepeliatur, rubiginem perinde contrahat, ac si sub dio poneretur: quandoquidem autem acidum aëri inesse nullus nunc dubitat; quidni etiam & mercurio? Exinde forsan est, quòd, mercurii administrationem pustulas siccas à sale volatili ut plurimum introductas, quam sæpissime feliciter auferre, experiamur.

Siquidem ex *Bohnii, in Dissert. Chym.* sententiâ, particulæ mercuriales liquori innatent; idcirco ea vino vel cuivis liquori infusa lumbricis egregiè adversari comperiuntur. Exinde fit, ut practici hodierni *Æthiopem* mineralem in bolum confectum aliquandiu primum exhibeant, lumbricis dein hoc modo interfectis,

Cathartica (quidni & pulvis hujusmodi?) perinde eos ac putrilaginem una cum eorum seminio ex intestinorum canali foris eliminant: ordo enim tutissimus, quo infecta id genus prorsus extirpentur, hic nimirum est; ut ii primitus enecentur, tum expellantur; nam si ordo hic adeo inverteretur, ut eos prius extrudere, quam mactare niteremur; quot & quanta symptomata identidem exinde subsequi adverteremus! Mercurialia vero vel in ipsâ febre, à lumbricis ortum habente, feliciter administrata novimus; quinimo cuncta symptomata ab iis excitata, & vel ipsæmet convulsiones, si tam *Francisco Paulino* quam nobis fidem adhibeatis, ab eis sæpissime tolli observatæ sunt.

Quippe cacochymia redundans, in febribus intermittentibus nunquam non evacuanda est; Cathartica idcirco solummodo in intermissione die propinentur, quod alioqui commotionem, jam nimis evectam, per ea magnoperè intenderemus: atque ità vel spiritus nimium evaporando vel particulas morbificas visceribus nobilioribus altius impingendo, ægrotos in vitæ discrimen extremum adduceremus.

Quandocunque remedia intemperiem immutantia aliquandiu (quamquam præsidia ritè usurpentur citra felicem tamen vel exoptatum exitum,) exhibuerimus; purgantia necessario tum propinentur, quoniam quemadmodum obstructions paulò contumaciores latitare exinde creduntur, ita ejusmodi raro aut nunquam citra vasorum succussus perquam violentos auferri queunt: quibus tandem ita reſeratis; causa, morbus ac symptomata non multo post penitus evanescunt.

Tametſi *Horſtius* in morbis paulo maturius humores eliminare velit; tantum tamen demere jubet, quantum spiritus inde non usque eo exhauriantur, ut *Λύσις* vel *Κεῖσις* discrimini subjiciamus: quæ ambo spirituum copiâ justâ omnino nituntur; virium autem quantitatem à symptomatibus necnon causis evidentibus metimur; quæ si gravia vel vehementia sint, necesse erit, evacuationes eis gradu convenient; quandoquidem autem evacuationes his de causis viribus haud continuò accommodari possunt, Cathartica idcirco cautè tum exhibeantur.

Naturam,

Naturam, evacuationes tam geminas, à partibus nimirum adversis, quam succenturiatas, cum symptomaticæ criticarum locum teneant, ægre ferre fræquentius experimur; quocirca cum ægrotantes pleuritidis crisin, in quâ anacatharsis pulmonalis aliquanto liberalius extruditur, attigerint; Cathartica tunc temporis exhibita ideo plurimum obsunt, quod ea invitâ aggrediamur. minervâ; quandoquidem alvi fluxus vel spontanei laborantes in discrimen adducunt: qui vero cum à naturæ molimine, proinde critico (cùm adsit nimirum humorum in corpore copia; cum coctionis signa in urinâ se manifestaverint, & si cum euphoriâ feratur evacuatio, necnon cum denique tam dolor quam febris exindè confestim evanescant) interdum manaverint, idcirco non tantum sinendi, sed etiam promovendi sunt; quidni & evacuationem, quam natura saluberrime molitur, arte subindè naturæ ministri tutò æmulentur?

Ubi dolores infra diaphragma aliquando gradum stitisse contigerit; *Hippocrates* ibi evacuare deorsum jubet; ^a Qui (dolores) vero infra (septum transversum,) deorsum (purgandi) *Aph.* 18. *sect.* 4. Quanquam vero nonnulli doloribus in renibus, intestinis, hepate cæterisque visceribus graviter affligantur, ii tamen omnes Catharticis non continuò fatigandi sunt; hinc provenit, ut caute Aphorismus hicce intelligendus sit; quandoquidem sermo solummodo habeatur de doloribus istis, vel qui febre omnino vacant; vel saltem de doloribus à flatu oriundis; hinc *Aphor.* 20. *sect.* 4. hæc habet, “ Non febricitantibus si fiat tormen & genuum gravitas & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse indicat; etiam *L. ὅτε φυσῶν* ait, ἀπαντα πνέματα συμπλέον ἐστίν. (omne spiritu plenum est.) Quocirca ubi dolores vel flatulenti vel humorosi à lentore introducti ægrotantes excruciant; ibi solum nec alio in casu humores deorsum trudere vult sēnex divinus.

Fernelius in consilio decimo quinto pro D^{no}. *Boisdelphino*, viro perquam obeso, hæc habet, “ Ne quid autem posthac gravioris mali contingat, tentandum est,

^a Ὅτις αἰσθάνεται (ὀδυμήματα) ὅτι κατὰ (τὴν φρενῶν,) κατὰ (φρεμαχέας) εἶδη.)

“ ut quam exuperantiam victus parcior ac tenuior prorsus absorbere non poterit, medicinâ subtrahat; quandoquidem observatum est, alvum sive sponte sive arte solutam, emolumenti non parum contulisse: id autem sensim ac lentè præstandum, quod alvus lenissimis illis proritetur, quodque minimè tutum sit tantam illuviem vi & impetu concutere, ne universa corruat.” Quandoquidem vero cautelæ hujus rationem ipse haud reddat, illam, pro nostrâ parte, paucis pro eo nobis subjungere liceat. Quandoquidem ergo in habitu obeso, atque adeo laxo, solenne sit, ut fibræ non valeant sese eâ contrahere ratione, quâ inaniuntur; exinde est, ut, in evacuatione, vasorum parietes tardius, quam par est, sibi invicem accedant, adeo ut spirituum emporium, cerebrum nimirum, vice eorundem copiæ, tanto contractionis gradui idoneæ, liquore suo eatenus privetur, ut deliquia frequentius ex eo perpetiantur ægroti: rebus eò deductis, Cathartica in ejusmodi deliquiis, præ fluidi nervosi penuriâ, maximopere nocent; cum lipothymia vero id genus non tam à spirituum prostratione, præ penu eorum exhausto, quam absorptione eorum fortuitâ, quemadmodum evenire solet in exhibitione Cathartici, cujus operatio ineptè retardatur, originem ducat; in isto casu, tam *Syncopen* per salia volatilia, remedia cardiaca, & victum reficientem auferre, quam operationi mancæ per clysteres purgantes, & vel iteratos, subvenire debemus.

Puerperæ, pro *Riverii* sententiâ, non ante diem puerperii nonum, ni palam ac vehementius ostendatur catharsis, exinde purgandæ sunt; quod lochiorum fluxus ad idem fere tempus plerunque desinat; cum si citius Cathartico fatigarentur, spiritus earum perinde corruerent, quam fluxus ultra posthac augeretur.

In peste seu febribus pestilentibus, quæ inter se gradu solummodò dissident, Cathartica laudant hi, culpant illi; *N. Hodgesius* etiam si, in tractatu suo, cui titulus *Λοιμολογία Londinensis*, Anno 1665, usum eorum haud maxime deprædicet, non tamen usque adeo probis afficiat, ut omnino ab eorum exhibitione, si cacochymia tamen vel symptomata gravia usum eorum postulare videantur, nosmet contineamus: verum quidem est,

est, quod glandes ipse Cathartici longè anteponat; ut, in febribus λοιμώδεσι, lenientium exhibitio non solum invaluerit, quin etiam ea sæpissimè valdè requiruntur, ex hoc, quod alvum lenissimè proritent, nec tamen spiritus inde omnino conficiantur.

Franciscum Joëlem Catharticorum doses ex temperamentorum majori vel minori fluxilitate dudum meriri supra innuimus; hodierni tamen nonnulli eò pervenerunt, ut dosin cuivis individuo consentaneam ad amussim, nominatim, mehercule, proferre proponant.

Aqua medicata.

& Mann. Optim. ℥ij℥. dissolv. in ℞j. Aq. *Strethamensis*, & superbibat ℞iij℥. Aquæ ejusdem.

& Syr. Flor. Perficor. ℥ij. Capiat in primo Haustu Aq. *North-hallensis* purgant. & superbibat ℞iv. Aq. ejusdem.

OBSERVATIONES.

Quandoquidem aquarum medicatarum purgantium principia non mediocriter ab invicem diffideant, quid mirum ergo, si dispares omnino sortiantur effectus; *aqua Strethamenses*, apud *Listerum* nostratem, sale calcario, idcirco alcalico, scaturire feruntur; ex quo provenit, ut impinguent, faciei colorem vividum imperiant; arthritidi, morbis pulmonum citra febrim, cardialgiæ, melancholiæ, convenient; necnon sanguinem calefaciant; ac etiamsi calculum expellant, eum tamen postea generent; & astringentiam tandem qualitatem à se ergo relinquunt: *aqua North-hallenses* vero, cum ex sale marino constent, idcirco scabiei, vermibus, rheumatismis, flatibus, concoctioni læsæ convenient; quæ tamen sitim, diarrhœas, aliosque fluxus inferre comperiuntur. Siquidem tamen aquæ hujusmodi tam humores deorsum pellant, quam interea diluant; tanto bilem proritatione suâ leni deturbant, quanto remedia diluentia cum acidis vel falso-acidis mista ac diutius exhibita deinceps illam quam certissime obtundant; hinc qui, præ sanguine præfervido, cephalalgia decumbunt; humorum redundantia tam stimulo istarum leni efficaciter exhauritur, quam acrimonia eorundem diluitur; ut aqueis, acidis, ac farinaceis, farsâ, nimirum *Chinâ*,
C. C.

C. C. acidulis, lacte aliisve quam expeditissime deinceps salia alcalina, quæ sanguini præfunt, obvolvuntur ac immutentur.

Quemadmodum remedium quodvis Catharticum ex paroxysmo calculi laboranti plerunque malè cedat, ita aquarum etiam purgantium usum in ejusmodi impense vituperamus; quandoquidem inflammationem exinde quam sæpissime inferri constat; quinimo interdum & ulcera huic administrationi malæ plerunque usque eò succedere solent, ut fibræ disruptæ ac ulceratæ nunquam deinceps (præ calculo ibidem defixo, necnon urinæ salibus, paulo acrioribus, ulcerum fibras valde mutilatas jugiter alluentibus) resarciri queunt; hæc vero certè dicta tam de renum quam vesicæ calculo solummodo grandi intelligi volumus.

Hæmoptoi ne purgantia quidem omnino conducere olim advertimus, nedum igitur aquæ hujusmodi stimulant; præter enim quam, quod salia irritativa vasa, jamdudum rupta, ultrà eroderent, præterea ingurgitatio earum fœcunda, quâ saginantur propinantium ventriculi, vasa amplius distenderet ac dilaceraret; adeo ut erosioni, vel dilaceratio etiam superinjiceretur; quæ glutinantia idcirco, præ erosione, ac balsamica unâ cum stypticis, præ dilaceratione, sedulo exhibita, necessario postularent.

Eruptiones ac pruritus aquis purgantibus quam frequentissimè ex eo tolluntur, quod evacuationi, dilutioni ac immutationi pustulæ ferme cunctæ actutum cedant; cum omnes vero non omnibus æque conveniant; propterea quod hæ, eruptiones ejusmodi adaugent, illæ vero, compescant; breviter idcirco virtutes earum perstringemus; aquæ nimirum, atramento-sæ, tartareæ, vitriolicæ ac muriaticæ (quales sunt *Alfordenses*, *Colcestrenses*, *Lambethenses*, *North-hallenses*, *Dulvicenses*, *Richmondenses*) sanguinem refrigerant ac pustulas omnimodas auferre reperiuntur; aquæ vero nitrosæ seu calcaris (quales sunt *Epsomenses*, *Actonenses*, *Barnetenses*, *Kensingtonienses*, ac ex de *Brentwood-Weal*,) è contra sanguinis massam calefaciunt, & eruptiones omnigenas adaugent.

C A P. III.

E N E M A T A.

Fortiora.



- Seri Lact. ℥x . Terebinthin. (in Vitell. ovi Solut.) ℥ij . Vin. benedict. ℥j . m. f. Enema.
- ℞ Decoct. Flor. Chamæm. ℥x . Pulv. Hier. Picr. (in eo Solut.) ℥ij . Sacch. Rub. ℥ij . Vitell. ovi n^o. j. m. f. Enema.
- ℞ Decoct. Commun. ℥℥ . Ol. Amygd. d. ℥ij . Rhodamel. Simp. ℥ij . Hier. Picr. ℥℥ . Agaric. Trochiscat. ℥j . Elect. è Succ. Rosar. ℥ij . m. f. Enema.
- ℞ Aquar. Strethamens. (alteriusve) Coct. ℥xij . Syr. è Spîn. Cervin. ℥j . Sal. Gemm. & Culinar. ā . ℥ij . m. f. Enema.
- ℞ Fol. Rut. Artemis. ā . m. j. Sem. Fœnic. dulc. ℥ij . Coq. in Aq. Font. colatur. ℥x . add. Elect. Diaprun. ℥℥ . Sal. Commun. ℥j . m. f. Enema.
- ℞ Fol. Malv. Bismalv. Mercurial. ā . m℥. Hord. Mundat. m. j. Prunor. Damascen. Par. n^o. vj. coq. in Aq. Font. colatur. ℥x . add. Elect. Diacartham. Sacch. Rub. ā . ℥j . Sal. Prunell. ℥ij . Vitell. ovi n^o. j. m. f. Enema.
- ℞ Rad. Alth. Levistic. ā . ℥ij . Fol. Beton. Hyssop. Agrimon. ā . m. j. Flor. Genist. Sambuc. ā . p. ij. Incis. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥x . add. Elect. Diacartham. ℥j . Ol. Tartar. per deliq. ℥j . m. f. Enema.
- ℞ Rad. Alth. ℥j . Fol. Mercurial. Parietar. ā . m. j. Flor. Violar. p. iij. Fol. Senn. ℥ij . (℥℥ .) Sem. Lin. Fœnugræc. ā . ℥ij . Fœnic. d. ℥j . Coq. in Aq. Font. in colatur. ℥xij . Solv. Elect. Diaphœnic. Diaprun. ā . ℥℥ . Ol. Chamom. ℥j . Sal. Culinar. ℥j . m. f. Enema.
- ℞ Decoct. Senn. Gereon. ℥vj . Decoct. Commun. (Emollient. & Carminat.) ℥iv . Mel. Mercurial. ℥ij . Sal. Commun. ℥j . m. f. Enema.

 ℞ Decoct.

- ℞ Decoct. Commun. pro Clyster. ℥iv. infus. Cróc. Metallor. ℥j. (iv.) Benedict. laxativ. ℥j. Sal. Gemm. ℥j. m. f. Enema.
- ℞ Herb. Rut. Centaur. Min. Origan. Salv. ā. m. j. Rad. Aristoloch. Rot. Helleb. Nig. ā. ℥iij. Cyclamin. ℥ij. Sem. Cartham. Agaric. in petia Ligat. ā. ℥ij. Pulp. Colocynth. ℥β. Coq. f. a. in f. q. Aq. Font. in colatur. ℥vij. Solv. Elect. Hier. Picr. cum Agaric. ℥j. Sal. Rut. ℥j. Castor. ℥j. Mell. Anthosfat. ℥j. m. f. Enema. In apoplexiā, *Dekkers super Barlette.*
- ℞ Decoct. Carminativ Urin. pueri ā. ℥iij. Hier. Picr. ℥j. Elect. Lenitiv. ℥ij. Mel. Rosat. Ol. Commun. ā. ℥ij. Sal. ℥j. m. f. Enema. in *Hydrope. Mangetus.*
- ℞ Fol. Malv. m. ij. Rad. Lilior. alb. ℥β. Flor. Sambuc. Verbasf. ā. P. iij. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥vij. add. Elect. Hier. Picr. ℥vj. Sal. Gemm. ℥j. Vitell. ov. no. ij. m. f. Enema.
- ℞ Rad. Levistic. Angelic. ā. ℥iij. Flor. Chamom. m. iβ. Fol. Lauri p. iij. Sem. 4. Calid. min. a. ℥ij. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥x. add. Elect. è Bacc. Lauri. ℥vj. Tinct. Hier. ℥ij. Syr. è rhamno Cathart. ℥j. Ol. Carvi gtt. x. Vitell. ovi no. j. m. f. Enema.
- ℞ Juris Pisorum ℥vij. Vin. Benedict. ℥iβ. Ol. Commun. ℥j. Sacch. ℥β. m. f. Enema.
- ℞ Decoct. Pisor. ℥bj. Extract. Esul. ℥j. Ol. Lin. ℥iv. m. f. Enema.
- ℞ Cort. interior. Sambuc. Frangul. ā. m. j. Rad. Ireos nostrat. ℥vj. *Bryon* ℥j. Sem. Cumin. Fœnic. ā. ℥ij. Baccar. Junip. ℥β. Coq. in f. q. Urin. Pueror. in colatur. ℥bj. solv. Hier. Picr. ℥β. Vitell. ov. no. ij. m. f. Enema.
- ℞ Sem. Fœnic. d. apij. ā. ℥iij. Fermenti Commun. ℥β. Coq. in Urin. pueri q. f. colatur. add. Mell. Despu-mat. ℥β. Vin. Bened. ℥j. Ol. Terebinth. stillatit. ℥β. m. f. Enema.
- ℞ Fol. Centaur. Min. Absinth. Rut. ā. m. Rad. Pyreth. ℥iij. Colocynth. in petia ligat. ℥iβ. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥vij. add. Hier. Picr. ℥ij. Fell. Taur. inspif-fat. ℥j. Sal. Vol. Succin. ℥β. Vitell. ov. no. j. m. f. Enema.

- ℞ Summit. Melilot. Fol. Malv. ana m. j. Rad. Alth. ℥iij. Coq. in Aq. Hord. in colatur. ℥viiij. Solv. Elect. Diacatholic. ℥j. Ol. Lilior. alb. ℥℥. m. f. Enema.
- ℞ Aq. calid. ℥x. Sal. Culinar. ℥ij. m. f. Enema. In alvo affectâ. *F. Dekkers.*
- ℞ Rad. Bismalv. Lilior. alb. ana ℥℥. Passul. Fic. ana n^o. 20. Sem. Lin. ℥℥. 4. Sem. Frig. maj. ana ℥ij. Anis. Fœnic. ana ℥j. Coq. in Aq. Font. in colatur. Solv. Elect. Diacatholic. ℥℥. Mell. Rosar. ℥j. Oxymel. Scill. ℥ij. Ol. Amygd. Scorpion. ana ℥ij. m. f. Enema.

Leniora.

- ℞ Rad. Lilior. alb. Alth. ana ℥ij. Herb. Mercurial. Absinth. ana m. j. Sem. Fœnugræc. ℥℥. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥℥. add. Sacch. Rub. ℥ij. Sal. Culinar. ℥ij. m. f. Enema.
- ℞ Aq. Pluvial. ℥xij. Fæc. Cerevis. ℥ij. Sapon. Venet. ℥ij. m. f. Enema.
- ℞ Fol. Borag. Violar. ana m. j. Polypod. Querc. ℥℥. coqr. in brodio vitulino, colatur. ℥x. add. Mell. Rosar. ℥ij. Vitell. ov. n^o. ij. Butyr. Rec. ℥j. m. f. Enema.
- ℞ Juris Vitulini ℥℥. (j.) Ol. Amygd. d. ℥iij. Butyr. ℥j. Sal. Comm. ℥ij. m. f. Enema.
- ℞ Juris Pulli ℥℥. (j.) Cass. Rec. Extract. ℥j. Ol. Rosar. ℥ij. Sacch. j. Vitell. ov. n^o. ij. m. f. Enema.
- ℞ Fol. Rut. m. j. Flor. Chamom. Sambuc. Summit. Aneth. ana p. j. Sem. Anis. Fœnic. d. Carv. Cumin. ana ℥ij. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥x. add. Vin. Canarin. ℥iij. Elix. Propriet. ℥ij. Ol. Chamom. ℥j. Succin. ℥j. Aq. Mirab. ℥ij. m. f. Enema.
- ℞ Lact. Coct. x. Mell. Despumat. ℥j. Sal. Prunell. ℥ij. Butyr. ℥ij. Sal. Culinar. ℥ij. m. f. Enema.
- ℞ Unguent. Potab. ℥iv. Ol. Tereb. ℥iij. Ol. Rosar. ℥viiij. m. f. Enema.
- ℞ Rad. Levistic. Imperator. Polypod. a. ℥iij. Fol. Salv. Meliss. Origan. Matricar. a. m℥. Flor. Anthos. Chamom. a. p. ij. Incis. Coq. in Aq. Font. colatur. ℥x. add. Aq. Vit. ℥j. Sal. Succin. ℥℥. Ol. Cumin. Chym.

(feu Anis.) ʒj. Elect. è Bacc. Laur. ʒʒ. Vitell. ov. n^o. ij. m. f. Enema.

℞ Violar. Branc. Urfin. Mercurial. Alth. Malv. a. m. j. Rad. Lillior. alb. Alth. a. ʒij. Sem. Lin. Fœnugræc. a. ʒʒ. Sem. Anis. ʒiʒ. Prunor. Dulc. ʒj. Flor. Melilot. Chamom. a. p. j. Coq. in Aq. Font. in colatur. Solv. Elect. Diaprun. ʒvj. Ol. Lillior. Lin. a. ʒij. Butyr. Rec. ʒʒ. m. f. Enema.

℞ Decoct. Intestinor. Verveç. ℥j. Butyr. Recent. ʒij. Cass. Recent. Extract. ʒiʒ. Sacch. Rub. ʒj. m. f. Enema.

℞ Flor. Chamom. Melilot. a. p. j. Fol. Rut. m. j. Bacc. Laur. Sem. Fœnic. Sefel. Cymin. a. ʒʒ. Summ. Centaur. Chamæd. a. m. j. Agaric. ʒj. Furfur. p. j. Coq. in Aq. Font. in colatur. ℥j. Solv. Ol. Chamom. Rut. a. ʒj. Ol. Spic. stillat. ʒj. Mell. ʒj. m. f. Enema.

℞ Fol. Mercurial. Betar. a. m. j. Coq. in Lacte, in colatur. ℥j. Solv. Mell. ʒiʒ. Tereb. (in Vitell. ov. solut.) ʒij. Ol. Aneth. Chamom. a. ʒj. m. f. Enema.

℞ Decoct. Emollient. ℥j. Cass. ʒj. Mell. Violac. ʒj. Ol. Violar. ʒij. Sal. ʒj. m. f. Enema.

℞ Vin. alb. ℥ʒ. Ol. Lin. Amygd. a. a. ʒij. m. f. Enema.

℞ Ol. Chamom. Aneth. a. ʒvj. m. f. Enema.

℞ Furfur. Hord. a. p. j. Fol. Malv. m. j. Flor. Chamom. p. j. Sem. Carv. ʒj. Coq. in Aq. Font. in colatur. Solv. Cass. Mell. Violac. Ol. Violar. a. ʒj. m. f. Enema.

℞ Decoct. Carn. Ovin. ℥ʒ. Vitell. ovor. n^o. ij. m. f. Enema.

SCHOLIA.

Enematum evacuantium tam fortium, quam lenium, quæ, ni longè fallamur, fini medicorum cuivis proposito non possunt non sat esse, catervam numerosam sane, vobis, ex authoribus, exhibuimus: Enemata quidem hîc purgantia solummodo pertractavimus; quandoquidem Enemata immutantia Pars altera vobis opportunior erit exhibendi locus.

Illâ intestinorum scybala tam deorsum alliciunt, quam foris eliminant, fæces perinde emolliunt atque sordes ex glandularum

glandularum intestinalium orificiis omnimodas etiam eluunt; ac hunc in modum secretionem ventralem restaurant; hinc si fæces minus, præ intestinorum ficitate, descenderint; meatus illa tam lubricant, quam inde fæces exhauriunt.

Hystericis ac hypochondriacis, qui cathartica ægre ferre ut plurimum solent, eo exhibentur, quo natura officio suo usitato non modo non desit, verum etiam usque eo stimuletur, quo humores ibidem subsistentes quadantenus exturbentur; quandoquidem etsi sensim exhauriant, haud tamen ejusmodi laborantes omnino enervant: quæcunque enim in crassioribus intestinis comprehenduntur, per ea juxtà tam expeditissime atque quam placidè ac imperturbato extrahuntur; ex quo provenit, ut pituita, tanto magis vitrea, quanto magis acida, per ea penitiùs itidem exantletur.

Visceribus humorum, qui ea impetu quodam adoriuntur ac ibidem gradum sistere minitantur, admodum onustis, Enemata eatenus conducunt, ut aliò, præ prostratione suâ leni eorundem sordes alliciant, atque ita morbos plerosque instanter impendentes, maturius injecta, præcidunt.

Quicquid alii opinantur, motum intestinorum peristalticum in vomitione symptomaticâ inverti, nosmet, tam experimentis, quam ratione creti, affirmare nulli dubitamus: ac proinde, ni irritatio juxta vehementior atque adversa confestim adhibeatur, evacuatio istiusmodi aliquanto diuturnius eò durare poterit, ut ægrotantium vires exindè perquam imminuantur; quocirca Enemata frequentius hic usurpata, adversus motus istius ordinem inversum usque adeo contendunt, ut ordo id genus inversus vermiculari usitato quam sæpissimè occyus deinceps cedat; potissimum vero, si opiata sub idem tempus intùs præterea sumantur.

Siqui aquarum vel & liquorum quorumvis quantitatem copiosorem, quam par est, ingurgitaverint, quæ in ventriculo vel intestinis moram solito magis diutinam faciunt; Enemata injecta, eorundem descensum properanter adurgent: hinc est, ut si cathartica unquam exhibeantur, quæ officio defuerunt suo; per Enemata, procellis inde orituris, maturo consilio, obviam ire possamus;

possumus; quæ eò certius effectus sortientur suos, quò constantius in intestinis crassioribus humores nidulari percipiuntur.

Medicis quibusdam consultis solenne hoc est, ut, pridie, nimirum quam Cathartica propinantur, Enemata quamplurimum eà injiciantur, quâ intestina postredie melius voto cedant; quandoquidem si intestina scybalis unquam repleantur; illa sunt usque eo maximo, motui peristaltico paulò concitatiore, impedimento; quò resistantiam hanc, conatum hujusmodi vermicularem, admodum infringere experiamur.

Morbis cephalicis, à causa frigida oriundis, idcirco opitulantur, quòd simul irritant, exhaustiunt, ac humores, segniter motos, deorsum alliciant, atque aliò derivent; ac dummodo sub idem tempus remedia volatilia simul adhibeantur, morbi somnolenti ac veteranosi fininus abigantur, ii tamen multum inde sublevantur.

In mensium seu suppressione sive emanfione Enemata adeo erunt usui, ut tam fotûs vice fungantur, quam calorem impertiant ac motum vasorum oscillatorium pristinum refricent ac reponant: ex quibus fit, ut vasa seu arteriæ uterinæ quam ocyssimè exinde elidantur ac recludentur; atque hunc in modum fluxus extemplo denuò coram aderit; qui tamen longè certius est futurus, modo sanguinem ab intemperiei vitiis primum expediverimus. Enemata tamen idcirco paulo calidiora nunc injiciantur, tam quod vasa, præ fotu, exinde flexiliora fient, quam quòd liquorum impetui deinceps facilius cedent.

Doloribus infra Ileon subsistentibus, Enemata ut plurimum idcirco subsidio sunt, quod ea, prout usu quotidiano erudimur, quâ colon subire quâ humores exinde illicò extrudere frequentius experimur: siquidem vero non ultra colon cogi poterint; eam ob rem dolores istiusmodi in Ileo intestinisque tenuioribus fixos, præ Enematibus, inepte injectis, multum invalescere ac intendi posthac, plus vice simplici advertimus.

Quemadmodum in febrium principio nulla atque ista intestinorum per Enemata evacuatio tutior esse poterit; ita quotiescunque nausea, vomendi nixus, oris amarities

marities, appetitûs prostratio, intestinorum quasi luctæ, bilem ibidem hærere ac cumulari testantur; toties istam per illa deturbare liceat; utpote cum evacuatio hujusmodi sit simul tuta, simulque lenissima: motu proinde intestinorum vermiculari paulo ex eis concitatori facto, humorum biliosorum illuviem anum versus quam promptissimè ac quam commodissimè deinceps pelliciemus.

Uti scorbuto seu malo hypochondriaco fracti, alvo ut plurimum idcirco sunt astrictæ, tam quòd intestinorum fibræ, præ salinâ earum intemperie, fiant paulo rigidiores, quam quòd fæces exinde multum arescant; ita Enemata perinde fibras istas flexiles reddendo, atque fæces humectando, spem nostram si minus superabunt, at certè explebunt.

Quandoquidem intestini tam recti quam coli canalibus, utero, vesicæque usque eò prope adfit, ut ea tantum non attingat; Enemata proinde, in calculo renum vesicæque (exiguo tamen) in molâ, in secundinarum retentione, injecta, eorundem expulsionem quam optimè, sicut usus docet, suppetias ferent.

Siquidem infantuli, senes, ac languidiore & valetudinarii evacuationes cujusvis speciei ægre, nec impune, ferant; eâ de causâ in hujusmodi, clysteres in purgantium vicem ideo substituantur, quoniam, extra viri-um prostrationem, humores necessario deturbandos suaviter emulgent.

In Epilepsiis, perinde tumultus ac ἀταξία, quibus sanguis impensius subindè premitur, quam humorum, cerebrum versus, impetus ac ῥοπή, antispasmi non modo utilem, verum necessariam etiam plerunque faciunt; quæ per Enemata idcirco eò commodius perficitur, quod his sanguinis excandescencia multo minus exinde quam aliis evacuationibus evehatur.

In dolore ischiadico, quo stimulatio parti affectæ seu doloris sedi propius adfit, eò vehementius ac certius impetuosum humorum influxum, jam nunc ingruentem, aliò derivat; quocirca Enemata vel fortiora, etiam iterata, hic requiruntur; tam quâ humores influunt extrorsum pellantur, quam quâ aliorum revellantur.

Lumbrici medicamenti amarioris quam optimè interficiuntur; quod si, sub idem tempus, lac, una cum saccharo, vel melle, mistum (in quo hydrargyrum aliquandiu infusum fuerit) per anum injiciatur; ii artificio quidem id genus subdolo expeditè deorsum pel-
lentur.

Alvus paulo contumacius aliquoties ante partum adeo constipatur, ut causa hæc fæces prius Enematibus amovere, quam partum exturbare necessitatem nobis afferat; quippe cum eæ tandem de viâ decesserint, partus deinceps minori negotio vel promoveri vel extrahi poterit.

Enematum emolumenta aliquantò accuratius usque adhuc in hac diatribâ libravimus: jam superest, ut paucis eorum nocumenta quoque seriò contemplemur. Quanquam igitur Enematum injectiones quandoque periculo vacare videantur, in quamplurimis tamen casibus & temporibus ægrotos in discrimen vel extremum adducere comperiuntur; quotusquisque enim (nisi furat) is est, qui prægnantes Enematibus, ultimis gravidationis mensibus, fatigare suscipiet? Quandoquidem eæ Enemata, præ proritatione, quamvis lenissimâ, haud idcirco impunè ferunt, quod hæc, tam obonus quam fibrarum atoniam, foetum refigere valuerint.

Iis, quorum alvus paulò pertinacius subsisterit, Enemata, ideo vix vel ne vix omnino profunt; quia, fæcibus quaquaversum intestinis adhærescentibus, eis non datur liber introeundi locus; quo in casu, fæcum portiunculâ per instrumenta primum evulsâ; quæ superfuerunt, eas per Enemata injecta, facillime deinde foras pelli experti sumus.

Quandoquidem revulsio nusquam requiratur, nisi quum humores suspiciosè visceribus, imo vel uspiam, infederint; in abscessibus idcirco criticis adeo non ostenditur, ut, miasma venenosum retrocedere cogendo, maturationem non solum perutilem, verum etiam necessariam vehementer perturbet; quamobrem in febribus eruptivis, sive petechialibus sive papillaribus, quoad efflorescentiæ jure merito criticæ habeantur; eatenus medici paulo consultiores à revulsionibus prorsus abhorrent; quæ tamen perquam utiles tum eva-
dunt.

dant, cum tantâ humorum copiâ onustæ sint partes, ut plures deinceps, nisi cum damno, capere nequeant; ex quo nempe fit, ut residuum adeò sanguini præsit, ut symptomata graviora quamplurima exinde nascantur. Rebus ita se habentibus, cum istud humorum, cuti impactorum, momentum criticum omninò sit; è contra vero, quippe reliquum etiamnum cum sanguine confusum, symptomata vehementia nunquam non producat, ac symptomaticum sit: eis idcirco de causis expulsionis istiusmodi ad cutim criticæ usque adeo, nec ultra, favendum est, ut particulæ noxiæ, in sanguinis sinu reconditæ, nec concitatus nec laculentiùs, quam fas est, in cutis glandulas impetum faciant; quinimo efflorescentiæ perinde per alexipharmaca nimirum, ac materiæ reliquæ putridæ quidem per evacuationem aliò derivandæ, eo usque habenda est ratio, quoad utriusque, voti, tam expulsionis nempe quam reliquiarum aliò derivationis, (citra virium tamen jacturam vel sanguinis excandescentiam ulteriorem) penitus stamus compotes; uti fusiùs jampridem, in tractatu nostro, cui titulus, *CRITICON FEBRIVM*, à p. 140, ad 143. annis abhinc, nempe, præterpropter tribus primùm edito, (at in editione alterâ, à p. 142, ad 145.) de crisi differuimus. Exemplorum coram vobis filiter quamplurima difficile haud esset, unicum tamen, è multis quæ supersunt, proferemus; infantulæ, matris suæ deliciis, olim ministravimus; cujus tam urina sedimentum deposuit laudabile, quam petechiæ interpunctæ ac vividæ sparsim apparuerunt; cui nutricula, nobis inconsultis, ut aliquoties, eheu! fieri solet, Enema, solummodo domesticum, præ constipatione, injici curavit; ægrotulam, diluculò, fuisse deliram, cum pulsu myuro, diarrhœâ laborasse, furdam, lipothymiis ac tendinum subsultibus vexatam fuisse, paulò impensius mirari subiit, quandoquidem illi pridie sospiti ac re fere integrâ potenti valedixerimus; re tamen penitus perspectâ, ultrâ suspicere desivimus; error autem hic, etiamsi minimus, non nisi cardiacis ac vesicatoriis aliquandiu adhibitis, tandem auferebatur; siquidem idcirco ne vel Enemata mehercule in febribus eruptivis perpetuò convenire, palam; ut opinamur, vobis fecerimus; nedum, ab argumento
fortiori,

fortiori, emetica unquam fere tuto in ejusmodi, administrari queunt.

Ventriculi doloribus, quos medicorum turba colicam ventriculi καλαχρησινῶς appellant, enemata idcirco parum conveniunt, quòd tùm tumultus in istis locis uspiam tum spirituum ἀταξίας commoveant; necnon motum intestinorum peristalticum usque adeo urgent, ut bullas, flatus circumsepientes, nec, præ suâ visciditate vel lentore expulsionem etiamnum habiles, vehementius aliquantò muscoli comprimant abdominales; quocirca dolores istiusmodi confestim exinde magno-pere augeantur: hinc eadem de causâ contingit, ut Enemata inepte in intestinorum tenuium doloribus etiam injiciantur; quorum phænomenon causa in promptu est; etenim quanto magis intestinalis exagitantur canalis bullæ, tanto magis aer, intus contentus, at circumvallatus, adeo rarefcere solet, ut, cum eæ non diffiliant, intestina immensum quantum distendant, ac, siquidem distensionis sensum, dolorem probè nuncupemus, colicas eò graviores idcirco, quo distensiones ejusmodi immaniores sunt, introducere comperiuntur.

Quamquam Enemata, alvo aliquantò consipatiori, mitiora, in hæmorrhoidum fluxu exinde injicere liceat, quòd sublata causâ, astrictione nimirum, tollatur effectus, fluxus scilicet; fortiora tamen nunc adhibere ridiculum sane esset, utpote quæ, præ jugi eorum proritatione, validiori quidem; vasa renitentia licet, jamdudum tamen aperta, amplius delinfcere, vi pertraheremus.

Fœmellis ternum quaternumve gravidationis mensem feliciter emensis, Enemata idcirco parum conferre reperiuntur, quòd ea fœtum glandulis uteri, propter hepar uterinum, nimirum, intermedium, exiliter solummodo etiamnum fixum, quam facillimè excutere valuerint.

In herniis, enterocèle nimirum, clystères hi audacter injiciunt, illi vero ab eis abhorrent; controversia vero, cum parvi æstimetur, hunc in modum solvi poterit; quandoquidem Enemata mitiora fæces non solum foris eliminant, verum, cum eæ locum paulo ampliore detineant, etiam cavitatis spatium, quo inte-

flina facilius reponi poterint, dilatent; ejusmodi tutò immitti possunt; à fortioribus autem medici consultò nunc abhorrent, quoniam, ab illorum injectione, pro-ritatio usque adeo vehemens est, ut, plenius inspirando, quàm ejiciantur recrementa, thoracis capacitatem quinquaversum ampliando atque animam tantopere comprimendo, abdominis spatium egregie exinde minuitur ac proin intestina non possunt non cum impetu quodam ex foramine, si minus rupto at laxato saltem, tandem proruerè.

Quandoquidem observavimus olim evacuationes qualescunque inter crisin cautè, præcipue ubi ordinem à naturà præstitutum immutandi, quidpiam periculi est, adhibendas esse; quocirca consulto naturæ molimina constanter priùs præstolemur, quam illam, vel invitam, stimulemus unquam. Cum exacerbatio autem sit periodi quasi propylæum seu vestibulum, nec etiamnum constet, quo natura verget; idcirco Enemata sub periodorum initia, sive febrium intermittentium sive remittentium, caute adhibeantur; neque adhæc sub statum, propter causas easdem, injiciantur Enemata; quanquam enim alvum emissarium humorum haud intutum esse omnino persuasos nos habeamus; quinimo febres ocyùs secessibus quam diaphoresi frequentius cedere novimus; verum tamen Enemata importunè injecta, cum humores forsan aliò vel nunc tendant, vel jam versuri sint, naturæ conatus ac nifus perturbando, tumultus ac ἀταξίας sæpenumero infanda exuscitare solent: quamobrem licet in evacuationibus criticis, necesse sit, in promotione toti simus, quippe quæ excernuntur toto genere præter naturam seu noxia sunt; humorum tamen πορνὴν, evidenter utilem, aliò inconsultò derivare, praxis esset quam pessimè quidem instituta.

Supra notavimus, Enemata hæmorrhoidibus fluentibus idcirco obfuisse, quod vasa jamdudum erosa, aperta vel rupta, amplius irritando, patentiora hoc pacto efficeremus; eo de nomine procul omni dubio dysenterix clysteres purgantes nocumento erunt; quamobrem in hocce morbo eà de causâ ab eis nosmet omnino cōtineamus.

Quoties-

Quotiescunque proritationis causa, passionem Iliacam introducens, ab intestino usque recto initium summat, toties Enemata ingerere supervacaneum omnino esset; quandoquidem ob inversi intestinorum motus vehementiam ocyùs aliquantò fursum, atque adeo vel in ipsum ventriculum, raperentur, ac proinde confestim exonerarentur.

Ubi fæces intestinis unquam crassis firmiùs aliquanto quibuscvis de causis affigantur, Enemata idcirco ibi proderunt, quod eas rursus certò refigent; cæterum cum recrementa intestinis tenuioribus pertinaciter adhærescant, tum Enemata adeo non profunt, ut maximopere quidem ægrotos offendant; quamobrem oleosa in hoc casu per os exhibita in Enematum locum probe substituuntur; quæ, cum adhæSIONem paulo pertinaciorẽ tandem aliquandò amolitæ sint, Catharticis deinde posthac adhibituris viam longè faciliorem sternunt.

Quemadmodum thoracis interioris spatium magnopere præ septi transversi, in abdominis cavitatem, descensu, ampliari asthmaticis solenne sit; ita thoracis, ob Enematum injectionem, cavitas vicissim minuitur; quibus de causis, cum Enematum usus in istiusmodi ægrotis respirationi paulo liberiori impedimento sit, utpote quæ spatium istud, non utile tantum, quin necessarium etiam, nimium adimpleant; idcirco nè diutius unquam, in alvis asthmate decumbentium, quam ubi fæces emolliverint, moram faciant.

Siquando humorum exhaustio paulò validior necessario requiratur, quæ tamen, ob adversam ægrotantium valetudinem, probe sustineri nequeat; Enemata tum frequentius injicere apud medicos incessit mos; his, nimirum, de causis, quippe cum emetica pariter ac cathartica humores *ἀθρόως* ac confestim nimis, secus quam Enemata, fursum ac deorsum omnino deturbant, quos ista tamen perinde sensim sine sensu, quam citra virium jacturam, efficaciter exhaustiunt.

Si Enemata paulo, solito, fervidiora injiciantur, intestinorum tunicas erodunt, inflammantque; ac tandem vel ipsam gangrænam inferre possunt; sin frigidiora, humorum ac sanguinis in orbem motui ponunt obicem;

cem; quocirca Enematum liquamen non magis calefiat, quam, ut, genis vel metacarpio, vesicâ interjectâ, admotum, aliquandiu levioze cum negotio ibidem ferri poterit.

Quandoquidem ita more comparatum sit, ut quo ventriculus paulò vehementius, quam æquum sit, prematur, eo sarcinam suam certius evomere soleat; ita, hâc nimirum de causâ, providendum est, ne in vomitione symptomaticâ clysteres ultra uncias octo unquam alvo injiciantur; quippe cum intestina crassiora, præ liquoris injecti copiâ, tantoperè insentur; tum ventriculus tam infernè per Enematis copiam, quam desuper ob musculos abdominales paulò impensius imò adeo comprimitur, ut ne quid liquaminis ultra retinere quiverit, cum hoc pacto motus ipsius peristalticus non potest non exinde inverti.

Medici, experienciâ solâ edocti, lumbricos per Enemata dulcia ad anum usque jugiter allici; ac deinde per amara tam infernè injecta, quam supernè devorata posthac interfici, jampridem ac multis ante sæculis nobis tradiderunt; siquidem idcirco cautelæ istæ veræ, vel apud omnes, etiamnum habeantur: quidni, & antiquorum sententiis, vetustate firmatis, morem expeditè geramus?

Quandoquidem jamdudum advertimus, medicos alvum prius solvere, ac subducere quam carminantia remedia exhibere, cautelæ hujus denuò vos commonefacere nullius esset loci.

Quotiescunque colocynthidem unâ cum cæteris pharmacis, ex quibus Enema conflandum sit, commiscere avent ulli; medici sagaciores eam, in petiâ suspensam, idcirco coquere jubent, quod, cum particulis constet paulo acrioribus, intestina alioquin egregie vellicaret, si minus eroderet; quemadmodum igitur acriora, qualia, sunt colocynthis, sal gemmæ, cum multis id genus aliis, non aliâ de causâ, quam irritationis ergo, cum Enematum liquore commisceantur; ita remedia obvolventia tunc unâ adhibere ineptum esset; tum idcirco ab oleosis omnino temperandum est.

Inter Enematum nutrientium usum cautelæ sequentes paulò exactius observentur, primò, alvus Enemate laxante

laxante prius subducatur ac à fœcibus expurgetur; 2^{do}. componantur ex brodio, vitellis ovorum, vino canarino, cæterisque nutrimentis id genus euchymis; 3^{io}. quandoquidem ista, quamdiu poterint ægroti, retinenda sunt, idcirco remedia aciora seu irritantia tum prorsus evitanda sunt; 4^{to}. ad quantitatem sat largam eò, exhibeantur quò ad colon ac simul lactea istic sita pertingant; 5^{to}. clystere nutritivo injecto, somno saltem quieti posthac indulgeant.

Ex *Helvetio* ac *Baglivio*, Enemata febrifuga, præcipue ex corticis decocto conflata, toties injiciantur, quoties rejiciuntur; ac eatenus in injectionis usu persistamus, quoad febris penitus evanescat; hæc tamen notatu digna sunt, eà quantitate injicienda, quâ ad colon usque vehantur; quoniam lactea ibidem dehiscencia liquorem in sanguinem confestim importabunt, & hæc porro de causâ fit, ut in copiâ sat largâ ea semel injicere cogamur: quinetiam declinante paroxysmo ejusmodi injicere incipiamus; at de his fusius posthac agemus.

Gabelchozerius, *Obs. C. 1. Curat. Anatom. 62.* Cautelas sequentes super Enematibus nobis inculcat; 1. Enema catharticum non ultra horæ dimidium retineatur; 2. Inter injectionem, ægri lateri incumbant dextro; (uti etiam *Fernelius* ait, “*In latus, nimirum, dextram decumbenti facilius, celeriusque subit, sursumque excurrens intestina proluit.* L. de meth. med. 3. C. 2. n^o. 40.) 3. Sensim ac pedetentim injiciantur; 4. Injecto Enemate, at incassum, seu alterum confestim injiciatis, seu glandem intrudatis. Addit *Fernelius*, “*Hoc diutius subsistente potest laborans cibum sumere, aut huic etiam si volet indormire: nam postea licet non syncerus, ingenti tamen scœnere redditur.*”

Corollarium.

Enema laxans.

℞ Decoct. commun. pro Clysterib. emollient. ℥xij. Syr. Violar. ℥iij. Terebinthin. (ovi vitello solut.) ℥β. m. f. Enema statim injiciendum.

OBSER-

OBSERVATIONES.

In quamplurimis capitis morbis idcirco clysteres injiciuntur, quippe quam sæpissime contingere soleat, fæces, in recto defixas, ramos vasorum iliacorum tantopere premere, ut sanguinis ad terminos inferiores cursum quadantenus impendant; quamobrem usu fit, ut partes supernæ eò magis oppleantur, quò magis rami premantur isti; quocircà tali in casu, Enema emolliens omnino necessarium est; nam intestinis à sarcinâ suâ gravi tandem ità liberatis, sanguis deinceps pro solito more rursus ex æquo, ultrò citròque circumgyrari cernitur: hisce de causis egregie phrenitidi ideo profunt, quoniam fæces non solum exinde mollescent, verum clyster etiam quivis emolliens, quandoquidem in intestinis aliquandiu commoretur, in fotûs vicem substituitur; ac proinde tunicas ibidem relaxat: vasorum ac intestinorum tunicis ita laxatis, fluida longe copiosius in eis nunc quam antè pelluntur in orbem; ex quibus fit, ut cæteræ, superioris speciatim regionis, partes onus excutiant suum; necnon deliria hoc eodem onere, tanquam causâ sui præcipuâ, suffulta, seu sensim sive confestim posthac evanescent; dummodo tamen sub idem tempus tam victus refrigerans ex jufculo nimirum avenaceo, seu panatellâ, &c. quam remediâ ejusmodi, ex sale, nempè, prunellæ cum julapiis misto, &c. exhibeantur; ac ii à lecto interim arceantur; necnon etiam in erectâ perpetuò sedeant posturâ; in hoc rerum statu, vix fingi potest, quantò postura erecta horizontali præeat! quorum causa cuivis, rem paulò accuratius ac attentius expendenti, manifesto constabit; quippe sanguinem velocius vel lentius, sursum vel deorsum, ultrò citròve, quâ motui postura subsidium ferat, circumrotari certo ferè certius est, quemadmodum in mensium fluxu immodico palam fit; quamdiu enim ejusmodi in erectâ sedent posturâ, tamdiu longe cumulatus solito fluxus emanare solet; è contrario tamen, fluxus à posturâ horizontali sensim continuò minuitur.

Hujusmodi Enema renum calculo idcirco conducere valebit, quod, cum in ureteribus fotûs vice fungatur,

eos egregie laxet; ureteres, usque adeo exinde laxati, extraneo cuivis corpori impellenti facilius deinceps cedent, atque quicquid ibidem subliterit, posthac confessim exturbabitur; quoties hoc cum eventu prospero in renum calculo peractum novimus!

Visceribus inflammatis, ac intestinorum doloribus idcirco suppetias ferunt, quod perinde discutiant, (tantum enim secundario refrigerant,) atque relaxent; cum *Ballonius* igitur *Ischuriam* memorat, quæ febribus ardentibus frequentius comitatur, quam etiam *Hypogastrii* doloribus contorsivis stipatam nuperrimè vidimus; clyster ejusmodi dolori huic prodesse poterit, quoniam cum dolor iste sit plerunque spasmodicus, cui clyster idcirco præsidio erit quod partes valdè tensas adeo relaxet; qui tamen ab enemate, cui opii grana aliquot adjiciuntur, multo proculdubio efficacius miteret; uti in ægroto jam memorato experti sumus.

In thoracis morbis ejusmodi Enemata sæpe proderunt; quippe cum inspiratio difficulter, imo vix vel ne vix interdum, peragatur; respiratio pro impedimenti hujus modulo magis vel minus libera, ac proin intestinorum exoneratio eâ ratione magis vel minus utilis erit; thoracis enim spatium maximopere exindè ampliabitur; nihilominus tamen hæmoptoi, ex hoc egregie obsunt, quòd cum necesse sit ejusmodi altum agant silentium, nosmet ab omni medicinæ genere, quæ tum thoraci vim inferat, omnino contineamus, ni impensius unquam indicetur; quapropter, ni alvus à stypticis, hæmoptoës gratiâ introsumptis, nimium constipetur, ab Enematibus prorsus abhorrent medici.

In hæmorrhoidum dolore Enemata relaxantia ac oleosa apprimè conducunt; quocirca in hæmorrhoidum internarum dolore *Sydenhamius* oleum lini, tepescens, injiciendum curat; quod perinde fæces emolliat, atque intestina propemodum tensa discingat; humores adhæc acres obrundendo, dolores istiusmodi leniat; observatu porrò dignum est, quod ni fistula, pulli intestinulo, jugiter obtegatur; intestinis admodum illa inflammatis alioquin erit incommodo.

Quanquam Enemata dolori colico notho damno sint, ea tamen vero plerunque quam maximè conveniunt;

niunt; ex eo quod flatus, in coli cellulas conclusos, deorsum pelliciant: cæterum & hoc cum delectu à vobis adverti volumus; quoniam colicas, vel veras, ab Enematum usu magis aliquoties intendi, nec insuetum neque novum est; brevi autem, ut scrupulum ex animis vestris hunc eximamus, ita se res habet; quotiescunque coli valvulæ superiores flatibus scatent, imo quoties inferiores ipsæmet adeo tenduntur, ut, in immensum, auctâ medii cellulæ cujusvis diametro, valvularum utrinque sitarum extrema parietesque ex hoc sibi propius invicem accedant, fræno ibidem interjecto, parum elongato; toties flatuum omne undequaque impeditur effugium: quicquid autem, in hoc rerum statu, remediî sive per os sive per anum adhibeatur, quod præ calore suo potentiali seu actuali flatus solummodò rarefaciat, dolor adeo non exinde mitescit, ut geminato potius augeat impetu; quod si medicamen fibras efficaciter retendens exhibeamus, unâ cum remedio quod motum vermicularem simul paulò validius stimulare poterit, vomitiones compescimus, dolores lenimus, necnon flatuum præterea fomitem strenuè deturbamus, ac demum ægrotos propemodum vitâ donamus.

Hieronymus Mercurialis, l. 2. consult. consil. 48. p. m. 123. Clysteres laudat, ubi humorum copia indies coacervatur; quam sententiam ut meliusculè capiat, ita prorsus existimamus; quoties homines sese cibis ingurgitaverint, vitam autem agunt apprimè desidem, toties humores paulo cumulativius, quam fas est, congerere solent; qui cum longè tutius evacuari quam retineri debeant; qui porrò minori cum damno per Enemata quam per aliud quodvis remedii evacuatorii genus extrudi idcirco possunt, quod hæc confertim, illa tamen, iteratò licet, leniter ejusmodi deturbent: ita est, ut humorum per anum exclusionem si non magis, at perinde nostræ ac *Italica* regioni, quam optime competere reperiamus.

In lethargo vel apoplexiâ, clysteres ex remediis paulo acrioribus omnino conflagant; quinimò, ex quorundam sententiâ, alvum usque eò stimulari convenit, quò sanguinem è mesentericarum inferiorum aliarumque arteriarum ramulis copiosè eliciant; metho-

duſ hæc licet nobis ardeat, iſta tamen eximii Dris. Cole, quâ ſanguinem vel interdum ad uncias ſexaginta ſemel extrahere ſolebat, cum huic longè anteponatur, clyſterum inſuper injectioni opem feret.

Tam molas quam ſecundinas Enematum auxilio jamdudum feliciter extruſimus; quæ neque per emetica neque per cathartica, neque per obſtricticis manum expelli vel extrahi debent, niſi neceſſariò requiratur.

Siquidem ergo clyſteres, de virtutibus eorum, à ſe invicem longe diſſideant, circa Enematum carminantium, nutrientium, aſtringentium, anodynorum, cæterorumque uſum, poſthac opportunior dabitur diſſerendi locus.

Enema Emolliens.

℞ Decoct. Commun. pro Clyſterib. Emollient. ℥x. Syr. Violar. Mell. Mercurial. ā. ℥j℞. m. f. Enema ſtatim injiciendum.

OBSERVATIONES.

Siquidem Enema hoc ab *Enemate laxante* parum diſcrepet, idcirco nec alias virtutes poſſidere poterit; quamobrem uti penſum in Enemata purgantia præſcriptum aliquantò accuratius abſolvimus, de glandibus deinceps dicemus.

C A P. IV.

Glandes (Suppositoria.)

Fortiores.

Colocynth. ℥℞. Agaric. ℥j. Sal. Gemm. ℥℞. Hier. Picr. ℥ij. Mell. Coct. q. ſ. m. f. Glandes.

℞ Sapon. Venet. ℥j. (vel q. ſ.) Diagryd. ℥℞. (j.) Sal. Commun. ℥j. m. f. Glandes.

℞ Agaric. Trochiſcat. Pulv. Hier. Picr. ā ℥j. Aloes Roſat.

- fat. Pulv. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. Despumat. & Coct. q. f. m. f. Glandes.
- ℞ Sal. Culinar. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$. Spec. Hier. Picr. $\mathfrak{z}\beta$. Mell. Coct. q. f. m. f. Glandes.
- ℞ Pulv. Fol. Senn. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$. Sal. Culinar. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Butyr. Salit. q. f. m. f. Glandes.
- ℞ Mell. Commun. $\mathfrak{z}\beta$ Spec. Hier. cum Agaric. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Fell. Taur. inspissat. $\mathfrak{z}\text{ij}$. m. f. Glans.
- ℞ Stercor. Mur. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Pulv. Rad. Hellebor. alb. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. Crud. q. f. m. f. Glans.
- ℞ Aloes, Myrrh, \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\beta$. Succ. Absinth. inspissat. Fell. Taur. inspissat. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. q. f. m. f. Suppositorium.
- ℞ Suppositorii cujusvis supra præscripti q. f. illinatur oleo Diacolocynthidos & aspergatur Sale Cathartico amaro, imo vel Sale Armoniaco, Gemmæ, vel alio quovis remedio acri ac stimulante f. l. a. Suppositorium.
- ℞ Pulv. Rad. Pyreth. Troch. Alhand. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\beta$. Sal. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. q. f. m. f. Glandes n^o. ij.
- ℞ Rad Pyreth. $\mathfrak{z}\beta$. Spec. Hier. Coloc. \mathfrak{a} gr. xv. Mell. Coct. (cum Sal. Gemm.) q. f. m. f. Glans.
- ℞ Pulv. Mechoac. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Helleb. n. gr. x. Mell. q. f. f. Glans.
- ℞ Nitri, Sal. Armon. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\text{ij}$. M. P. Rud. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. Coct. $\mathfrak{z}\beta$. Ol. Succin. q. f. m. f. Glans.

Leniores.

- ℞ Alum. Pulv. q. v. Album. Ovor. agit. q. f. ut f. Pasta, m. f. Suppositoria pro ætatis modulo. *Bastans.*
- ℞ Alum. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Sal. Commun. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. Despumat. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Coqr. in duritiem sufficientem, m. f. Glandes.
- ℞ Sterc. Mur. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mell. Crud. $\mathfrak{z}\text{ij}$. m. f. Suppositorium.
- ℞ Pulv. Sem. Cumin. Carv. \mathfrak{a} $\mathfrak{z}\text{ij}$. Nitri cum Antimon. fixat. $\mathfrak{z}\beta$. Mell. Elect. è Bacc. Laur. \mathfrak{a} q. f. m. f. Suppositorium.
- ℞ Butyr. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Sal. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Vitell. Ovor. q. f. m. f. Suppositorium.

SCHOLIA.

Propter usûs identitatem seu unitatem fere, Glandes enëmatibus subjunximus; quæ anum irritando, enteroceli idcirco conveniunt, quod fæces leviori cum negotio promoveant; etenim enemata, cum, intestina replendo, parietes eorum paulo magis solito distrahant, nec non expulsionis molimen adaugeant, herniosis male quandoque cedunt; ideo quia nemini ignotum est, quòd eo magis istiusmodi conamina crescunt, quo magis intestinorum parietes à se invicem distent.

Infantulis quam sæpissime adhibentur, quippe qui enemata usque adeo retinere nequeunt, donec expulsionem præcipiamus: hinc fit, ut eorundem anis uvam passulam, amygdalam excorticatam, betæ radicem rasum, saponem castiliensem in *Magdaleonem* formatum felici cum eventu ut plurimum intrudamus.

Siquando in alvo constipata cathartica prius incassum adhibuerint medici, imò vel quotiescunque fæces usque adeo induruerint, ut enemata nequaquam introduci queant; vel demum ubi clysteres voto prorsus haud convenerint nostro, Glandes jugiter in eorum substituantur vicem; utpote quæ, præ levi suâ, nempe, proritatione, humorum nonnihil ex cerebro, ac thorace, præcipue vero ex intestinorum canali quadantenus eliciant; quandoquidem eæ catharticorum instar, parum (imo longe) tamen infra, propositam attingant metam. Cum hæmorrhoidum fluxus sit idcirco salutaris, quod sit humorum nocuorum exterminatio ac naturæ molimen, quod criticum haud immeritò nuncupatur; quoties igitur periodica istiusmodi humorum exinanitio, de more ac instituto suo antiquo, pro voto nostro prospere non eveniat: Glandes, ex medicamentis paulò acrioribus conflatas, ac ano intrusas, Suppressionem hanc, si naturæ minus inimicam, ancipitem tamen, efficaciter recludere reperiemus. Quandoquidem lumbrici, ascarides dicti, quasi in extremo intestini re-
cti maxima ex parte moram faciant, Glandes idcirco quam aptissimè componuntur, quæ eas per nutrimenti simulationem interficere possunt: quamobrem nonnulli mercurium vivum cum saccharo crySTALLINO ac olei

lei paulillo, in globulos atomorum instar, divisum, ac unâ cum axungiâ porci mistum, in Glandes compingunt; easque subindè, cum emolumento, recto intrudunt; quoniam ita, refectionis ritu perinde dolosius ac certius aliquanto interimuntur.

Quantumvis ejusmodi formulas usui subindè nobis modò fuisse demonstravimus, eas tamen ægrotis paulò apertius officere quam convenire, cuius, vel leviter advertenti, ex sequentibus, extra omnem dubitandi ponemus aleam; quamobrem gravidis geminâ de causâ Glandes obsunt, perinde nimirum, quia nimium os uteri internum, quinimo uterum sæpius ipsum, atque intestinum rectum, utero præterea vicinum, irritant; & quemadmodum irritatio ne partibus quidem inflammatis, neu ulceratis, neu demum vasi rupto, eroso neu aperto idcirco conducere comperiatur, quòd partibus inflammatis, (quidni ergo & hæmorrhoidibus cæcis) solenne sit, ut quo magis moveantur, eo certius augeantur; quòd ulceribus (quocirca & ani sive fissæ sive ulceratæ) usitatum hoc sit, ut quo asperius tangantur, eò magis increbrescant; quòd in hæmorrhoidibus fluentibus obtineat, ut eo magis emanent, quo vehementius vasa stimulentur; ita, quod demonstrandum erat, id vobis palam fecimus.

Glandes sint tres quatuorve uncias longæ, nec ultra; quoniam sphinctere recti non altius pertingere debent; sint etiam digitum eorum, quibus adhibentur, minimum crassæ; pulveres demum commiscendi, sint tenuissimè lævigati, alioquin anus, cum sit membranosa, ac proin haud parum sensilis, eorum angulari figurâ nimium irritaretur, si minus tandem exulceraretur.

Quantum ad Glandes opiatas authores nobis inculcant; ut in eis opij quantitas grana tria, quatuor vel sex ad summum non exuperet; adhæc ut non ultra horæ dimidium ejusmodi Glandes retineantur; siquidem ergo de Glandibus hucusque sat abundè disceptaverimus, receptui canamus.

Quandoquidem eximius vir Glandes perrarò præscripserit, easque sub *Suppositorii vulgaris* titulo contexerit; nobis non constat, nec multum forsan referet, quale id fuit, cui se magis consueverit.

CAP. V.

DIAPHORETICA.

Fortiora, Calida.

- Sal. Absinth. gr. x. Sal. Card. bened. gr. xij.
Sacch. Crystill. $\text{᠑}\beta$. m. f. Pulvis.
- R Aq. Puleg. Epileptic. Lang. \bar{a} $\text{3j}\beta$.
Menth. $\text{3}\beta$. Sp. Sal. Armon. gr^{tt} . xx.
Conf. Alchem. ᠑j . Syr. Caryoph. 3ij .
m. f. Haustus.
- R Sal. Absinth. Sal. Vol. Armon. \bar{a} gr. iij. Zinzib. gr.
xij. Sacchar. Crystill. gr. x. Ol. Caryoph. gr^{tt} . j. m. f.
Pulvis.
- R Conf. Fracastor. f. m. 3j . Antim. Diaph. ᠑j . Croc.
gr. x. Sal. Card. b. gr. vj. Aq. Mirab. $\text{3}\beta$. m. f.
Haustus.
- R Theriac. Androm. 3j . Sal. Vol. C. C. gr. iij. Sal. Ab-
sinth. $\text{᠑}\beta$. Ol. Cinnam. (in Sacch. solut.) gr^{tt} . ij. Aq.
Card. b. 3iij . Sp. Croc. ᠑j . m. f. Haustus.
- R Aq. Card. b. Flor. Sambuc. \bar{a} $\text{3j}\beta$. Sp. Theriacal.
Camphorat. 3j . Sp. C. C. gr^{tt} . vj. Antim. Diaph. ᠑j .
Syr. Croc. q. f. m. f. Mistura.
- R Antim. Diaph. Cinnab. nativ. \bar{a} $\text{᠑}\beta$. Sal. Vol. C. C.
gr. vj. Decoct. Guaiac. 3vj . m. f. Mistura.
- R Aq. Lact. Alex. 3iij . Sp. Theriacal. $\text{3}\beta$. Mistur. sim-
plic. ᠑j . m. f. Mistura.
- R Fol. Chamædryos, p. ij. Coq. in Vino, m. f. Mi-
stura.
- R Sal. Vol. C. C. $\text{3}\beta$. in Vino Calido.
- R Pulv. Pannon. Rub. $\text{3}\beta$. Sal. Vol. C. C. gr. v. m. f.
Pulvis.
- R Aq. Lact. Alex. 3iv . Theriac. Androm. $\text{3j}\beta$. Antim.
Diaph. ᠑j . Camphor. gr. iv. Syr. Croc. q. f. m. f.
Mistura.
- R Aq. Lact. Alex. 3iij . Dris. Stephani 3iv . Ol. Succin.
(in Sacch. solut.) gr^{tt} . xv. m. f. Mistura.

Huic

Huic Diaphoreticorum Classi sequentia referuntur.

Ex *Pharmacopœiâ Londinensi*. Aq. Bezoartica. ʒj. ʒiv. Confect. Alkerm. ʒj. ʒij. Spec. Diacinnam. ʒj. ʒj. Confect. Fracastor. ʒj. ʒjʒ. Elect. de ovo ʒj. ʒjʒ. Extract. Bezoartic. ʒj. ʒ. s. Pulv. lætificans ʒj. ʒj. Mithridat. ʒj. ʒjʒ. Pleres-Archonticon. ʒj. ʒj. Pulv. Bezoartic. Magistral. ʒj. ʒj. Pulv. è Chel. c. ʒʒ. ʒj. Pulv. Saxonie. ʒj. ʒj. Sal. Absinth. (ac aliarum herbarum amarulentarum) Volat. gr. j. x. Spec. Diambrae, Diamoschu dulc. Diamoschu Amar. Dianthûs ʒʒ. ʒʒ. Theriac. Androm. ʒʒ. ʒj. ʒjʒ. Troch. Alexiter. ʒj. ʒʒ.

Ex *Pharmacopœiâ Bateanâ*. Aurum Mosaicum, Dof. gr. x. xij. Antimon. Diaphoretic. ʒj. ʒj. Ceruss. Antim. ʒj. ʒj. Cerussæ Martis ʒj. ʒj. Cinnab. Antimon. ʒʒ. ʒj. Crocus Jovis. gr. iv. x. Decoct. Ambrosian. ʒʒ. Decoct. Ulmi ʒʒ. Flor. Antim. gr. ij. iv. Flor. Benzoin. gr. v. xij. Flor. Sal. Armon. gr. v. xv. Jupiter Diaphoreticus gr. iij. x. Jupiter nitratus gr. iij. x. Lapis Contrayerva ʒʒ. ʒʒ. Lap. de Goâ ʒʒ. ʒj. Mars Diaphoretic. ʒʒ. ʒj. Nitrum Cachectic. gr. vj. xx. Ol. Camphor. gtt. x. xv. xx. Panacæa Hartmann. gr. x. xx. Phosphorus ʒʒ. Pil. *Matthæi* ʒʒ. &c Pulv. alb. ʒʒ. ʒj. Pulv. Cantian. rub. vel nig. ʒʒ. ʒʒ. Pulv. Pannonic. ʒj. ʒj. Sal. Armon. Vol. gr. iij. x. Sal. Vol. Oleos. gtt. x. xxx. Sal. Philosophor. gr. iv. xij. Sal. Tart. Vol. gr. x. xxx. Sal. Viperar. Volat. gr. vj. ʒʒ. Sal. Urin. Vol. gr. xv. xx. Sedativum Archæi Spir. Camphoræ ʒʒ. Spir. Cochlear. gtt. x lx. Spir. C. C. Succinat. gtt. v. xxx. Spir. Dracuncul. ʒiv. Spir. Sal. Armon. gtt. x. xij. xx. Spir. Sal. Armon. Tartarifat. gtt. x. xxx. Spir. Sal. Armon. Succinat. gtt. x. xxx. Spir. Sal. Armon. Chalybeat. gtt. v. xx. xxx. Spirit. Sambuc. Cochl. j. ij. Spir. Sanguin. gtt. x. xx. xxx. Spir. Vin. Succinat. Cochl. j. ij. Spir. Theriacal. Camphorat. ʒj. ʒj. Spir. Viperar. gtt. iv. x. Tinct. Bezoartica ʒiij. ʒj. Tinctur. Guaiac. ʒvj. ʒjʒ. Tinct. Sassafras Cochl. j. ij. Tinct. Virginian. ʒj. ʒiij.

Ex *Pharmacopœiâ Fulleri*. Bolus Cardiacus ʒj. Bolus Sudoriferus ʒj. Decoct. Fracastor. ʒiv. Decoct. Sac. Cochl.

Cochl. ij. iij. Decoct. Sanct. ℥iv. Elect. Spirituos. ℥j. 3j. Haustus Alexiphar. ℥iv. Haustus Amar. ℥iij. ʒj. Haust. Diaphoret. ℥iv. 3j. gr. xij. Haustus Febrifug. ℥iv. &c. Haustus è Salib. Volat. ℥iv. 3iij. Julap. Volat. ℥iv. Mistur. Volat. Coch. j. Pilul. Alexiter. ʒj. Pilul. Diaphoretic. ʒj. Pulv. Alexiphar. ʒj. Pulv. Bezoartic. nost. ʒj. Pulv. Contrayerv. composit. ʒj. 3β. ʒjj. Pulv. Diaphoretic. ʒj. Pulv. Epidemius ʒj. ʒij. Pulv. Pestilential. ʒj. Pulv. Theriacal. ʒj. 3β. Sp. Vin. Camphorat. cum Sp. Sal. Armon. ʒj. 3j. Syrup. de Sassafrâ Coch. j. ij. Syr. Theriacal. Coch. ij.

Mitiora, Media.

- ℞ Lap. Bezoar. Orient. ʒβ. Marg. ppt. gr. xvj. Spec. Conf. de Hyacintho gr. v. Nitri Purif. ʒβ. Sacch. Crystill. ʒj. m. f. Pulvis.
- ℞ Terr. Sigillat. Bol. Armen. C. C. C. ā ʒβ. Pulv. Rad. Petasitid. 3β. m. f. Pulv.
- ℞ Acet. Flor. Calend. 3iij. Aq. Scord. Lact. Alex. ā 3j. Antim. Diaphoret. ʒj. m. f. Haustus.
- ℞ Diascord. Fracastor. 3j. Sal. Card. b. ʒj. Aq. Theriacal. 3ij. Ol. Vitriol. gr. vj. m. f. Haustus.
- ℞ Sal. Commun. 3j. Acet. 3iij. m. f. Haustus.
- ℞ Aq. Theriacal. 3ij. Succ. Citri 3β. Sal. Card. bened. ʒj. m. f. Haustus.
- ℞ Bezoar. Mineral. gr. xv. Sal. Prunell. ʒj. Sacch. Crystill. q. s. m. f. Pulvis.
- ℞ Terr. Sigill. ʒij. Troch. Viperin. 2β. Acet. Bezoartic. Aq. Thriacal. ā 3j. m. f. Haustus.
- ℞ Aq. Card. Bened. Borag. Acetos. ā ʒj. Succ. Citri. Syr. Acetosi. Citri, Rob. Ribes. r. ā 3j. Ol. Sulph. q. s. m. f. Apozema.
- ℞ Sal. Febrifug. (ex Salis Armoniaci capite mortuo resid.) 3β. Antimon. Diaphoret. ʒj. Marg. ppt. ʒβ. m. f. Pulvis.
- ℞ Aq. Verben. Trifol. Fibrin. Beccabung. ā 3ij. Ror. Vitriol. 3j. Tinct. Rosar. 3β. Syr. Corall. 3j. m. Cap. ℥iv.

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex *Pharmacopœiâ Londinensi.* Acetum Theriacale. Cochl. ij. iv. Acetum Theriacale Norimberg. Cochl. ij. iv. Aqua Limonum. ʒj. iv. Aqua Theriacal. ʒʒ ʒij. Confect. de Hyacinth. ʒj ʒij. Species cordiales temperatæ ʒj. ʒj. Spec. Diamargarit. frigid. ʒj. ʒj.

Ex *Pharmacopœiâ Bateanâ.* Alumen Febrifugum. ʒj. Antifebrile Conchar. ʒj. Aq. Stimulos Sulphurea (Dosis ea, quâ vehiculum acetat) Arcanum Joviale. gr. iij. viij. Aurum Fulminans gr. iij. iv. Bezoar. animale gr. vi. xx. Bez. Joviale gr. iij. vj. Bez. Lunar. gr. vj. xij. Bez. Mineral. gr. vj. xv. Bez. Solar. gr. iij. viij. Mixtur. simplex ʒj. ʒʒ. Sal. Aceti Essential. gr. v. x. Sal. Aceti fix. gr. v. x. Sal. Alumin. gr. v. x. Spir. Vitriol. Diaphoretic. ʒj. ʒʒ.

Ex *Pharmacopœiâ Fulleri.* Nulla prorsus; nisi si Diuretica temperata, intra nominanda, auctiori dosi administrata, ex ipso afferremus: Quisquis tamen is est, qui Diaphoreticos causas serio secum expendere volet; facile nobiscum agnoicet, sudores non idcirco jugiter emanare, quod sanguis concitatus aliquantò, quam decet, in orbem roteretur; quoniam hydrostatices axiomata si quisquam ad rationem paulò attentius revocaret; profitebitur ipse, quod cum motus liquoris progressivus obliquo longe suinde prior sit, eà de causâ liquaminis, istius nisi quod unquam sibi claudatur iter, si minus integra moles, at portio longè major, rectà, non autem obliquè propelletur; quocirca sanguis etiam, hoc in casu, per anastomoses seu ductus amplores, non vero per glandulas seu canales angustiores iter suum instituet; si Diaphoretica igitur paulò calidiora jam exhiberemus; fluida, quippe quæ cumulatus exinde protruderentur, alicubi subsisterent idcirco, quòd apulsus momenta regressus momentis longè essent disparia ac priora; hinc autem fit, ut medici saniores à remediis calidioribus sub febrium initia seu augmenta prorsus abhorreant, quandoquidem ea pleuritides, phrenitides

tides ac inflammationes istiusmodi funestas properanter accerlant: quocirca non potest non palam, ut opinamur, vobis fieri, quin remedia temperata, Diaphoretica etiam aliquoties, evadant; utpote cum hinc motus, in longum, qui illinc nimis intenderetur, tantopere mutetur, ac minuatur, ut deinceps eo copiosius diffluat, quod magis pedetentim, aliquatenus, in gyrum flectatur; ac sudores proinde profluant, quod sanguis ad glandularum ostiola paulò placidiùs appellat.

SCHOLIA.

Quemadmodum de vetere naturæ instituto fieri solet, ut nequid remedii è poris, imo vel uspiam, humores unquam exturbare poterit, nisi quod præcesserit irritatio; ita nec diaphoresis provocari potest, nisi, unà cum sanguinis fluore adsit porro pororum stimulatio; quæ fieri tam à temperationibus quam calidioribus Diaphoreticis jugiter observatur.

In temperamento, sigillatim, serosis, serum è poris effluenter ea extrudunt; quamobrem ægroti catarrhis obnoxii maximoperè exinde adjuvantur; quippe cum serosæ sanguini præsent particulae, ita, cum articulos adorianur, arthritides vagæ actutim in lucem prodeunt; quæ porro bronchiis & pulmonibus insidentes, tusses ac ejusmodi morbos introducunt; quæ in intestinorum glandulas depositæ, diarrhœas vel similia confestim producant; quæ demum alicubi vectæ, morbos varios partis, cui insident, usitatos exuscitant;

Non humores solum serosi, sed pituitosi ac glutinosi etiam per ea extruduntur; quemadmodum enim ovorum albumina per conquassationem in fluorem penè aqueum perducere queunt; ita humores nostri ocys aliquanto circumpulsi perquam divelluntur ac proin attenuantur; quocirca cum diaphoretica, calidiora præcipuè, humores primum tenues faciant, ac dein expellant, hydropi, anasarcae dicto, idcirco egregiè opem ferunt; nam medicamenta sudores provocantia, urinam unà eodem extrudunt momento; humorum, hoc modo, serosorum excessu magna ex parte dempto, qui

-superfunt,

superfunt, expeditiùs à medicamentis humorum speciei commodis immutari queunt.

Quandoquidem Diaphoretica sanguinis motum intendunt, stagnationes ac concretiones fatalia tam generatura intercipiunt quam generata sanant, ac unâ particulas noxias è sanguinis sinu propellunt; hinc quoties pulsus parvus ac debilis est, calor ferme naturalis ac symptomata nervosa, in febris quavis sive continuâ sive eruptivâ, variolosâ, nimirum, morbillosâ, aliâve, adfuerint, istiusmodi remedia multum hic conducunt.

Quoniam morbi hysterici, hypochondriaci, spasmodici ac convulsivi, symptomatibus, quæ irritationem quanquam, simul stagnationes tamen, arguunt, plerunque stipantur; ideo Diaphoretica his commodo sunt, quia sanguinem acerbum acidumve perinde mutant, quam mutatum expellunt; nam statim ut morbi causam remotam præciderit medicus, proxima haud ita multo post, nisi in vasa altius impellatur, facillime detruncatur; hoc autem in casu, salis peccantis figurâ penitus immutatâ, cessat irritatio, ac cohæsiô tandem simul extinguetur.

A cane rabido, tarantulâ vel etiam quovis animali viroso morsis, remedia hujusmodi ex eo conveniunt, quod sanguinem, extemplo subsistentem, denuo in motum concitent; hinc alexipharmaca è remediis volatilibus, fixis, ac absorbentibus conflata (qualia nimirum sunt, *salia volatilia* è cornu cervino, sale armoniaco, &c. *salia fixa* absinthii, cardui benedicti, &c. *testacea*, è chelis cancrorum, margaritis, &c.) morsis usui maximo sunt; externa tamen sedulò interim admoveantur, cauterium nempe actuale, cucurbitulæ, cum scarificatione, ac discutientia, quæ si maturiùs adhibeantur, sæpius internis non comitata rem absolvunt: at in tarantatis, musicâ, citharâ potissimum, oblectantur, ac saltando sanguis circumpelli ac humores extrudi comperiuntur; nonnulli etiam addunt, axungiam viperinam, à viperâ morsos specificè, exterius admotam, adjutare.

Mensium suppressioni ideo ferunt opem, quoniam, cum in sanguine commotionem cieant, globuli sanguinei ita expansi, à latere quaquaversum semet-explicant,

ac vasa eà cedunt ratione, quâ expanduntur; hinc fit, ut amoveantur obstructionis hujusmodi causæ.

In gangrænis, ita se res habet; vasa minutula nimirum non solum obturantur, verum motus etiam circularis ex integro ibidem cessat; hinc cum humores stagnantes movere ac vasorum obturationes amovere diaphoreticorum sit; in istiusmodi laborantibus sedulò exhibeantur.

Siquidem obstructiones igitur omnimodas auferre comperiantur, quidni & paralyfin à vitio sive humorum sive nervi productam? sæpius itaque decocto guaiaci, horis medicis ad uncias quatuor vel sex, adhibito, paralyfes vel graviores, etiam in senibus intra septimanas sex penitus abstulimus.

Lues confirmata citra Diaphoretica vix ac ne vix auferri potest; quocirca *Grimm*, *Sylvius*, ac reliqui medici ad unum omnes, in eorum usu, usque adeo, persistendum esse perhibent, donec symptomata primaria (gonorrhœa nimirum virulenta, ulcera, caries, tophi, dolores ac pustulæ) penitus evanescunt.

Diarrhœis ab humoribus serosis oriundis (qui sunt simul salini) idcirco suppetias ferunt; quod, cum eos tam exturbant quam aliò derivant, opiatīs unà cum stypticis ac decocto albo exhibitis rem posthac facilius absolvemus.

Quemadmodum infantum fluida aciditate ac glutinositate peccant plerunque, iis Diaphoretica nunquam non emolumento sunt, quia vitium utrumque, ut sæpius demonstravimus, penitus dirimunt.

Cum dolores rodentes, perterebrantes, lacerantes, & *σεκόποι*, scindentes, ac pungentes ab humoribus acidofaliniis ut plurimum producantur, quorum spicula partibus insidere solent; ita hujusmodi ægrotis Diaphoretica profunt volatilia, quippe quæ acidum perinde immutant, quam istud foris ablegant; ex quo fit, ut arthritidis fomes aliorum evocetur; qui glandulas mucosas alioqui multum irritaret; quamobrem miasmate morbifico quadantenus expulso, siquid supersit, id omne placidius deinceps in articulos jam dolentes ruet; unde accessio, quanquam interdum paulisper exinde gravior fiat, cœtus tamen aliquantò proinde declinabit.

Fluxum

Fluxum istum sanguineum, quem hepaticum appellant medicorum turba, in omni circumstantiâ, demptâ sede, cum hæmorrhoidum fluxu convenire affirmamus; quandoquidem utriusque causa sit arteriolarum obturatio; Diaphoretica hic profunt, quoad nimirum quâ attenuant, quâ aperiunt.

Quemadmodum salia unâ cum sero per poros amandant, scabierum ac eruptionum quarumvis fomitem subtrahunt; ita qui reliquus est, antidotis obvolvuntibus ac diluentibus facile deinceps cedere reperitur; eâdem de causâ fit, ut scorbutus, qui coagulationes, stagnationesque in vasis capillaribus comites sibi adjungit, à Diaphoreticis volatilibus multum adjuvatur; quoniam serum ea salinum omnino foris ablegant.

Febribus juxta continuis ac intermittentibus perutilia sunt; quoniam veluti in febre continuâ (speciei nempe hæcticæ) sanguis ac spiritus propemodum subsistunt, ita Diaphoretica fixa vel volatilia, at alcalina, concretiones aut intercipiunt aut eas solvunt; ex quo fit, ut cum pristinus fluor redeat, motus sanguinis deinceps more solito in gyrum flectatur: in febre intermittente autem, cum causa penitus eorum ope exhaustiatur; quidni & accessiones febriles posthac declinent, ac haud ita multo post extinguantur?

Etiam si plerisque morbis sint quam commodissima, ea tamen subinde quam maxime nocere observantur. Quorum idcirco ventriculi saburrâ cujusvis speciei saginantur, sive ab eduliis seu ab humoribus oriatur ista repletio, hi à Diaphoreticis perquam ideo læduntur; quippe cum integra medicamenti energia in materiam hanc, in ventriculo contentam, unicè erogetur; quandoquidem ista non modo in bullas elevetur; verum etiam colicæ aliquoties graviores hinc suboriantur, quinimo calor etiam febrilis, citra sudores tamen, invalescat; his nimirum de causis fit, ut vires remedii tantò magis enerventur, quanto intimiùs illud humori vel cibis implicetur.

Sequentis cautelæ vos commonemus; quod licet Diaphoretica humoribus acidis glutinosive exterminandis convenire asseruerimus, mitiora tamen exhiberi volumus; ex eo, quod cum sanguis hujusmodi per-

quam cohæreat, ac præ pondere ipsius parum habeat molis; statim ut rarefcit, spatium longe majus occupando, vasa plurimum tendi ac interdum rumpi advertuntur: quocirca hoc in casu maximè cavendum est, ne in sanguine glutinoso acidove Diaphoretica ante exhibeantur, quam vasa quadantenus inaniantur.

Quemadmodum evacuationes in spirituum atrophiam seu exhaustionem nequaquam exinde conveniunt, quòd hoc modo evacuationem supra evacuationem moliremur; ita nec Diaphoretica hic, ne insuper atrophie universali neu colliquationibus iisdem de causis conducunt.

Sanguis in quibusdam temperamentis usque adeo cohæret, ut sudores quanquam à Diaphoreticis vel fortioribus exhibitis, haudquaquam diffuere observentur, quotiescunque idcirco in ejusmodi introsunt, quippe cum citra, si minus contra, indicationem exhibeantur, inflammationes graves quam sæpissime exinde suboriuntur.

H. Scriver in tractatu de febre castrensi Diaphoreticorum usum in febribus duplici de causâ nigro carbone notat; primò in mulieribus tenellis, quoniam spiritus earum unà cum sero excreto fugam capeffunt; dehinc in gravidis, quippe quæ placentam uterinam usque eo refigunt, ut abortus, nec anticipatu nec relevatu facilis, pone subeat ac inflet.

In sanguine lento, rheumatico dicto, serum adeo nos fallit, ut pars subtripla sit reapse viscida; quandoquidem serum aliquantisper igni commissum statim lentescit; hinc fit, ut, in tali sanguinis statu, cum Diaphoretica partes massæ serosiores exhauriant, viscidæ, quæ supersunt, demum solidæ fiant; atque ita motus in orbem tandem conquiescit: quocirca in ejusmodi, Diaphoretica parum conducunt; quæ tamen, quum, diuturnitate, sat abunde diluuntur & putrescunt humores ac eo usque attenuantur, quoad cohærere desinant, ab eis deinceps quam facillimè extruduntur.

In paralyfibus ubi salia fixa, scorbutica, sanguini præfunt, Diaphoretica ideo nequaquam conveniunt, quoniam uti in tali statu salia nervos & fibrillas corrugant crispantque, ita, Diaphoreticis exhibitis, salium istiusmodi

modi copia vel exinde augetur, vel salia, sero quantenus extruso, sibi invicem propius adessent; ac hunc in modum motui circulari, perinde in vasis sanguineis atque in nervis ipsis, impedimentum adjiceretur.

Quamquam serum à Diaphoreticorum usu quam expeditissimè extrudi concederemus; observatu tamen dignum est, quòd cum humores maximè redundant; satius tum esse portionem eorundem per secessus ante deturbare, quam per poros eliminare: quâ de causâ palam est, quod regio *Anglicana*, *Italorum* climate longe inferior quantum ad calorem, existat; quoniam pori in *Italiâ* perspirationi longè tutius quam in *Angliâ* cedere comperiuntur.

Quandoquidem delinquentium & emaciatorum par utrobique sit ratio; quemadmodum igitur emaciatis evacuationo non omnino conducit; ita nec delinquentibus: quocirca Diaphoretica evitentur in hujusmodi viris.

Biliofi hecticive ejusmodi medicinam haud impune ferunt, quoniam exinde contingit, ut æque motus intendatur, ac salium quantitas, quâ calor augefcit, accumuletur; quocirca phthifici porro Diaphoretica evitent, ex eo quod acrimoniam, calorem, colliquationes, ac cæterorum symptomatum, phthisi solennium, catervam adaugeant.

Hæmorrhagiæ exhinc magis profluunt, quia, per sanguinis rarefactionem, vasa abunde fatiscunt; at non idcirco inferre licet, fluxum hepaticum inde continuo augefcere, nam etiamsi fluxum aliquantisper urgeant, causam tamen, obstructionem nimirum, defodiendo, vasa facillimè denuò ferruminantur; uti supra advertimus mercurialibus solenne esse, quæ paulisper licet liquaminis corrupti effluxum perennent, ideo tamen cura facilius perficietur, quia partes detument, obstructions referantur, & circulatio modo debito circumagi posthac comperitur.

Quemadmodum Diaphoretica in hæmorrhagiis vituperavimus; ita in ascite *Etmullerus* eadem probris afficit; siquidem enim hydropis ascitæ non citra rami lymphatici, saltem citra venæ capillaris, disruptionem

introducì soleant; hujusmodi apertura dietim exinde augefcit.

Cum viro, affhmate pulmonali laborante, jampridem affidui fuimus, qui longe acerbius remediorum bechicorum paulo calidiorum, usu ac gravius eò, affligebatur; ipso defuncto, ac thorace infpecto, polypo in corde ægrotabat; quocirca ejusmodi remedia, quæ motum sanguinis invigorant, idcirco fuffinere nequeunt, quòd cum ventriculus dexter in arteriam ac venam pulmonariam fluida in copiâ majori pergere finat, quam ventriculus finifter ea trajicere queat; hinc fit, ut in eis tandem fuffiftat fanguis; hincque affhmata, hæmoptoës ac alia horrenda fubfequantur fymptomata.

Apoplectici, quemadmodum *Mufgravius* cum *Et-mullero* obfervaverit, Diaphoretica volatilia non impunè ferunt, utpote qui vaforum rupturarum, atque effufionum fanguinis, vel in ventriculos vel fubftantiâ cerebri callofam, immedicabilium pericula fubeant; hinc fit, ut praxis ejusmodi prorfus evitanda fit.

Sudores facili negotio in hypocaustis ac laconicis excitari comperimus; quinimo neque certius quam in eis provocantur unquam; cujus rei, fi placeat, reddemus caufam; quandoquidem omnis evacuatio irritationem præmitti arguit; quo magis igitur obtunduntur particulæ irritativæ eo minus sudores effluunt; quo propius eæ tamen emunctoriis accedunt, eo certius fcopum attingunt deftinatum; quâ de caufâ evenit, ut cum particulæ igneæ fimul glandulas miliares perinde vellicent ac fimul fanguinem exagitent; fieri non poteft quin ferum exindè expedite exudet; cum fudorifera tamen introfumpta ufque eò propofito aberrant, ut fubinde voto cedere, interdum vero deeffe comperiantur. Ille vero temeritatis jure merito redarguuntur, qui quâvis de caufâ, vel ineptâ, sudores in laconicis provocare audent.

Quotiefcunque vel mercurialia vel antimoniata exhibentur ut Diaphoresin accerfant, toties fub id tempus cavendum eft à faccharatis, cremore tartari, vino vel acido quovis; utpote quæ, cum medicamentis iftiusmodi effervescentiam concitando, vires fuas in ventriculi parietes ante exercerent, quam ad glandulas mi-

liare

Mares appellerent; atque hoc modo non sudores, cæterum vomitionem, saltem cardialgias, provocarent.

Nemini ignotum est, quam seriò Sydenhamius laciniam laneam, quâ sudores provocentur in peste, nobis commendatam habet; esto, hâc de re jam non philosophabimur; longe vero nobis probabilius est sudores in lecto per spiritûs vini fumum provocatos iri; cum glandularum ora immediatè salutet.

Quandoquidem temperamentorum respectus sudorifera varia nobis ostendat; hinc fit, ut in morbis chronicis, in quibus sal acidum præesse supponitur, testacea ac volatilia exhibenda sint; cum in temperamentis biliosis sal volatile dominari dicatur; quocirca in eis sudorifera, quæ irritant, non vero calorem adaugeant, capiuntur.

Quoad exhibendi *tempus*, nonnulli matutinum eligunt, alii vero pomeridianum; *Etmullerus* ter in viginti quatuor horis illa exhiberi vult; in febre malignâ, pro indicationis exigentiâ danda & repetenda sunt. Quoad *formulas*, in temperamentis biliosis, siccisque exhibeantur in formâ humidâ, quoniam serum supplendo sudores augent; in humidis autem, sicciora introsumentur, ex eò, quòd humoribus attenuatis, serum copiose effluet.

Nonnulli somno inter sudandum indulgere prohibent; non videmus tamen, quâ de causâ tam somno quam quieti cedere nequeant, nisi inter somnum stragula amovendi periculum sit; cessantibus autem sudoribus, æque lodices atque indusium exuantur, ne dolores inde rheumatici suboriantur, quemadmodum experti sumus, neu febris recrudescat.

Exhibeantur jejuno ventriculo; sudantes stragulis non obruantur; intereà copiosè bibant vel juscula vel liquida; eis Emetica, Cathartica, Enemata, venæ sectiones & ejusmodi præmittantur; raro in febribus exhibentur, nisi signa coctionis præcesserint; ni pestilenciales, & pestes excipiamus.

*Corollarium.**Bolus Alexiterius.*

℞ Pulv. è Chel. Cancror. è Rad. Serpentar. Virgin. ā gr. xij. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Bolus, quaque hora sexta repetendus, super-bibendo Julap. Vulgar. Cochl. iv.

OBSERVATIONES.

Bolus hic vel spirituum inopiam ac absumptionem, uti in febre maligna solenniter evenire solet, quadantenus compensat, vel eos sartos tectos conservat; hinc quoties pulsus parvus, debilis, myurus, intermittens, deficiens, vermicularis, formicans, tremulus vel obscurus est, calor modicus est, ac extrema frigescent; toties bolus hujusmodi tutò exhiberi potest; quandoquidem præ foetore concludere licet, radicem, utpote qui è salibus constat volatilibus, massam sanguinis exagitare, attenuare, atque adeo rarefacere, ut spiritus facilius ac expeditius deinceps in cerebri corticem secernantur, quinimo ut tota sanguinis moles à residentiâ ubique vindicetur: quibus fit, ut, motu tam in orbem quam in latera magnoperè aucto, secretiones ritè perficiantur, & febris tandem evanescat. Causarum exploratio medicum sagacem probat; ast causæ tam externæ quam internæ latebunt, nisi scrutinium serium adhibeant medici; quî fiet, ut illi causas morborum abditas & occultas inspiciant, qui præcognitorum imperiti sunt? inexperti vero ii habendi sunt, qui *structuram* corporis humani, qui *Chymiam*, qui *φασμαχομαθίαν*, qui *motus* leges, qui demum *praxeos* exercitium prorsus nesciunt: neque idcirco ii unicè fidendi, qui medicinam, andabatarum, eheu! more, officiose facitiant, nec ii qui in theoriâ solâ ac limine praxeos hæsitant; nec demum ii, qui chartis solis impalluerunt.

Arthritidi anomalæ mirum in modum idcirco remedia id genus conducere reperiuntur, quod humores noxios ad extrema ab internis (stimulis externis ritè adhibitis) pellant; acida quævis uspiam mutant, pituitam

tum glutinosam incidunt & attenuant; hinc fit, ut particulas in sanguine, spiritibus vel ductibus secretoriis divertentes eliminant. Hincque est, ut in catarrhis serosis, morbillis, variolis, ac febribus malignis, peste, gangræna, anasarca, paralyfi, convulsionibus in temperamentis frigidis, scorbuto frigido, ac hystericâ passione conveniant. Quod si ventriculus saburrâ viscidâ vel acidâ repleatur; modo etiam atrophîâ vexentur; modo gravidæ sint mulieres; modo in quovis morbo desit serum; modo corpus bile vel acrimonia redundet; modo polypo laborent; modo denique plethorici sint ægroti; Diaphoretica ejusmodi non idcirco ferunt, quòd acrimoniam evehant, massam exagitent, vasa immane quantum tendant, quinimo quatiant, ac sanguinem sero magis in dies spoliant; hinc fit, ut deinceps omnia in pejus ruant.

Jamdudum advertimus, quòd oportet Diaphoretica electiva esse; quippe quæ sanguinis temperiei accommodari debent: hinc hac de re incepto desistamus.

Quandoquidem omnibus notum est sudores symptomaticos (quantumvis olim criticos) nequaquam finendos, nedum provocandos esse; eâ de causâ linteamenta cuncta sudoribus perfusa exuenda sunt, ut supra observavimus; utpote quæ si madore macerentur, poros obturare solent; secus verò, si arida ac nitida induantur, perspirationem augent insensibilem.

Bolus Resumptivus.

Rx Pulv. è Chel. Canc. c. ʒj. Sperm. Cet. gr. xv. Castor. Sal. Succin. Croc. ā gr. iv. Conf. Alkerm. q. s. m. f. Bolus,umat sextâ quaque horâ.

OBSERVATIONES.

Quamquam formulam hanc egregius vir ipsemet haud præscripserit, siquidem tamen præscriptam subfignaverit, suam fassus est.

Ubi sanguinis massa aciditate inquinatur, ibi pulvis è chelis vel etiam reliqua testacea non solum medicorum hodiernorum suffragiis comprobantur, verum etiam nullos jam reperietis, quin ejusmodi exhibere, optime factum fateantur; Sperma ceti acrimoniam qualem-
cunque

cunque obtundere agnoscunt; reliqua in præscripto spirituum motum & quantitatem potissimum adaugere comperiuntur. Quamobrem attentè trutinemus, quibus hæc formula quadret morbis. Imprimis quandoquidem hypochondriacorum sanguis acido redundare ideo suspectus sit, quoniam ejusmodi sæpenumero subsistit, spiritus parcius aliquanto generantur, asthmata convulsiva frequentius occurrunt; præscriptum tale his multum confert.

Bolus hic mulieribus, quarum lochia substiterunt, cum emolumento exhiberi potest; utpote qui, vasa juxta, laxando, ac sanguinis motum intendendo, fluxus nisi visceribus insidiosè insederit, revertetur: discrimina in quæ ejusmodi præcipitantur ob fluxus istius impedimentum, indubitata ac plerunque lethalia sunt; quandoquidem febris, *pestis sororum* dicta, ut plurimum ponè subit: quot autem hinc *et* *ad* ac in tumultum raptim adurgeantur, in praxi paululum modo exercitati, pluribus, si tamen hoc ipsis arrideat, per me persequantur.

Uti notatu dignum est exanthemata, præ spirituum inopiâ, in variolis sæpenumero ex voto non erumpere, ita ex regimine malo frequenter in maximum ægrotantium damnum retrocedere solent; in casu id genus mistura hæc, vel alia ei confimilis, motum in orbem, paulo interioriorem, denuo redintegrat; adeo ut exinde illa repullulare viderimus; quâ de causâ symptomata anomala quam expeditissimè evanuerunt: hoc autem cum *Sydenhamio* adverti volumus, hanc anomaliam, nimirum, à nutricularum officiosarum petulantia sæpius manare, utpote quæ regimen hunc in modum laborantium, ufcuptione quadam sibimet nunc dierum adeo arrogaverint; ut medicos aliter sentientes hallucinari audacter affirmabunt; medicorum tamen est ægrotos advertere, quam valdè mendæ hujusmodi vetustate augecant.

Quandoquidem in morbis soporosis cerebrum particulis lentis oppletur, spiritus neutiquam in quantitate sat copiosâ generari queunt; & hinc fit ut segniter in fibris medullaribus progrediantur: mistura hujusmodi motum eorum torpidum denuò invigorat, lentorem attenuat, & tandem morborum istorum accessiones vel

incurfus

incurfus efficaciter summovet; ii tamen, qui ab intemperie sanguinis insigniter vitiata originem capiunt, aut non multum aut omnino nihil exinde adjuvantur; quoniam hoc in casu massa sanguinea prius evacuanda est, stimuli admovendi sunt; attenuantia fortiora exhibenda sunt, eo ut ventriculus sarcinâ suâ liberetur, vasa sanguifera & cerebrum depleantur, quam Diaphoretica exhibeantur: quibus ita peractis, residuum facilius deinceps in materiam tenuiorem immutari poterit; & symptomata sensim, ex profectionis in melius modulo, in dies mitescent; atque hunc in modum, nisi vasa vel solida, magnâ ex parte, vitientur, velii ab ætate paulo profectione pendeant, confestim reconvalescent.

Fœminæ, quæ præ vitâ otiosâ ac sedentariâ succos glutinosos acidovè congefferunt, morbo hysterico indolis frigidioris plerunque laborant; cujus symptoma haud infrequens, quemadmodum observat *Baglivius*, hoc est, capitis nimirum vertex ipsis perinde algere videtur, ac si aquâ frigidâ perfunderetur; delinquant, etiam, sudoribus glutinosis vexantur, & valde prosternuntur earum vires: mistura hæc ejusmodi ægrotantibus adeo convenit, ut spirituum defectibus confestim suppetias afferat.

Quotiescunque febres malignæ nobis incubuerunt, spiritus vel figuntur vel exhalantur; hinc fit, ut sanguinis circuitus segnius perficiatur: tum pulveres cardiaci hujusmodi frequenter in die repetiti spiritus restaurant; quamobrem symptomata exinde orta confestim evanescent: quandoquidem particulæ noxiæ, cum massâ sanguineâ intimius aliquanto admistæ, secerni incipiunt; ac haud ita multò post ægrotantes sensim convalescunt.

Isti asthmatis speciei, morborum mali moris, five febrium five variolarum, cæterorumve comiti, mistura hujusmodi idcirco subveniet, quod tam membranam pulmonum ac bronchias lubricando, quam irritando, adhæSIONem materiæ lentæ qualemcunque simul refigit, simulque exantlat, quinetiam spiritus valde labefactatos recreat.

Cum morbi convulsivi ut plurimum ab acido austero, ex *Sylvii* sententiâ, oriantur; si quando adsint, ac ita se habere pateat; bolus hic maximoperè ejusmodi auxilio sublevabit: quantum vero ad causæ amotionem integram, chalybeata sola, saltem anti-acida paulo fortiora magis efficaciter subsidio erunt.

Causam colicæ hystericæ implicatam haud facile est enucleare; aliæ aliis longe diuturniores sunt: ex eo quod vel causa magis partibus insideat, vel organa morbi diuturnitate valde distorqueantur: acidis enim particulis in canalis intestinalis superficie internâ defixis, fermentatio inter particulas speciei diversæ statim oritur; unde glandulæ irritantur, quinimo subinde eroduntur, ac symptomata horrenda non possunt non hinc exordium capere; quo in casu tamen medela longe erit consummatu faciliior, quoniam causa quamvis aliquantulum figatur, non tamen impossibile est eam amovere; nam si lenientia, quæ saburram leniter exhaurient, præmittantur, qualia nimirum sunt infusa ex sennâ, rheo, cum sale tartari in aqua, cum syrupo è rosis edulcorata; si istiusmodi infra debita intervalla repetantur; si bolus hic vel illi analogus exhibeatur; si tandem opiata pro doloris vehementiâ introsumentur ac repetantur pro re natâ, pristinam valetudinem recolligent laborantes. Quod si ex sententiâ *Willisi*, causa nervis medullitûs insideat, cura saltem absolutu difficilis, si minus impossibilis erit; quia paralyses nunquam non colicas id genus insequuntur; nisi primos istarum conatus irritos faciamus. Ubi spiritus levi quavis de causa in ἀταξίας ac tumultus, ex victu, nimirum, animi pathematis, cæterisve nonnaturalibus seu nonnecessariis, cursim urgentur, colica nuncupatur convulsiva, quæ evacuationibus causæ accommodatis, remediis alcalinis, martiatis, diluentibus ac opiatis prorsus fere cedit; verum, si nervorum crispationes ac decurtationes, iterato repetita, perinde stagnationes in furculis vasorum capillaribus ac membranarum ibidem inflationes produserint, vel, si propter obstructiones, inepti ad irradiandum fiant nervi, nil, præter *Εὐθανασίας* procurandam, medicis reliquum est; quoniam nec opianti mors ad caput adstat.

Pulvis

Pulvis Alexiterius.

℞ Pulv. è Chel. Comp. Lapid. de Goâ. ana ʒij. divid.
in viij. Chartulas, quarum unam capiat horâ quâque
tertiâ in Cochl. *Julapii* (*Chorici dicti*) & superbibat
Cochl. tria vel quatuor ejusdem.

OBSERVATIONES.

Pulvis hic, cum Julapio cardiaco (ex Aq. Ceras. n. Theriacal. Pæon. & Margarit.) una cum guttis aliquot spiritûs volatilîs oleosi, præscripta apud eximium virum in febribus trita fuerunt.

Simul ut febris putridæ fervor propemodum decreverit, status adest: ubi res in eodem nempe statu per dies aliquot manent, nec tamen in melius provehuntur nec in pejus prolabuntur. In hoc casu, medici officium est attente advertere, quò natura hostem abigere molietur; ubi spiritûs enim in certamine languescunt, atque exhalant, aliquid periculi est, ne particulæ noxiæ, putridæ dictæ, non satis citra remediorum opem egerantur: in hac re, pulvere hoc alexiterio, vel alio huic simili, spiritus erigendo ac motum sanguinis progressivum augendo, febris ad optatum pervehetur exitum; quod si spiritus his non abunde satis restaurentur, ad epispastica & emplastra solearia confugiendum est, ac istis unis, tanquam asyis, fides habenda est.

Eximius Dr. *Slare* in tractatulo de lapide bezoar pulveres hujusmodi parum conferre audacter affirmat, at, salvo meliore judicio, non videmus, quare vis testaceorum absorbens non subinde profit: utcunque res se habet, *Margaritas*, corallia, ac reliqua testacea, multum, dum acida eis affunduntur, effervesce cuiuslibet constat, uti *N. Grew*, viri cum honore nominandi, prælectiones de misturis legentibus patebit; Quamobrem inferre licet remedia ista non prorsus inutilia esse; quoniam cum aciditates absorbent, effectibus diris inde ortis vel mœduntur; vel anteverunt: ii sunt, *coagulationes*, in cerebro defixæ, unde deliria, comata, subsultus ac reliqua symptomata nervosa enascuntur; *pulmonibus*, unde respirationes anhelæ, ac peripneumonix malignæ pullulant; *ventriculo*, unde vomitiones,

nes, & aliquoties gangrænæ, (modo pestis vel febris pestilentialis adsint) dimanant; *hepate*, undè icteri lethales proveniunt: quinimo *visceribus quibuscvis* insidentes, unde symptomata cuivis organo fatalia quam sæpissime superveniunt.

Cardialgiæ ab humore acido, qui subinde ventriculū ipsummet erodit, initium facienti, pulveres tales opem ferent, quippe qui acidi vel concentrati, spicula infringent. Quandoquidem vero morsus hujusmodi molestus non jugiter ab hac oriatur causâ; enimvero aliquoties à salibus alcalino-corrosivis nascitur; veluti nobis à vomitione ac dejectione humorum fursum ac deorsum flavi vel fulvi coloris, à ructibus nidorosis, (qui ovorum putridorum, vel & *Raphani* comesti eructati odorem repræsentant) à causis prægressis bilem generantibus, spiritu nimirum vini, &c. palam fiet; hoc in casu, aquea, mucosa, ac acida, ea sunt aqua hordei, emulsiones, sal prunellæ, spiritus acidi & similia, eo exhibenda sunt, ut acrimonia obvolvatur; quippe hæc remedia porro *causis* ipsismet conducunt; &, modo cardinalgiæ adsint unâ cum febre *causo*, eis medicamentis ipsis, etiam uno eodemque momento febris & cardinalgia adjuvantur.

Pulveres testaceos in diarrhœis olim *Riolanus* deprædicavit, quos rursus eximius Dr. *Harris* hoc tempore consuefecit, nec injuriâ quidem; quandoquidem enim humores aqueos, acidosque absorbent vel immutant; simul quantitatem feri minuendo, simulque qualitatem acidi mutando, causas fluxuum adeo auferunt, ut opiata sola (præmissis evacuationibus tamen) rem deinceps facilius absolvant.

Julapium volatile.

℞ Aq. Lact. Alexit. Ceras. n. ana ℥ss. Aq. Absinth. Mag. C. Mirab. ana ʒjss. m. f. Julap. Cap. gr. x. xv. Sal. Vol. Oleos. alb. in eo, in languoribus.

OBSERVATIONES.

Salia volatilia usque eo sanguinis massam attenuant, ut, cum ea quaquaversum exinde se expandant, vasa aperiant, quinimo aliquoties disrumpant, uti viro mihi amicissimo

amicissimo falis volatilis oleosi semiunciam intra 12 horas devoranti jam pridem evenit; hæmorrhagiâ enim profusa exhinc laborabat quæ neutiquam prorsus, quin acidis unice, cedebat: hinc suspicari par est, quod si menses unquam subsistant, salia istiusmodi, humores lentos ac glutinosos attenuando glandularum orificia à muco eis adnascente usque adeo expedire, ut non solum ductus earum inde referentur, verum etiam fluxus usitatus more solito haud ita multo post pedem referat.

Salia volatilia oleosa primus in usum introduxit *Sylvius*, quæ apud ipsum panpharmaca meherculè audiunt; salia volatilia tamen aromaticorum mixturâ satis equidem grate variantur; inter salium volatiliū oleoform, ac salium volatiliū ipsorum inventionem non multi interfluxerunt anni; salia autem volatilia, Anno Domini 1656, primum invaluerunt.

Quandoquidem morborum soporosorum causa sit sanguinis lentor, quo vasis minutulis hærescente aliquoties massa ibidem subsistit, cum salia vero volatilia lentorem id genus (pituitosum, nimirum; quia non omnimodam tollunt visciditatem) attenuent, motum idcirco progressivum; valdè diminutum, iterum invigorent; epispastica verò, una cum evacuationibus aptis prius adhibeantur, quam istiusmodi alterantia remedia introsumentur, ex eo quod humorum quantitatis ratio, qualitatis rationi merito anteire soleat. Quod si tamen ex consensu hominibus incumbant, causæ primariæ *sedes* ac *species* sedulo trutinentur.

Memoriâ deperdita laborantium status ut plurimum hic est; sanguis eorum perinde lentus est ac segniter in orbem pellitur; quinimo fibræ cerebri membranosæ vel aliæ adeò laxantur, ut repræsentationum species confestim obliterentur ac intercendant; statim ut per evacuationes humorum quantitas demitur, fluorem aqueum volatilia unâ cum aromaticis juncta, perinde quam styptica fibrarum atoniam, tollunt; quocirca salia volatilia priorem locum, styptica vero posteriorem tenent; hinc fit, ut subinde tinctura lunæ cum aquâ liliorum convallium à quibusdam tanquam remedia specifica prædicentur.

Salia volatilia sunt pe:inde diuretica atque diaphoretica, quandoquidem enim urinam provocare ac sudores elicere nil aliud sint, quam irritationis, gradu solummodo discrepantis, species; idem remedium sudores exprimet, atque urinam proliciet, modo dosis adaugeatur.

Quotiescunque sanguinis vel feri particulæ sulphureæ ab acido in eis nidulante in grumos vel offas albas abeunt; toties in fluorem debitum à salibus volatilibus introsumptis remeare solent; ac hunc in modum succi denuo in orbem gyran- tur; Quantum ad grumos seu internos seu externos ij vel omnifariam imo vel uspiam oriundi, remediis hujusmodi quam efficacissime auferuntur; hujus ergo, casum, si placet sequentem commemorabimus; Fœmina quædam gravida à scalarum culmine ad imum usque præceps ruebat, hinc infanti recens enixi auris usque eo in utero matris intumuerat, ut vel ipsius caput æquaret; quam obstetrix simul impavidè atque officiose rescindere extemplo consuluit: Cui tamen consilio chirurgus peritus admodum, ut decuit, illul- sit; ac mulierem sordidulam idcirco usque eo despicatui habuit, quò non ita multo post exauctorabatur: Nobis autem accersitis, misturam, ex spiritu vini rectificato, sale volatili salis armoniaci una cum sacchari saturni pauxillo conflata, ægrotulo externè adhibendam imperavimus; cujus admotione unicâ, paulo solertiùs factâ sanguinis grumi, ibidem infixi illico lique- scebant, pars sensim (imo sat celeriter) detumuit ac tandem auris forma adeo rediit; ut puerulus jam novem annos natus, quantum nos audimus, inconcussâ fruitur valetudine, quod nisi meatus auditorius forsan cõaluerit, ac auris externa sit etiamnum quadantenus informis.

CAP. VI.

DIURETICA.

Calida.



Aq. è Nucleis Persicor. ℥iij. Sal. Tartar. ℥j. m. f. Haustus.

℞ Pulv. Milleped. ℥β. Aq. Vitæ. ℥j. Aq. Petroselin. ℥j. Sacchar. q. s. m. f. Haustus.

℞ Tinctur. Cantharid. gr̃. x. xv. Capiant in Vini albi ℥iv.

℞ Vitriol. alb. Tereb. Venet. ana ℥j. m. f. Pil. n^o. xxiv. Capiant vj.

℞ Spir. Sal. armon. super Cort. aurant. Cohobat. ℥j. Capiant in Vin. alb.

℞ Elixir Nephritic. (fit hunc in modum, ℞ Sal Tartar. ℥β. Cort. Aurant. ℥j. Aq. Petroselin. ℥β. m. digerantur per tres dies; filtretur liquor; dein add. Ol. Mac. Cort. Aurant. ana gr̃. viij. digerantur iterum) Cochl. β. detur. in Vino albo.

℞ Milleped. viv. Cont. n^o. xxx. N. M. ras. ℥j. affund. Spir. Tereb. opt. Tinct. Sal. Tartar. ana ℥vj. destillentur; Capiant gr̃. x. in Vino.

℞ Milliped. Siccāt. Pulv. ℥ij. Coccinell. Pulv. N. M. ras. ana ℥j. Spir. Junip. Sal. Volat. Oleos. ana ℥j m. digerantur per noctem, f. Tinctura, filtra. Cap̃. gr̃. 40. in Vino albo Gallico,

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Aqua Apij ℥iij. Aqua Petroselini ℥iij. Aqua Raphani comp. ℥ij. Aqua Sambuci ℥iij. Floris Salis Armoniaci gr. v. x. Liquamen Tartari ℥β. Ol. Dauci Chymicum gr̃. iij. vj. Pulvis Ari comp. ℥j ℥β. ℥ij. Sal fixum Absinthii, &c. ℥j. ℥β. Sal Absinthii volatilis &c. gr. iij. vj. Spiritus Nucistæ ℥β. ℥j. Syrupus Raphani comp. ℥j. iβ. ij. Tinctura O-

nonidis ℥℥. j. Tinctura Sal. Tartar. ℥j. vj. Vinum Scil-
liticum ℥℥. j. ij.

Ex *Pharmacopœiâ Bateanâ*. Aqua omnium Florum
℥iv. Balsamum Lucatelli ℥j. Balsamum Succini gtt. v.
xv. Decoctum diureticum Augenii ℥vj. Electuarium
Juniperinum ℥j. Flores Salis Armoniaci gtt. v. 15.
Mars Diaphoreticus ℥℥. j. Sal Diureticum ℥℥. Sal Tar-
tari ℥℥. j. Sal Tartari Volatilis gr. 10. 20. 30. Spiritus
Ceraforum ℥ij. ℥j. Spiritus Juniperi ℥ij. ℥j. Spiritus Mil-
lepedum gtt. 5. 20. 30. Spiritus Salis Armoniaci gtt.
vj. xij. Spiritus Salis Armoniaci (fuccinatus, tartari-
fatus, chalybeatus) gtt. 5. 15. 30. Syrupus Lumbrico-
rum ℥. Tinctura Armoniaci gtt. vj. xij. Tinctura Ju-
niperi ℥j. Tinctura Serpilli gtt. 5. 15. Vinum Ecphra-
cticum ℥iij.

Ex *Pharmacopœiâ Fulleri*. Aqua Juniperi compos.
℥j. Aqua Millepedum ℥iv. Aqua Scelotyrbica ℥j. ij. Ce-
revisia aperiens ℥℥j. Cerevisia de Baccis ℥℥j. Cerevisia
de Dauco ℥j. Cerevisia Diuretica ℥j. Cerevisia Juni-
perina ℥℥j. Cerevisia Scorbutica calida ℥℥j. Decoctum
Allij ℥vj. Decoctum febrifugum Salsum ℥ij. Decoctum
Juniperi ℥vi. Decoctum Juniperi compos. ℥iv. Deco-
ctum urticæ alcalisatum ℥iv. Electuarium Nephriticum
℥℥. Electuarium de Sinapi ℥ij. Electuarium Terebinthi-
natum ℥ij. iij. Expressio Millepedum simplex ℥iij. Hau-
stus ad arenulas ℥ij℥. Hydromel Diureticum ℥℥℥. In-
fusum urticæ ℥iv. Julapium Diureticum Aromaticum
℥iv. vj. Mistura balsamica Nephritica Cochl. j. Mistura
Diuretica ℥i j. Mistura Juniperina Cochl. j. Mistura Suc-
cinata ℥iv. Mistura Terebinthinata ℥j℥. Mistura Vola-
tilis ℥℥. Pilulæ de Allio ℥j. Pilulæ de Apibus ℥j. Pilu-
læ Diureticæ 2. n^o. iij. Pilulæ Nephriticæ ℥℥. Pilulæ
Salinæ ij. Pulvis Diuretic. 2. ℥ij. Pulvis Millepedum
comp. ℥j. Pulvis Sinapeos comp. ℥℥. Tinctura Can-
tharidum gtt. iv. xx. Vinum Diureticum ℥iv. vj.

Media.

℞ Ol. Vitriol. gtt. v. vj. viij. Vin. Mosellan. ℥vj. viij.
m. f. Haustus.

℞ Spir.

- ℞ Spir. Nitri dulc. gr. x. xv. Vin. Rhenan. ℥vj. viij. m.
 ℞ Sal. Prunell. ℥iij. Sal. Succin. ℥j. m. f. Pulvis Dosis 3℔.
 ℞ Marg. præp. Corall. r. ā ℥j. infundantur in Succo Limonum per horas 24. rad. Petroselin. m. j. Syfibr. aquat. m. iij. Aq. Petroselin. Vin. alb. ana ℥xij. coq. ad tertias; pro tribus Dosisibus.
 ℞ Aq. Petroselin. iij. Syr. Limon. ℥j. Sp. Sal. optim. 3℔. m. f. Haustus.
 ℞ Syr. Limon. ℥ij. Sp. Terebinthin. 3℔. ℥ij m. f. mistura.

Huic Classi referuntur sequentia.

Ex *Pharmacopœiâ Londinensi* Acetum Sambucinum 3℔. ij. Acetum Scilliticum 3℔. j. j℔. Acetum Theriacale (& *Norimbergense*) 3℔. ij. Aq. Asparagi ℥iij. Aqua Ononidis ℥iij. Diaspolicum 2℔. ℥j. Lapis Prunellæ 3℔. ℥j. Lumbrici terrestres præp. 3℔. j. Mellepedes præp. 3℔. ℥j. Oleum Salis gr. iij. x. Oleum Sulphuris gr. iij. xv. Oleum Vitrioli gr. j. vj. Oxymel (simplex, composit. elleboratum Julianizans, Scilliticum, Scilliticum compos.) 3℔. j. ij Rob. Sambuci 3℔. Syrup. è 5 Rad. ℥j. ij. Syrup. Sambucin. & comp. ℥j. ij. Tartar. lotus 3℔. Tartar. Vitriolat. gr. vj. viij. 3℔. ij.

Ex *Pharmacopœiâ Bateanâ*, Alkekengi conditum 3℔. Aqua Cucumerum comp. ℥ij. Aqua Cynosbati comp. ℥iv. Aqua Stimmios Sulphurata (ad acorem.) Conserva hepatica corallitana 2℔. ℥ij. Cremor Hordei ℥vj. &c. Crocus veneris 3℔. Julapium Fragorum ℥ij iij. iv. Mars fulminans 2℔. Nitrum hermaphroditicum gr. xx. xxx. Sal Martis Catharticus gr. xij Sal Polychrestum 3℔. (etiam per sedes movet) Silices præparati gr. x. xx. xxx. Spiritus Aluminis dulcis gr. iv. x. Sp. nitri 3℔. ij. Spiritus nitri dulcis 2℔. ℥j. Spiritus Salis coagulatus gr. v. xv. Spiritus Salis martialis gr. vj. xv. Tinctura Corallij. gr. xxx. xl.

Ex *Pharmacopœiâ Fullerii*, Decoctum Aperiens 3℔. v. Decoctum Coccineum ℥iv. Decoctum Diureticum 3℔. v. ℥vj. Decoctum Liberans ℥ij. Decoctum Lusitanicum q. v. Decoctum Malvæ ℥vj. Decoctum Nephriticum 3℔. iv.

℥iv. Electuarium Acidum ʒβ. j. Emulsio Diuretica ℥vj.
 Expressio Beccabungæ ℥β. Haustus Diureticus acidus
 ℥iij. Haustus Diureticus Oleosus ℥vβ. Haustus Nitro-
 sus ℥iv. vj. Julapium Diureticum acidum ℥iv. vj. Julapi-
 um Diureticum nitrosum iv. vj. Julapium de Sedo ℥iij.
 iv. Mistura ad arenulas ʒiβ. ij. Mistura ex oculis can-
 crorum ℥iij. Pilulæ Diureticiæ. 1. ʒβ. ʒj. Pilulæ testa-
 cææ. ʒj. ʒβ. Pulvis Diureticus. 1. ʒβ. ʒij. Pulvis Fili-
 pendulæ ʒj. ʒβ. Pulvis Nephriticus ʒj. ʒj. Pulvis Ni-
 trosus ʒβ. ʒj. Pulvis Salinus major & minor ʒj. ʒj. Pul-
 vis Tartari 1. & 2. ʒβ. ʒij. Pulvis Tilingii ʒβ. ʒj. Se-
 rum Tamarindinatum ℥iv. Syr. Diureticus ʒj. ij.

SCHOLIA.

In evacuantium tribu, Diuretica minimè omnium
 quidem irritant; utpote quæ varios prius anfractus pe-
 netrare debent, quam ad glandulas renales appellant;
 quæ demum tam leniter officio funguntur suo, ut le-
 viter ab attenuantibus, gradu nimirum pusillo, dissidere
 videantur.

Quocirca Diuretica infantulis, hysteris, imo lan-
 guidis cunctis ideo (evacuationum potentiorum, ac mo-
 chlicarum ferè, vices gerentia) prosunt; quoniam san-
 guinis massam, cum fibras modicè solum irritent, pa-
 rum aut nihil exagitant. Obstructiones referant, quip-
 pe cum è particulis volatilibus seu irritantibus potissimum
 consistant, seu coagulum ac offam fundunt, seu vasa usque
 adeò succutiunt, quo humorum in ramulis minutulis de-
 fixorum, ibidem subsistentium, vincula solvantur; hinc fit,
 ut icteris, à materiâ glutinosa ortis, opem ferant; quo-
 niam mucum eliquant, etiam quæ emunctoriis secreto-
 riis, quæ ductui choledochi irritationem requisitam im-
 pertiunt, ac tandem particulas ipsasmet, meatum op-
 plentes, ac causam proximam imitantes, emulgent, at-
 que eas adeò vinculis eripiunt, ut in posterum imper-
 turbate cum reliquo sanguine in gyrum flectantur. Hinc
 est, quod Paralyfibus, à Colicâ oriundis, suppetias fe-
 rant, quandoquidem ad nervorum mæandros ac am-
 bages extimas vi suâ penetrativâ eo usque pertingunt;
 ut tunicis, membranâ quæ durâ, nimirum, quæ te-
 nui constantibus, motum imperiant oscillatorium; ex
 quo

quo fit, ut fluida intus contenta deinceps attenuentur, ac paulò post alacriter circumeant.

Symptomatibus diris, humoribus acidis, pituitosis serosisve prognatis, cruciatis diuretica idcirco succurrunt, quod aciditas exinde quâ absorbeatur, qua immutetur; adhæc quod pituita ab eis attenuetur & lique scat; demum quod serum exhinc rapidius aliquanto circumagatur, ac tandem aliquando, ad glandulas renales appellendo, corpore penitus exigatur; quocirca melancholiâ afflictis istiusmodi remedia subveniunt, utpote quæ ab acido ut plurimum exordium sumat; asciticis etiam aliquatenus opitulantur, quâ nempè, humores serosos per renes amandando, ulteriorem ejus effusionem in abdominis spatia eo usque propedire solent; quò tensio progressum suum adeò sistat, ut in eodem postmodo permaneat statu: Anasarcae demum aliquâ ex parte auxiliantur, quandoquidem attenuatio atque evacuatio, ejusmodi hydropes amovere solent.

Renum ac vesicæ calculos, urinæ secretionem augendo, frequentè extrudunt: Cæterum cautè providendum est, ne inconsulto nunc exhibeantur, siquidem calculum grandiusculum ita non expellunt, ut eum altius infigant, necnon ischurias inferant sæpissime lethales.

Cephalalgias ideo manus porrigunt auxiliares, universalibus, uti aiunt, primo præmissis; quoniam humores aliò pariter derivant, ac extrorsum pellunt; hinc fit, ut *Fullerus à Baglivio* pulveris de gutteta usum in cephalalgia ad drachmam usque aliis frustra adhibitis in thea maximis præconiis efferat.

Præmissis emeticis, Catharticis, ac venæ sectione, modo ostendantur, in colicâ carminantia evadunt diuretica; quatenus, nimirum, saburram primum fundunt glutinosam, deinde eam per renes exturbant, quînimo aliquoties, modo paulo sint validiora, per secessum, ex *Hoffmani* sententiâ, miasma istud morbificum extrudunt.

Non febribus solum lymphaticis, verum quibusvis etiam opem diuretica suppeditant; sed ita si febrium tempora ac indoles seriò perspiciantur; nam quando humores ad renes allegerint, eos foras ablegant; hinc est quod diuretica hic mitiora ut plurimum eâ introsumantur,

mantur, quia commotio ac ataxia, quam minima, nunc temporis concitanda sint.

Quemadmodum diuretica humores per renes pellunt, ita eos ab aliis juxta derivant partibus, ac eorum minuunt affluxum; hinc fit, ut fluidorum copiâ primum avulsâ, postea aliquanto de ipsorum impetu multum etiam ita subtrahatur, ut ista deinceps aliò ruant: Quamobrem vasa tametsi disrupta, longè minorem tamen quantitatem (imo aliquoties nihil) in posterum expuent: hanc ob causam sanguinis fluxum uspiam, urticarum succus reprimere comperitur, quia nimirum, tum irritando humores magis tenues ac serosos per renum glandulas foris amandat, tum eos à parte principio affectâ tam avocat, ut posthac vasculo rupto, exeso, vel alio quovis modo aperto, segnius accedant: Et sicut urticarum succus sit quadantenus acris, humorum exhaustionem & accelerat, & circuitus impedimenta simul excutit; ex quo fit, ut fluxui hepatico maximè conducat; cæterum si styptica præterea unâ introsumentur; eâdem astutiâ humores paritèr exhaurimus, ac attenuamus; ac vas ruptum ferruminamus.

Hydrocephalis idcirco conveniunt, quod serosos humores aliquatenus extrudant; hoc enim in morbo aqua cumulatius aliquanto, in fibris vel cutis vel etiam cerebri ipsius, in angustum concluditur; quod porro in uteri vel tubæ fallopianæ hydrope, dummodo vascula usquam in his partibus pervia sint, verissimum est.

Arthritidis accessione decedente, ubi nempe, urina hypostasim deponit laudabilem, ac dolores leviores aliquanto fiunt; diuretica, quippe quæ leniter ac sensim humores foris derivant; paroxysmo, citra tumultus tamen, seu perturbationem ullam, finem statuunt.

In scorbuto quovis, diuretica idonea, salia pontica vel alia peccantia tantopere per renes amandant, ut symptomata dira ac cruciantia exhinc germinantia ex integro actutum deinceps sarpantur.

Quandoquidem caloris febrilis atque hæcticæ in empyemate causa in hoc consistit, quod matéria purulenta in vasculorum ostiola remeare soleat; idcirco diuretica hic forte fortunâ conducunt, quod pus sanguinis Massæ inhærens extrorsum quasi clanculum eripiant.

Ad humorum plenitudinem aliqualem perinde ac ad varios inde morbos à lunæ phasibus iter sterni asseritur; fac ita esse, diuretica sanguinem onere suo sat molesto ita feliciter expedient, ut symptomatibus hinc initium facientibus certissime vel occurratur, vel ea & auferantur.

Quanquam diuretica empyematibus aliquam-multum conducere supra adverterimus; haud tamen ibi tum convenire, quia diuretica seu irritantia fuerunt remedia, protulimus; omnimoda enim diuretica adeò non ulceribus profunt, ut ea maximoperè aliquoties irritent, atque hinc symptomata subinde funesta introducant: Veruntamen individua eorum nonnulla plurimum idcirco conferunt, quinimo valde requiruntur; quod ea perinde humorum acrimoniam acido-corrosivam obvolvant hebetentque, quam glandulas renales leniter titillent.

Num diuretica, quia irritant, emmenagoga sint, non magnoperè laboramus; hoc tamen resciscatis, necesse est; diuretica una non eventus prosperos modo in medium non afferunt, sed sanguinem etiam lentiolem, spissiolem, ac magis obstruentem exinde conficiunt, quia serum tantoperè exhauriunt ut fluidorum, quæ supersunt, gyro deinceps non sufficiat.

Diuretica ætate paulò provectioribus haud prorsus conveniunt, quoniam perinde spiritus atque humores unà exinaniunt; hinc fit, ut ii, qui *Fulapium diateffaron* (liquorem scilicet istum celebrem nostratibus usu frequenti receptum, ex spiritu vini, nimirum, succo limonum, aqua, & saccharo conflatum) sæpius ingurgitant, idcirco marcescant atque languescant; quòd particulis nutritiis una cum sero foras per renes amandatis, sanguis principiis nutritioni perutilibus omnino spoliatur.

Hæticæ, præ pruritacionis cujusvis vehementioris accessione intempestivâ, confestim idcirco augefcunt, quod sanguinis in orbem rotatio festinantius exinde conficiatur: Ex quo fit ut massa à particulis quas sibi asciverit, si minus acrior fiat, magis tamen hinc acescat; quamobrem fibræ, vel ad inflammationem usque plerunque torrefactæ sunt: Nec ea, temperamenta biliosa (ni indolis sint acidæ vel saltem falso-acidæ) ferre queunt; quoniam

uti

uti horum sanguis particulis aliquanto acrioribus fere scaturit; ita ejusmodi (acrioribus nimirum) administratis acrimonia prius lenis erosiva evaderet; necnon ægrotantes idcirco in hæmorrhagias atque ulcera, ex hoc conjicerentur, quod non sanguinis solum acrimonia multum eveheretur, verum vel vasa etiam aliquoties exederentur.

Ideo crisibus catachresticis ea non competere reperiuntur; quia nihil humorum unquam prius extrudi debet, quam præsidio nobis esse ostendatur: quum sudores autem, unâ cum sanguinis orgasmo stipati, crudâ prorsus urinâ, nec statu febris etiamnum emenso, non ultrâ provehi possunt, ex eo, quod symptomatici nunc habeantur: quocirca nec evacuantia, vel subfellii infirmi, Diuretica nempe, etiam tum laborantibus omnino conferre sciatis.

Quamvis verissimum sit, Diuretica paulo diutius exhibita ferum foras amandando, mensium periodum non solum retardare, sed ex integro etiam cohibere; siquis certè fluxu eorum immodico laboraret unquam, tunc temporis ista intus sumere prorsus idcirco iniquum est, quòd etsi ea proritando voto nostro cedere concedatur; sanguinis effusionem tamen multò magis provocare comperiuntur: eâ de causâ fluxum istiusmodi imminuentem ac proxime infecuturum potius eludunt, quam præsentaneo, quem reverà promovent, conferunt.

Morbis nephriticis paulo diuturnioribus cruciati Diuretica ideo haud impunè ferunt, quia sanguinis temperie, propter evacuationem adeo perennem, omnino posthabitâ; renum tamen fibræ præ plenitudine, quâ pertinaciter laborant, ita dispanuntur, ut vel nimium deinceps flaccescant vel constanter intumescant; ex quo fit ut, secretio in posterum neutiquam ex naturæ normâ perficiatur; quia urina omnino posthac nequaquam profluat, vel ex contrario continuò emanabit, ac proinde in diabeten laborantes præcipites dabunt.

Quotiescunque pelvi, ureteribus, vesicæ, vel urethræ seu meatui urinario inflammatio vel ulcus unquam infederint, toties Diuretica ejusmodi laborantibus administrando graviter hallucinamur; quandoquidem motum oscillatorium illac vehementius aliquanto adur-

gendo.

gendo, inflammatio in abscessum extemplo abiret; quinimo laborantes aliquoties in fistulæ discrimen adduceret; multum autem inter apostema & fistulam interesse sciatis; cum abscessus sit cito medicabilis, fistula vero quam difficillime (imo haud scimus, an unquam) sanari poterit; fistulas quibusdam hæc de causâ olim obtigisse meminimus; saniesque in uno per musculos lumborum, in altero per inguinem tam copiosè extillavit, ut hæctica, tabes, marcor & marasmus vitæ tandem finem dederint.

In causo seu febre ardente ideo non requiruntur, quia irritantia, quoad calor summus duraverit, inepte ac imperite exhibentur; siquidem evacuationis vice, magis irritando, fibræ & ductus excretorii dietim inardescerent ac inflammarentur, nec evacuatio tamen exinde subsequeretur ulla; quocirca in ejusmodi rerum statu, calor sanguinis immodicus venæ sectione, enematis necnon julapiis ac haustibus attemperantibus prius imminuatur, quam Diuretica intus exhibeantur; quandoquidem his posthac ita administratis, si vel febris crisis præ foribus sit, vel ea in remittentem evadat, tunc voto sat feliciter cederent Diuretica; quippe quæ, febris emenso vigore, particulas putridas, modò subsidentia satis aptas, per renes deturbare possunt.

Pthisin querentes ideo non ejusmodi remedia impune devorant, & propter hæcticam, & ulcus, & demum, quia eorundem languor ac spirituum vacillatio eos amplius evacuatoriis angi non patietur.

Jampridem ea haud sanguinis fluxibus nec ulceribus competere advertimus: quamobrem dysentericis apprimè nocent; ex eo, quod sanguis neutiquam hic effundatur; quin ex vase, propter ulcus ibidem genitum, eroso effluat.

Uti calculus renum paulo grandior haud prorsus expelli poscit, sic commotio hæc prorsus nulla Diureticis cienda est, ne propter impetum usurpatum subsequeretur inflammatio: neque vesicæ, urinæ copiâ nimium dispensæ, suppetias ferent; quippe quæ, cum hinc immane quantum musculus ipsius detrusor patefeat, magis exinde viribus cadit contractoriis: quacunque enim

urinam provocare nitimur, frustra, suspiciosè, saltem, præterquam per catheterem perfici potest.

Revulsiones omnigenæ diabeti proptereà profunt, quòd humores illum introducentes alioversum trahant; necnon eos à parte affectâ, eis onustâ, alibi derivent; Diuretica autem vix vel ne vix quidem eà convenire putantur, quia cum omnis evacuatio ἀπὸ τῶν ὑμφορῶν καὶ χρείων (per loca convenientia) sit, ex Hippocratis animo, vehenda; atque alicubi per locum affectum humorem peccantem neutiquam ducendum esse affirmet; Diuretica nequaquam diabeti omnino competere senis auctoritate palam fecimus: quibus verò loca evacuationi apta accuratiùs perpendere animus est, perlegant ii partis secundæ articulum quintum libri nostri superiore anno primum editi, *Euodia* inscripti, *De methodis in crisis usurpandis*, Editionis primæ p. 169. at secundæ p. 177.)

Quandoquidem dysuriæ causa ab humorum acrimoniâ penitus pendere, plerunque, cernitur; Diuretica in eâ administrare ineptum sane foret; utpote quæ acrimoniam ultra eveherent, ac proinde dolorem istum vix ferendum amplius stimulant.

Arthritides ab humore acri exordium sumentes à Diureticorum usu eà magis increbrescunt: quia inflammationem aliquatenus accelerant; siquidem enim sanguinis motui circulari calcaria adjiciunt, necnon acrimoniam ejusdem magis intendunt; humores paulo velocius partem affectam versus feruntur, ac exhinc dolores mirum in modum exacerbescunt: demum temperamentum calidum nunquam non à Diureticorum primæ classis exhibitione in pejus prolabi observatur.

Quotiescunque metus est, ne abortum patiantur foemellæ, toties Diuretica sedulò evitentur, propterea quod quies imperanda, non vero stimulantibus uterus quatiendus est.

Rondeletius, Cappivaccius, Hildanus, Bruele, Wallaus, imo medici ad unum ferè omnes in hoc conveniunt, quod ii, nimirum, evacuationes magis universales continuo prius præmittant, quam Diuretica exhibendi periculum faciant; quandoquidem enim humorum quan-
titati

titati evacuationes unicè accommodantur, necnon uti multitudo per glandulas, quarum ora magis patent, commodius eripitur; satius est, ut prius humorum per portas, eorundem copiam facillime, imo confertim, admit- tentes, exinanitioni operam navemus, quam per loca, quæ istis parcius aliquantò aditum præbent; quamob- rem per ventriculū, intestina, ac glandulas miliares antea elutrientur humores, quam per renes istos detur- bare nitamur.

Vacuo propinentur ventriculo, propterea quod, si unà cum eduliis sumantur, adeo obtunduntur ac refrin- guntur eorum vires, ut alterantia tantummodo dein- cept evadant: quinimo sanguinis intemperiei, primas tenenti, prorsus repugnent, cū omne remedium præ- fidium idcirco censeatur, quod sit morbi causæ adver- sum. Quoties vel dolor vel inflammatio quosdam in- festant, toties eis abstinere satius ideo ducimus; quia cum istiusmodi incommoda ab irritatione alicubi or- tum ducant; irritationem aliam ac majorem super al- teram accumulare, atque obstructionibus exinde iter sternere, ineptum foret; præterea quando penis cannu- la vel muco vel calculo obturatur, ista obstacula prius amoveantur, quam Diuretica introsumentur.

Quantum ad methodum in Diureticorum exhibitio- ne observandam, hæc sciatis; 1º, Evacuantia univer- salia, emetica nempe, cathartica, diaphoretica, ac ve- næ sectio continuò, modo ostendantur, eorum u- sui præmittantur. 2º, Obstructiones, inflammationes necnon impedimenta cuncta prius amoveantur, quam sumantur. 3º, Siquando Diureticum in formâ siccâ cuiquam porrigitur, liquor mediocriter calefactus post- ea eò hauriatur, ut particulæ remedii aculeatæ dilu- antur; quò eæ in sanguinem expeditius vehantur. 4º, Ocyus effectus sortientur suos, dummodo exiguum exercitii adhibeant. 5º, Vini tepidi pauxillum, Diu- retico sumpto, devorent. 6º, Cavete, ne paulò im- petuosius urina laceffatur; sin ex *Dris. Paxtoni* senten- tiâ nil proprie Diureticum appellari poterit, quando- quidem ea propinata certè ut plurimum parum succe- dere comperiuntur, Diuretica eò præscribere futile ac inane est. 7º, Sint *electiva*, ubi, nempe, calculi, hu- mores

mores viscerum & similia foras sunt expellenda, remedia Diuretica sint aquea & diluentia; sin morbi ab humoribus aqueis, copiâ peccantibus, oriantur, uti fit in anasarca, hydrocephalis, hydrope, cæterisque id genus, Diuretica sint solida & sicca. 8º, Ubi Diuretica hausta immodicum urinæ effluxum cieverint; tum remedia diabetei proficua, hic etiam erunt perquam utilia; qualia sunt astringentia ac glutinosa ex bolo armenâ, sanguine draconis, lapide hæmatitâ, corallio, gummi arabico; tragacantho, aliisque quamplurimis.

Diuretica foris admota subinde voto nostro cedere novimus, ubi primum intus devorata ne vel hilum proficere experti sumus; quamobrem nos historiam sequentem coram vobis sistere juvat; dux equitatus, in legione prætoriâ Northumbricâ, cui cognomen erat *Heath*, anno 1708, in monomachiâ gladio in thorace transfixus; quotannis per idem tempus, æstatem nempe, urinæ suppressione, dolore in parte sauciata, unâ cum deliquiis necnon pulsu intermittente laborabat; intus remedia quamplurima cardiaca ac Diuretica incassum ipsi porreximus; quocirca demum cataplasma sequens ex saponis nigri ʒvj. Croc. Anglic. ʒß. Sal. Succin. gr. xv. umbilico & regioni lumbari admovimus: urina dein aliquanto post assatim effluxit, medicamenta propinata non posthac evomit, ac cuncta symptomata dira se haud multo post subdixerunt: quæ remedia hæc externa renum cataractas referare valent, nugatoriè disceptare haud impræsentiarum operæ pretium erit: siquidem verò particulis ea constant tam emollientibus, quam volatilibus, oleosisque; suspicari licet, particulas istas salino-volatiles ad vasa capillaria usque penetrare, atque ita sanguinem cuspidare, ut is solida tantisper irritare valeat, dum particulæ molles fibras, quas tangunt, dilatant: hinc fit, ut fluida perindè vasa liberius introeant, quam velocius ab eisdem retrocedant. *Et mullerus* sequentia ad eundem finem deprædicat; R. Fol. Parietar. mij. Chærefol. miß minutim incidantur, coquantur, adde Butyri insulsi ʒij. Ol. Scorpion ʒiß. m. f. cataplasma pubi admovendum; linimenta ex oleis chamæmeli, liliorum alborum, succini, scorpionum, &c. in hunc usum componere jubet.

Corollarium.

Vinum Diureticum.

℞ Cortic. interior. Sambuc. p. j. Absinth. roman. m℞.
 Rad. Gentian. ʒ℞. Sem. Dauc. *Sylvestris* ʒiij. In-
 fund. in Vin. Hoccomorens. opt. ℞ij. bibat hau-
 stum ad libitum.

OBSERVATIONES.

Diuretica calculum minorem in pelvi vel uspiam ist-
 hinc ad balanum usque commorantem sat feliciter ex-
 trudunt: cæterum hoc memoratu dignum est, quod si
 qui paulo diutius renum calculo fortè ægrotaverint,
 Diuretica iis minus idcirco suppetias ferunt, quod eti-
 amsi istum, præ succussibus ac irritationibus sat violentis,
 vel expeditè nimis deturbent; sæpius tamen repe-
 tita, sanguinem sero suo, perquam utili, omnino spo-
 liant; ex quo fit, ut quam maximè exinde lentescat
 massa, necnon concretiones ac offæ, inde orta, mo-
 tui circulari paulo frequentius obicem ponant.

Renum morbis inflammatoriis vel eorum ulceribus,
 quinimo vesicæ vel sphincteris ejusdem inflammationi
 maximoperè obesse comperiuntur; quoniam cum pars
 inflammata nequaquam sit omnino movenda; atqui
 Diureticorum idea essentialis motum iteratò factitatum
 complectatur, hinc dubio procul sequitur, quod siqui-
 dem pars affecta magis exinde irritaretur, inflammatio
 plurimum increbresceret: quicquid autem de inflamma-
 tione protulimus, id omne de ulceribus, in istis locis de-
 fixis, intelligi volumus; utpote quæ, cum unioni mo-
 tus omnino adversetur, longè magis inde offenduntur:
 hoc tamen perinde proferri nolumus, quasi nulla Diu-
 reticorum species ulceribus opitulari posset: quando-
 quidem, quæ virtute pollent balsamicâ, non ineptè
 renum ulceribus convenire reperiuntur: quâ de causâ
 erebinthina, necnon balsama cuncta inde confecta, u-
 rinam cum emolumento proritare cernuntur; quippe
 quæ renum glandulas simul leniter emulgent, simulque
 particulas purulentas, ibidem moram trahentes, foris
 pellunt;

pellunt; ex quo fit, ut pars affecta quâ sordibus liberetur suis, quâ non multo post cicatrice obduci possit: remedia tamen deterfiva non diutius adhibenda sunt, quam ulcus saniem ac pus male coloratum ubertim demiserit; posthac enim medicamenta siccantia & absorbentia eò exhibeantur, quò unitio citius absolvatur: hinc scitè *Groenveltius*, De usu *cantharidum* interno primum *cantharidas* ad grana aliquot intus ita dedit, ut ulcus vesicæ mundaretur; deinde remedia glutinantia, absorbentia, ac siccantia, (qualia fuerunt succinum, corallium, gummi arabicum ac balsamica,) bonis propinavit avibus.

Remedia tantummodo Diuretica uteri obturationi referendæ destinare, secundum *Morellum*, ineptum foret; quippe cum sanguinis massa multum exinde feri copiâ sibi perutili spoliaretur, quâ usque eò lentesceret, ut hinc periodo menstruæ in posterum minus foret habilis: in cujus rei fidem, succum urticæ memorare licet, qui quanquam sit acris ac proinde Diureticus, sed usus quotidianus medicinam exercentes, istum hæmoptoi ac sanguinis vomitui opem ferre docet; utpote cum, urinam leniter proritando, particulas sanguinis aqueas ita foris evehat, ut eâ de causâ, non minus sulphureis quam acidis sibi propius accedentibus, lentor certissime exinde oriatur, ac meatus tandem coalescat apertus: artificio haud dissimili nuper quandam tabacum immodice fumigantem propterea apoplexia lethalis corripuit, quòd massa lymphâ, sanguinis in gyrum motui peropus, hinc omnino privaretur.

Quoties fœminæ sæpiusculè abortire sueverint, (quemadmodum recens nuptis, iisve, quorum sanguinis massa sero scaturire solet, seu fibris laxis gaudentibus, obtingere invaluit,) motus intestinorum paulo concitator, nimium frequenter iteratus, uterum adeo concutere reperitur, ut per consensum patiatur; atque siquid oneris complectatur, id omne sensim foris propellitur, quam moliminis speciem *Borellus* centuriâ 2^{da}, observatione 98^{va}. *Vomitum matricis* idoneè fatis appellat: siquidem tali succussu uterus, fibris suis maximopere compressis, infantulum evomere cogetur. In

hoc

hoc rerum statu, serum cautè admodum evacuandum est; nec hic Diuretica prorsus conveniunt.

Quoniam Diuretica particulis constant plerunque subtilibus, idcirco illa ipsa, pro lubitu, propter dosin, scilicet, paulò minorem vel auctiorem; vel alterantia, vel Diuretica vel Diaphoretica tandem evadent; quocirca præparantium vices ista quam optime gerere comperit habemus: quandoquidem catharticis si præmittantur, humores exinde fiunt magis fluxiles; atque hunc in modum *Hippocratis* sensui morem omnino gerimus dicentis, τὰ σώματα καὶ ὅπερ ἂν τις βάλῃ καθαίρειν, εὐοχα ποιεῖν. Authores quidam neoterici præparantia tanquam prorsus inutilia nuper repudiaverunt; atque licet in quovis temperamento ipsorum usus evidenter eluceat; in nullo tamen magis quam in hypochondriaco hystericove perspicuè liquet: ubi symptomata prægrandia ac tremenda catharticonum exhibitioni, præparantium antecessu omnino posthabito, plerunque comitantur: quorum causam, si placet, paululum perpendemus. Facile adducimur igitur ut credamus, quod acidum, cum sit principium congelans, sanguinem, (imo lympham integram) in hypochondriacis, plus minus, lentiores effecerit; quâ de causâ fit, ut motus istorum in orbem exhinc non mediocriter impediatur: in actu autem purgatorio, perinde motus fluidorum intestinalis quam progressivus multum increbescunt; hinc fit, ut fluida hæc, quæ in arteriis primum fere substitissent, hoc, operationis nimirum, tempore usque eò tumultuari cernentur, ut vix citra inflammationis insculturæ discrimen vasa capillaria deinde perreptare queant; ex quo fit, ut symptomata dira, ausa istiusmodi temeraria, pone fere subeant. Cum hæc autem conjectatoriè tantum protulerimus, haud quenquam ita nobis morem gerere volumus, ut si continuò res sic se haberet; siquidem tamen *Sennertus*, *Sylvius*, *Sydenhamius*, *Etmullerus*, *Dolaus* ac *Waldschmidtus*; imò medici nunc fere omnes famiores præparantium usum prius præcipiant, quam cathartica præscribant, nobis hæc in re forsan delinquentibus promptius, uti par est, ignoscetis.

Quoties uteri glandulæ humorum pituitosorum affluxu paulo pleniore adeo laxantur, ut tam ineptæ fiant, quæ fluida contineant sua, ut humores exinde secretos luculenter deponant; præterea quoties sanguinis massa tum sero glutinoso nimium scatere deprehenditur; toties hinc fluor muliebris, albus dictus, exordium sumit; qui si ad tempus parvi pendatur, immedicabilis ferme fit; utpote qui cum annum quasi, nimirum, præterpropter duraverit; haud prorsus ut plurimum deinceps remediis cedere comperiatur: hoc in casu, Diuretica, præmissis catharticis, apprimè idcirco suppetias ferunt, quòd primum serum uberius aliquanto eliminant, quod fluxum deinde ad aliam trahant portam; & demum quod remediis absorbentibus, glutinosis ac stypticis, quibus ægrotorum res deinceps invado fiant, iter sternant: cum hoc autem obiter advertendum sit, quod, fluxu laborantes alio, motu omnimodo prorsus interea dum abstineant; hinc rationum momentis proferri poterit, fluxus quosvis, dum cathartica exhibentur, adeo non minui, ut ad tempus in pejus continuò provehantur; qui tamen expeditius inde posthac remediis cedunt, quoniam humorum copiâ primum aliquatenus demptâ, influxui in posterum uberiori adeo occurritur, necnon partes ideo affectæ ita detumescunt, ut vasorum ora ac parietes idcirco ita sibi invicem propius accedant, ut tandem aliquando remediis specificis satis aptè claudantur. Simili fere modo, sicubi intestina molem suam expeditius aliquanto, quam fieri oportet, deorsum labi finerent, ex quo fit, ut lienteria exinde oriatur; fibrarum perinde laxitati, quam saburræ viscidæ seu serosæ in istis moram facienti Diuretica idcirco opem ferent; quippe quæ humores istos, postquam illos paulo tenuiores fecerint, aliò pellunt; necnon, eos foris amandando, fibrarum tonum casu fortuito adeò firmant; ut ciborum pondus usque ad tempus solitum retinere queant: hic autem haud de catarrho ferino, ex *Dureti* observatione, verba facimus; qui cum ulcus, intestina graviter erodendo, in medium attulerit, istiusmodi remedia, plerunque acria, nequaquam ferre omnino poterit; è contrario enim, per medicamenta id genus æque increbresceret ulcus, ac

chyli expulsio usque eo præcipitaretur, ut sanguis nutrimento solito, quo diu egere nequimus, omnino posthac privaretur; quâ inscitiâ, geminâ de causâ, tam ulcus, nimirum, ampliando, quam illos fame enecando, ægrotos perimeremus.

Sanguinis lentor, ipsius, in vasis minutulis, stationis causa est præcipua; quinimo huic motus remoræ disruptio aliquoties comitari solet; quæ, cum intestinorum vasis evenerit, fluxus nuncupatur *hepaticus*: tali, quamvis, in casu, fluxum hujusmodi ad breve tempus frænare haud arduum omnino sit, quippe qui stypticis expeditè cedere comperiat, hæc remedia tamen ita voto, (obstructionis amotioni nempe,) non respondent, ut quamplurima agenda etiamnum supersint: quandoquidem enim meatus juxta apertus atque obstructio unâ quidem præsidium indigent, alterutro posthabito, manca certè foret indicationis *τελείωσις*: quocirca remedia styptica, cujusmodi sunt corallia, sal martis, sanguis draconis, terra lemnia, saccharum saturni, conserva rosarum rubrarum, atque alia ejusdem generis unâ cum acribus, aromaticis, amarisque mista, in pilulas, electuaria, imo vel quasvis formulas redacta, ac intus propinata, fluxum hunc ita perinde reprimere quam vascula obturata referare poterint, ut ægrotantes haud ita multo post penitùs reconvalescant.

Per fluidorum, in canalibus suis, motum paulo inertiores factum est, ut ista minus rectâ progrediantur, quin passim in vasculis evanescentibus cursum subindè fiant; utpote quæ, cum ita in arteriis aliquandiu permanerint, quotidie magis ac magis adeo lentescunt, ut in orbem ultra flecti postmodò prorsus renuant: exhinc fit, ut ea, vel omnino vel quadantenus nempe subsistendo, seu anasarcas sive humores œdematosos, in superficie defixos, in medium afferant: uti medicis vel minimum exercitatis, quibus nautarum à *Sti Michaelis* portu solventium valetudo curæ est, frequentius elucescit: hujusmodi enim fluida perinde à victu crasso, quam à frigore sævo, atque à quamplurimis aliis *angustiis*, his solennibus, valdè concreescere solent: quamobrem, universalibus præmissis ac pro re natâ iteratis, Diuretica tam humores fundendo quam
meatus

meatus obstructos referando, imo perinde motum fluidorum circularem renovando atque illa per renes foris amandando, istis hoc modo laborantibus quam maxime opem ferunt.

Uti axioma apud *Hippocratem* celeberrimum, *ἐναρτία ἔναρτίαν ἰσχυρά*, morbo fere omni, soli, & semper accommodetur; ita inanitiones repletionis vice præscribere ineptum agere sanè foret: Diuretica ergo emaciatis præbere nullo, quod scimus, jure concessum est; quippe cum repletio sit anchora istiusmodi, reipsà, sacra; ii succoladâ, gelatinis, ovorum vitellis, succo inspissato arboris Lybicæ, *sago*, dicto, temporibus opportunis, virium refarciendarum gratiâ, adeo saginentur, ut remedia alterantia administrandi etiam; ad humorum malitiam obtundendam, locus præbeatur.

Alma mater, Tellus, ab ærâ dominicâ 1500, ad hoc usque seculum particulis aculeatis, metallis deciduis, scaturre fertur; ex quo fit, ut aquæ, quibus utimur quotidie, istiusmodi salibus viventium sanguinem adeo inquinaverint, ut morbus iste atrocissimus, *scorbutus* appellatus, jam inde ab isto tempore mortales immanner cruciaverit: uti *Johannes Harrisonus* Dunelmensis, M. D. Senex perspicacissimus, in tractatu suo, cui titulus, *scelera aquarum*, ejus morbi perinde fastos atque causas enumerando, nos sat palam edocuit; quemadmodum autem salium istorum indoles plerunque deliteat, nisi quod à temperamento nobis ea innotescat; *Willisii*, viri disertissimi, sententiam, scorbuti causam bisecantem, jure merito amplectamur. Temperamentum itaque biliosum, seu istud saltem calore immodico stipatum, dummodo vasa impendiò repleantur, evacuationes postulat; per venæ sectionem, ubi vasa sanguine impensè tenduntur, uti rubore, vasorum repletionem, oculorum gravitate cæterisque id genus signis liquet; per emetica, si quando nausea, aliaque signa ventriculum laborare denotantia adfuerint; per cathartica, ubi abdominis tensio, crepitus atque alia intestinorum idiopathicè affectorum signa præstò sunt; ac tandem per Diaphoretica vel Diuretica, quoties ponderis in renibus sensu, seu lassitudine per totum corpus sparsâ (quæ ponderis etiam glandulis incumbentis species

species revera est) ejusmodi remedia ostendantur; his ita præmissis, remedia diluentia, quæ salium acrimoniam utramvis efficaciter diffociando emendant, primum exhibeantur; necnon, modo potis sit, acrimonie species, alcalina an acida, mineralium an vegetabilium, eò penitiùs indaganda est, quò remedium contrarium meliusculè accommodetur. Ex egregii viri præscriptis, aciditates succis animalibus præfuisse, ipsius tulisse sententiam, quam maxime enitet; si igitur praxin fœliciter, istorum remediorum usu, continuò confecerit; quemadmodum ex ipsius magnificentia ac pompâ, necnon ex honore ipsi delato egregiè constat: nulli omnino dubitamus, quin pulveres hi testacei ægrotis opem tulerint maximam. Cum sanguis autem in temperamento frigidiori limosus ac lentus ut plurimum sit, proinde juxtâ, evacuatoria ἀνα καὶ κάτω inanientia, maxima à medicis ambit ope; atque Diuretica, quæ residuam humorum vitiatorum portiunculam per renes planè amandant; quam ad rem vinum hoc haud parum conducere reperietur: à quo, salia quæcunque volatilia, sal nimirum, volatile cornu cervini, sal volatile salis armoniaci, sal volatile oleosum sive siccum sive liquidum, spiritus cornu cervini, spiritus salis armoniaci; plantæ quævis volatiles, *Raphanus*, scilicet rusticanus, cochlearia, nasturtium, beccabunga, semen sinapios; amara cuncta, absinthium, nemoe, centaurium minus, fumaria; salia fixa, sal, videlicet, absinthii, genistæ, cardui benedicti, juniperi, & similia, in varias formulas confecta, scorbuto frigido colophonem addunt.

Quotiescunque materiâ lenta seu glutinosa ductui communi, vesicæ felleæ orificio, sive glandulis hepaticis uspiam in istis locis adnascitur, ac proinde bilis secretioni debitæ impedimento est; Diuretica, utpote quæ tam motûs obstacula summovere quam urinam exorire possint, quam maxime conferre comperietis: quâ de causâ fit, ut vinum hoc ictero maximas ferat appetias; icterum vero omnimodum isto auferri non siveveramus, quandoquidem non modo ab humore toto, verum aliquoties etiam à calculis, à viperæ morsu primordium sumit, quæ morbi hujus species istiusmodi

huiusmodi remedia adeo non ostendunt, ut hic acida ille vero mollia ac lubricantia omnino poscat.

Mulieres perinde hytericæ atque infantes, languescentes jure merito nuncupari debent: uti vero ejusmodi evacuantia fortiora haud impunè ferunt, ita ne hi; quocirca Diuretica sola his convenire affirmamus.

Infusum Diureticum.

℞ Sem. Sinap. ℥ij. Sem. Dauc. Sylvest. ℥ij. Absinth. Roman. p. j. Infund. simul in Vin. alb. Gallic. ℥ij. capiat dosin ad libitum.

OBSERVATIONES.

Quandoquidem præscriptum hoc à vino Diureticum parum dissidet, siquid cuiquam istud proderit, id omne de hoc quoque, gradu tamen longe eminentiori proferri potest; quocirca vela trahamus.

Pilula Nephriticae.

℞ Terebinth. è Chio ℥ss. Opobalsam. ℥ij. Pulv. Oc. Cancror. è Chel. Cancror. ā ℥i℥. Syr. Balsam. q. s. m. f. Pilulæ Mediocres Obvolv. Pulv. Oc. Cancror. Capiat iv. bis de die.

OBSERVATIONES.

Quanquam urinæ odor, sumptâ terebinthinâ, violaceus continuè fiat, inde solummodo subsumere, particulas terebinthinæ sulphureas cum sanguine confundi par est; sed an perinde quantitatem urinæ majorem idcirco proluciant Diuretica, quam isti odorem imperant, litem hanc expedire nobis neutiquam vindicabimus: ii tamen, qui ab hujusmodi remedio præsidium efflagitant, vehicula copiosè sub idem tempus ebibere meminerint; qualia sunt serum lactis cum vino albo, vel julapio diateffaro conflatum, ut arenulæ, pelvi ureteribus incubantes, paulò expeditius eluantur: ut enim verum fateamur, Diuretica inceptum non magis indubitanter unquam pertexunt suum, quam cum liquores, eâ propinati, particulis imprægnentur aculeatis; quippe cum perindè liquoris affatim ingurgitemus, atque glandulas unâ proritemus renales, ista simul juncta

munerit

munerî huic continuò sat esse reperiemus. Quoties igitur nephritidis accessio quenquam adoritur, diuretica ista, *aqueo-acria* nimirum, arenulas usque ad vesicam ipsam deturbabunt, quæ posthac tantò commodius ejicientur, quantò quis validius vesicam comprimendo, urinam diutius continet; quoniam cum arenulæ nunc eò pervenerint, quo lotium uberiori prorumpit rivo, eò certius istæ tam ex canalîs dilatatione temporaneâ quam ex vi, quacum contenta profluunt, prorsus abluentur: Proinde spasmi, causâ omninò loco meabili prognati, hunc in modum quam expeditissimè, ac sine morâ, mitigari solent. Hæc autem de arenulis solis proferimus; quippe renum calculum paulò grandiore diureticis impetere haud æquum esse censemus; utpote cum, aut impetu, quo solidum istius molis concitari solet, ureteres dilacerarentur, aut spasmi saltem ac dolores sævi, aut inflammationes (quæ morte ægrotos ut plurimum multant) citius aut serius exhinc accelerarentur: Monitum hoc vobis haud inculcâsemus, quod nisi experti, periculis inscitè iteratis, loquamur; infortunia porrò hæc eò magis lugubria sunt, quod cum à calculo primum initium sumplerint, usque eò deinde sub eodem titulo, improprio autem, etiamnum occultantur, dum humorum gradum nunquam deinceps revocare possumus: Sin forti super isti iniquæ fuerint; ulteri renum mors casu fortuito palmam defert; quod ensim, dummodò citra meatûs urinarii fines subliterit, istulosum, ac proindè immedicabile fit: Quod si meatibus urinariis infigatur, experientiâ propriâ duce, sæpe numero remediis cedere reperitur: Pilulæ autem hæc, præ particulis suis absorbentibus ac balsamicis, huic conducunt fini; ulceris igitur genium paulò accuratius, si placet, ad stateram exigamus; ex quo fiet, ut medicinarum energias longè expeditius intueri valeamus. Quum fibræ fluidorum mole adeò explicantur, ut eorum arcinam ultra sustinere nequeant, eæ tam tenues ac raræ evadunt, ut confestim exinde crepent; atque materiam purulentam in spatium istud promiscuè effundant; unde fit, ut materiâ hæc, fibris tantopere disructis circumscripta, abscessûs nomenclationem adepta sit: Qui reapse ea ulceris species est, quæ ab inflammatione

O

exordium

exordium fecit: Simul autem ac primum materia hæc fibrarum obstacula adeò discutiit, ut ex foramine, seu sponte suâ formato seu secto, profiliat, fibrarum læsio in eodem etiamnum statu permanet, fibra intra diabrofeos ambitum singula pus, quod in se complectitur, in spatium hoc usque eò sejungit, donec unaquæque ad metas consuetas rursus redigitur; deinde eæ sponte, modo sanguis particulis adeò vacet aculeatis, ut oleosis, balsamicisque solis affluat, ita coalescunt, ut fluida sua imperturbatò ac ex ordinè in posterum circumagant: Quod si ex infortunio, quale nimirum sanguinis seu lymphæ acrimonia quadantenus septica vel caustica foret, solida vel putrescant, vel exedantur, proinde saniem continuo, quinimò diutiùs aliquanto, extillent: Pilulæ hæc, acrimoniam hanc aliquatenus obvolvendo, humorum suppetias admodum imminuunt; sin proximè fibras ipsasmet læsas hujusmodi remedium admoveatur, longè citiùs rem absolvemus: Imò citiùs adhuc medelam inchoatam, absolutam faciemus; ita si laborantes venustatem ac vulnera flocci faciant; quippe cum remedium deinceps uniuscujusque ac universalium fibrarum oscula in propinquò amplexetur, nullo modo fieri potest, ut remedii admotio universis fibris non magis auspicato, quam si quibusvis solummodo admoveatur, voto cederet: Hac de causâ fit, ut chirurgi paulò consultiores aperturis amplioribus aliquanto haud immeritò tantoperè capiantur.

Quicquid cæteri de terebinthinæ, in gonorrhœis veneris sanandis, usu vel senserint vel protulerint, nos longè secus, atque ii, certè opinamur. Recentiore quidam injectiones in urethram per siphonem pulsas adeò impensè mirantur, ut gonorrhœam virulentam his unis auferri jactitent; illas equidem haud improbamus, si tamen istæ præfinito tempore admoveantur; quippe cum eæ peculiari cuivis fibrarum incommodo jugiter aptari queant, quid vetat, quo istæ minus introducantur. Quandoquidem autem hæc meliuscule capi volumus, sententiam nostram paulò fufius explicare liberum nobis sit; quippe, hoc agendo, pseudodoxiam haud minoris momenti, quam infortunia quamplurimis optimatum natalibus ac stirpi per futurum genus tradendi

ad rectam rationem traducemus. Esto, quenquam à certamine, cum pellice lue infecta, aliquando conflictò, contaminatum esse; ac portiunculam veneni hujus septicì, per coitum vel in balanum, vel præputium, vel etiam in ipsum urethræ canalem, irreptâsse; quod magnâ ex parte, propter attritionem vehementiorem, in poros membri priùs introducitur, quam semen in vaginam effunditur, quodque istis pressius aliquanto adhærescit; nulli enim dubitamus, quin attritio partium veneni hujus subtiliorum perinde intromissionis causa sit, atque embrocatio, sit modus, quo materia haud magis spirituosâ poros longè minus flexiles introire cogatur: neque Themidi non litare, ullis artis medicæ peritis, omninò videbimur; cum emissionis moram ætati ut plurimum, seu, quod unum idemq; est, scortatoris impotentix rationem gestare asseramus; eadem itidem ratione & attritio protrahi solet; unde fit, ut contagii fors certaminis diuturnitati obsequium præstet. Rebus ita se habentibus, analogia, per quam venenum hoc animalium venenis quadrare quit, sat elucescit: Quemadmodum enim hæc aliquatenus à se diffideant, ita & illud, imò vel à seipso, multum certè discrepat; haud facile cæteroquin esset proferre, quî fit, ut ii, qui juxta primum fodiunt, licentiâ blandâ pœnam subterfugiant. Cum ista ipsa tamen mœcha, paulo magis conspurcata, nullum deinceps aggressorem arietantem accipit, quem non tabo isto foedissimo imbuat; quod si morbum quo inquinatur, sive ex penuriâ sive egestate vel adhuc spreverit, ac posthabuerit, væ homines istos, quos hæc postmodo inescaverit! Quotus igitur quisque is est qui istiusmodi mutilatis, nullo discrimine, pharmacum adhibere velit? Quanquam enim remedia necessario sint ejusdem speciei, sed medicus immeritò nuncupatur, quod nisi propter sollicitudinem de salute ægroti maturam, seu veneni copiam, dosin remedii vel minuere vel augere devinctum se crediderit: Quocirca quemadmodum topica, si tamen confestim adhibeantur, atque quoad & quantum chirurgi sagaciores sat esse concedunt, particulas morbum virolas nunquam non à parte affectâ efficaciter amandant, ac proinde obstaculo istis sunt, quo, propter moram, quam in fibris fecerint, minus cum sanguine

confundantur; sic si horâ unâ vel alterâ elapsâ venenum istud corio nostro, vel etiamnum, infideat, remedia externa citra internorum consortium metam propositam haudquaquam attingent: Quæritur idcirco, nec injuriâ, utrûm in casu hoc, in medium dato, topica una admoveantes, an remedia simul intus præscribentes, consultius agunt? Siquem ideo canis momorderit rabiosus; neminem, ni multum fallamur, reperiemus, qui chirurgorum istorum incuriam non adèdè dedecorabit, ut fortibus spirituosiss, cæsuris, cucurbitulis, vel quibusvis externis unis non fidat: quin præterea diaphoretica selectiora aliquantò (quæ experientiâ duce, concretiones funestas, necnon vicissitudines diras, delirium istud avium præ vulneris hujusmodi cicatrizatione præmaturâ introducentia, efficacitè expugnant) jugiter exhibere soleant: Quanto solatio perinde morfi quam chirurgi, propter hanc diligentiam nimiam, modo siccinè impropereatur, patientur? Qui hunc igitur in modum ulceribus istiusmodi medicari conantur, ineptè idcirco agunt, quod pericula eminus, at certò ferè certius, à tergo tandem aliquandò eventura, haud trutinantes, ægrorantibus, diris contra eos, præ noxis haud multo post exinde pullulantibus, in posterum, agere permittant. Si igitur præter injectiones id genus, intus præterea exhibeantur *purgantia*, ex mercurio dulci, pilulis rudii, cochiaëve, resinâ jalapii, unâ cum balsamo seu peruviano seu opobalsamo, similibusve conflata; si itidem, remediis evacuantibus præmissis, (quæ cum detergentibus omninò uni conveniunt tertio) *balsamica* seu digestiva, terebinthinata aliave ideo introsumentur, quoniam urethræ tubulos undique prætumidos usque eo humorum onere suo levant, ut in mensuram ac molem nativam rursus redigantur; exindè fiet, ut quam facillimè postmodò remediis *stypticis* necnon absorbentibus meatus, etiamnum dehiscentes, tutò deinceps claudantur; petimus, num remedia nimirum insubida olim sumpta perinde laborantibus, atque caries, carunculæ, nodi, spinæ ventosæ aliaque quamplurima, aliquot post annis, quinimò vel mensibus, succretura, odio esse poterint? sententiam, vel ipsimet, heterodoxian hujusmodi propagantes, pro nobis ferant.

Præscriptum

Præscriptum hoc ulceribus pulmonum propterea competere potest, quod usu hoc compertum sit, quod phthiſici non diutius in hominum cœtu versari soleant, quam cum materiâ suâ purulentâ pulmones sat liberaliter expediantur; quandoquidem autem remedia istiusmodi balsamica expectorationem sat fœliciter absolvent, vitam, vel ad menses usque, producunt.

Quoties febris in empyemate parum exæstuat (febris autem non multum urgere solet quoties sôlida haud magnoperè læduntur; saltem ista deservere advertitur, ut primum materia purulenta in thoracis spatia defluerit) pilulæ hæ, sanguinem particulis suis balsamicis imbuendo, fibras faucias valdè mundificant; ex quo fit, ut fibræ, cum materiâ hâc admodum fœdâ expediantur, adeo posthac detumescant, ut absorbentibus (præ acidi septici immutatione, quod unitioni obstaculo nunquam non præmagno extat) aliquoties cedat ulcus.

C A P. VII.

Masticatoria, Ptyalifmica.

1^o. *Masticatoria Calidiora.*



- Sem. Sinap. ʒj. Mastich. pulv. ʒij. m. f. pulvis.
 R Rad. Pyrethr. ʒij. Gum. Mastich. ʒj. m. f. pulvis.
 R Pulv. Staphid. agr. ʒʒ. Sal. vol. CC. gr. vj. m. f. pulvis.
 R Lign. Sanct. ʒj. Sem. Cubeb. ʒij. m. f. pulvis.
 R Merc. præcip. alb. bene lot. ʒʒ. Merc. d. ʒʒ. Mastich. pulv. ʒij. m. f. pilulæ minores cum Balsam. peruvian. Sub linguâ tenendæ subinde.
 R Aq. Cinnam. ʒij. Sp. CC. ʒʒ. m. f. mistura in ore volutanda.
 R Nicotian. rec. succolent. Mij. Rad. Pyrethr. ʒij. Zinzib. ʒj. m. f. pulvis, qui postea formetur inglobulos vehiculo quovis appropriato.

- ℞ Pulv. Nicotian. ℥ij. Rad. Pyrethr. præp. ℥j. Cardam. Cubeb. ana ℥j. Mastiche pulverisatâ f. pilulæ majores.
- ℞ Succ. Nicotianæ inspissat. ℥ij. Mastich. ℥ij. Pyrethr. ℥j. Cardam. Cubeb. ana ʒβ. cum ol. piperis f. pil. majores.
- ℞ Rad. Pyrethr. ʒβ. Mastich. ℥ij. Sem. Sinap. ℥j. Cardam. Cubeb. ana ℥j. contundantur, & indantur Sacculo pro Masticatorio.
- ℞ Herb. organ. Majoran. Serpill. ana p. j. fol. Nicotian. p. j. Rad. Pyrethr. ʒβ. Sem. Nigell. ʒβ. Cardam. Cubeb. ana ℥j. Coqr. in aq. font. Colatur ʒij. add. Syr. Nicotian. ʒiv. Oxym. Scillit. ℥ij. m. f. apophlegmatismus.

Frigidiora.

- ℞ Sal. prunell. Mastich. ana ℥j. m. f. pulvis.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi; nulla prorsus continet.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Masticatoria; Mixtura Tubularis; Pilulæ Masticatoriæ.

Ex Fulleri Pharmacopœiâ. Electuarium apophlegmaticum; Gargarisma paralyticum; Gargarisma ad pituitam; Gargarisma de pyrethro; Gargarisma sinapium; Lohoch apophlegmaticum; Masticatoria; Pulvis salivam movens; vapor ad anginam.

Saccharum Nitratum, refertur Masticatoriis frigidioribus.

2^o. Ptyalismica.

- ℞ Merc. dulc. gr. x. xv. ℥j. ʒβ. Conf. Rosar. Rub. ℥j. m. f. Bolus. *Mediocre.*
- ℞ Turpet. mineral. gr. ij. Merc. dulc. gr. x. Conserv. Lujul. ℥j. m. f. Bolus. *Forte.*
- ℞ Turpet. mineral. gr. ii. ad viij. Conf. Rosar. Rub. ℥j. m. f. Bolus. *Fortius.*

℞ Cinnab

R Cinnab. nativ. ℥j. Benzoin. Myrrh. Oliban. Styrac.
ana ℥β. Mastich. ℥β. Tereb. q. s. f. suffitus; *Fortissi-*
mum.

R Axung. porcin. ℥iv. Mercur. crud. bene purgat. ℥β.
m. f. unguentum, ℥ij. semel pro infantibus. *Fortius.*

R Axung. porcin. ℥ij. Mercur. crud. ℥j. m. f. Ung. pro
tribus vicibus, in adultis. *Fortius.*

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ, Aqua salivalis (); Pa-
nacæa aurea () Mercurialia.

SCHOLIA.

Morbus, qui Ptyalismò potissimum dirui solet, lues
est venerea; utpote quæ evacuatione hujusmodi stirpi-
tùs evellatur: Hinc est, quòd haud immeritò *Πιζότις*
subinde nomen adepta sit; qui usque eò protrahatur,
modo vires finant, donec pustulæ, nodi, gonorrhœa, ul-
cera necnon dolores atque alia quædam morbi sympto-
mata primaria ac paulo graviora prorsus, saltem quadan-
tenus, evanescunt: Salivâ hunc in modum sat ubertim
aliquandiu educât; lignorum decocta, ad tempus, intro-
sumantur; sudores in hypocausto vel laconico aliquo-
ties, pro virium modulo, proritentur, necnon cuncta
luis antidota sat abundè propinentur; quò fiet, ut hu-
moribus quâ educâtis, quâ linitis, reliqua *sanguinis mas-*
sa deinceps protinus balsamica, atque acrimoniâ poste-
rius omni expers sit.

Ulcera quam gravissima exinde auferri non semel ex-
perti sumus; quinimo quæ non alteri cesserunt metho-
do, hac sat foeliciter demoliti sumus: quippe cum salia
pontica, septica, caustica atque adeo salia cujusvis spe-
ciei unâ cum lymphâ per glandulas salivales foras ave-
hat; sanguinis moles integra, quæ superest, adeò post-
hac non aculeata est, ut confestim balsamica, ramosa, ac
mollis prorsus evadat: Ulceribus autem minus infestis,
seu iis, quæ minoris sunt ambitûs, per ptyalismum me-
deri operæ non erit pretium, utpote quæ methodo, *pagi-*
nâ hujus libri *sexagesima quintâ*, sub titulo *Pilularum*
preparantium ac matutinarum, memoratâ, longe com-
modius, quâ propter vires, quâ dispendia, relevantur.

Morbis catarrhalibus, omnigenis, paulò contumaci-
oribus seu frequentius recidivis, ptyalismus idcirco sub-
fidio

fidio venit, quod particulas quasvis tam tenuiores, quam copiâ delinquentes, uti salinas etiam, quæ sunt horum morborum origo, prorsus eliminet.

Ptyalismum *Ettmullerus* in casu paralytico, nempe hemiplegia, ab apoplexiâ per metaptosin, *diadochen* dictam, ortum ducente magnis præconiis effert; *Mayernius* item eundem in guttâ serenâ laudat; quæ cum reapse idem sit morbus, nervi obstructio nimirum, propter sitûs igitur varietatem solum discrepat: Quandoquidem paralyssis hæc medullæ spinalis, amaurosis autem nervi optici obturatio sit: quâ de causâ quædam paralyssi huic opem iste ferat, guttæ etiam serenæ auxilio erit. Quoniam vero ii, qui hydrargyri fodinis seu fumis gnaviter insudant, paralytici ut plurimum evadunt; exindè est, quod nonnulli haud infirmi subfellii medici mercurialium exhibendorum potestatem in morbis systematis nervosi negent: Siquidem autem hydrargyri minima neque medicorum, quod scimus, quisquam hætenus certis nobis indiciis patefecerit, sint-ne videlicet acida an alcalina, calida an frigida; quî sit ut hydrargyrum sit unicum remedium salivam ubertim ac aliquandiu proritans; fateamur, necesse est, nil de ipso pro certo prolato dignum esse, quod experientiæ fulcro non prorsus nititur. Quemadmodum omne, quod in hydrargyro est, præter molem ac gravitatem specificam, nobis huc usque latet; mercurialium idcirco energias, nullo ratiocinio, extra pondus ipsius, confirmare possumus; cum verò quamplurimis proprietatibus, ponderis hujus ope haud enodandis, gaudere competiatur; argumenta de virtutibus ipsius aliorum necessariò petenda sunt; quamplurimorum phænomenorum causas cum peripateticis indagare, vel insanire vel saltem nugas agere prorsus esset; quæ hi enim de idiosyncrasiis, sympathiis, antipathiis, formæ parentalis, in foetibus, congruentiis, olim protulerunt, anxie perquirere operæ non esset pretium; philosophi, vel recentiores, cum proprietates unas, essentiis intimis omnino posthabitis, indagent, cum cæteris tantundem egisse reperientur: Cum remedii hujus cæterorumvè eventuum *Ὅτι* solum, eorum vero *Διότι* non vel etiamnum exploraverint: Quod mercurialia igitur exhibita salivam

vam abundantius aliquanto proliciant certò nil certius; quâ de causâ vero id obtingit, nemini usque huc istud innotuit.

Quemadmodum igitur mercurialia nonnullis opem ferunt, aliis vero mala quamplurima accersunt; ita horum eventuum rationes paululum, si velitis, subducamus. Quoties mercurialia, quatenus talia, nervis prodesse solent, toties nunquam prorsus obessent; cæterum è contrario, ubi, in sensu reduplicativo, accidentia mala inferre solent, laborantes ea nunquam deinceps impunè ferrent: Quapropter sussumamus necesse est, hujusmodi remedium præ *regimine unico*, vel ægrotantibus prodesse vel obesse. Nonnulli autem fossiores necnon hydrargyrgos paralytibus aliisque quamplurimis morbis exinde affligi regerunt: Serio verò secum perpendant ii, quid sit, cur opifices perinde alii atque isti subterranei morbis multifariis, cavernarum istarum uligine, ac vaporum exhalantium frigiditate prognatis, quam sæpissimèprehenduntur? dein attentè pervolvant animo, quî sit, ut acida una, quibuscum mercurius in minutias rapitur; opificibus istis damnum inferre soleant? His autem ita prolatis, atque probatis, sententiam nostram libentè in medium proferemus. Quoties ptyalissimum nimium nempè evehimus, toties è sanguinis massâ particulas serosas adeò elicimus, ut ista crassa ac lenta confestim exinde fiat; quod si in eo humores paululum tantum fundamus, necnon sub idem tempus liquorum affatim istis propinari præbeamus; perinde motûs istius intestini causa, quam fluidorum tenuitate, atque mineralis hujus pondere relativo obstructions, vel quam contumacissimæ, expedite defodientur: Hinc patere speramus, particulas mercuriales non magis ex naturâ suâ quam particulas salino-volatiles nervis unquam noxam intulisse.

Quanquam ad febrium quartanarum medelam ptyalissimum deprædicent nonnulli, sed ii haud consulto nimis res suas gerere reputantur; quandoquidem enim remediis evacuantibus paulo lenioribus primum exhibitis, remediis deindè alterativis aliquandiu, modo requirantur, propinatis; cortex demum peruvianus febris istius vel pervicacissimæ, medelam ad umbilicum perducet. Quid igitur

igitur ptyalismum, modum inaniendi periculosum, evacuantium lentiorum, tutiorum, ac magis exploratorum vice moliremur?

Ptyalismus propterea maniae conducere poterit, quod demptâ humorum necnon spirituum redundantia, vesania posthac sensim ita compescatur, ut somno per opitata noctu, conciliato, ac alimoniâ paulisper subducta, pristinam haud multò post recolligant valetudinem.

Remediis topicis frustra aliquandiu admotis, ptyalismum gingivarum ac labiorum ulceribus (scorbuticis, an venereis, hic non est disceptandi locus) olim, opem tulisse comperimus.

Tametsi ptyalismus, salia aculeata foris eliminando atque adeò eruptionum fomitem efficaciter subtrahendo, scabiebus omnigenis, fermè subsidio sit; elephantiasi tamen ita non præsto est, ut cis tres quatuorve menses continuò, eâ laborantes, recidivam patiantur; quî autem morbus hic penitus auferri poterit, nemini, quod scimus, etiamnum constat. De arthritide porro, idem fere pariter asserendum est, quoniam ptyalismo valido, vel aliquoties, attentato; tantum abfuit, ut voto cederet, ut certò, aliquanto serius autem, laborantes denuo salutaverit.

Quoniam epilepsiarum fomes sero ut plurimum infidet, isto maximâ ex parte per ptyalismum exhausto humorum, qui supersunt, acrimoniam deinceps adeò auferri subinde novimus, ut morbus hic postmodo haud redierit; epilepsiæ verò, quæ ad annum vigesimum quintum usque duraverunt, sanari recusant.

Mercurialia extrinsecus admotâ dolores ac nodos venereos auferre solent; quum verò de mercurii energiam solum evacuatoriâ hic sermo fiat; virtutem ipsius anodynâ, dissipantem, aliaque in præsentî reticere placet.

Petunt nonnulli, num utero gerentium vires ptyalismum perferre valeant? culpatur à *D. Juncken*; laudatur à *G. Morriceau*, litem vero hanc, in modum sequentem, facile est expedire: Quandoquidem enim morbus quam gravissimus matris atque infantis vitas adeò in discrimen adduceret, ut vel ambos perimeret, quid vetat, quo ptyalismus modicus, ubi sensim scilicet effluunt humores, minus instituatur, mensibus præcipue

mediis

mediis; quippe cum, hunc in modum, morbus, symptomatibus diris comitatus, in universum auferri poterit: hoc tanto audactius affirmamus, quanto felicius olim voto nostro cessisse comperimus.

Temperamentis perinde paulo calidioribus quam frigidioribus, plethoricis quoque, ac macilentioribus ptyalismus nocumentum inferre plerumque advertitur; utpote cujus causa plethoricorum ac frigidiorum sanguis adeo in immensum explicatur ac elevatur, ut spatium longe majus posthac occupare notetur; quo fiet, ut hæmorrhagias, aliæve malæ huic similia, inferre soleat; quinimo cum macilenti ac biliosi magis inde febricitent; providendum est nobis, ne super noxas, temperamentis ejusmodi solennes, alias etiam adjungamus.

Quoniam tremores potissimum à spirituum inopiâ ortum ducunt suum (qui cum pauci sint, *ἀνομάλως* quam sæpissimè tum exilire solent) inanitiones istiusmodi afflictis inepte propterea accommodantur, quod ii exinde ulterius justo debellantur; quocirca evacuationes tremori, senili præcipuè, ita non competere observantur, ut è contrario, remedia spiritus recreantia ac victus reficiens solummodò tunc exhiberi debeant.

Quanquam ulceri palati ac narium, *ozæna* dicto, initium à lue confirmatâ sument, ptyalismus idcirco ut plurimum obfit, quod, cum humores exinde sursum vehantur, faucium ac oris caro, glandulæ ac aliæ partes vicinæ, quam maximè adeo tendantur, ut continuïtas solvatur ac partes quæ antea sibi adfuerunt, nunc miram in distantiam sejungantur; sed hinc non immerito concludere licet, quod necesse sit, ulcera istiusmodi aquis mercurialibus prius carne propemodum obducantur, quam ptyalismus instituatur.

Nonnulli authores, homines ptyalismum primùm expertos nequaquam posthac omnino febricitare, audacter asseruerunt: hoc notavit imprimis *Potérius*; deinde *Ettmullerus* p. 217. cerdones istos hydrargyrum è fœdinis eximentes raro aut nunquam febricitare affirmat; cum quodam autem jampridem amicitia nos conjunximus, qui, annò post ptyalismum secundo, febri mali, imò pessimi, moris adeo laborabat, ut comata, festucarum ac stragularum collectio, convulsio-

nes, deliria, sæcum ac urinæ effusiones involuntariæ ac alia symptomata quamplurima dira, illi incumbentia, ægrè, Epispasticis nimirum pluribus, Julapiis, in quibus *Sal præfuit regale*, emplastris folearibus, cæterisque id genus remediis cederent.

Methodus usitator ptyalismum instituendi hæc est; mercurii dulcis, seu potius calomelanos, grana quindecim aut scrupulum (plus minus pro ætatis ratione) cum quavis conservâ primo exhibemus die; deinde secundo die, drachmæ semissem; ac tertio die, drachmam unam; ex quo fiet, ut quarto vel quinto die (subindè autem non ante septimum vel etiam decimum diem) saliva profluat; mercurius dulcis usque adeò reapse mane & vespere repetendus est, donec caput ac fauces doleant, facies paululum intumescat, fœteat os, nec non saliva pauxillum effluere cœperit: his ita se habentibus, mercurii exhibitionem ulteriorem ipsis paulisper interdicamus; dum fluxus, aliquatenus minutus, eum paulo post rursus propinandum esse ostendat: fluxus autem per decem, quindecim, imò vel viginti dies, etiam vel usq; protelari debet, dum oris fœtor, modo robustiores aliquanto sint laborantes, penitus evanuerit: posthac cathartica ac sudorifera, propinamus, enemata sæpiusculè injicienda curamus; quinimo sulphuris flores ad ʒij. partitis vicibus, aurum foliaceum ad grana decem quater vel quinquies in confectiōe alchermes exhibemus; ac demum gargarismis è stypticis conflatis, os frequentius colluimus; salivam porro deglutire sensim se consuefaciant: Cum hæc aliquamdiu fecerimus, ptyalismus sensim quiescit.

Quoties ptyalismum ungendo instituere vehementer avetis; Tarsos atque articulos inferiores per tres dies, se invicem proximè excipientes, unguento perlinitote; nonnulli verò carpos, poplites atque axillas unguento mercuriali perungunt: quandoquidem autem methodus hæc potius corbulonibus, mesonautis cæterisque id genus homuncionibus, quam delicatulis accommodari videtur; medicis idcirco, quibus proletariorum incolumitas curæ est, omninò, saltem ut plurimum, permittatur.

Quando

Quando suffumigando saliva proritanda est; pulverem supra præscriptum vel alium quemvis mercurialem carbonibus sternamus; ægrotus autem fumum testus recipiat; methodus hæc cæterarum omnium longè incertissima ac perniciosissima idcirco est, quod mercurii quantitas in corporis poros se insinuans, vix vel ne vix quidem adjudicari possit.

Ubi diarrhœa mercurii exhibitionem aliquando exceperit, laudanum in quavis formulâ devoratum eam certissimè dirimere solet; quo-circa methodus nostra hæc est, ut mercurium dulcem seu καλομέλανα unâ cum laudano commisceamus, atque isto ita exhibito, ptyalismus quarto vel quinto die post ferme subsequitur; quod si nec hoc modo saliva efflueret, à mercurialium dosibus nosmet postmodo temperemus, quandoquidem vero simile sit, ejusmodi naturas mercurium, propter idiosyncrasiam, aversari; quamobrem his, diaphoreticis unis, mederi moliamur; quandoque enim mercurii quantitas introsumpta temperamento vel laborantis viribus adeo non quadrat, ut metus sit, nè virtus ac spiritus obruantur exinde; quâ de causâ, iste quamprimum è corpore deturbandus est; adhibendo, nimirum, cathartica, enemata injiciendo purgantia, lodices atq; indusium permutando, ac demum flores sulphuris, devorando; hæc enim cum egerimus, ptyalismus vel omninò non ultrà fluet, vel usque eo minuetur, ut vires non exinde prosternantur: quoties etiam prælargam mercurii dosin quivis incassum introsumpserit, cum foris eliminare confestim ideo laboret medicus; quia nocumenta corpori alias inferret quamplurima. Jampri-dem nos quidam de dolore fixo scapularum quam gravissimo consuluit; quippe vero remedia multifaria antea frustra aliquanto diutius attentaverat, ptyalismum tandem experiri voluit; cum ipsi mercurium dulcem, καλομέλανα, imo turpetum minerale, ad quantitatem sat largam intus non modo incassum exhibuissimus, verum unguentum mercuriale quam copiosissimè forinsecus admotum frustra etiam adhibuissimus; salivam etiam dum proritandi obtentu, cathartica quamplurima feliciter (quod mirum dictu) illi propinavimus; atque sanguine particulis mercurialibus ita tandem expedito

P

dito, diaphoretica ex lignorum decoctis diutinè exhibuimus; his ita confectis, ipsi clanculum valediximus, id arbitrio ipsius permittendo, nos furiis addiceret, an pro nobis se supplicem exhiberet; haud multò post mercurium, chirurgi cujusdam consilio denuo ea sumpsit dosi, quæ salivam certè elicuit; post decem, à meo recessu, septimanis, homuncionis uxor musæum nostrum tandem properanter advolat, impense rogans, ut maritum suum rursus inviseremus; ipsius jussu libenter morem gessimus; cæterum cheu virum, non morbi modò gravitate, sed mercurii etiam quantitate oppressum, occumbentem reperimus.

Deliquia ptyalismo præcedentia, vel istum, sub initia, subsequencia, vini haustulo subinde pro re natâ devorato quam optimè sublevamus; periculo autem istiusmodi omnino vacant.

Deliria necnon alia symptomata quamplurima nervosa ptyalissimum male institutum excepisse nota; epispasticis cucurbitulis seorsim vel simul admotis, una cum remediis causæ proximæ idoneis aliquoties evanuisse comperta sunt.

Ex *Cornel. Bontekoe* sententiâ, satius est ptyalissimum bis terve, ad aliquot hebdomadam distantiam, excitare, quam graviolem unquam aliquando instituere. "Optime igitur, ait, est in lue, aliisque morbis sanandis, ut potius duæ vel tres salivationes leviores instituantur, quam unica gravis, longa & periculosa. 163. c. 5. *Fundament. medic.* Quantum hoc observando tam ægrorum incolumitati quam propriæ ac suæ famæ consulerent medici ac chirurgi, haud dictu difficile erit.

Toto salivationis tempore fauces lacte & aquâ, mistis, tepefactis, seu jusculo avenaceo non salito quam sæpissime laventur.

Quum glandulæ gutturales adeo intumuerint, ut deglutitionis functio exinde incommodetur; vel eâ versecetur, dummodo tumor sit phlegmonodes; vel cathartica exhibenda, si tamen sit œdematodes; quia mygdalæ cæteræque pharyngis glandulæ, in immersum tumefactæ necnon humoribus nimio plus oppletis his de causis extemplò detumescunt; neque ptyalissimum cursum eò secius tenebit secundum.

Victus inter salivæ fluxum sit jusculum pullinum, vitulinum, ovinum, panatella, possetala, ova ac cætera cuncta forbilia; quamprimum autem dentes conferere valent, carnes teneriores pullorum, vitulorum, aliaque comedant: Tempestate brumali lecto per omne tempus affigantur, quo salivatio duraverit; æstivâ autem, igni assideant.

Nonnulli mercurii præcipitati albi grana quatuor in pilulam conficiunt, eamque aliquandiu, per horam scilicet unam vel alteram, sub linguâ detinendo ac circumvolutando, ptyalismum aliquantisper exinde cieri affirmant; qui morbo graviore tamen certe accommodari nequit.

Quantum ad *masticatoria* seu *apophlegmatismos*, quando salivam, perinde ut masticantur, etiam pro vi suâ irritativâ, proliciunt, ita anginis pituitosis subsidio propterea sunt, quod cum humores id genus in glandulis istius loci passim coacerventur; totidem patent glandularum portæ, quot sat erunt, ut à quovis apophlegmatismo manducato tanta effluat saliva, quantâ opus fuerit ad tumoris œdematodew; istiusmodi subsidentiam: Atque etiam apoplecticis succurrunt, propterea, quod (cum oris glandulæ materiam in se contentam seponant) quantum istius ejicitur, tantum, nec amplius, à vasorum plenitudine detrahatur: Quocirca quoties sive *humores, propter plethoram genuinam vel notham*, redundare advertuntur, uti coryzâ, uvulâ laxatâ, cephalalgiis, epilepsiis, linguæ paralyfi, odontalgiis, surditate, odoratu abolito, cæcitate, ranulâ facieive pustulis afflictis solenne est, seu quoties *saliva paulo copiosior est vel salibus nimium aculeatis* imprægnatur, uti lue vel scorbuto laborantibus communiter evenire solet; toties apophlegmatismi, universalibus præmissis, ejusmodi incommodis opem ferent.

Remedia autem hæc non semper tantoperè profunt, quin aliquoties etiam temerè usurpata mala quamplurima vel accersere vel intendere observentur: Hinc est, quòd faucium ulceribus nocumento sint, quippe quæ humores jam ibidem depositos, præ nimio partis læsæ motu, ulterius illuc allicerent: Necnon catharrhis ferinis, ab humore acri, septicove ortis, phthificis, hæmop-

tyfi, atque hecticæ feбри damnum inferre solent, quoniam humores aliò evocandos, huc suspiciose sollicitant: Macilentis ideo obsunt, quia hujusmodi inanitiones posteriores haud impunè ferunt, quandoquidem hoc usu receptum est, sputatores, nimirum, qui salivam abundè nimis expuunt, phthificos ut plurimum fieri. Asthmaticis idcirco fraudi sunt, quod cum humores copiosius aliquanto non ad os solum, verum ad laryngem etiam, proin ad pulmones ipsos pelliciant; ij aliquoties exinde inflammationes patiuntur graves; quinimo hinc fit, ut anginæ veræ adeo non profunt, ut eam multo magis irritant; utpote cum materia impacta, in istis locis, pertinaciter ibidem subsistat, nec in orbem posthac ritè volvi queat, quin quo major humorum copia ad partem affectam deinceps appellat, hoc eorum statio in horas securior fiat; ut tandem ij vel nimium, seu paulo magis, aucti, in posterum, omnino subsisterent; quæ omnia longe secus in anginâ notâ evenire solent; ubi saliva, præ masticatoriis, placidè atque imperturbatè perfluere observatur.

Quomodo ptyalismum vir egregius aliquando instituerit, parum nobis equidem refert; cum hic non tam petatur, quâ iste excitari poterit, quam quare illum omnino proritaverit.

CAP. VIII.

Errhina, Ptarmica, Sternutatoria.



Sem. Nigell. in Aceto macerat. pulv. ʒij.
Succi majoran. ʒvj. m. f. Errhinum.

R Fol. Betonic. Salv. Thym. Majoran. ana
pij. Rad. Pyrethr. ʒß. m. f. pulvis Errhinus.

R Sal Nitri ʒj. Fol. Tabac. ʒj. m. f. pulvis Errhinus.

R Vitriol. alb. ʒj. Aq. Betonic. ʒj. Majoran. ʒß. m. pro Errhino.

R Rad.

- ℞ Rad. Pyrethr. ʒj. Hellebor. alb. gr. xv. Sem. Nigell.
Staphid. agr. ana ʒß. m. f. Pulvis Ptarmicus. (*forte.*)
- ℞ Pulv. Rad. Irid. Florent. ʒij. Euphorb. Lilior. Con-
vall. ana ʒj. Ol. Caryoph. Chymic. gr̃. v. m. f. Pulv.
Sternutatorius. (*forte.*)
- ℞ Pulv. Fol. Nicotian. Majoran. Flor. Lilior. Convall.
ā ʒj. Rad. Helleb. alb. ʒj. Castor. ʒß. Ol. Majoran.
gr̃. v. m. f. Pulvis Sternutatorius. (*forte.*)
- ℞ Merc. dulc. (vel Turpet. mineral.) ʒß. Pulv. Gly-
cyrrhis. ʒj. m. f. Pulvis Ptarmicus. (*forte.*)

Ex Pharmacopœiâ Londinensi; nulla prorsus.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Balsamum apoplecti-
cum; Pulvis Sternutatorius.

Ex Fullerî Pharmacopœiâ. Errhinum Chymicum;
Errhinum detergens; Errhinum de Elaterio; Errhinum
de Euphorbio; Errhinum solidum; Errhinum è Suc-
cis; Errhinum Vitriolicum; Pulvis Sternutatorius.

S C H O L I A.

Parum equidem interest inter medicamenta Errhina
ac Sternutatoria (πλάσματα dicta) quandoquidem hæc
membranam narium pituitariam seu papillas ibidem
nervosas adeo titillent, ut exinde sternutemus; quòd
illa verò humores, extra sternutationem, omnino pro-
liciant; quamobrem, propter irritationis morem unum,
à se invicem dissidere percipiuntur.

Qua humores foris eliminare solent, eatenus phetho-
ras capitis particulares uspiam auferre comperiuntur;
hinc autem est, quòd ea morbis capitis pituitosis, imo vel
quibusvis inibi paulo pervicacioribus, cephalalgis ni-
mirum gravativis, catarrhis, cæcitati, surditati, oculo-
rum morbis à pituitâ oriundis, necnon morbis soporo-
sis opem sæpe tulisse exploratum habeamus; nam si-
quidem hisce in casibus adsit, ut plurimum, humorum
plus satis, qui partibus istis firmiter insederint, atque ita
dolores, oppressiones, humorum decubitus ac similia
introduxerint; idcirco fieri non potest, præmissis pri-
mùm universalibus, quin evacuatio deinde particularis

plenitudini istiusmodi sat idoneè accommodari reperitur. Febribus etiam lymphaticis plurimum ideo conferunt, quoniam cum coëctio hic parum eà attendatur; quia non tam putredo quam copia adesse observetur; quamobrem humoris quantitate sat amplà primo subductà, hæc febris deinceps fere confidet: at de hâc paulo prolixius infra loquemur.

Etiam si ptarmica errhinis quadantenus similia sint; quatenus, nempe, pari modo irritant; cum tamen non ex æquo hoc faciant, gradu solummodo à se invicem differre hic rursus affirmamus: Hinc autem fit, ut sternutamenta plurimum nobis utilia sint; quare siqui poly-po leviori, ac paulò laxiùs naribus adnascente, affligantur, pulvere quovis sternutatorio iste quam expeditissimè exinde excuti poterit; siquando abscessus sinum frontalem occupaverit, ex vi compressivâ partibus vicinis communicatâ materiam profilire cogent: partui difficili, fœtui mortuo, vel secundinis retentis idcirco præstò sunt, quod cum sternutando abdominis musculi maximè comprimantur; siquid in utero grandiusculum capiatur, id omne fortiter exinde propelli cernimus; huic sententiæ tam *Mercurialis S. 7. in Aphor. p. 781.* quam *Wedelius ac Dekkers,* cum aliis quamplurimis, uno consentiunt ore.

Errhina autem hæmorrhagiis, nasi ulceribus, anginis, oculis inflammatis, epilepsiis, vertiginibus, ac similibus morbis, à spirituum tumultu ortis, obesse comperiuntur; etiam aphthis haud conducunt; præterea herniis, hydropi, doloribus nephriticis, pulmonum morbis, ac gravidis etiam oculorum morbis siccis (*ex Hollerij observatione secundâ & libello proprio*) ac guttæ serenæ (*ex Hollerij obs. Chirurg. c. 1.*) noxam afferunt; quoniam hisce in morbis, succussus quivis, præcipue si corpus plethoricum sit, periculum minantur.

Fiunt tam ex salibus volatilibus (*ex Ftmullero*) quam ex mercurialibus (*ex Barbetio & Fullero*) ad morbos soporosos debellandos; quandoquidem enim ii plenitudine nituntur particulari, evacuatio per nares portiuunciam humorum eliminare poterit.

Vitriolum album cum aquâ quâvis cephalicâ commistum, à *Wedelio* in infantulis, qui, præ naribus mu-

co obturatis, vix spirare possunt, tanquam errhinum optimum laudatur.

Sternutatoria singultibus opem ideo ferunt, quia motum diaphragmati alteri morboſo adverſum communicant; coſtis fractis incommodare reperiuntur, quippe quæ partes, quæ quieſcere debent, nimium explicant: neque doloribus capitis venereis adſunt, utpote cum caput, humoribus jam nimium diſtentum, particulis aculeatis ultra ſufferciant. Summatim, ubi acriora ſunt ſternutatoria, rarò in uſum vocentur; ubi vehementiora, providendum eſt ne frigus inde ſuſcipiant ea uſurpantes; has cautelas tamen de mercurialibus præcipuè proferri volumus; demum manè præcipuè uſurpantur.

Sternutatoria quædam eâ gaudent acrimoniâ, quæ cathæretica audit; nam colcothar vitrioli præ fale ſuo cauſtico, tam vehementer irritat, ut meatum uſquam apertum eſcharâ occludat; hinc fit, ut iſtud hæmorrhagiis narium quam maximè, cæteris cunctis fruſtra inceptis, ſubſidio celerrimo venire novimus; notandum vero eſt; quod quoties pauxillum ejus, pennæ inditum, naribus inſufflamus, toties os aquâ impleamus, nequid pulveris, laryngi incumbentis, in ventriculum delabatur.

Corollarium.

Errhinon Cephalicum.

℞ Fol. Mari Syriaci, Majoranæ, Lilior. Conval. ana ʒj. Fol. Afari pulv. ʒij. m. f. pulvis pro Errhino, quo utatur ad libitum.

OBSERVATIONES.

Pulvis hicce quamplurimis morbis vel obviam ire vel prodeſſe obſervatur; quoties enim caput oculive pituitosis humoribus ſcaturire notantur, pulvere, hoc naribus inſufflato, materiæ iſtius portiuncula ſubtrahitur, ac pars aliquatenus ſublevatur; eſto, quenquam lethargo laborare, ubi cerebrum pituitæ copiâ obruitur; perindè ſpirituum generatio atque motus fluidorum progreſſivus,

greffivus, juxtà ab ejusdem quantitate atque lentore valdè intercipiuntur; quî enim pituita vapida spiritus, quibus vacat, cerebro suppeditare possit? Hinc autem elucescit, cur nervi cordis suppetiis adeò sibi necessariis privantur, ut vibratio ipsius, quâ sanguis in orbem pel- litur, admodum posthac elanguescat; quandoquidem enim fibrillæ extremæ muco valde obturantur, necnon uti quod à tergo insequitur, haud sat fortitèr in poste- rum propelli queat, humorum lentorum sarcina illic accumulatur; quæ cum sensorii emporio admodum ali- quoties incubuerit, ni maturius aliquantò stationi ipsius occurratur, morbus deinceps immedicabilis fiet. Eva- cuationibus autem pituitam educentibus iteratò ac a- bundè præmissis, Errhinon hujusmodi, pariter humores aliquâ ex parte exhauriendo ac, sensionem molestant nimirum inferendo, ægrotos expergefaciendo, lethar- gicis auxilio fere sunt.

Quendam sinûs frontalis ulcere cruciatum olim novi- mus, quod carunculas fungosas quâque septimanâ vel saltem quoque decimo quarto die jugiter extrusit; quas, cùm ad nares usque neque citiùs delapsæ fuissent, istos emungendo, quam facillimè foris ejecit; petimus ergo num errhina opus hujusmodi sat feliciter emetiri valuissent? dubio procul! Siquidem autem de sinûs frontalis ulcere verbis egimus, nonnulla de *Riverii* nec- non *Willisii* sententiis hæc de re incautè prolatis, me- morare liceat: *Riverius*, in centuriâ primâ, observa- tione autem tricesimâ septimâ, mercatoris, nomine *Fexon*, filiam capite doloris lethali afflictam nobis spe- ctandam præbet; ipsâ è vivis emigratâ, materia putris è naribus profiliit. *Willisius* in anatome cerebri, capi- te duodecim, dominam memorat nobilem, è cujus naribus, à cephalalgîâ gravi, serum flavum sat abundè profluxit; cadaveris cerebrum cultri anatomici auxilio perspectum, ventriculos eâdem materiâ flavâ plenos fuisse, indicium fecit; horum authorum uterque in hæc sententiâ conveniunt, quod, nimirum, humor iste, qui è naribus effluxit, à cerebri ventriculis emanaverit: Cum tamen *Lowerus* ab isto tempore rei huic tunc co- opertæ, detegendo nempe non potis fuisse ut quic- quid à cerebro ad palatum vel nares appellere potuerit, lucem

lucem jam clariorem aliquanto attulerit; serum hujusmodi igitur abundè effluens, non à cerebro quin aliunde promanâsse elucet: Quandoquidem vero liquamen hoc nusquam nisi in naribus vel sinu frontali hospitari potuerit; palam nobis fiet, hydatides in *sinu* positas, membranam nimio plus explicando dolori huic immaniori principium dedisse: quî autem fiebat, ut eodem momento cerebri ventriculi tali sarcinâ onerarentur; non aliâ sit de causâ, quam quòd hoc sit *argumentum propagationis*, seu incrementi causæ; non autem *sedis unica morbi*: Cum *sedes morbi*, ab effectibus partem aliquam indefinenter affligentibus, manifestò deprehendatur; *causa vero morborum* à sanguine, & spiritibus, à solidis, necnon à corporibus superfluis malè affectis quam optimè ac jugiter petatur; nam quoties sanguis quantitate, qualitate vel motu peccare advertitur; toties nutritio, calor, ac secretiones modo aliquo afficiuntur insolito; cum spiritus animales autem malè mutantur, tum vel motus organicus vel sensatio aliquatenus incommodantur; ubi vero solidæ partes aliquo læduntur morbo, ibi morbus iste incessanter affligit, nec unquam remediis cedere, saltem continuò revertere observatur. Quam demum superflua irrepperint corpora; ea dein aut ab introsumptis; proin ægri relatu; aut vermium aut calculorum signis quam evidentissime elucescunt: Siquidem vero longè extra oleas ferimur, inde ad explicationem errhinorum, unde expatiari cœpimus, nos denuo conferamus: Pulvis autem hic sternutatorius membranam pituitariam adeò percelleret, ut cystim perrumperet: atque materiâ putri, ferosâ, similive primum exclusâ, suffitus, ex cinnabari cum mastiche mistâ, humorem residuum deinde vel absorberet, vel dissiparet; ac tandem fibrillas læsas ita constringeret, ut citò posthac clauderentur: Remedia autem internè sumpta copiosius aliquanto sub idem exhibeantur tempus.

Inter sternutandum, fortiter expiramus; diaphragma ac viscera cuncta cum impetu sursum feruntur, ac abdomen juxta cartilaginem xyphoidem immane quantum intumescit; cæterum subter seû infra umbilicum ac in regione hypogastricâ tantum abdominis capacitas minuitur,

minuitur, quantum supra ampliata fuerit; hinc fit, ut uterus, quoties sternutamus, adeo comprimatur, ut quicquid intra se capiat, celerrimè prorumpat; quocirca pulveres hi tam partum faciunt quam fœtum mortuum vel secundinas diutius solito retentas sat valide disturbare observantur.

Febres, *catarrhales* nuncupatæ, sunt febris *anxiosa* exemplum ferme unicum; siquidem enim ad synocham imputrem ut plurimum spectare comperiantur, febris nomine per improprium solummodo gaudent; quippe quæ sanguinis excandescencia una potius sit quam febris, cum febris idea non effervescentiam modo, verum putredinem etiam subter se comprehendat; hæc autem ita materiæ putridæ paucillulo fruatur, ut ipsius juxta, atque vasorum plenitudinis causâ, propter pororum obturationem, ostendatur evacuatio: Quoties igitur particulæ noxiæ capiti uspiam incubuerint, remediis magis universis primum exhibitis pulveres hujusmodi ptarmici membranam narium pituitariam ita fodicabunt, ut particulæ cunctæ residuæ ac loco-mobilis per glandulas nasales facile posthac transmeare queant.

Quibusdam surditate conflictatis adeo pulveres sternutatorii tulerunt auxilium, ut humores, nervis vel tympano firmiter insidentes, atque eo nomine immobiles ferè censendi, exemplo isthinc migraverint; quo fiebat, ut solatio maximo exinde denuò potirentur istiusmodi.

Quemadmodum autem hydrographorum est tam scopulos quam portus indigitare; ita medicos perinde remedium nocumenta subjungere, quam eorum commoda notare oportet; quid igitur est quod ptarmica hæmorrhagiæ obsint, nisi quod energiâ suâ irritativâ vasa sat sanè ferruminata recludent? oculis inflammatis nocumento propterea sunt, quod cum ophthalmia humorum lentore fermè sata sit, illos paulò uberius illuc accersimus, nec foris tamen istos exhaurimus; hinc fit, ut in dies altius impellantur ii, ac plus plusque impervia deinceps evadunt vasa, tandemque diffiliunt, ita ut oculorum humores non possint non adeo perturbari ac situm suum ita mutare, ut visio in posterum vel non omnino

omnino vel parum recte peragatur: Quicquid de ophthalmiâ affati sumus, id etiam de inflammatione omni propinquâ sive anginâ sive peripneumoniâ, proloqui liceat; quandoquidem enim sternutando pulmones validius aliquanto contrahuntur, sanguis eâ ratione ocyus propellitur, ac cum impetu partes invisit inflammatas, easque magnoperè, humores ulterius accumulando, intendit; quippe cum hoc tritum sit, ut *organa inflammata, quo minus moventur, eo citius persanentur*, cæterum quando humorum acervus quotidie augefcit, nullo fieri pacto potest, quin ij ad partem concitatus aliquanto appellant, atque eam nimio plus stimulent. *Hollerium* igitur sat expedite jam capimus, cum in ptarmica in morbis oculorum invehat; quoniam oculi solum uliginosi; at inflammati non item, istis sublevantur; *Hildanus* autem ea in guttâ serenâ defamando nobis omni ex parte haud placet. Neque adhæc ozænæ auxilio sunt, quoniam uti stimulando humorum ap-
pulsus ultra sollicitant, ulceris labia latius hinc disjunguntur, ac unitio quam maximè exinde præpeditur.

Herniosis idcirco subsidio non sunt, quod cum à motu vel exercitio modico intestina adeo delapsa fuisse meminerimus, ut de laborantibus posthac actum fuerit; quid istis fiet, ubi muscoli abdominis tam validè comprimuntur, ut intestinis ipsismet locus non præbeatur ita competens, quin foris è foramine in scrotum profiliant?

C A P. IX.

P E S S A R I A.



Gum. Galban. Elect. Ammon. ana ʒvj.
Camphor. ʒj. cum Vini q. f. f. Massa
mollis cui imprimantur Pulv. Rad. Hel-
leb. nig. ʒij. Pyrethr. ʒj. M. cum Ol.
Succin. q. f. m. f. Pess.

℞ Gum. Ammon. Opoponac. ana ʒiʒ. Ellebor. n. sta-
phid. agr. Aristoloch. long. Colocynth. ana ʒiʒ.
Scammon. ʒj. Fell. Taur. q. f. f. Pessus lanæ invo-
lutus, syndoni insuendus & intrudendus.

℞ Myrrh. Pulv. ʒj. M. P. Coch. min. ʒj. Ol. Succin.
q. f. m. f. Pessus.

℞ Spec. Hier. Picr. comp. Benedict. Laxativ. ana ʒj.
Mell. q. f. m. f. Pessaria.

℞ Pulv. Rad. Helleb. n. ʒʒ. fol. Perficar. Maculos. ʒʒ.
Gum. Tragac. in Vin. alb. infus. q. f. m. f. Pes-
sarium.

℞ Rad. Asar. Agaric. ana ʒij. Myrrh. fol. Rut. Sicc. ma-
jor. Sicc. ana ʒj. Sem. Pæon. ʒʒ. Gall. Moschat. ʒij.
contundantur, excipiantur in Melle Anthosato, ad-
dendo Fell. Porci ad ʒj. m. f. Pessaria.

℞ Fol. Meliss. ʒj. Spic. Nard. ʒʒ. Caryoph. ʒiʒ. Nuc.
Cupress. ʒij. Mosch. ʒʒ. Styrac. liquid. ʒj. Tereb. (in
ovi vitello solut.) parum m. f. Pessarium.

℞ Myrrh. Thur. ana ʒj. Caryoph. Cinnam. Meliss. ana
ʒʒ. Xylo. Aloes ʒj. Storac. calamint. ʒvj. Styrac. li-
quid. ʒiij. Mithridat. q. f. m. f. Pessaria.

℞ Fell. Bov. ʒj. Rad. Asar. Agaric. ana ʒj. Cinnam. ʒiʒ.
Succ. Mercurialis ʒj. coq. cum Mellis pauxillo, reli-
quisque permittis, fiat instar unguenti ad Sacculos
implendos.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri; Pessaria. Raphani radix
sectus.

SCHOLIA.

SCHOLIA.


Pessaria irritantia perinde inter evacuantium classem quam purgantia vel alia quævis locari debent; quandoquidem ea juxta vellicant atque humorem è vaginæ lacunis exhauriunt.

Hæc notatu digna sunt; providendum est, ne frequentius in usum vocentur, ex eo quod vaginam exulcerarent; per noctis spatium solummodo retineantur; nuptis *Pessaria*, virginibus autem *Nasalia* adhibeantur.

CAP. X.

Scabra, Sinapismi, Psilothra, Detersiva, Vesicatoria, Caustica, (Pyrotica.)

SCABRA.

 Sem. Sesel. ʒβ. Fœnic. ʒij. Sacch. Cand. ʒij. Off. Sepiæ ʒj. Aloes Succotrini Troch. alb. Rhas. Tutia pp. ana ʒj. Sal. Armoniac. gr. x. m. f. pulvis oculo insufflandus.

℞ Vitriol. alb. ʒβ. Sal Nitri ʒβ. Aq. Rosar. ʒv. m. f. Collyrium.

℞ Aq. Chelidon. ʒj. Fœnic. ʒβ. Croc. Metallor. (vel Vit. Antim.) ʒβ. Nitri gr. v. macerentur, filtrentur, f. Collyrium.

℞ Aq. Fœnic. Rut. ana ʒij. Euphrag. Ros. alb. ana ʒiij. Vitriol. alb. gr. v. virid. æris gr. ij. m. f. Collyrium per Mensem unum vel alterum usurpandum.

℞ Sacch. Cand. Marg. pp. ana p. æ. & q. s. m. f. pulvis oculo insufflandus.

℞ Aq. Rosar. ʒj. Sacch. Cand. ʒj. Croc. Metallor. pulv. ʒβ. m. f. Collyrium.

℞ Aq. Calcis ʒj. Mercur. præc. alb. ʒj. m. pro Collyrio.

℞ Aq. Rosar. ʒij. Fœnic. ʒj. Mercur. sublimat. gr. v. m. f. Collyrium.

f. Collyrium ad gr^{ss}. j. vel ii. mane & vespere, in ungue, oculo instillandum.

℞ Pumic. ignit. ter vino albo extinct. & relict. donec refrigescat; trit. & lot. f. *pulvis dentifricius*.

℞ Origan. cum Vitriolo & Melle, m. f. linimentum dentifricium.

℞ Corn. Cerv. Calcinat. ℥j. spong. ust. ℥j. m. f. Pulvis Hyperfarcoticus.

℞ Farin. Puleg. Cyperi calcinat. ana ℥i℥. Putam. ovor. cochlear. ust. ana ℥ij. m. f. pulvis pro gingivis sanguinolentis.

℞ Merc. Rub. præc. ℥j. Lap. Calamin. ℥ij. Vitriol. Calcinat. ℥℥. Emplastr. Diacalcit. ℥j. m. liquefiat, & candelâ cerea eo immergatur, *pro Caruncula Penis*.

SINAPIS MI.

℞ Sem. Sinap. Contus. ℥℥. Cepar. No. j. Acet. ℥℥. Oxymel. Scillitic. ℥j℥. m. f. *Phœnigmus*.

℞ Euphorb. ℥ij. Ferment. acerrim. ℥vij. Alij. ℥℥. m. f. *Phœnigmus*.

℞ Pulv. Sem. Sinap. ℥j. Pulv. Rad. Pyrethr. ℥ij. Mell. ℥ij. Acet. q. f. m. f. *Sinapismus*.

℞ Sem. Sinap. ℥ij. Sapon. Nig. Ferment. acerr. ana ℥ij. Acet. q. f. m. f. *Sinapismus*.

PSILOTHRA.

℞ Rusmat. Turcic. Calc. viv. ana p. æ. m. admoveatur mucilago hujus misturæ partibus pilosis.

℞ Auripigmenti ℥j. Pulv. Pyrij. ℥℥. Calc. viv. ℥ij. coqr. in dimidiâ mensurâ lixivij, in ollâ vitreatâ, donec ususui accommodetur; quod scietis, cum penna eo oblinita facile plumas dimittat in manum.

℞ Resin. Laryc. ℥ij. Mastich. subtiliss. trit. ℥℥. liquefiant super ignem, dein effundantur in aquam frigidam, f. *Dropax* parti pilosæ admovendus & ubi adhæserit avellendus.

DETERSIVA.

℞ Aq. Phagædenic. (ex Aq. Calc. cum Mercurio sublimato mistâ) q. f. parti ulceratæ admoveatur.

℞ Alum.

- & Alum. crud. virid. Æris ana ʒij. Coq^r. in vino ʒxviij. f. decoctum admoventum.
- & Vitriol. alb. ʒij. Alumin. Ærugin. Æris ana ʒij. Acet. fort. ʒij. Acetum mist. evap^r. tum calcinentur f. pulvis, cui addatur unguent. Ægyptiac. q. f. m. f. unguentum.
- & Alum. usti ʒj. Ung. Basilic. q. f. m. f. Unguentum.
- & Mercur. præcip. rub. ʒß. Unguent. Basilic. compos. q. f. m. f. Unguentum.
- & Ægyptiac. seu Apostolor. q. f.
- & Refin. ʒß. Cinnab. nativ. ʒij. Ærugin. ʒiß. m. super ignem, f. Emplastrum pro *Clavis Pedum*.

VESICATORIA.

- & Cantharid. abject. pedib. & capit. ʒj. Ferment. acerrim. ʒß. Mell. ʒij. m. f. Cataplasma.
- & Euphorb. ʒj. Sem. Sinap. ʒij. Cantharid. ʒj. Ferment. acris ʒß. q. f. m. f. Emplastrum.
- & Pulv. Cantharid. absciss. pedibus & alis ʒß. Sem. Ammeos. ʒj. Ferment. ʒß. Caricar. ping. No. j. Acet. q. f. m. f. Cataplasma.
- & Emp. Diachyl. ʒj. Euphorb. ʒj. Cantharid. pulv. ʒj. m. f. Emplastrum.

CAUSTICA.

- & Butyr. Antimon. Ol. Vitriol. Aq. fort. Residuum ex Lixivio Saponis; Lap. infernal. lunar. vel vener.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi; SCABRA, Trochisci albi Rhasis, Sief de Plumbo, Sief de Thure, Tutia præparata, Lapis Calaminaris præparatus; *DETERSIVA*, Unguenta, Ægyptiacum, Apostolorum, Agrippæ, Amarum, Aregon, de Artanitâ, de Bdellio, è Nicotianâ, è Succis aperitivis; *VESICATORIA*, Emplastrum Epispasticum, Vesicatorium (in appendice); *CAUSTICA*, Lapis infernalis seu septicus.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ; SCABRA, Aqua Camphorata, Ophthalmica, Ophthalmica Sapphirina; Vitriolum Camphoratum, Unguentum Ophthalmicum;

PSILOTHRA, Unguentum Depilatorium; *DE-TERSIVA*, Aqua aluminosa, Vulneraria; Balsamum Martiale, Sclopetarium; Mercurius præcipitatus omnis, Mercurius Sublimatus; Pulvis Sympatheticus; Tinctura Myrrhæ, Proprietatis; Unguentum fuscum; *CAUSTICA*, Pulvis sine pari, Unguentum herpeticum.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri; *SCABRA* nulla neque collyria ulla pro oculis; *SINAPISMI*, p. m. 306. Edition. 5 Sinapismus; *PHOENIGMUS* Epithema de Calce; *PSILOTHRA*, nulla; *DETERSIVA*, Gargarisma myrrhisatum 1 & 2. Gargarisma de Pyrethro; *VESICATORIA*, Emplastrum Epispasticum; *CAUSTICA*, nulla.

SCHOLIA.

Cum cuncta remedia, in hoc capitulo memorata, sint propemodum caustica, gradu solummodo à se dissidentia; idcirco de iis omnibus hic simul disceptandum censemus.

Quantum ad remedia *Scabra* seu *Testacea*, sintne proprie caustica, animi, nec immerito, adhuc dum pendemus; quoniam autem tam figurâ gaudent angulari quam duritiem possident, excrescentias quasdam partium ac organorum delicatulorum, oculorum nempe, paulò teneriores sensim ac paulatim abradunt; quocirca non aliâ de causâ caustica censentur, quam quod affricu continuo à scabritie eorum orto, substantiam hanc membranofam atterunt ac defricant: Hinc etiam est, quod *dentifricia* habeantur; quoniam materiam quamvis tartaream, quæ *Lithodonton*, seu tophi, nuncupatur, valde deterunt: Fungos demum, ulcerum cacoëthæ^{orum} prolem efficaciter, si tamen paulo acriora etiam sint, exedunt; hinc fit, ut gingivæ, quæ ideo sanguinem expuunt, quia vasorum ora, præ fungosâ carne, patent, ejusmodi scabris multum adjuvantur; ex eo quod fungi à pulveribus his ita exeduntur, ut posthac styptica rem expedite absolvant.

Inter evacuantium censum *Sinapismos* seu *Phænigmos* disposuimus, non quod reapse evacuant, sed quia irritando

tando sanguinem superficiem versus pelliciunt, necnon sæpiusculè admoti vesicas jugiter excitare solent; quamobrem à nobis haud immeritò inter evacuantia locantur.

In arthritide anomalâ idcirco adhibentur, quod stimulando ac vellicando, humorum, regimine quovis malè instituto retroactorum, cursum ad partes stativas denuò accersant; hinc est, quod, malleolis admoti, arthritidis pedes digitos solito morè actutum revifat: Nec arthritidi uni, verum cuivis etiam tumori critico, vel retrocedenti vel haud satis prominenti, subsidio veniunt sinapismi; quippe qui humorum affluxum eò uberio-rem ad locum quemvis provocant, quò stimulatio gravior sensûs principio accommodatur.

Quod ad cautelas inter eorum usum adhibendas; observandum est, quod sinapismi neutiquam diutiùs cuticulæ adhærescant, quam ubi ruborem (quocirca *Rubifcancia* etiam appellantur) parti impertiverint; nec, vel eis amotis, rubor iste omninò dispereat: Quàm calidi parti admoveantur, quæ, utprimum refrixerint amoveantur; tum alii usque eò adhibeantur, dum rubor ac tumor permanens adfuerint: His spei nostræ non respondentibus, epispastica cum fructu admota novimus, utpote quæ non humores solum ad partes invitaverint, verum istos etiam adeò exhauserint, ut in posterum sanguinis particulæ noxiæ, foris derivarentur.

Ad *Psilothra* (a *ψιλόω* nudo) seu *Depilatoria*, quæ pilos defluere cogunt; cum ea apud septentrionales parum sint in usu, illa *prolixius* illustrare in præsentī nobis non est animus; quandoquidem capilli seu crines hîc novaculâ solâ auferri soleant; quoniam tamen verendorum, muliebrium præcipuè, pili, propter sudores profusos vel pediculos inguinales, cancrinos dictos, aliquoties molestiam quamplurimis aliqualem afferunt, necnon pungendo vel angendo admodum discruciant; nec hortando novaculam usurpabunt, psilothra istiusmodi opem suppeditabunt, ubi cætera frustra imprimis adhibuerunt.

Toties remedia *Detersiva* ulceribus adhibenda sunt, quotiescunque adsunt hyperfarcosis; seu callositas; nam

quî fieri potest, ut caro, quæ luxuriat, sanari poterit, cum sit porosa, cellularis, malè colorata, spongiosa, ac uvida nimis, cum è contrario, necesse est, sit firma, fibrosa, vivida, nec humore sanioso, quin pure laudabili scatescat? simili fere modo, quî fiet, ut callositas, quæ labiorum seu sinuum scirrhostas quædam est, mollibus prius tollatur, quam durities ista cultro vel deterfivis imminuatur? his symptomatis autem, deterfivis semel everfis, balsamicis deinde digestivis, sarcoticis, ac epuloticis ritè usurpatis, ulceri finis aderit; nimirum, dum ulceris labia humorem ubertim effundunt, eò usque balsamica admovenda sunt; sarcotica non sunt prius usque adhibenda, quam quoad saniei seu puris copia minuatur; quo demum plurimum cessante, necnon cum labia rubra sint, ac detumescat ulcus undequaque; tum epulotica denique sunt applicanda.

De *Epispasticis*, ex *Bartoleto*, phrenitidi febrium statui comitanti propterea præsto sunt; quod humoribus magnâ ex parte coctis emissario sint, quodque istorum affluxum ulteriorem, tantâ in copiâ ad cerebrum usque adeo propediant, ut non modò suppetias præciant, verum istas etiam proficuè aliorum derivent; multoties autem admota novimus, cum maximam delirantibus attulerint noxam; quamobrem ut usus eorum in deliriis indistinctus in posterum præcludatur; quæsumus, ut quæ infra dicturi sumus, auribus non averfis accipiantur: Phrenitis autem in furiosam ac comatosam ritè bifecatur; ambo deliriis, desipientiâ, ac sermone inconcinno nunquam non stipantur; in hac tamen sanguis particulis serosis aliisve inactivis scatet, cum in illâ biliosis atque activis principiis adeo redundet, ut immane quantum evehatur ebullitio; quando igitur in *Phrenitide furiosâ*, sanguis paulo rapidius adeò circumagi solet, ut rarefientiæ seu motui ipsius quicquid superinjungere imperitorum esset, cum inde vasorum rixin, ac proinde hæmorrhagias funestas, periclitaremur; epispastica tum admovere, mala hæc vel similia certo ferè certius ægrotis impenderent: In *Phrenitide* autem *Comatosâ*, ubi typhomania, seu stupor cum delirio adest, calor juxta, atque pulsus in omnibus mediocritatem tenent; pulsus enim spatium, non multò latius; ictus paulo

paulò fortior, durior, vel celerior; nec intervallum multò frequentius solito sunt; calor autem potius infra quam supra stateram est; cum res ita se habeant, epispastica pro symptomatum ratione ac violentiâ adhibenda, quinimo reiteranda sunt; quippe quæ motum sanguinis tam progressivum quam intestinum rursus invigilant ac instaurant; ex quo fit, ut particulæ noxiæ, cerebro vel insidentes vel jam incubituræ, efficacitè excutiantur ac avocentur ac tandem foris amendantur; Ita authores primi subsellij continuò hætenus senserunt; nimirum, ubi *torpidi, veternosi, leipyrici* sunt ægrotantes, ea jugiter admoventi jubent.

Tussibus item humidis epispastica magno idcirco sunt commodo, quod perinde irritationem adeò prosperè conficiant, ut ex inani tussendi conatu pituita Bronchiis firmiter adnascens, tandem feliciter expuatur, quam humores ad extrema, pelliciant; hinc fit, ut tam humores pulmonibus influi quam ibidem defixi, vel anticipentur vel eliminentur. Hincque est, quod quoties in pleuritide expectoratio parum ex voto succedat, ita ut vel nequaquam pus omnino, vel in minori, quam par est, quantitate expuatur, eximius *Baglivius* suris utrisque epispastica admoventi jubeat; nec immeritò; hæc etiam nosmet ipsi cum eventu sælici in famulo nobilissimi. Baronis de *Blankney* olim admovimus; hic enim ex aëris injuriâ in pneumo-pleuritidem inciderat; morbi vero inscius, saltem reconvalescentiæ securus nimis, foras prodeambulat, nec pectoralia neque V. Sm adhibuerat; quid tandem fit? Puris expuitio primum minuitur, ac deinde in totum cessat; adeo ut metus erat ne, secundum Hippocratis sententiam empyicus moreretur, *Aphor. 8. Sect. 5. (a) Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecem diebus, his in suppurationem convertitur*; a pilulis è fuligine, salibus valatilibus ac balsamicis conflatis; decocto pectorali cum oxymelite scillitico misto perquam calidè devorato; ac tandem epispasticis acribus, suris internis, admotis; ex im-

(a) 'Οκόσοι πλωρητικὸι γενόμενοι ὅτε ἀνακαθαίρουσι ἐν τρισκαίδεκα ἡμέρῃσι, τότε οἱσιν ἐς ἐμπύημα μετέτασσιν.

provisio pristinam recollegit valetudinem; ut qui hesternò adeo anhelus fuerat, ut è vestigio, ab astantibus de vitâ migraturus haberetur; cùm die vero proximè insequente pus cum sanguine, ubertim excreverit, ac respiratione liberiori exinde factâ; ita quotidie melius se habuit, ut illum è fati faucibus emeruisse ac ab inferis revocatum fuisse videretur.

Morbis pituitosis ac frigidis, cujusmodi sunt comata, lethargi, apoplexiæ, quinimo subinde convulsiones, ideo auxilio veniunt epispastica; quoniam cum humorum istorum cataclysmus seu diluvium, quibuscumq; ipse perquam opprimuntur, sit omni ex parte seu pituitosum seu serosum, atque adeò vel exudare vel subsistere ubique proclive sit, idcirco epispastica, quando proritant impensius aliquanto, perinde motum fibræ oscillatorium, quo sanguis circumpellitur, impertiant, atque vitiosos humores foris eliciunt, atque hunc in modum morbos hos vel minuunt, vel illis finem statuunt.

Nulli dubitamus, quin solertissimorum virorum Bellini ac Baglivi libros de *stimulis* quisque in medicinâ vel parum versatus, pervolverit; quocirca epispasticorum commoda summatim ex iis recenserebimus; sunt igitur utilia, *ubi solida partes stimulanda sunt; ubi fluida agitata; circuitus circumpellendus; liquida exprimenda; quantitas minuenda; spiritus agitandi; sanguis attenuandus; coagulationes solvenda; ac revulsiones seu derivationes tandem peragenda sunt*: Siquidem enim ex particulis volatilibus, aliquâ ex parte septicis, ac fibras superficiei proximas exedentibus, consistunt; fieri non potest, quin particulas fluidis activas tum adjiciant, cum cuticulam in vesicas attollant; hinc palam sit, quare morbis indolis frigidaë adeò ferè conducunt.

Catharticis, V. Sæc atque aliis multis frustra extrinsecus, attentatis aut admotis in dolore fixo; epispastica tandem illum quam efficacissime abstulisse novimus.

De epispasticorum commodis hæcenus sat abundè tractavimus; propè adest, quum noxas eorum etiam enumerare oporteat; quoties ideò in urinâ vel ardor vel incontinentia adsunt, eorum admotioni prorsus interdicens est; utpote quæ, salibus sanguinis acribus, acriora longè apponerent; hinc autem fieret, ut

vesicæ

vesicæ inflammationes vel ulcera, quibus epispastica quam maxime nocent, inde initium, præ fibris irritatis, imo vel erosio, sumerent.

Sanguinis fluxus multum ab epispasticis admotis ferè intenduntur; quocirca ubi febres adsunt, cum hæmorrhagiis comitatæ, cautè admodum procedamus; nec ea, ni quam evidentissimè indicentur, hoc in casu admoveamus unquam; ac interea prospiciendum est, ut eodem, quoque momento remedia intus exhibeantur, quæ hæmorrhagias reprimere queant: hinc autem est, quod non admoveantur omnino, ubi fluxus mensium immodicus fuerit, nec etiam in gravidis, nisi perspicuè admodum ostendantur.

Tumoribus maturaturis vel iis, qui suppurari debent, tales sunt *bubones*, haud admoventur; quoniam humores magis tenues evacuando, lentiores ac glutinosiores, ità coerciti, intus latent, qui in posterum vel cancro vel scirrho exquisito seu vero viam facilem sternent.

Quoniam in *Causis* seu febribus ardentibus salia sanguini volatilia fermè præsidet, perinde pulsus igitur magnus ac fortis, atque calor immodicus erunt; hujusmodi autem ægrotis haud competere possunt epispastica, quippe quæ spatium pulsûs magis ampliarent, nec non sanguinis fervorem ac motum intestinum quam maximè intenderent, adeo ut phrenitides, inflammationes, atq; morbi multifarii certissimè ponè subirent.

Physicus ille perinde insignissimus atque nobilissimus *Robertus Boyle*, de visu vitiato epispastica immodicè ac iterato admota cæcitatem cuidam olim intulisse affirmat; nam, uti suprà, vobis demonstravimus, quòd diuretica, serum nimium amandando, sanguinis lentorem introducant, ac ita mensium periodo regulari obicem ponant; sic, cum epispastica evidenter ac copiose serum ac deinde pus foris eliciant, sanguis eò magis necessariò lentescere, quò magis sero suo privari, solet; quò fit, ut succus, nervosus dictus, ne secerni quidem possit; nedum idcirco visionis functionem ritè peragere valeat.

Quandoquidem evacuationes magis universæ ac generales, specialibus seu individuis continuò præire debeant,

beant, quoniam alioquin humores eà ubertim ruentes, partem, unde sensus afficitur, adeò suffercirent, ut mala quamplurima indè exordium caperent; quâ de causâ, nec partibus inflammatione afflictis, neque magis delicatis, neque tendinibus, neque articulis ipsis admoventur unquam; quippe quæ humorum affluxum partes, ad quæ eos haudquaquam impune ferunt, inconsultò laceffunt: hinc autem inferre licet, epispastica abdomini œdematoso vel ascitico admota, nequaquam istiusmodi omnino prodesse, quinimo plurimum obesse; quia huic emolumento non erit, cum nihil stagni, exindè eliminetur; nec isti ex usu erit, quoniam serum viscidius exinde solum eliciendo, crura etiamnum, pars magis pendens, œdematosa permanent.

Occo salium vesicantium, exemplo ferè inaudito, acutiem probat; cum miſtum sanguineum, cantharidas in perâ gestando, pone subiisse asseruerit. Eximius vir *Groënveldt* in tractatulo cui titulus *de tuto & interno usu cantharidum* exhibet cantharidum ficcatarum & tantum non crematarum grana 6 pro dosi unicâ, quartâ quaque horâ usque quoad dolor in mingendo increbrescat, ac urina copiose fluere cœperit; tum manum sistit; tempore intermedio emulsiones propinandas exhibet; ad vesicæ ulcus detergendum aliquo confecto, testacea ac glutinantia tandem foeliciter exhibet.

Siquidem *Andreas Schmitzius* cineres vitis ad ichoris fluxum, ab emplastro epispastico excitatum, perennandum deprædicet; quidni & *vesicatorium perpetuum* vel ex pulvere cantharidum secundum *Chefneau*, vel potius ex eis infusis conficere liceat; uti inter præscripta in libro nostro, cui titulus, *CRITICON FEBRIUM*, olim delineavimus: Unguentum hujusmodi humores diutine ac efficaciter usque eliciet, dum voluerint medici; hoc autem artificio perquam facili morbis quamplurimis, quibus evacuatio id genus lenis ac perennis convenire poterit, manus auxiliares porrigimus: *Henricus ab Heers* vesicandi modum etiam peculiarem memorat, hisce, nempe verbis, p. 187. *observ. medic.* “ Vesicis capitis
“ non amplius fluentibus novas in nuchâ & viciniâ,
“ sed *solis cucurbitis* excito; quod quando meum in-
“ ventum

ventum est, neque quod sciam, ante me cuiquam
 usitatum, libenter vobis communico. Capiō lati oris
 cucurbitam vitream, aut vitrum humilius, quo mo-
 sellanica aut rhenana vina sorbemus, illis stuppa ar-
 dente, ut sit, munitis, ubi libet applico; cum per
 horæ quadrantem hæserunt, detraho, novamque cum
 flammâ, quam possum maximâ, stuppam adpono,
 paulo post in junioribus & eufarcis, (in senibus aut
 densâ cute præditis tardius) vesiculæ surgunt, par-
 varum acicularum capitella vix æquantes; quibus
 omnibus horæ spatio cœeuntibus, surgit vesica maxi-
 ma, & orificio cucurbitæ aut vitri par vel major:
 Tum si vas vitreum, quorum multa huic usui paravi,
 non habet foramen cerâ obductum quo acu perforato,
 flatu exeunte sponte suâ cadit, plerumque vitrum
 cultro percussum frango, alioquin vesicam dum ma-
 nu avellitur lacerans, dolorem sævum excitat. Hinc
 eductâ semper magna aquæ copia, esurialibus diebus
 folia, extra quadragesimæ tempus, macram muscoli
 bovini carnem adligo, tamdiu dum illa virore & fœ-
 tore amovendam se indicet. Hoc modo innoxie &
 intra horarium spatium, certò certius surgunt vesti-
 cæ, cum omnia alia vesicantia, post multas horas
 sæpe spem nostram eludant, morbumque vel pro-
 crastinent, vel contumacem autem, etiam invictum,
 reddant.

Tandem ut finem de epispasticis dicendi faciamus, à
 sinapismis pro irritationis more seu gradu solummodo
 discrepare asserimus.

CAUSTICA, sunt medicamenta inter irritantium
 individua longè omnium potentissima; quæ non ex aci-
 cidis solum, verum ex alcalinis, impense acribus, etiam
 conflantur; inde autem est, quod non cuticulam tantum,
 sed cutim porro, quinimo musculos ac membranas ad
 os usque exurant; cum pharmacum tamen causticum
 sit omnium topicorum extrinsecus admovendorum no-
 vissimum; brevi eorum perinde commoda, quam nox-
 as vobis enumerabimus. Cauterium in *actuale*, ubi in-
 strumenta ferrea ignita cuti admoventur; necnon *po-
 tentiale*, ubi medicamenta acria valdè adhibentur, ritè
 bifecatur. *Actuale Dekkers* in cæcitate elogiis profe-
 quitur;

quitur; ferrum ignitum super futuram coronalem depangit, eoque tamdiu os exurit, dum ad diploen usque pertigerit; os ita ustum aliquandiu apertum propterea permaneat, quod humores noxii ibidem passim defixi foris eliciantur: Dolorem etiam ischiadicum paulo contumaciorem cauterio actuali ad os femoris usque protruso sublatum memorat; quem etiam olim à patris præscripto, cum honore colendi, persanatum in rustico quodam meminimus: *Ettmullerus* cauterium etiam actuale, parti, unde coeperint convulsiones, admovere præcipit; quâ verò de causâ morbi hi caustico cedere reperiuntur, vos hac de re jam certiores facere oportet; quoties, nempe, humores, qui morbis hisce ansam præbuerint, adeò partibus incubuerint, ut sint immobiles, neque per remedia usitata partes istis expedire valuerimus; cauteriis admotis ac altius aliquanto protrusis, ad humoris nimirum sedem; iste è vestigio exhauritur; causâ autem proximâ tam citò amotâ, dolores, convulsiones, necnon symptomata cujuscvis generis, in oculi ictu, mirum in modum ideo disparent, quia humor extra vasa effusus, qui stimulationi huic principium dedit, foris amandatur; ac tamdiu fluxus istius incitari debet, dum medicamentis introsumptis sanguis in statum meliorem provehi poterit, vel dum vasculum ruptum humorem istum expuens internis ac externis rursus ferminari poterit, vel humoris influi copia dempta fuerit: Causticum actuale ossibus cariosis ac nudatis ideo admovetur, quia humiditatem absumendo, ista lamellatim vel assulatim deinceps excidunt. Idcirco *Gangranis* perutilia sunt, quod carnem sanam ab insana sejungant; partem autem mortuam cauterio circumcingunt, ne ulterius serpat; ulceribus *callosis* ideo admoventur, quia callositatem, quæ deterfivis non cesserit, abradunt; inde est, quod *trochisci vigonis*, ex mercurio sublimato ac pane triticeo conflati, ad horas aliquot in ulceris sinum intrudantur; callositate autem hunc in modum exesâ, ulcus digestivis, sarcoticis ac epuloticis deinceps facile persanari poterit; hinc est, quod ulceribus fistulosis seu sinuosis quam maximè conducere reperiantur: *Bubonibus* seu pestilentibus seu venereis propterea opem ferunt, quod cute paulò latius exesâ

pus contentum confestim exiliat: *Nodis* ideo subsidio veniunt, quia cysti exinde absumptâ, fit ulcus exemplo digestivis cedens: *Verrucas* æque ab eis atque à cultro expeditè auferimus, quinimo cùm verrucarum radiculæ altius aliquanto cuti infederint, si minus ocyus at efficacius ab eis quam à cultro tolluntur. *Hæmorrhagiis* ideo opem suppeditant, quia vasa aperta vi suâ septicâ corrugant, ac crispant, atque adeo indurant, ut ni sanguinis pondus seu momentum paulo majus sit, vasis parietes prope partem crispatam coalescant, ac ita effusio posthac ulterior intercipiatur: Notandum autem est, quod prius vasa humoribus expediantur, quam cauteria admoveantur; quoniam irritatio paulo validior humorum influxum sat ubertim alioquin accersiret, adeò ut tandem inflammationes, gangrænæ, aliave mala regimini hujusmodi perperam instituto actutum succrescerent. *Fontanellas* caustico frequenter excitare præcipimus; quoniam perinde humorum affluxum parti exesæ incitamus, atque uberiores eorum effluxum ulceris labiis accersimus; hinc est, quod uno eodemque artificio juxtâ revellimus seu derivamus atque evacuamus: Siquidem vero de setaceis ac fontanellis infra sermonem habituri sumus, gressum hic paulisper comprimamus.

Causticorum eventus foelices hætenus perpendimus; jam reliquum est, ut nocumenta eorum paululum trutinemus: Caustica igitur nequaquam admoveamus omnino, nisi quum ratio quam evidentissimè ista exigat: Corporis autem partes nonnullæ ita parum eorum adhibitionem tolerant, ut neutiquam istis applicari queant; cujusmodi sunt articuli, partes nervosæ seu tendinosæ, venæ, arteriæ, organa delicata v. g. oculus &c. partes inflammatae, canceri ulcerati, intestinum rectum; uti etiam hæmorrhoidibus, tumoribus calidis, vel infantibus raro aut nunquam adhibentur: Quippe cum vel partium, vitæ omnino necessariarum tonum dirimant; vel morbos istarum partium amplius irritent, vel demum temperamentis, tenerioribus aliquanto multum adversentur; ut plurimum igitur vel eorum usum hisce in casibus omnino interdiciamus, vel eorum admotionem parum propugnemus.

Nemo est, qui urendi methodum non callet: quocirca superest ut causticum potentiale admovendi modum vos edoceamus: Emplastrum quodvis adhæsivum, in cuius medio foramen, caustico admovendo æquale, inciditur, admoveatur; huic foramini, cauterium cuti superimponendum adaptetur; huic caustico ita admoto aliud emplastrum etiam adhæsivum imponimus, quod usque parti incumbat, quoad escharam exusserit; hoc autem vel ocyus vel serius, pro cauteriorum energiâ, quæ longè à se invicem discrepant, fieri solet; cum dolor omnino desierit, eximatur causticum, & eschara digestivis, basilico, linimento Arcæi cæterisque decidere cogatur; vel cultro auferatur.

C A P. XI.

De Aquis Purgantibus.

UOD ad vim aquarum hujusmodi cathartica, fatius esset istas in catharticorum classem redeigisse; cum sint reapse in eorum numerum referendæ; quia tamen salibus multifariis, sanguinem etiam mirum in modum immutantibus scaturiant; ideo capitulum hoc pro iis sigillatim destinavimus; cum tam deplendo quam immutando opus absolvant suum.

Quatenus istæ humores deorsum trudent, sanguinis vasa cacochymiâ onusta sat idoneè deplent: Siquidem etiam ventriculi sarcinam quadantenus eliminant, *anorexia* idcirco, istius pedissequæ, subsidio veniunt: *Vomitioni* idèd auxiliantur, quia materiam deorsum trahunt, necnon foris tandem eliminant: *Colica* præstunt, quoniam pituitam vel bilem, istius fomitem, per secessum extrudunt: *Melancholiis* adsunt, quia perinde humores diluunt, atque exhauriunt: *Cardialgiis* se adjuutores præbent, ex eo quod salia simul dissociant, simulque foris amandant: *Vermibus* propterea suppetias ferunt

ferunt, quod quâ istos enecant, quâ foris deturbant. *Doloribus nephriticis, urina ardoribus* necnon *ischuriis* idcirco succurrunt, quòd meatus irrigent, salia obvolvunt, necnon glandulas lenitè irritent: *Icteros* auxilio sublevant, quoniam glandulas irritando, istas deoppilant: *Eruptionibus, cephalalgis, vertigini, doloribus vagis, scorbuto, hystericis, hypochondriacisque* ideò patrocinantur, quia salia exotica, pontica, imò cujusvis speciei, deorsum pellunt, secretum nativum in ventriculū ac alia viscera reponunt, intestina perinde ac exta proxima expurgant, istaque refrigerio perutili perfundunt.

Cum, quī morbis nonnullis auxilio sunt, jam fati sumus, reliquum est, ut injurias ab eis nobis laturas ingenuè exponamus. *Anasarcis* haudquaquam utiles sunt, quoniam cum sint cathartica paulo aquosiora, quantum nobis evacuando profunt, tantundem aquam adjiciendo nobis obesse observantur: Febricitantibus ideò non propinantur, quia punctione ac salium adjectione febris multum increbresceret: Nec *hemoptysi* competent, quoniam salium acrimonia, vas jamdudum apertum, magis adhuc vi suâ pungente dilacerarent: *Cholerâ* cruciatis non exhibentur, ex eo quod ægrotos plus nimio exhaustos, ulteriùs evacuationibus fatigare, planè desipere esset: *Paralysi* ab humore pituitoso vel quovis alio frigido inductæ haud eò conveniunt, quod etiam si salium vis pungens nervos laxos nimis aliquantulum irritaret; quia tamen aqueis scaturiunt particulis, nervis ex æquo noxas accersirent: *Pregnantibus* ideo primis ac ultimis mensibus usum earum omninò interdiciamus, quia uti catharticum quodvis, irritando fœtum istis mensibus excuteret, ita multò magis aquæ catharticæ istis, cum sal earundem sit fermè septicum, damna inferrent: *Calculum renum* paulò grandiore uti haud movent, ita visceris istius inflammationem sæpiusculè introducunt, cum vim eis inferendo, attritio succussuum vestigia æquis subsequeretur passibus: *Vesica calculo* cruciatis haud idcirco conferunt, quod cū nunc stranguriæ sint frequentiores aliquantò, salia salibus superinjiciendo dolor immane quantum increbresceret: Nec tandem *gonorrhœis, diarrhœis* afflictis neque *vomiturientibus* conduce-

re reperiuntur; quoniam uti quodvis acre istiusmodi mala quamplurima creat, necnon fluxum perennat, ita istas propinando ineptè quidem ageremus.

Quandoquidem igitur salium proprietates, quibus imprægnantur, tam *Listerus* quam *Allenus* jamdudum accuratissimè delineaverint; notitias ab eis mutuatas huc transferre, hic inserere non erubescimus.

Salia ex quibus constant, sunt vel vitriolica vel nitro calcarea, vel tartarea, vel alcalina, vel nitrosa, vel denique marina; de quibus in ordine.

Salia Vitriolica malo hypochondriaco necnon eruptionibus quibusvis subsidio maximo sunt; quæ tamen vomitiones, hæmorrhoidesque introducunt: Hæc autem salis specie scaturiunt *aqua Richmondenses* ac *Scarburghenses*. Quî vero febres introducere observentur ipsi viderint.

Salia Nitro-calcarea, colicis, glandularum obstructionibus, melancholiæ, cardialgiis, doloribus vagis, scorbuto, obesitati, *alvi constipationi*, calculo renum, arthritidi, morbis pulmonum (citra inflammationem invadentibus) conveniunt; sanguinem calefaciunt; quæ autem calculum, ac alvi constipationem paulo post, ex *Listeri* sententiâ inferre solent; huic classi referuntur *aqua Ebeshamenses*, *Actonenses*, *Barnetenses*, *Strethamenses*. Quî autem eruptionibus (utî asserunt nonnulli) auxiliari queant, paululum hæremus?

Salia Tartarea, aciditates immutant, ventriculum corroborant, vomitui frænum injiciunt, diuresin provocant; febribus vel morbis profunt periodicis; huc referuntur *aqua Upminsterienses*. Num autem hydro-pibus quibusvis unquam conferant, ultra inquirendum est?

Salia Alcalina acidum in sanguinis massâ mutant; fluxibus ab acido introductis profunt; malo hypochondriaco adsunt; lepræ tamen ac impetigini damno sunt; hujus speciei sunt *aqua de Brentwoodweal*. Quî vero mensium fluxui alcalina obicem ponunt, pensandum est?

Salia Nitrosa, diuresin proritant, bilis acrimoniam obvolvunt, sitim sedant, ac refrigerant; ad hanc aquarum classem pertinent *aqua Kensingtonienses*.

Salia

Salia Marina, lumbricos enecant, eruptiones frænant, pepsin juvant, flatus dissipant; huic classi referuntur *aqua Alfordenses, Colcestrienses, Lambethenses, North-hallenses, Dulvicenses.*

Brevi igitur, aquæ purgatoriæ, quæ salibus vitriolicis seu marinis redundare percipiuntur, scabiebus, eruptionibus, vermibus medicari observantur, ac refrigerant: Quæ vero salibus alcalinis seu nitro-calcareis constant, sanguinis fluiditatem ac tenuitatem augment, calefaciunt, scabiei, lepræve obsunt; *nitrosa* vero bilem acrem temperant ac figunt.

Ordo bibendi hic est; 1^o. Mane hauriantur ab heminâ unâ ad duas, tres imo plures, pro operationis more: 2^{do}. Ubi tempestas pluviosa salia earum nimium dissociaverit, vel usque coquantur, donec pellicula seu cremor innatare percipiatur, vel salis Glauberi seu cathartici amari semuncia cum eis inter bibendum commisceatur. 3^{tio}. Cum tempore æstivo plerunque usurpentur, ideo regimen exercitio omne, cum non aliud agunt, præterquam quod tamdiu peragraré soleant, dum foris amandantur, bibentes posthabere mos invaluit. 4^{to}. Tempestate vero brumali eo usque decoquantur quoad pellicula supernatet, tum aquas has bullientes neogalacti superfundite; sepositoque coagulo cum custodiâ solitâ hauriantur.

Hactenus quicquid authores, quicquid etiam nosmet, vel soli vel eorum autoritate muniti, de medicamentis evacuatoriis, utilitatis, praxeos diuturnæ adminiculo, usque adhuc deteximus, vobis libenter admodum impertivimus; reliquum autem est, ut evacuationum, instrumentis peractarum, paucis deinceps mentionem faciamus; his confectis, parti deinde primæ coronidem addemus.

CAP. XII.

De Venæ Sectione, Arteriotomia, Sanguisugis, Cucurbitulis, Transfusione.

QUandoquidem libellum huncce praxeos regulis accommodandis unicè destinaverimus; theoria igitur exercitii omninò vacua pro nobis inculta maneat: Ingenuè tamen fate-mur, quicquid de sanguinis extractione hic dicturi sumus id omne maximâ ex parte fundamento Belliniano, quippe quod id cæteris longè sanius nobis esse videatur, reverà niti.

Quemadmodum sanguinis missio nequaquam ostenditur omnino, nisi cum plenitudo vel vera vel metaphorica adfuerit; ita symptomata cuncta istam indicantia, ex plethorâ universâ vel individuâ fermè pendere advertuntur, hinc est, quod doloribus quibusvis immanibus, nec non fœminis gravidis mediis in mensibus iis cruciatis convenire reperiantur; *Cornax* ac *Burgravius* venæ sectionem in febre Hungaricâ deprædicant, modò cautelæ à *Cobero* memoratæ ante oculos versentur; doloribus pleuriticis, imo pleuritidi ipsimet adeo succurrit, ut quamvis pulsus inæqualis vel intermittens micaret unquam, nihilo tamen secius missio ipsius plurimùm competere idcirco ex *Ballonio* L. 2. p. 214. *epidem.* reperitur, quod sub morbi initium pulsus debilitas seu anomalia quævis ipsius vix vel ne vix à spirituum absumptione, cum nihil quod ipsos exhalet, omninò præcesserit, dimanare queat; quin ista ab humorum sarcinâ proficiscatur, necesse sit: In quo rerum statu sanguis usque eò vasa rarescientiâ suâ dispan-dit, ut paulum absit quin ea haud multo post diffiliant: Inde est, quòd cum ventriculorum cordis parietes parum sibi invicem accedant, pulsus sit oppressus, qui debilis perperam nuncupatur: Nam statim ut onere vasa, depletione, expediuntur, pulsus fortis confestim, ex apparenter debili, evadit: Quamobrem idem author p.

204. l. 2. *epidem.* Sanguinis missionem, vel in pulsu languido, à nobis celebrandam, supra modum ni fallamur, efferre videtur, cum sic fari *audeat, fortuitus scilicet, ausus saepe rationem prudenter initam superat*; cum ægrotantium incolumitatem medicorum peritiâ unicè niti palam sit, hoc autem in casu controversiæ cardo circum ~~axem~~ hunc volvatur, ut pulsum languidum ac debilem ab oppresso internoscamus; pro exercentis igitur facultate aut fortuna labori nostro aspirabit, aut illam infestam habebimus. Quandoquidem inflammationes succrescentes intercipiat, eas in viscere quovis defixas itidem amovere poterit: Quoniam vasis à sanguinis onere magnâ ex parte expeditis, de impetu ipsius posthac in partem affectam aliquid in horas adeò subtraheatur, ut tandem, vasis majoribus sic depletis, rami evanescentes, quibus inflammationes potissimum incubuerint, deinceps omninò flaccescant; ex quo fit, ut diluentia cum medicamentis referantibus exhibita, necnon dissipantia cum emollientibus extrinsecus admota, concretiones, quæ supersunt penitus solvere queant, vasis & sanguine ita in statum naturalem reductis inflammatio prorsus in posterum disparebit. Usque eò pleuritidi reverà convenire venæ sectionem experimur, ut in eâ ad nonum usque diem sanguinem, modò expuitio adeò parum votis responderit, ut ne vel minimum sputi prorsus apparuerit, extrahere liceat; cum haud vero simile sit pleuritidem hujusmodi expectorando unquam finitam iri; Quinimo vel puerperarum pleuritides hinc etiam auferri patet. *Vigilias*, sanguini nimium fervido ortum debentes, actutum compescit; quoniam cum eæ nunc, à rarefcentiâ unâ cui depletio adversatur, initium faciant. Quoniam in maniâ spirituum *aragzia*, à sanguinis motu concitatori oriri percipitur, idcirco sanguinis extractio, tumultui huic omnino obsequium præstare debet; hinc autem est, quòd venæ sectio, sæpius iterata maniacis auxilio fere maximo fit; quippe cum vasa eo usque depleantur, donec unum sanguinis momentum alterius vestigia ita parum urgeat, ut oscillationi vasorum uni, non autem fluidorum etiam copiæ, circuitus morem tantum gerat. Asthmati, catarrho suffocativo, necnon apoplexiis propterea adest, quod cum

in

in hujusmodi morbis sanguis ex improvisò vel omninò subsistere vel extra vasa effundi soleat, uti ex symptomatis paulo gravioribus suspicari fas sit, venæ sectio igitur raptim celebranda, cæteroquin in posterum omitenda est. Quippe cum phthisis ferme omnimoda, si-
ve acuta sive lenta, sit ex morborum inflammatoriorum genere, citius aut serius humores in vasis minutulis tandem adeò defiguntur, ut bronchiarum glandulæ ac membranæ admodum inde intumescant; respirationis organo ita tumefacto, ægroti difficulter spirant, impense tussiendo conatibus affligantur; cum inflammatio tamen aliqualis sit tussis hujus causa unica, sit aliquando ex humidâ, adeo sicca, ut nil prorsus expuatur: Phthisi recens inchoatæ venæ sectio ideo efficax adest reconva-
lescentiæ causa.

Quoties inter ptyalismum, à mercurio institutum, adeò dolorifice intumuerint glandulæ pharyngis salivales, ut saliva ultra fluere desinat, ac salivantes in suffocationis discrimen inde conjiciantur; his venæ incisio emolumento erit, quippe quæ inflammationis pullulaturæ progressum impediat.

Ophthalmiis eò succurrit, quò nihil certè magis prodesse comperitur; quinimo nonnulli venæ jugularis incisionem in hujusmodi inflammatione pertinaciori aliquanto, tanquam carmen magicum deprædicare solent. *Veromandus* sanguinis extractionem miris in abortu præconiis propterea effert, quod vasis liquorum suorum onere quadantenus expeditis, placenta in utero depacta impetum sanguinis adeò deinceps subterfugiet, ut non timendum erit nequà refigatur. Quando variolæ vel ἀνομάλως erumpunt, vel quoties suffocationis periculum febre putrida, undecimo sc. superveniente, subeunt laborantes, apprime conducit tum sanguinis subtractio, ex eo quod symptomata horrenda, exinde oriunda, ferme præcidantur, cùm sanguis deinceps respirationis organa aliasve functiones ultra laceßere desinat. Siquando mensium seu hæmorrhoidum fluxus stativus aliquandiu quieverit, ac hunc in modum vasa, morâ suâ, humorum vitiatorum onere ita sufferferit, ut symptomatis hystericeis, hypochondriacisve ansam præbuerit; venæ apertio jure merito primùm ostendi ideo censetur, quia

quia vasa humore excernendo prius redundant, quam sanguis facultates auxiliares ac vitiosas sibi asciscat; qui tamen prætereà deinde vasis depletis, mutandus est.

Venæ sectio palàm ostenditur ubi pulsus perinde fortitè micare percipitur, atque ubi calor aut ebullitio vehemens laborantes infestare solet, uti ex *Sylvii operibus* p. 236. manifestò elucet; quinimò quoties calor febrilis immaniter sævierit, etiamsi unà petechiæ aessent, pulsusque digitum paulo validius percussisset, sanguinem, aliquo saltem modo, extrahere certè licet.

Quoties inflammatio parti cuivis incubuerit, vena lateris oppositi idcirco tundatur, quod humor in partem influus exinde revellatur, hoc est, sanguis præ antispasmos istius molimine, seu depletione vasorum idèò illic expeditius vehitur, imo pellitur; quia ubi moles minuitur ac pondus sublevatur, ibi liquoribus à tergo pressis facilius paratur aditus; inde est, quòd *Waldschmidius* sectionem saphænæ, alteriusve in pede venæ, phrenitide captis, elogiis cohonestet.

Quanquam regionibus nostrâ soli vicinioribus mos hic invaluisse feratur, ut sanguinem massæ totius partem subquadruplam, ubi quis febricitaverit, extrahant; cum tamen inter medicos lites, de sanguinis ac fluidorum mensurâ, etiamnum moveantur; eæ prius componendæ sunt, quam quantum sanguinis hic demendum sit, dijudicari poterit; medici hodierni longe aliter sentiunt hac de re atque theoretici jampridem opinati sunt; cum hi libras viginti ad summum assignaverant; ii vero libras centum & quinquaginta, in homine ducentorum pondo, delegaverint; quam igitur quantitatem subtrahunt exteri, adhuc cespitamus.

Ut foeminæ longiùs à partu absunt, ita venæ superiores tutius inciduntur; quo minus igitur è contra à partu distant, tutius inferiores venæ secantur, inquit *Riverrius*; saphænâ enim tundere, cum primos vel medios saltem menses gravidæ nondum emensæ fuerint, sanguinis ποπλω uterum versus adeo accersiret, ut abortus pressò subsequeretur passu.

Quotiescunque tam venæ sectio à plethorâ, quam catharsis à cacochymia unà ostenduntur; toties vena prius tundatur quam catharticum exhibeatur; ex eo, quòd detractò

detractō sanguine, perinde copia à cathartico eliminatūra perquam minuatur, atque impulsus, in vasorum parietes, momento, à quantitate initium sumentī, ac à commotione, præ vi cathartici illatâ, protractō, occurratur.

Quemadmodum variæ usurpantur methodi, quibus sanguis è naribus extrahatur, uti *Hollerium* consulentibus facile patebit de *capitis doloribus*, nimirum, eos frequenter scalpendo, fetis, foliis arundinis, festucâ, herbis aculeatis, sanguisugis (pinnis narium admotis) cucurbitulis scarificatis; ita Indi, occidentales præcipuè, in doloribus capitis paulò pertinacioribus, uti fertur, ramulum venæ jugularis, in naribus situm, hujus gratiâ cum eventu foelici tunderè solent.

Prægnantes primis gravidationis mensibus vomitione quam gravissimâ sæpiusculè afflictatas novimus; siquidem verò à semine virili sanguinem rarefaciente ac alio forsitan modo mutante ortum debet, ita illam incisâ venâ, iteratò, modò à symptomatis diuturnitate indicetur, disparere vidimus: *Riverius* ita sententiam suam hac de re eloquitur; “ Et docuit experientia vomitum, qui prægnantes frequenter infestare solet, “ primis gestationis mensibus, à purgatione exacerbari; “ à venæ sectione vero plurimum sublevari; imo verò “ in totum auferri, si usque ad solutionem symptomatis “ singulis mensibus iteretur; quam sententiam etiam eximium *Boerhaave* amplexum fuisse videmus, cum p. 341. §. 1297. hæc habeat, “ Quæ (nauseæ, vomitus &c. in §. 1296.) proinde pendentia ab unâ causâ, “ eodem remedio, venæ sectione, tolli solent.

Lusitanus Cent. I. Curat. 10. Duo à nobis in venæ sectione pensitanda esse affirmat; 1^o. Nimirum, num ista à morbo indicetur? 2^{do}. Num ægrotorum vires eam tolerare queant? *Forestus l. I. de febribus, obs. 12. in scholio*, tutius esse venam iteratò tunderè, quam nimium unicâ vice detrudere asserit: Hinc autem concludamus, necesse est, eam, nempe, sanguinis mensuram solummodo, quæ morbo vel symptomati urgentiori opem ferat, à medicis esse demendam. Brevi igitur sanguinis detractio æque evacuat ac alio derivat; quocirca plethorâ universâ priùs diremptâ, cùm sanguinis

his influxuri momentum minuatur, portiuncula istius, quæ parti infederit, posthac expeditius in gyrum flectetur.

Hactenus de venæ sectionis utilitate sermonem habuimus; reliquum est, ut de ejus nocumentis, ex eo quod perperam in usum aliquoties vocetur, verba faciamus: Quoniam igitur in languentibus necnon temperie frigidâ contactûs momenta adeò minuuntur, ut sanguis lentè ac segniter circumpellatur, ejusmodi sanguinis detractionem malè idcirco ferunt. Neque pleuristici liberius aliquanto, materiam albam, lævam, dolores in horas sedantem, quarto vel etiam nono die, expuentes, eam tolerant; quia cum *Ἀναθάλασσις* hæc sit omnino critica, quoad fieri potest, proritanda est. Ubi febres ad *Ἀρμύ* seu statum pervenerint; venæ sectione tum perperam celebratâ, coctio, quæ antehac naturæ normam exactè secuta fuerat, ita parum deinceps perrexerit, ut gradum stiterit, ac urina statim ex coctâ cruda facta est, necnon symptomata funesta confestim exorta sunt. Neque Diarrhœis neque vomitibus (nisi in prægnantibus ut supra notavimus) opem fert, quippe cum ista spiritus plus nimio prius exhausserint, illos ulterius derivando ineptum ageremus.

Febribus mali moris afflictis neutiquam prodesse potest, utpote cum hic spiritus vel figuntur vel evaporantur, non igitur evacuatione ulteriori opus est.

Neque paroxysmo infantum convulsivo præsto erit, quippe cum hic sanguis in vasis fermè subsistat, necnon hujusmodi nimium elanguescant; hinc est, quòd si residentiae opem suppeditemus, languori accessionem quam maximam faciamus.

Neque contra *Sylvium* apoplexiis *positivis* (seu ab assumptis *opiatis* originem ducentibus) auxilium ferent, quoniam eæ emeticis, volatilibus introsumptis, ac stimulis externis unicè cedere observantur; nisi quod adfuerit plethora, ventriculum tranaverit opium, pulsusque virtutem ac robur palam, per ictum, ostenderit: *Privativis* equidem (à sanguine, pituitave, obstructioneque inductis) incisio venæ ideo conducit, quia cum eâ laborantes sint adolescentes, facies eorum in paroxysmo rubescat, vitam prius egerint *desidem*, genio indulserint,

ferint, fluxus sanguinis soliti suppressio præcesserit, ac sanguis demum substitutus sit, vasorum depletio non clarè ostenditur, ut nil velocius venæ sectione istis subsidio venire poterit: Neque Asthmati humido, quippe cujus sarcina expuitione solummodò levatur, auxilio erit.

Scardius, p. m. 2517. Venæ sectionem in pleuritide vituperando, non ita ab usu ejus nos metu exanimet, ut ab eâ nosmet in hoc morbo ideo contineamus; quandoquidem vel de Pleuritide malignâ loquitur, vel de statu ejus verba facit.

Quod ad *Arteriotomiam* attinet, paucis, si placet, operationem istam expediemus: Non authores modo antiquiores, sed hodierni etiam arteriotomiam quibusdam in casibus paulo contumacioribus supra modum, ex *Willisii* sententiâ, extulerunt: Siquidem verò ii, qui de illâ meminerunt, non sunt optato ut plurimum eventu destituti; operationem hanc rationibus aliquantulum expendere pro viribus nostris contendamus: *Cephalæam* quam sæpissimè necnon quam expeditissimè eam sustulisse quamplurimi jam pridem asseruerunt; *Riverius* enim illam in praxeos libro primo, capite decimo sexto, de dolore capitis, hemicraniam abstulisse affirmat; ille ipse in centuriæ secundæ observatione quinquagesimâ sextâ, necnon observatione duodecimâ à *Jacoz*, ac trigessimâ primâ à *Formio* communicatâ, eandem arteriæ sectionem cum eventu foelici institutam commemorat; *Nicholaus Chesneau, c. i. l. i. de doloribus capitis obs. 11.* arteriam, licet ab imperito pauxillulum tactam, emolumento laboranti fuisse retulit: Arteriotomiam sæpe feliciter institutam in melancholiâ laudat *Doleus*; in epilepsiâ etiam eandem deprædicat: Eximius circulationis inventor *Harveus* nostras arteriam in scrophulis ligasse fertur, adeo ut sanguinis portiuncula, tumorem istum per influxum nutricans, penitus isthinc averteretur: His autem ab authoribus practicis, ita libatis, exitus prosperi causas, quoad fieri poterit, jam enumerare naves operam. Quandoquidem arteriæ perinde, nec magis, canales atque venæ sunt; revulsio igitur, derivatio, seu aversio tam in istis quam in his valere queunt; quia tamen arteria prætereâ circulationis scaturigini

gini venis propius accedunt, inde est, quòd derivationes ocyus arteriotomiæ quam phlebotomiæ cedere comperiuntur: Quamobrem, cum dolores capitis immaniores isti intra dimidiam horam cessisse ferantur, quid est, quod ista nostris temporibus rarius sit in usu? Fingamus nobis amnem itaque bisectum, cujus sinui ad dextram sito iter claudatur liberum; canalis, hæc, adeo aquarum mole inundabitur, ut longè extra consuetos terminos statim exundabit fluvius; ripâ tamen alicubi perforatâ statim ac primum profluent aquæ in decliviora loca, ac deinde subsident: Cum autem inter fluvii canalem ac vasa, maximum ideo sit discrimen; cum hæc secus atque iste sint perquam flexilia; arteriæ, quæ ita fluidis oppressæ sunt ut neutiquam omnino ferè micent, eò quod haud se contrahere valeant; tandem aliquando onus hoc per systolen restitutam ac iteratam, dimovent, ac ita laborantium sanguis, imposterum more solito ac imperturbatè circumagitur: Hæc autem hætenus dicta de *evacuatione particulari* intelligi debent; quantum enim ad revulsiones per arteriæ sectionem factas, consulatis, quæ supra de venæ sectione explicuimus; cum hæc factæ revulsiones gradu solummodo, ab istis illac peractis, diffideant. Arteriæ furculo quovis gravitèr obturato; membrum, cui sanguinem prius iste advexerit ramulus, ariduiâ plerunque laborat; hinc, quî sit, ut, arteriolâ ligatâ, vel etiam sectâ, scrophulæ istius succo depravato altæ, sensim decidunt, perspicue liquet.

De *sanguisugis* seu *hirudinibus* deinceps sermonem habituri sumus, quæ cum sanguinem, à vulnere vasi cum ore trifulco inflicto, pedetentim exhauriunt, vel noxam vel utilitatem aliquatenus in nos conferre reperiemus: Casus quosdam ex authoribus probatis præ vobis primò sistemus, deinde conjecturas nostras subnectemus. *Zacutus Lusitanus* in libri primi observatione octavâ, dolorem in temporibus defixum hirudines admovendo sustulit; *idem author* in libri secundi observatione quinquagesimâ septimâ, dolorem in lumbos defixum, sanguisugas super partem affectam applicando, penitus amovit. *Platerus* in observationum libro tertio, paginâ 797, de vomitione, sanguisugas podici, canalis ope, familiaritèr

miliaritèr ac sæpiusculè admovit, quo artificio sanguinis nigri vomitionem frequentèr recurrentem intercepit. *Mayernus* in variolis sanguifugas adhibet, ait enim “ In frequenti, brevi, & difficili respiratione non sine suffocationis periculo, vel si in variolarum maturatione inflammatio ingruat summa, aut tumor erysipelatodes caput occupet; sine morâ præsens periculum præcaveatur applicatione hirudinum sub auribus. (Addit, vel ranularum sectione.) *Willisus* pro epilepsiâ seu motibus convulsivis puerorum, sanguinem hirudinum succtu à venis jugularibus ad sesquiunciam vel ad uncias duas, modo vultus floridus sit, extrahi jubet, providendo, ne inter somnum sanguis, paulo fortassis tenuior, stragulorum ac cunabulorum ope, factus, rursus effluat. *Ettmullerus* in mesenterii inflammatione hirudines ano admoveere in mandatis habet. Quid multa? quæ jam de hirudinum commodis diximus, ab eorum ferè inficias euntibus hoc sine labore, ni fallamur, extorqueri potest, ut earum admotionem, praxi ac exercitio quotidiano firmatam, utilem quinimo necessariam aliquoties fateantur: Admotæ enim non *evacuatio particularis* modò evadunt, sed revulsione etiam vices gerunt: Hinc est, quòd vel umbras horrentibus ac meticulosis, perinde ad humores alio derivandos venæ sectionis vice fungantur, quam humores non extra vasa quidem effusos, cæterum subsistentes ac canales circumcirca opplentes, sine morâ ita exhauriant, ut doloribus, hæmorrhoidibus suppressis, ac interdum mensibus suppressis, evacuationibus magis universis prius adhibitis, allevamento ferè sint perquam efficaci.

De *Cucurbitulis* deinceps pauca advertamus: Egregius *Waldschmidius* eas venæ sectionis locum in languentibus tenere affirmat; *Dekkers*, vir eximius, in doloribus, ac cæcitæte, earum admotionem laudibus effert; uti etiam in ischiade; *Forestus* in capitis dolore istas inter cætera tanquam utilia deprædicat; *Hippocrates* hæc habet, (a) *Menstrua si velis cohibere, cucurbitam*

(a) Γαῶναι τὰ κατὰ μέρη ἐν βέλῃ ἐπιχεῖν, κύκλῳ ὡς μεγίστῳ πρὸς τὰς τιτθὰς πρὸς ὅσῃ.

quam maximam ad mammas appone, Sect. 5. Aphor. 50. Ettmullerus eas in catarrho suffocativo commendatas habet. Riverius eas summo capiti in phrenitide admo- vet; item occipitio in guttâ serenâ; sub mento ad lin- guæ inflammationem; ac lateri dolenti in pleuritide. Siquidem earum admotionem autoritate satis firmâ munivimus; reliquum est, ut operandi modum paucis explicemus. Cum cucurbitulæ igitur sensionem quan- dam partibus molestam inferre soleant, cum humores subsistentes ac parti impactas evacuent; cum tandem humores extravasatos etiam, pro sectionis ac scarifica- tionis modulo, exhaustire possint; palam fiet, quî per- inde humorum parti cuivis influxum insidiosum aliò derivare atque eos alicubi subsistentes evocare value- rint: Hinc fit, ut non venæ sectionis vices modo ge- rere notentur, sed evacuationis immediatæ seu apertu- ræ etiam locum teneant.

*De Transfusione; cum pauca habeamus, quæ experi- entiâ illustrari queant; istam silentio dissimularemus, quod nisi à quibusdam adeò in morbis, alioquin insana- bilibus, deprædicetur: Hi, nimirum, in epilepsiâ, icte- ro, mania, pervigilio, phrenitide, phthisi, pleuritide, scorbuto, aliisque quamplurimis, amplissimis verbis, u- tinam & exemplis, illam ornant: Cautè etiam, neque nisi obtentâ magistratûs ac ægri veniâ, peragendam in- culcant: Hanc transfusionis operationem à *Richardo Lowero*, primùm inventam, ita parum hætenus exco- luerunt medici, ut jam penitus, quòd scimus, exole- verit: Num verò hoc fiat, ne quis in hoc opus insudantes ludibrio habeat, an quoniam hominum ingenia nunc o- tio torpeant? etiam dum hæremus.*

CAP. XIII.

*De Paracentesi, Abscessuum Apertione,
Setaceis, Fontanellis.*

Variis instrumentis Paracentesis perfici solet; sive, scilicet, acu sive cestri specie; acus una à *Blockio*, vel altera à *Barbeto* inventa, in usum vocari solet; hodierni verò epistomium, in apice acuminatum, siphoni quam exactissimè aptatum, ex argento fabrefactum, in abdominis spatia confodiunt; tum, epistomio evulso, liquamen ex siphone tantisper effluit, dum medico, sanitatis præsidii visum fuerit. Paracentesin olim aggressuri, siphonis crenæ superiori syringam ita aptavimus, ut, cochleæ siphonis syringa figeretur: Hunc autem in modum ideo instrumentum fabrefactum fuit, quia sic tam gelatinam quam serum simul extrahere potuimus. An in cavitatem penetraverint, facile propterea conjectari poterit, quod chirurgus se omnem repugnantiam superâsse sciat; ex eo quòd, dum instrumentum altius trajicit, sponte ferè illabatur.

Siquidem autem paracentesis rarò aut nunquam, votis respondet nostris; quia ad operationem hanc ægri vel serius properant, an quia vasa rupta, præsertim modo majora sint, vix aut ne vix quidem rursus fer-ruminari queant? Litem non expediemus: Cùm vero paracentesis sit tensioni perquam molestæ levamini sat efficaci; ita tironum animos, tam de modo eam instituendi, quam de quantitate demendâ, præceptis expollemus.

De modo eam instituendi pauci nunc disceptant; de quantitate vero unicâ vice exhaustiendâ, argumentis adhuc contendunt varii: Eximius *Dominus Ihouvenot* aquas ad libras septem, decem, imo vel viginti usque simul ac semel in robustis; at in debilibus, non ultra quinque, sex vel decem ad summum extrahere solebat; proinde intra tres quatuorve dies integram aquarum molem exhausit;

hausit; quod si tantum non statim regenerarentur, paracentesin denuo, ut ante, instituit: Interea diuretica leniora, hydragoga necnon reficientia exhibuit, motum denique modicum, quo liquamen melius efflueret, deprecavit: Authores alii consultò internè exhibere solent conservam rosarum rubrarum, pulverem diarrhodon abbatis, absinthium, aquam cinnamomi, ac traumatica, corpore primò catharticis ac diureticis expurgato; quid vero est, quod istiusmodi remedia introsumantur? non aliâ certè de causâ, quam quod humoribus intra vasa aliquatenus exhaustis, vires vacillantes renoventur, ac vascula evanescentia vel lymphatica disrupta rursus adeò ferruminentur ac consolidentur, ut nec sanguis nec lymphæ in posterum emanare possit.

Divinus senex *Hippocrates l. epid. 6. sect. 7. §. 8.* jubet anasarcicos cito incidere; item *Aphor. 27. Sect. 6. Qui hydropici, secantur, hi—aquâ acervatim effluente, omnino moriuntur.* Hinc colligendum est, hydrope (de ascite vero hic sermo est) laborantes, vel cito *κέντησθαι* perforandos, vel missos inde ab illo tempore omnino faciendos esse; præterea nisi sensim exhauriatur aqua, vires impendiò prosternuntur: Quoties igitur maturè exhauritur, viscera sarta testæ manebunt; quoties sensim sine sensu extrahitur, vires pro molis exhaustæ modulo tantum concident.

Paracentesis igitur instituenda est, ubi ascite laborantium vires constant; nec cachectici nec invaletudinarii sunt; ubi febre vel vacant, vel modicè saltem fervent; ubi viscera labe quâvis immedicabili, (scirrhus, phthisis, similibusve) cassæ sunt; ubi denique vas lymphaticum vel aliud disruptum minutulum est. Instrumentum, ex *Blockii* sententiâ intrudatur “ Sub umbilico interpositis tribus digitis (quem locum, inquit *Barbættus*, in “ omnibus non accuratissimè tamen observat) ubi etiam “ musculos & peritonæum ad aquam usque instrumento hoc perforat, & raro ultra duas libras simul & eodem tempore emittit. Deinde instrumentum illud “ rursus extrahit, & factò foramini nihil aliud imponit quam plumaceolum siccum & emplastrum glutinatorium, quibus optimè impeditur, ne aquæ gutta, “ se invito, exeat. Nostra es autem, cum tantum,

quantum voluerint, liquaminis extraxerint, laborantes ad lectum consultò relegant, ac abdomen totum spiritu vini camphorato, (cui nos saccharum saturni semel, ut partes nimium tensæ constringerentur, addi curavimus) aquæ bullientis ope calefacti cum stuphis aliquandiu foveant; deinde vulneri unguentum peniculo extensum, emplastrum adhæsivum, ac lintea quadruplicata imponunt; demum panno laneo wallico, spiritu vino intincto, abdomen quaquaversus cooperiunt. Paracentesin, quantumcunque potis est, tempestate tam æstiva quam brumali instituere declinemus? Quantitas viribus cum æquis adjungenda est passibus; inde est, quòd ad uncias vel libras usque extrahatur; si hodie tamen extractio vires nimium prosterneret, ad plures dies, imo vel septimanam usque, operatio procrastinetur.

Quod ad *abscessuum incisionem* jam pauca dicturi sumus: Primum vero de empyematis operatione, deinde de abscessuum, minoris momenti, apertione locuturi sumus.

In *empyicorum sectione*, hæc notanda sunt; est *locus necessitatis*, est & *locus electionis*; *locus necessitatis*, iste est, 1^{mo}. Cum, nimirum, dolor alicubi ad tempus laborantes cruciaverit, nec illum ullo pacto dissipare valuerimus, quin in apostema abierit; 2^{do}. Cum tumor promineat; hisce enim in casibus, sectio in loco, ubi dolor aliquandiu subsisterit, instituatur; cæterum si tumor tandem se in conspectum protulerit, in protuberantiæ istius parte imâ aperiatur. *Locus electionis* autem iste est, ubi nec tumor adfuerit, nec pondus, calori, dolori, dein abscessui cysti alicubi incluso, succedaneum, senserint laborantes; tum enim culter, inter 4^{ram}. & 5^{ram}. costam infernè numerando (secta prius cute) in parte superiori musculorum intercostalium, transfadigatur. Ubi laborantes febre, sitique vacant, bene appetunt, pus extractum album, lævum, nec foetidum est, diarrhœa abfuerit, vix nostris excidemus ausis. Aëris ingressus quam maximè præcaveatur; pus ad libram unam vel duas, pro virium ratione, primâ vice extrahamus; tum minori in quantitate, in dies, eo usque exhaustiatur, quoad tota puris moles eliminetur; his confectis, *injectiones conflatae*, ex hordeo & herbis traumaticis una coctis.

coctis, ac cum melle mistis, syringâ introducantur; ac à posturâ reclinâ reijciantur, ut tum partes faucis à fordibus, istis adhærentibus, liberentur, quam detergeantur, mundificentur ac tandem aliquando cicatrizentur; interna verò remedia sedulo etiam exhibeantur, balsamica, nimirum, testacea, absorbentia, cardiaca temperata, lactea, ac hydromeli (ex antiphthificis conflatum) quinimo aliquoties opiata ad vigilias compescendas. Homini jampridem pyrœni ingluviei dedito ministravimus; qui pleuritide laboraverat; illa autem malè judicatâ, in empyema tandem abiit; ex inciso latere, pus ubertim effluxit, symptomata graviora in horas evanescebant; cum ipse tamen, ut compotatores occurreret, foras prodeambulaverit, ex virtutibus ornatus est, nam in ipso quasi reconvalescentiæ limine seu exordio vitam conclusit.

Quantum ad *abscessuum apertionem* hæc notanda veniunt; *sectio instituenda est*; ubi materia corrosiva est, atque adeò nervos, tendines vel ossa ipsa erodere apta nata est; ubi visceribus vitæ necessariis aliquando infederit; ubi articulum ipsum adortus est; ubi abscessus tralatitius est ac à molimine critico initium fecerit; ubi demum ad maturationem perducere nequit. “*Quod ad modum*” verò, hæc attendatis, necesse est: *Sectio igitur fiat*” per longitudinem & rectitudinem musculorum sub cute jacentium, v. g. *In capite* secemus secundum capillorum ductum; *in palpebris*, transversè; *in temporibus, naso, cervice, pectore, dorso, brachiis, pedibus, articulis*, per longitudinem; *in inguine*, parum transversè, non admodum profundè, ob vasa spermatica; *in lateribus ventris*, parum oblique; *in medio ventris*, per longitudinem; in genere cave tibi, ne *venam magnam, arteriam, sive nervum* attingas, ita *Barbette*.

Setacea, hunc fiunt in modum, acus serico, oblito unguento digestivo, abunde armatur, cutim eâ utrinque transadigunt chirurgi; tum sericum à dextrâ ad sinistram, & è contra, in dies trahatur, unguentoque illinatur: Foramen à foramine, unciarum duarum, trium, quatuorve intervallo distet. *Fontanella*, vel cauterio inuruntur, vel phlebotomo secantur; *Setacea ac fontanellæ*

fontanellæ in hoc conveniunt, quod utraque materiam purulentam extrorsum exportant; cum setacea autem in magnitudine longe fonticulos exuperent; facilè elucescit, quâ fiat, ut ista his magis efficaciora sint: Setacea ac fonticuli igitur à *Baglivio* ad accessiones arthriticas anticipandas apprimè laudantur; num eæ verò ità intercipi possunt, ut nunquam in posterum revertantur, admodum hæremus: *Bootius* in labrisulcio seu cheilocace infantum (ubi infantum, nimirum, labia scrophularum instar tument) usum eorum deprædicat; catarhos frequenter recidivos, inflammationes oculorum, phthises recentes, epilepsias, dolores ischiadicos, raucedinem, rachitidem, arthritidem vagam, aurium ac faciei morbos, multum sive anticipando sive curando, adjutant; quandoquidem enim continuò ac sensim humores extrahunt, morbi diuturnioris fomes partite subtrahitur; hinc est, quòd cuius plenitudini cacochymicæ manus auxiliares porrigant: Humores igitur foris eliminant nec non aliò devocant: Ubi primum vasa per eâ humoribus noxiis sat expeditivimus; cathartica iterato usque eò propinentur, quoad humorum, fonticulos versus, affluxus sat aliò avertatur; hoc peractò, ulcera occludantur: Quoties humores ubertim ejicere desinunt, toties *pisa lutea, viridia, vel rubra Batai*, vel *pisa ex aurantiorum corticibus facta*, ex Italiâ ad nos importata, adhibenda sunt.


Siquidem tandem de evacuationum tam commodis quam nocumentis sat abundè suprà commentati sumus; reliquum est, ut de alterantibus, in paginis sequentibus, verbis agamus.

Finis Partis primæ.



D E

ALTERANTIBUS, PARS ALTERA.



De Medicamentis alterantibus.

Proœmium.



Uemadmodum homines morbis paulò gravioribus rarò aut nunquam prehendantur, nisi si vasa humorum sarcinâ aliquantò vel multò antè onusta fuerint; ita necesse est, *evacuationes* ferè prius semper moliamur, modò his virium consideratio, nempe, moras haud nectat, quam alterantia omninò adhibere incipiamus. Quinimò evacuantia non ordine solum alterantia antecedere debent; sed plethoræ, puræ vel cacochymicæ, etiam ita sunt accommodanda, ut ex ipsius respectu uno, rariùs vel frequentius in usum trahenda sint; quicunque de hujus normæ animadversione parum solliciti sunt,

sunt, jure merito à medicis, artis peritis, malè audiunt: Siquidem verò evacuantia suprà sat abunde, imò prolixiùs, illustravimus; reliquum est, ut alterantia, in paginis sequentibus, pluribus etiam persequamur. Cum axiomata verò nonnulla ita omni alterantium speciei continuò convenient, ut nunquam non medicorum pectoribus insigi debent; si de istis jam, paucis, sermonem habeamus; tirones, uti speramus, eorum mentionem, citra fastidium, æquo ferent animo. Quamobrem,

Imo. Medicamenta qualitatum sensibilibus, saltem secundariarum, excessu laborantia, non sunt intus exhibenda; hinc est, quòd aqua fortis, oleum vitrioli, arsenicum, & similia minus intus sumenda sint; saltem medici consultiores ejusmodi citra summam cautelam ac necessitatem urgentissimam non propinant unquam: Quippe cum ista sanguinem vel nimium tenuent vel ulterius justo congelent: Vel quoniam etiam vasa nostra humorum vitiatorum onere refertiunt; vel demum quia fibras rigidiores, laxiores, curviores, tensiores, magis solito corruptas efficiunt, quinimo aliquoties exesas nobis præbere solent; adeò ut oscillationes, contractiones, dilatationis functiones ritè posthac peragere nequeant; his, nimirum, de causis, medio tutissimi ibimus. Quocirca, cum Πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσιν πολέμιον sit, siquando consilia igitur extrema moliremur, dedecori certè nostro velificaremur. Inde est, quod morbi cautè admodum abigendi sint: simul ac enim fluidorum seu solidarum partium vitia depulimus, vel superflua corpora foras abegimus, illa ad statum naturalem usque perduximus; remediis non sunt homines ultra fatigandi; nam uti sanitas in puncto consistit; cum temperamentum istud justum primùm attigerimus, quod ita se habere, ex symptomatum gravium rescissione, ac functionum omnium statu naturali restituto, suspicari fas est; medicamentorum fastidio posthac intermittamus: Quocirca ii haud leviter peccant, qui medicamenta nimis attenuantia in tussi humidà propinant; nam uti N. Piso rectè observat, humores crassi tenaciores sunt à calore; unde incidentia non sine humectantibus dentur; quisquis aromatica intempestivè ac immodicè ingurgitavit, hic cephalalgia, hæmorrhagia, vel similibus poenas dabit:

bit : Hinc palam fit, quâ omne nimium vertatur in vitium.

2^{do}. *Medicamenta vel diata alterantia sensim, non ubertim, nec in prelargis dosibus, propinanda sunt.* Sicut enim sanitate paulatim ferè excidimus, ita sensim reconvalescendum est : Nam uti est in Hippocratis aphorismo 7^{mo} sectionis secundæ, (a) *Qua longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet : Quæ verò brevi, celeritè.* Viscera enim morbo chronico vexata, uti eximius Listerus observat, nec pondus sustinere, nec humores concoquere, neque glandulæ recrementa sua supervacua dissipare, queunt.

3^{tio}. *Hinc est, quòd laborantes medicamentorum numero nec perterrefaciendi, nequè urgendi sint.* Egregius Baglivius optimatum liberos eorum multitudine ut plurimum obrui palam profitetur : Agyrtarum sanè, non medicorum est, medicamenta crumenæ uni, non morbo verò accommodare.

4^{to}. *Quo propius pars emendanda ventriculo adest, eò medicamenta leniora ; quo longius verò ab eo distat, eò potentiora sint.* Utpote cùm partis solidæ vel sanguinis vitium in propinquo sit, medicamentum vitio emolumento erit efficaci ; ex eo, quod illud cum fluido vitiatum statim colluctetur, vel fibris confestim adhibeatur ; quæ secus longè eveniunt, ubi pars malè affecta procul à ventriculo abest ; quippe cum, in isto casu, medicamentum à succis depravatis nimium obtunderetur ; pars malè affecta ægerrimè tandem remedio cederet.

5^{to}. *In morbis chronicis ac diuturnis, medicamenta horis medicis ; in acutis verò, quâque horâ quintâ vel sextâ ; in magis acutis, unaquâque horâ tertiâ vel quartâ ; in maximè acutis, quâque horâ secundâ ; vel etiam in horas propinanda sunt.*

6^{to}. *Cum pulveres testacei faucibus adeo hareant, ut fitim ut plurimum inferant ; inde est, quod quotiescunque propter febrem ostenduntur, toties fauces liquore quovis postea colluantur ; hinc forte est, quòd medici qui-*

(a) Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπνώμενα σώματα, καθεῶς ἐπαναλφεῖν δεῖ· τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

dam absinthii salis grana aliquot pulveribus hiſce conſuito adſciant, hæc, nimirum, de cauſâ, ne præ ſuccis ventriculi viſcidis in lapillos ruruſum abeant; uti aliquoties malaciâ affectis uſu venire ſolet, quemadmodum eximius *Nehem. Grew*, in prælectionibus, coram ſocietate regiâ *Londinenſi*, habitis, jampridem rei huic lucem attulit.

7^{mo}. A remediis repellentibus uſque eò nos contineamus, donec evacuatione in uſum ſat abunde traxerimus: Quippe cum, iſtiusmodi admovendo, humores vaſis ruruſum committamus, hi in partem primò affectam invicem adeò arietarent, ut dolor, tumor, vel aliud quodvis ſymptoma homines, prius agentia, vehementius paulò poſt laborantes cruciarent.

8^{vo}. Quandoquidem *Hippocrates l. de flatibus* hæc habet, “ Qui enim morbi cauſam cognoverit, is utique ex his quæ in corpore inſunt, adeptâ per contraria morborum cognitione, facilè poterit, quæ conferunt, offerre. Ipſa enim ars medica maximè à naturâ ineſt. Ne longè abeam, fames morbus eſt. Quicquid enim homini moleſtiam adfert, morbus appellatur. Quodnam igitur famis eſt remedium? hoc certè quod famem ſedat. Id autem ci- bus facit, illius ergo hic medela eſt. Ruruſus quoque ſitim potio ſedat. Plenitudinem item evacuatio ſanat, evacuationem verò plenitudo, laborem otium, & otium labor. Atque ut uno verbo dicam, ^(a) Contrariariorum contraria ſunt remedia. Item *aphor. 22. ſect. 2.* ^(b) A repletionem quicumque ſiunt morbi, evacuatio ſanat. Et quicumque ab evacuatione, repletio. Et aliorum contrarietas ſanat. Planè igitur conſtat morborum medelam ex contrarietate omninò pendere; quocirca cum remedia morbi ſpeciem præcognitam æmulentur; cauſarum diagnôſtica præcipua ſunt medelæ fundamentum: His enim ſemel perfectè indagatis remediî genus facilè nobis occurret.

^(a) Ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰήματα. ^(b) Ἀπὸ πλεωμονῆς ὁκόσα ἀνὲς ἰήματα γίνονται, κένωσις ἢ. καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλεωμονή καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεναντίως.

9^{no}. *Nec totius corporis vitia, citra partis cujusvis etiam vitium; neque partis cujusvis citra totius corporis vitia, omnino respicienda sunt; quippe cum singulæ causæ remedium seorsim indicent, indicatio curatrix istis unis æquiparanda est; quæ propterea vel simplex vel composita jure merito censetur.*

10^{mo}. *Serio pensitandum est, num pars idiopathice ac essentialiter, an sympathice laborat: Quoniam enim pars idiopathice laborans morbi sedes propriè nuncupetur, sedi remedia verè admovenda sunt; nam sedi ejus notha seu parti sympathice affecta, ineptè medicamina prorsus admovemus.*

11^{mo}. *Morbo demum depulso, partis, quæ malè fuit affecta, tonus nativus quamprimum remediis idoneis instauratur: Cum paragraphus autem hic sit ipsissimus quasi nonus; de eo, non habemus, quod ultra fari possumus.*

Hoc demum adjicere liceat; senem divinum medicinæ artem compendiosè in duas partes jamdudum divisisse; cum in libro Περὶ φύσεων, ait, Ἰατρικὴ μὲν ἐστὶ πρὸς θεοῦ, ἢ Ἀφαιρέσεως (additio & subtractio;) quod redundat igitur, subtrahatur; cui autem adjiciendum est, modo deficiat: Hactenus subtractionem, seu alio nomine, evacuationes paulo fufius explicuimus; jam superest, ut additionem, seu alterantia specifica, sive amica sive vulgaria sint, tandem etiam illustremus.

Eximius vir *Hollerius* additioni seu alterationi quinque conditiones, perinde quasi omninò necessarias, considerandas assignat; *movens, motum, terminum à quo, terminum ad quem, & tempus; per movens, spiritus seu calorem; per motum, chylum ac sanguinem; per terminum à quo, cordis pulsationem; per terminum ad quem, regiones corporis superiores ac inferiores; per tempus, horarum numerum subaudit. Quoties igitur movens est aliquanto validius, necnon motum, eâ vel aliâ de causâ, remedio immutante plenius imbutum est; ac ubi demum terminus à quo celerius vibratur; termini ad quos, seu spatia percurfa longè productiora erunt; ac tempus, alterationi idoneum, contractius erit: Seu ut clariùs alterationem capiat, philosophiæ novæ nos paulisper accommodemus; vires igitur motrices,*

vires impressas, materiæ quantitatem, spatia percursa, celeritates, & momenta breviter expendamus: Cum nostri tamen non sit, extra propositum inepte divagari; *Johannis Keill mathematici insignissimi lectionum physicarum paginas 97 & 98* hac de re consulatis; ubi a-

parte vobis demonstravit, quod, $C \times A = M$ seu $C = \frac{M}{A}$


seu $A = \frac{M}{C}$. seu $S = C \times T$. seu $C = \frac{S}{T}$. seu $T = \frac{S}{C}$. seu

$M = \frac{A \times S}{T}$. seu $M = A \times S$. seu quod celeritas ducta in ma-

teriæ quantitatem æquet *momentum*; seu celeritas æquat *momentum* divisum per materiæ quantitatem; seu quod *materiæ quantitas* æquet *momentum* divisum per celeritatem; at cum *spatium percursum* expendendum sit, *spatium* istud æquat celeritatem ductam in tempus; seu *celeritas* æquat *spatium* divisum per tempus; seu *tempus* æquat *spatium* divisum per celeritatem; demum *momentum* (cum de spatio percurso ac tempore simul sermo sit) vel æquat quantitatem materiæ ductam in spatium, divisa per tempus; vel (si tempus detur) *momentum* æquat materiæ quantitatem ductam in spatium. Quod ad *virium motricium* & *impressarum* vires consulatis eundem authorem in problem. 2^{do} theorem. 24^{ti}; hinc est, quòd, notis singulorum viribus, alterationis mensura ac modulus facile nobis innotescant. Nam quo numeris majoribus illorum ipsorum vires increbrescere advertuntur, eò citius alteratio perficietur; quo minoribus autem, eo lentius certè progreditur.

CAP. I.

RESTAURANTIA.

- 
 Aq. Ceras. nig. Fragar. ana. ℥iij. Epidem.
 Scord. Cinnam. h. ana ℥j. Marg. pp. ℥j.
 Sacch. Cryſtall. q. ſ. m. f. miſtura, *in lan-*
guore ſpirituum exhibenda.
 ℞ Juſcul. ℥xij. Vin. alb. Aq. Cinnam. ana ℥j. Vitell.
 ovor. n°. ij. m. f. juſculum reſtaurans ſorbendum,
in virium proſtratione.
 ℞ Cocolat. ℥ij. Pulp. Citri fruſtulatim concif. ℥vj. Cin-
 nam. ℥β. Caryoph. Mac. ana ℥ij. Cort. Citri concif.
 ℥iij. add. Conf. Alchem. ℥β. Sacch. ad Tabulat.
 coct. q. ſ. m. f. Rotulæ, ſ. cum Aquâ Succolada pi-
 tiſſanda, *in virium proſtratione.*
 ℞ Carn. Bubul. ex Lumbis exect. lbiv. Medull. Bubul.
 lbβ. Prunor. ℥iv. Paſſul. Sol. ℥ij. Medull. Arboris
 Lybic. (*Sago dict.*) ℥j. coq. in q. ſ. Aq. font. ad juſ-
 culum uſque conſummatum, addendo inter coctio-
 nem Mac. Caryoph. ana q. ſ. m. f. juſculum, *in lan-*
guidis exhibendum.
 ℞ Aq. font. lbij. Raſ. CC. ℥vj. ſtent in Balneo parum-
 per; deinde coquantur per tres horas; colaturæ fri-
 gidæ add. Amygd. d. (in Aq. Roſar. excort.) ℥vj. Miſ-
 ceantur in mortario; ſenſim affundendo Flor. Laſt.
 lbij; iterum coquantur parumper; add. Sacch. albi
 refinat. q. ſ. Liquor coletur & ſervetur uſui. Vocaba-
 tur à Dominâ inſigniſſimâ, à cujus libro MS. huc
 tranſtulimus. *Flos Laſtis Imperialis*, eſtque nutri-
 mentum quam jucundiſſimum. *In Languidis.*
 ℞ Flor. Laſt. lbij. coqr. cum aromatis quibuſlibet, (Mac.
 vel Caryoph.) q. ſ. colatur. add. pollinis oryzæ
 Coch. ij. Aq. Flor. Aurant. Coch. ij. Sacch. alb. opt.
 q. ſ. Dein coqr. ad conſiſtentiam juſculi avenacei. Vo-
 cabatur *Flos Laſtis oryzatus*, ſi cum Flore Laſtis &
 Saccharo, vel Vino Saccharato comedatur, nutri-
 mentum

mentum erit quam optatissimum, imò & quam gratissimum. *In Languidis.*

- ℞ Aq. Fontan. ℔j. in eâ calefactâ infundr. Cort. Limon. n^o. j. per horæ spatium; Colatur. add. Succ. Limon. n^o. ij. addendo interim, liquori calefacto, Vitell. ovor. bene conquassat. n^o. xij. M.edulcoretur. Capiat ex hoc ad libitum. Vocabatur, *Flos Lactis Limonatus*; est nutrimentum palato quam acceptissimum; valet tam in ijs, quorum ventriculi fermento suo nativo privantur, seu *in defectu fermenti stomachici*; quam ubi nutrimentum deest.

Hæc tria Prascripta ab insignissima cujusdam Baronissæ codice popinali manuscripto olim transtulimus.

- ℞ Juscul. Vitulin. ℥xij. Vitell. ovor. n^o. ij. Vin. Hispanic. ℥ij. m. f. Enema nutritivum. *In Chyli Defectu.*
- ℞ Seri Canarin. ℥xij. Vitell. ovor. n^o. ij. Essent. Ambr. Gryf. gutt. xij. m. f. Enema nutritivum. *In Nutrimenti Defectu.*
- ℞ Vin. Canarin. ℥iv. Sp. Salis gutt. vj. viij. x. m. *In Defectu Fermenti Stomachici.*
- ℞ Vin. alb. ℥iv. Elix. Vitriol. gutt. x. xv. m. *In Fermenti Stomachici Defectu.*
- ℞ Jusculi consummat. ovin. ℥xij. Spir. Vitriol. gutt. x. m. *In Defectu Fermenti Stomachici.*
- ℞ Spir. Theriacal. ℥jß. Spir. Vitriol. gutt. iv. Sp. Sal. rectific. gutt. v. Elix. Proprietat. cum Acido fact. ℥j. m. Capiant in quovis vehiculo. *In Fermenti Stomachici Defectu.*
- ℞ Spir. Sal. Armon. Acid. ℥j. Ol. Menth. gutt. xx. Tinctur. Succin. ℥jß. m. *In Defectu Fermenti Stomachici.*
- ℞ Elix. Proprietat. ℥jß. Vin. Absinthit. ℥iij. m. *In Bilis Defectu.*
- ℞ Sal. Volat. Oleos. ℥j. Elix. Propriet. sine Acido ℥ij. m. Capiant. gutt. xx. in Vino. *In Bilis Defectu.*
- ℞ Tinctur. Absinth. ℔j. Elix. Propriet. ℥ij. Ol. Mac. Chym. gutt. vj. m. *In Bilis Defectu.*
- ℞ Vin. Hispanic. ℥vj. Vitell. ovor. n^o. ij. Essent. Ambr. Gryf. gutt. x. m. *In Seminis Defectu.*
- ℞ Lact. ℥iij. Succolad. ℥jß. Piper. ℔j. Sacch. Crystill. q. s. m. *In Seminis Defectu.*

℞ Gelatin.

R Gelatin. CC. ℥ij. Vin. Hispanic. ℥iv. Conf. Alcherm. 3j. Tinct. Cantharid. gr. x. Vitell. ovor. n^o. j. m. *In Seminis Defectu.*
 R Lapid. osteocoll. 3j. Syr. è Symphyto ℥ij. m. *In Cal- li Defectu.*
 R Aloes Succotrin. Acaciæ ana 3ij. G. Tragacanth. (In Aq. Rosar. vel alia solut.) m. pro Topico. *In Callo generando.*

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi Aqua Fœtida, Aro- matica (Anethi, Angelicæ, Angelic. C. Anthus, Be- zoartica, Bryon. C. Calaminth, Calendul. Caryoph. Chamæmel. Citri, Cœlestis, Cordial. Saxon. Epidem. Fœnicul. Galeg. Gentian. C. Absinth. mag. comp. Gil- berti, Hormin. Hungaric. Imperial, Juniper. Laven- dul. Lilior. convall. Limon. Majoran. Mariæ, Mirab. Naphæ, Ocimi, Pæon; & Pæon. C. Puleg. Rorisma- rin. Ros. damasc. alb. Rutæ, Sabinæ, Salviæ, Satureiæ, Scord. C. Serpylli, Stephani, Thymi, Flor. Tiliæ) sim- plices ad 3ij. compositæ, ad 3ß. *in Languore.* Aro- matic. Caryophyllat. ʒj. *In Languore.* Aromaticum ro- fat. ad ʒj. *In Languore.* Condita Aromaticor. q. s. *In Languore.* Conf. Alcherm. 3j. *In Languore.* Conf. de Hyacinth. 3ß. *In Languore.* Diacinnamom. ʒij. *In Lan- guore.* Diarrhodon Abbatis 3ß. *In Languore.* Elect. è Sassafr. 3j. *In Languore.* Flor. Sal. Armon. gr. vj. Læ- tificans ad ʒij. Olea Aromatica ad gutt. iij. iv. Pulvis Bezoardic. mag. ʒj. Pulv. Cardiac. mag. ʒj. Salia Vola- tilia ad gr. vj. Species Diamargarit. frig. 3ß. Species cordiales temperat. ad 3ß. Species Diambrae ʒj. 3ß. Species Diamosch. dulc. ʒj. 3ß. Species Dianthus ʒj. *Spiritus aromatici vel fœtidi Compositi* (Angelicæ, An- thûs, Aurant. Carui, Caryoph. Castor. Cinnam. Citri, Croci, Hormini, Juniper. Lavendul. Comp. Matthæi, Limon, Melissæ, Menthæ, Nucistæ, Salviæ) ad 3j. iß. ij. *Spiritus* C. C. Cranii humani, Salis Armon. Urinæ, Castorei, Cinnamom. Croci, 3ß. j. Vinum Anthosaf. ad 3iv. Usquebach. 3j. ij. Omnia hæc *in Languore* con- ducunt.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Aq. Cinnam. cardiac. ℥iv. In Syncope. Julap. perlat. ℥iij. In Languoribus. Julap. Vit. ℥vj. In Languidis. Spirit. Alkermes ℥ss. In Languore. Spirit. Ambræ gtt. vj. x. In Languore. Spirit. Embryon. ℥j ij. In Spiritibus languidis. Tabulæ Gryscæ ad ℥j. ij. In Languore. Emulsio Dactylorum lbss. pro Nutrimento; Elæosacchar. Cardiacum q. f. ad Languores. Elixir Vitæ ad ℥ss. In Languore. Flos Cordialium seu Cardiacum magnum ℥ss. In Languore. Rosa Solis ad ℥ij. In Languore. Saccharum Ambaratum ad ℥ss. In Languore. Tabulæ Diambæ ℥ss. In Languore. Tincturæ Virginian. ℥j. ij. In Languore Febris. Caudela Amygdalina lbss. ad vires reficiendas in puerperis Diarrhœâ Vexatis. Caudela nenupharina ad lbss. In nutriendo, ac fluxibus præcavendis. Gelatina C. C. q. f. In Languidis. Jusculum Galli q. f. In Languidis.

Ex Pharmacopœiâ Fullerii. Caudela Cordialis ad lbj. ad nutriendum & Spiritus reficiendos. Caudela restaurans. ℥vj. ad Spiritus reficiendos. Caudela restaurans 2. lbss. In Spiritibus prostratis. Cibus albus lbj. ad reficiendum in Tabe & Gonorrhœâ. Decoct. Phthific. ℥iv. ℥viii. cum Lactis tantundem, mane & vesperi. Pro Chylo sup-
plendo, &c. Electuar. Analeptic. 1. ℥vj. Pro Nutrimento. Electuar. Analeptic. 2. ℥ss. Pro Nutrimento. Electuar. de Satyrio ℥iij. In Vino malvatico, Aphrodisiacum. In Seminis Defectu. Enema Confortans & Enem. Nutriens. Pro Nutrimento. Gelatin. Analeptic. q. f. Pro Nutrimento. Haustus Lacteus. In Atrophia, pro Nutrimento. Jusculum Cancror. fluviat. j. ℥xij. Pro Nutrimento. Jusculum Cancror. fluviatil. 2. ℥iv. In Atrophia, pro Nutrimento. Jusculum consummatum, ℥xx. Pro Nutrimento. Jusculum Galli q. f. Pro Nutrimento. Jusculum Phthific. q. f. Pro Nutrimento. Julap. Alexiter. cochl. v. Ad Spiritus resuscitandos. Lapis Alexiterius ad ℥j. ℥ss. Ad Spiritus erigendos. Pilulæ Camphoratæ ad no. iv. In Spirituum Defectu. Pulv. Alexipharmac. ℥j. Ad Spiritus subsidentes erigendos. Pulv. Epidem. ℥j. ij. Ad Spiritus erigendos. Pulv. Angelic. comp. ℥ss. Ad vires recreandas. Tinctur. Alexiter. ℥j. ij. Ad Spi-
ritus

ritus erigendos. Decoctum Antiloimic. Cochl. iij. iv.
In Spirituum Languore. Elæosacchar. Cardiac. gr. xv. *Ad vires refocillandas.* Electuar. Cardiac. ʒss. *Ad Spirituum Languorem.* Electuar. magnum, ad ʒj. ij. *Ad Spirituum Languores.* Electuar. Stomachic. ʒj. ij. *Ad Spirituum Languores.* Electuar. è zz. ʒj. ij. *Ad calorem nativum sustinendum.* Elixir Cinnamom. gr. xv. 20. *Ad Spiritus refocillandos.* Elixir Garyophyllaceum ad gr. xv. xx. in Vino. *In Spirituum Languore.* Elixir Stomachicum ad gr. xv. xx. *In Languore.* Elixir Volatile, gr. xx. *In Languore.* Emulsio cordialis ad cochl. ij. iij. *In Spirituum Languore.* Enema confortans ad Spiritus vacillantes sublevandos. Essentia Cordialis Hyfterica, ad gr. iij. *Ad Languores.* Haustus Cardiacus. *Ad Spirituum Deliquium.* Haustus Consolans. *In Spiritibus Lapsis.* Julapium aureum ad ʒij. *In Languore.* Julap. Caryophyllat. ʒj. ij. *Ad Spiritus refocillandos.* Julap. Cordial. Cochl. iv. *In Languoribus.* Julap. Crocat. ʒij. *In Languore.* Julap. Idæum. ad ʒij. *In Languore.* Julap. Moschat. ʒij. *In Languore.* Julap. Perlat. Cordial. Cochl. v. *In Languoribus.* Mistur. Aurea ad Cochl. j. *Ad restaurandas vires.* Mistura Cardiac. j. & ij. mist. Cochl. v. *In Languore.* Mistura Cardiac. Oleos. ad Cochl. iij. *In Languoribus.* Mistur. Consolans ad ʒij. *In Languoribus prægnantium.* Pil. Syncopal. n°. v. *In Languoribus.* Pil. Volat. n°. v. *In Languoribus.* Pil. Volat. Oleos. n°. v. *In Languoribus Spirituum.* Pulv. Ambræ comp. ʒj. *In Syncope.* Tabulæ Cardiacæ ʒj. *In Languoribus.* Tinctur. Aromat. gr. xx. *In Languore Spirituum.* Vin. Mirabil. ʒij. *In Spirituum Languore.* Electuarium Camphoratum ad ʒj. *In Languore Hyftericarum.* Julap. Camphorat. ʒij. iij. *In Languoribus Hyftericis.* Julap. de Castoreo ad Cochl. v. (cum. Sp. Sal. Armon. gr. x.) *In Languoribus Hyftericis.* Julap. perlat. Hyfteric. ʒijss. *In Languore Hyfterico.* Mistura Paralytica ad gr. xxx. *Ad Spirituum Languores.* Pilul. Splenetic. 1. ʒj. *Ad Languores Hypochondriacos.* Pilul. Splenetic. 2. n°. *Ad Languores Hypochondriacos.* Tinctur. Epileptic. ʒj. ʒj. *Ad Languores Hyftericos.* Trochisc. Apoplectic. ʒj. *In Spirituum Languore:* Trochisci Moschati ad ʒj. *In Languore.* Vi-

num Stomachic. ζ iv. *Ad Languores.* Electuar. Acid. ζ j. *In Defectu Fermenti Stomachici.* Elect. Spirituos. ζ ss. *In Spirituum Languore.* Mistur. Alcalifat. ζ ij. *In Languore.* Mistur. Aromatic. gr. xxx. *Ad Spiritus recreandos.* Mistura Stomachic. gr. 40. *In Defectu Fermenti Stomachici.* Pulv. Majoran. gr. xv. *Ad Spiritus exsuscitandos.* Pulv. de N. M. comp. ζ j. *Ad Spiritus confortandos.* Pulv. Sinap. comp. ζ ss. *Ad Spiritus confortandos & exsuscitandos.* Pulv. Tartari comp. ζ j. *Ad Fermentum ventriculi restaurandum.* Spiritus Carui ad ζ ij. *In Languore.* Tinctur. Stomachic. ζ j. *In Languore.*

Externa, Cataplasma Theriacale. Ad spiritus distributionem restituendam. Emplastrum ad Languores. *Ad Languores Hystericos.* Sacculus Aromaticus. *Ad Spiritus vel calorem naturalem, resuscitandos.* Unguentum Cordiale. *Ad Spiritus refocillandos.*

Quantum ad remedia, quæ etiam si particulis salino-volatilibus oleosisque omnino vacent; nihilo secius spiritus refocillare censentur; ejusmodi à capitulo hoc penitus exulent; quippe cum ea sint partium tenuium fermè exortia, quo pacto fieri potest, ut spiritus, quorum omnifariam sunt vacua, laborantibus suppeditare queant? Quid est, cur bolus armena, emulsiones seminum frigidorum, succus lujulæ, sal prunellæ, spiritus salis seu sulphuris cæterive spiritus acidi, radices acetosæ, electuarium acidum *Fulleri*, miva boraginis *Batei*, atque alia medicamenta, ultra quam credibile est, in cardiacorum numerum digeruntur? Non utique quoniam spirituum manipulos laborantibus adjiciunt, sed quia sanguinis luctam refringendo, spirituum fugam interdicunt; inde est, quòd primariò inter refrigerantia, ac incrassantia, scilicet inter aquea, acida, astringentia, mucosa, glutinosaque annumerari debeant; secundariò vero inter cardiacorum tribum recenseantur: Quandoquidem non per *ὑποπόνησις*, sed *ἐναντία* effectus sortiuntur suos; hoc igitur lectoribus nostris seriò inculcamus, ut caveant, ne ipsimet impropieriis in re usque eo gravi deludantur, ut vitæ laborantium exinde in discrimine versentur. Quicquid de cardiacis protulimus, id omne de *reficientibus*, de *prolificis* cæterisque effamur; cum

remedium

remedium strictè *contrarium* vice medicamento distinctè *similis* promiscuè propinare, error esset remissionis prorsus incapax: Medicorum igitur est, specifica contraria an similia propinentur, sedulò investigare.

SCHOLIA.

Quamquam authores medici specifica investigare studii plurimum usque adhuc impenderunt; nihilo tamen secius specifica hoc in capite memorata perfunctoriè solum etiamnum libârunt; neque pensum istud ritè unquam conficient medici, nisi secretorum humorum indolem ad amussim, vel per analysin vel experientiam, calleant ii: Hinc est, quòd, cum *morbì causa* sit propriè *privativa*, specifica hujusmodi in usum necessario trahi debeant: Siquis v. g. rem cum uxore suâ habere nequeat; remediumque petat à medico; quandoquidem variæ hujus impotentiae causæ esse poterint; medici est serio rimari, quænam ex istâ causarum varietate jam minusabilem affligit; ubi paralyti enim ulli afficiuntur, nec muscoli penis erectores neque acceleratores ita tendi queunt, ut sanguinis è corpore cavernoso refluxum parumper cohibere possint; remediis antiparalyticis prius tractandi quam potentes evadent; at morbis vel senio confecti, quamvis aliàs sani, æstro quamquam venereo perciti, nec tamen emissionis capaces, non sunt hi medicamentis irritantibus ac stimulantibus omninò fatigandi; quoniam per appetitum eorum venereum sat elucet, istiusmodi non tam acribus stimulos, quam reficientibus suppeditandos esse; cum sanguis eorum salibus pungentibus, non autem chyli quantitate sat uberi repleri ex hoc pateat, quòd appetitu gaudeant, ætis verò venereis omninò excidant: *Quamobrem* modò isti parumper saginati fuerint; ex emortuis strenui statim evadent: *Paralytici* jam immutantibus sanguinis vitia, languidi autem reficientibus sanantur; his per similia, illis per contraria medemur: Hoc igitur in loco methodum *per similia sanandi* aperimus. Quî vero methodus hæc aliquatenus *contraria* quoque censeatur, consulas libelli nostri, *Euodia* dicti editionis primæ paginas 61 & 62; at editionis 2dæ paginas, 64, 65, 66.

Quicumque igitur impotentiam virilem à *seminis defectu* oriri experiuntur; ij serio perpendant, ex quibus particulis semen consistere reputatur; in quâ re *quantitas* ac *qualitas* ipsius tantummodo à nobis excutienda sunt: Ipsius quantitas suppeditari nequit, nisi particulæ quam maximæ *balsamica* ubertim propinentur; neque particulæ ipsius *irritativa* præstò erunt, nisi salia volatilia seu plantæ volatiles exhibeantur: Quocirca quoties remedia *prolifera* administrare animus nobis est, inquirendum est, num seminis pars *mucosa*, an *irritativa*, an ambo simul desint? Quoniam his non cognitis adjectio idonea erit alioquin impossibilis; cum salia in senibus, chylum in juvenibus impotentibus, ingurgitare, ineptum fermè esset; quinimo ii, qui chylum ac nutrimentum balsamicum senibus, salia vero junioribus exhibent, prudentè, huic consilio palmam dando, agunt.

Anorexiâ quamplurimas adèò laborâsse novimus, ut ne vel minimum aut victûs aut remedii ventriculus eorum ferre poterit; quin ista statim evomuerint: Qui, fermentum tamen ventrale unicum instaurando, extemplo reconvaluerunt. Anicula quædam spiritum vini, vel vinum ipsum copiosè aliquandiu ingurgitaverat, ita ut non solum ventriculi fermentum abluisset, sed fibras etiam ejus quadantenus adussisset; ex quò fiebat, ut assumpta illicò revomuerit; medici accersiti remedia stomachica *amara*, vel per anni dimidium, variis in formulis illi exhibuerunt; quid sit? Cùm remediis fatigata, senio confecta, cibos aversata, nutrimento omnimodo vacua fuerit, parum abfuit, quin ista confestim in tumultum exinde præceps daretur: Quia tamen consilio nostro attentè auscultaverat, spirituosis omnino valedixit, rus petiit, nutrimentum tenue sorbillavit, stomachica idonea, quæ fermentum ventriculi instaurarent, sumpsit: Atque ita valetudinem firmam tantum non statim recollegit; ac jam nunc vitæ muneribus tam strenuè fungitur, ut illam, vel in ævum adhuc vitam protracturam, fere suspicari fas sit.

Morbo quovis aliquandiu protracto, *spirituum languor* morbo huic itidem superinjici solet; qui remedia spiritus eodem tempore vacillantes refocillantia perinde ac alterantia præ morbo primùm affligente, requirit; quocirca

quocirca ni indicationis etiam vitalis, licet causæ privativæ, cardiaca ac reficientia simul exhibendo, rationem habeamus; quid morbum, cum ægrotus nihilo fecius animum efflaturus sit, auferre moliamur? Invalescente enim languore, quid, etiam si morbus evanesceret, iis proderit? hinc enim fieret, ut morbo primario extincto licet, languore unò laborantes perirent; ita ut ne languor neu morbus omninò posthabendi sint, quin isti unà auferri debeant.

Simili ferè modo, nonnulli, præ fibrarum ventriculi laxitate, cibum solidum coquere nequeunt; neque hujusmodi marasum facile effugiunt, nisi victus tenuis ac facilis coctu, eis sedulò propinetur; hinc est, quod vel forbilia vel potabilia devorare debeant; atque hinc etiam est, quod *Hippocrates aphor. 11. sect. 1.* hæc habeat, *Διμὸν Θώρηξις λύει*; tale autem nutrimentum chyli indoli ita accedere debet, ut tantum non statim in chylum ac sanguinem immutetur; veluti enim vinum liquor est defæcatus, uti tenue est, ac tandem siquidem sanguini consimillimum est; ita motui intestinorum vermiculari facile cedit, ac in sanguinem confestim urgetur; ex quo fit, ut nutrientia ejusmodi commodum ventriculo committantur, cum spiritus ipsosmet reficiant.

In hepate perinde est, ut bilis aliquoties desit; hoc in casu *amara* bilis vices quam optimè gerunt; cum sint ejusdem planè genii, cum pituitam inertem nimis acuant, cum glandularum hepaticarum obstructions summoveant, cum tandem coctionem apprimè evahant; atque adeò bilis facultates, in hujusmodi specie, quam perfectissimè æmulentur.

Corollarium.

Mixtura Hysterica Lactea.

R Gummi. Ammon. ʒij. Galban. ʒj. dissolv. in Aq. Ceras. n. ʒvj. m. f. mixtura, de quâ capiat Cochli. j. manè quotidie, & in Paroxysmis.

OBSERVATIONES.

In Medicamentis fœtidis, seu in paroxysmo five extra eum, passioni utique hystericae opitulandi facultas inest; quo autem artificio hoc eveniret, paucis exponere nobis copiam, si placet, faciatis. Fœtida ex salvolatili ac oleo, analysi chymicâ, constare reperiuntur; quæ duo principia activa, cum tam massam quam spiritus alacriter circumire cogant, motum progressivum mirum in modum adurgent; quoniam etiam spiritus sunt corpora minima quam subtilissima, fœtida eos optime suppeditant: His ita prælibatis, fuerit par est, quod quoties ii lentius, quam decet, in organa pelluntur, vel quoties numeribus vitæ sat esse cœdunt; non fieri potest, quin motus eorum et motus quamplurimum exhinc interpelletur; utpote cum partes aliæ spirituum turmâ nimium affluant, dum aliæ verò è contrariò penuriâ conficiantur: Inde est, quod muscoli seu nervi, qui eorum copiâ laborant, contractiones fiant; qui verò inopiâ cadunt, productiones sint: Sat igitur vobis elucere arbitramur, quâ sit, ut aut convulsiones aut paralyces, pro contractionis vel relaxationis more, ponè subeant: Quandoquidem verò mulieres hystericae spirituum inopiâ ferè laborant, contractiones; quasi uspiam cadentes, quoniam spirituum influxui anomalo ortum debent, paralyces censendæ sunt: Quocirca, fœtida exhibendo, motum instauramus, languidas vitæ donamus, ac paroxysmos tam infestantes quam infesturos in posterum anticipamus.

Emplastrum umbilicale.

℞ Emplast. Stomach. magistral. Galban. colat. ana. p. æ.
m. f. Emplastrum toti abdomini applicandum.

OBSERVATIONES.

Perpauci modum, quâ emplastra admota munus suum pertexunt, perspicuè etiamnum explicuerunt: Quamplurima certè ne vel hilum cuivis profunt; quoties utique è particulis salinis, vel oleoso-volatilibus constant, toties eæ poros introductorios facillè subire solent; ac proindè ad nervorum extrema vectæ, five in abdomine

five

sive alibi locentur, tam vigorem istis impertiunt, quam convulsiones apparentes tollunt; atque adeò mulieribus hystericis opem ferunt; cum cætera verò non altius fibris circumpositis penetrant, uti fusius infra dicetur.

Aqua Hysterica.

℞ Aq. Cerasor. n. ℥ss. Pæon. comp. ℥ij. Spir. Ceras. n. ℥ss. Sacchar. parum. m. f. Julapium, cujus capiat Cochl. iij. vel iv.

OBSERVATIONES.

Cùm hæc mistura apud virum eximium in usum frequentius traheretur, vehiculi vices gessit; spiritus pigrè circumactos extimulat, vires prostratas ac labefactas erigit, necnon motus anomalos exinde refrænât. Muliebus hystericis somnum conciliat; somnus enim hystericis imò vel cuivis raro unquam ingruit, nisi quum spiritus ac sanguis imperturbatè ac ordine circumaguntur; quoties autem angores, ab animi pathematibus, oriundi, spiritus evaporant; toties noctes insomnes omnino degunt istiusmodi; quod si medicamina volatilia propinemus, perinde spiritus alacriter circumpellimus quam eos fartos tectos conservamus, ac haud multo post somnus, diu ac multum desideratus, ponè subibit.

Mistura Cordialis.

℞ Sal. Volat. Oleos. ℥ij. Tinctur. Croc. Castor. ana ℥j. m. Capiat gutt. xv. vel xx. alternis horis, in haustulo. *Julapii vulgaris.*

OBSERVATIONES.

Deliquiis cujusvis speciei subsidio venit mistura hæc; spiritus enim quam maximè refocillat; quotus enim quisque est, qui spirituum indolem intimam etiam dum nobis patefecit? hinc fit, ut eorum textura non nisi à posteriori seu ab effectibus unquam detectum fuerit; siquidem igitur medicamenta è particulis volatilibus ac oleosis constantia, eos invigorant; palam est eorum genium particulis oleoso-volatilibus consimilem esse; atque hinc fit, ut ejusmodi spiritus laborantibus adjuvant.

Medicamentorum cardiacorum volatilium efficacia adeò fugax est, ut sæpius, modo deliquia pedem iteratò referant, repetenda sint: Hinc autem elucet, cur syn-
copes causa primaria adeò medicis curæ esse debet; cum deliquiis per spirituosâ una occurratur, cum eorum tamen causæ, primùm ægrotis incumbenti, remedia longè diversa subindè subsidio veniant: Spirituum inopiâ febricitantem laborare nobismet fingamus; ita erit, ut Spiritus identidem causâ, febre nimirum, non sublata, aufugiant; quos adeò suppeditare debemus, ut febris non exinde magis increbrescat; quinimo deliquia perinde remedium quam febris ostendunt; nec igitur nitrosa, aquea, lactea, vel similia febris speciei accommodata magis conducunt, quam cardiaca deliquiis; nec vice versâ, cardiaca febrifugis magis necessaria sunt; cæterum, utraque conjunctim, pro indicationis urgentiâ, exhibenda sunt; ita tamen propinentur, ut alterum alteri impedimento non sit: Quod si spiritus muneribus suis propterea desint, quòd sanguis sit lentus, viscidus ac pituitosus, utpote qui vel præ vapidityte sit eorundem expers, vel præ lentore haud facile cerebri corticem subire cernatur, tum medicamenta volatilia, non spiritus tantum adjiciunt, sed sanguinem etiam immutant; hinc autem fit, ut perinde intemperiei repugnent, quàm spiritus gratificentur; ut, adhæc, hoc in casu, modo agant prorsus composito, tam sanguinis vitium mutando, quam spiritus suppeditando: Lectores autem hic monendi sunt, ut his unis non ita fidant, ut alia remedia, quorum efficacia in sanguine diutius diversari solet, posthabeantur; quinimo *amara*, ac *martiata* sub idem exhibeantur tempus; primùm, quia fugam non tam citò quam volatilia parant; deinde acido quam maximè adversantur; siquidem enim *amara* è sale fixo, alcalino, maximam partem constare reperiuntur; quoniam etiam sal fixum unumquodque luctam cum acidis inire cernitur; cum *pituita* sit sanguinis pars aquea, sulphurææ per acida adunata; acido per *amara* vel *salia* fixa everso; sanguis fit exinde confestim tenuior, ac circumagendo aptior: *Martiata*, non per particulas suas sulphuræas modò agunt, verum per pondus suum etiam vires suas exerunt: Hinc est, quòd, si-

ve medicamenta volatilia five ponderosa exhibeamus, momenta poterunt esse paria, dummodo aucto pondere velocitas minuatur; vel auctâ velocitate aliquid è pondere detrahamus.

Emplastrum Suppedale.

Rx Emplastri Cephalic. cum Euphorb. q. f. Emplastrum rotis pedibus applicandum.

OBSERVATIONES.

Emplastra apud majores nostros magni sanè æstima-
bantur; jam verò parvi quinimo nullius ferè, momenti
putantur; cæterum utrobique erratur; quoties enim em-
plastra astrictoria eò admoventur, ut partium longè diffi-
tarum dolores leniant, toties ineptè agimus; quod si
partibus volatilibus vel oleosis abundè referciantur, va-
rios pro morbi sede sortientur effectus: Hinc est, quod
emplastrum hoc pedum plantis in delirantibus admo-
veri soleat; cùm, brevi, ex calore aucto necnon pulsu
invigorato partes ipsius tenuiores ac magis activas se in
sanguinem insinuâsse palam fiat. Humores à capite de-
rivant; cum enim plantæ sæpiusculè madore perfun-
dantur, quinimo cum vesiculas aliquoties excitare so-
leant, signa hæc sunt apodictica irritationis insignis.

Emplastrum foetidum.

Rx Emplastr. Oxycroc. Gum. Galban. Emplastr. Cepha-
lic. ana p. æ. f. Emplastrum totis pedibus appli-
candum.

OBSERVATIONES.

Emplastrum hoc ægrotantibus fermè subsidio venit,
quòd quâ sanguinis massam ultro citròque concitet, quâ
fibras irritando, humorum *ῥοιῶν* ad partem stimula-
tam copiosius accersat: Hincque est, quòd in deliriis
simplicibus febrium comitibus magno sint laborantibus
usui.

Pilula Hysterica.

Rx Gum. Ammon. ℥ij. Galban. ℥j. m. f. pil. minores;
quarum capiat ij. urgente Dyspnœâ, superbibendo
Cochl. iij. Aq. Ceras. nig. cum Sacchari pauxillo e-
dulcorat.

OBSERVATIONES.

Quotusquisque *mixturam hystericam lacteam* supra nominatam consulet, is non potest non certior fieri, quam parum pilulæ hæ ab istâ misturâ diffideant.

Spiritus Anticonvulsivus.

Rx Sal. Armon. Gum. Galban. extract. ʒj. naribus admoveatur in paroxysmis.



OBSERVATIONES.

In paroxysmis hystericis vel deliquiis, spiritus, aut quod fugam capeffant, aut quod ad eorum generationem ineptus sit sanguis, desunt: Siquando symptomata hæc à spirituum penuriâ eventuali, seu causâ evidenti prognatâ, initium faciant, periculo ferè vacant; quod si eorum penus idcirco subtrahatur, quòd sanguis, præ intemperie, illos suppeditare nequeat, vix aut nullo modo vires postmodum recolligunt: Quoniam hi morte præmaturâ ferè corripiuntur, illi verò illicò reviviscunt; his externa parum profunt, illis verò ideò statim præstò sunt, quia papillas narium nervosas percellunt, motum denuo undulatorium seu oscillatorium istis impertiunt, adeò ut tam integrum nervorum systema, quam meninges sese corrugent, ac efficaciter spiritus in cerebri cortice defixos urgeant; inde erit, quòd cor rursus micare trahant, sanguinisque motum progressivum, tantum non evanidum, tantoperè redintegrent, ut sopiti ac somno sepulti resuscitentur. Deliquia hæc patientibus hystericis necnon convulsivis frequentius obtingunt; cum spiritus enim eorum flatuosi seu tenuiores sint, partes extremas quavis de causâ, vel levissimâ, concitatus aliquantò invisunt; ex eo, quod tam fibris sensilibus valdè quam spiritibus agilibus gaudeant, adeò ut *planta sensitiva* instar, affricu vel lenissimo laborantes hujusmodi contrahantur: Flatus enim in coli angustum conclusus, motus seu exercitium, ultra quam par est, obita, animi pathemata instigata, & similia, spiritus ita incitant, ut ii cerebri pomœria cum impetu quodam transiliant; quocirca *spiritus hic anticonvulsivus*, vel alius sibi consimilis, naribus admotus, cum membranam

membranam pituitariam tum papillas nervosas ibidem fitas tam validè irritat, ut perinde humores, præ membranarum oscillatione, circumagat, atque secretionem renovet; quinimo hunc in modum suppetiæ novæ cerebro statim afferuntur: Artificium hoc, quo spiritus ita suppeditantur, à recentioribus quibusdam per metaphoram *Flagellationis* nomen haud improprie promeruit; quando ij præ vecordiâ suâ, torpidâ nimirum, adeò gradum fiſtunt, ut muneribus suis parumper prorsus defint; atque hâc de causâ in tripudium quasi solitum per effluvia pungentia rursus vapulent.

C A P. II.

ATTENUANTIA.

-  Cinnab. factit. ℥j. Cer. ℥viiij. Ol. Succin. ℥ss
 R. Ol. Tereb. ℥iss. m. f. Emplastrum. *Pro Nodo.*
 R. Vin. alb. ℥iv. Spirit. Absinth. gutt. vj. m. f. mistura capienda. *In Nauseâ.*
 R. Conserv. Fumar. ℥ss. Sal. Absinth. ℥j. Syr. Mart. q. s. m. f. Bolus. *In Hepate obstructo.*
 R. Staphid. agr. ℥iss. Ol. Petrol. ℥ij. Butyr. Salit. q. s. m. f. Linimentum capiti vel inguinibus illinendum. *In pediculis capitis, vel etiam cancrinis.*
 R. Summit. Majoran. Abrotan. ana m. ss. Rut. Hyssop. Rorismarin. ana p. vj. Baccar. Laur. Juniper. ana ℥j. Incis. & contus. coq. in lixivio, m. f. fottus. *In Pneumatocele, Phymosi, Paraphymosi.*
 R. Aq. Rut. ℥iij. Spir. Vin. ℥j. Sal. Armon. ℥ss. Cinnab. Antimon. ℥j. m. f. mistura pro Topico. *In Podagrâ.*
 R. Decoct. Amar. alterant. ℥xij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. capt. ℥iv. *In Arthritide Anomalâ (ubi sc. retrocessit.)*

- ℞ Vin. Hispan. ℥iv. Ol. Tartar. per deliq. ℥j. m. f. mistura sumenda. *In Malaciâ, Picâ.*
- ℞ Pulv. Rad. Ari ℥ij. Syr. Balsam. q. f. m. f. Linctus. *In Raucedine à Pituitosis Humoribus.*
- ℞ Milleped. viv. contus. n°. xx. Seri Lact. Canarin. ℥v. Elix. Propriet. ℥j. m. f. expressio. *In Rachitide.*
- ℞ Gentian. ℥j. Theriac. Androm. ʒß. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Bolus. *In Hydrophobiâ.*
- ℞ Aq. Theriacal. ℥iiij. Theriac. Diatessar. ℥ij. m. f. mistura. *In Hydrophobiâ.*
- ℞ Allii. Rut. ana q. f. tufis in mortario add. Sal. culinar. q. f. m. f. Cataplasma supra partem morsam admovendum. *In Hydrophobiâ.*
- ℞ Aq. Fumar. ℥j. Tinct. Antimon. ℥j. Syr. Mart. ℥j. m. f. mistura capienda. *In Scabie.*
- ℞ Rad. Gladiol. lut. ʒß. coqr. in lacte,edulcoretur, m. f. Haustus, quem capiant à cane rabido morfi, per 7 dies. *In Hydrophobiâ.*
- ℞ Rad. Gladiol. pulv. ʒß. Syr. violar, q. f. m. f. Bolus capiendus per mensem. *In Scrophulâ.*
- ℞ Aq. Puleg. ℥ij. Rut. ℥iiß. Pæon. comp. ℥j. Syr. è Succo Puleg. ℥ij. m. f. mistura sumenda cochleatim. *In Pertussi, seu Tussi convulsivâ Infantum.*
- ℞ Storac. optim. ʒß. Ambr. grys. gr. iij. m. f. Pilulæ mediocres. *In Tussi contumaci.* Pilulas è Styraçe liquidâ cum pulvere Glycyrrhizæ factas in Tussi diurnâ, à tractatione malâ inductâ, efficaces nuper novimus.
- ℞ Piper. Zinzib. ana ℥j. Sal. Gemm. commun. ana ℥ij. Origan. Calaminth. Rad. Ireos. Hermodactyl. ana ʒß. Mastich. ℥j. m. f. Pulvis sæpius inspergendus. *In Ranulâ Lingue.*
- ℞ Sal Lupinor. ʒßj. Capiant in Vini albi ℥iv. *In Ischuriâ.*
- ℞ Lixivij. Sarmentor. vitis, cum origan. Chamom. Puleg. Calaminth. in Vino coct. *In Pedum Inflatione.*
- ℞ Alb. Græc. cum Ciner. Nid. Hirundin. ana q. f. cum Melle m. f. Cataplasma. *Ad Anginam resolvendum.*
- ℞ Conf. Cochlear. ℥j. Cort. aurant. Enul. Campan. condit. ana ʒß. Zinzib. condit. ℥j. Elix. Proprietat. ℥j. Tinct.

Tinct. Cinnam. Succin. ana ʒʒ. m. f. Electuarium. *In Anorexiâ.*

℞ Cinnab. nativ. gr. vj. Gum Guaiac. ʒʒ. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Bolus, bis in die repetendus. *In Doloribus Rheumaticis.*

℞ Theriac. veter. ʒʒ. Succ. Cepar. ʒʒ. Sterc. Columb. ʒijʒ. Sal. commun. ʒij. Pulv. Rut. Scord. ana. ʒʒ. Aq. Vitæ q. f. m. f. Cataplasma. *In Vulnere venenoso.*

℞ Rasur. Lign. Guaiac. ʒijʒ. Sassafr. ʒj. Cort. Tamarisc. ʒvj. Rad. Enul. Camp. ʒijʒ. Fol. Eupator. m. ij. Centaur. min. m. ʒ. Sem. Nasturt. Dauc. Anis. ana ʒj. Coq. lento igne in Aq. font. Colatur. add. Sp. Vol. Oleos. ʒijʒ. Sal. Card. bened. ʒij. Syr. è Succ. Heder. terrest. q. f. m. f. Apozema. *In Asthmate humido.*

℞ Pulv. Sem. Sinap. Sulph. viv. ana ʒʒ. Tereb. è Chio. q. f. m. f. Bol. n^o. ij. *In Asthmate humido.*

℞ Mercur. viv. ʒj. Conf. flor. Anthûs ʒj. Tinct. Succin. gutt. x. f. m. Bolus. *In Partu difficili.*

℞ Rad. Fœnic. Petroselin. ana ʒij. Rad. Enul. lbʒ. Fol. Calaminth. Scabios. Hyssop. Adianth. Marrub. alb. ana m. j. Aristol. rot. ʒj. Ireos. ʒʒ. Sem. Urtic. Nasturt. ana ʒʒ. Spic. Nard. ʒij. Bacca. Laur. ʒiv. Nigell. Roman. ʒʒ. macerentur in Vin. alb. Cong. j. digerantur, destillentur. Dos. ʒijj. mane. *In Asthmate humido.*

℞ Aq. Hyssop. Menth. Fœnic. ana ʒj. Tinct. Propriet. ʒʒ. Syr. de Nicotian. ʒʒ. m. f. mistura cochleatim sumenda. *In Asthmate humido.*

℞ Cepar. crud. n^o. ij. Sal. culinar. ʒij. terantur in mortario, admoveantur *Parti ambusta, ubi Gradus Ambustionis secundus, seu Inflammatio adest.*

℞ Sp. Vin. Camphorat. Tinct. Myrrh. ana p. æ & q. f. m. f. mistura. *Pro Parte ambusta in secundo Gradu.*

℞ Aq. Cinnam. ʒj. Meliss. ʒij. Tinct. croc. gutt. xv. Ol. Succin. gutt. v. Borac. Venet. ʒj. Sacch. alb. q. f. m. f. mistura. *In Molâ.*

℞ Borac. Castor. Myrrh. ana ʒj. Sal. Vol. Succin. gr. vj. m. pro duab. Dosibus, capiant in Aq. Cinnam. ʒj. *In Molâ.*

℞ G. Galban. Ammon. ana ʒj. M. P. Aloephang. gr. x. Ol. Succin. q. f. m. f. Pessus. *Pro Molâ.*

℞ Scoriar.

- ℞ Scoriar. Antim. q. f. injiciantur super carbonēs pro
fuffitu. *In Molâ.*
- ℞ Sabin. Artemif. ana ℥vj. Myrrh. Sagapen. ana ℥ij.
Castor. ℥j. m. pro fuffitu. *In Molâ.*
- ℞ Rad. Pæon. ℥j. Helen. ℥℞. Fol. Betonic. Meliff. Salv.
Rorifmar. ana m. j. Flor. Leucoij. lutei. Liliior. Conv.
Anthûs a. p. ij. Primul. veris p. j. Stœchad. Arabic.
℥℞. Lign. Aloes ℥j. Cinnam. ℥j℞. fecentur, facculo in-
fuantur, infund. in Vin. alb. ℔vj. Capiant hauftrum
horis medicis. *In Cephalalgia frigida.*
- ℞ Ol. N. M. Chymic. ℥j. Balf. Apoplect. Lucatell. ana
℥℞. M. admoveantur cum Chartâ bibulâ. *In Cepha-
lalgia frigida.*
- ℞ Flor. Chamom. Anthûs Fol. Betonic. Majoran. N.
M. Mac. Caryoph. Ambr. gr̃s. Mosch. ana q. v. m.
Pro Pileolo feu Cucuphâ. *In Cephalalgia frigida.*
- ℞ Pulv. Zedoar. ℥j. Aq. Sambuc. ℥ij. Aq. Regin. Hun-
gar. ℥j. m. pro Epithemate. *In Cephalalgia frigida.*
- ℞ Succ. Sabin. ℥ij. Vin. a. b. ℥iij. Borac. Venet. ℥j. Sacch.
alb. q. f. m. *In Partu difficili.*
- ℞ Piper. Euphorb. Pyreth. Calam. arom. ana ℥j℞. Ol.
Succin, cum Ceræ q. f. m. f. Linimentum pro Cervice
ungendo. *In Lethargo.*
- ℞ Satureiæ totius m. j. coq. in Vino, instilletur Auribus
& occipiti. *In Lethargo.*
- ℞ Aq. Cinnam. h. ℥ij. Sp. Anif. ℥℞. m. *In Singultu.*
- ℞ Euphrag. ℥℞. Cinnam. Zinzib. ana ℥ij. Cardamon.
Cubebæ. ana ℥℞. Sem. Fœnic. ℥ij. Sacch. Cand. ℥j℞.
m. f. Tragæa, *Pro Catarrho.*
- ℞ Vin. Chalybeat. ℥iv. Sal. Satyr. ℥℞. m. capiant sæ-
pius. *In Sterilitate.*
- ℞ Cort. Aurant. exter. ℥vj. Calam. aromat. Galang.
Bacc. Laur. ana ℥j. Cinnam. Cymin. ana ℥j℞. m. f.
Pulvis, Dosis ℥j. *In Colicâ.*
- ℞ Cort. Peruv. opt. subtiliter Pulv. ℥j. Syr. Caryoph. q.
f. m. f. Bolus quâque horâ quartâ sumendus. *In In-
termissionibus vel Remissionibus Febris repetendus.*
- ℞ Decoct. Cort. Peruv. ℥jv. Syr. Caryoph. ℥℞. m. f.
Haustus. *In Intermissione vel Remissione Febris.*
- ℞ Flor. Chamom. ℥℞. N. M. gr̃. v. Sacch. Cryftal. ℥j.
m. f. Pulv. pro unicâ Dosi. *In Febre intermittente.*

- ℞ Sal Absinth. ℥j. Elix. Prop. ℥j. Vin. alb. ℥iij. m. f. Haustus. *In Febre intermittente.*
- ℞ Pulv. Rad. Serpentar. Virgin. gr. xv. ℥j. Confect. Alcherm. ℥j. m. f. Bolus. *In Febre continuâ.*
- ℞ Camphor. gr. iv. Pulv. Rad. Serpent. Virg. gr. x. Confect. Alcherm. ℥j. m. f. Bolus. *In Febre malignâ.*
- ℞ Bals. Peruv. q. f. pro lotu. *In Steatmate.*
- ℞ Myrrh. ℥jβ. Camphor. ℥β. Labdan. ℥ij. m. f. Emplastrum. *Pro Steatmate.*
- ℞ Lign. Santal. alb. Sassafr. ana ℥β. Rad. Apii. ℥β. Fol. Scabios. Betonic. ana p. iij. Sem. Coriand. pp. ℥j. infund. in Aq. font. bullient. ℔ij. Colatur. add. Syr. Mart. ℥ij. m. f. Apozema. *In affectione hypochondriacâ, hystericâ, palpitatione.*
- ℞ Stipit. Caulium calcin. ℥ij. Urin. hom. san. ℔ij. m. f. Lixivium. *In Alopeciâ.*
- ℞ Apum Melle Saturat. q. v. calcinentur. m. cum Oleo f. Linimentum. *In Alopeciâ.*
- ℞ Spir. Vin. Camphorat. rectif. q. v. accendatur, fumus super partem affectam recipiatur, deinde.
- ℞ Emplastr. de Ran. cum. Mercur. admoveatur. *In Crepaturâ Tendinis.*
- ℞ Succ. Fœnic. Verben. Chelidon. ana ℥iij. Capit. Hirund. n^o. ij. Mell. optim. ℥iv. Urin. Pueri impub. ℔ij. Aq. Fœnic. Beton. ana ℥ij. Fol. Rut. mβ. destillentur; Aq. hujus Guttæ aliquot in oculum à cubitum ituris instillantur. *In Debilitate visûs.*
- ℞ Sp. Sal. Armon. Sal. Vol. Oleos. ana q. v. vapor hujus in aurem ex angusti Colli Phialâ recipiatur. *In Surditate.*
- ℞ Spir. Tartar. ℥β. Spir. Formicar. rectif. ℥jβ. Tinct. Lign. Sassafr. ℥j. m. instilletur Auri. *In Surditate.*
- ℞ Milleped. viv. n^o. CC. Vin. alb. ℔iv. m. infundantur, capiant haustulum. *In Gutta Serenâ.*
- ℞ Liquor. Jecor. Hirc. (cui infiguntur Fol. Fœnic. Rut. Chelidon.) assat ℥j. instilletur Oculo. *Pro Guttâ Serenâ.*
- ℞ Milleped. n^o. CC. Vin. alb. ℔iv. infund. simul. *In Guttâ Serenâ.*
- ℞ Mell. Anthosat. Zinzib. Caryoph. Sal. a. ℥β. m. indatur Oculo quantum Sem. Sinapios. *In Guttâ Serenâ.*
- ℞ Cepar.

- ℞ Cepar. Allii n°. ij. axung. Porc. q. s. m. f. Linimentum admovendum Plantis Pedum (probè infricando); tum Linteis calidis involvantur. *In Raucedine.*
- ℞ Capit. Allii q. v. coq. lente in Vino, capiat haustum mane & vesperi. *In Raucedine.*
- ℞ Aq. Menth. Puleg. a. ʒß. Lign. Sassafr. cum Vin. ʒj. Ol. Menth. Mac. a. gtt. ij. Tinct. Croc. gtt. xv. Sacc. perlat. ʒij. m. *In Apepsiâ.*
- ℞ Ciner. Rad. Fœnic. ʒß. Mell. opt. ʒij. m. *Pro Aphthis Sordidis.*
- ℞ Sp. C. C. ʒß. Aq. Meliss. ʒvj. Sp. Lavend. ʒj. Dris. Stephan. ʒj. m. *In Apoplexiâ.*
- ℞ Aq. Epileptic. Lang. ʒij. Bryon. C. ʒij. Sp. C. C. ʒjß. m. indatur ori. *In Apoplexiâ.*
- ℞ Sp. Sal. Armon. cum Calce parat. q. v. naribus admoveatur. *In morbis somnolentis.*
- ℞ Aq. Hysteric. Sp. Ceras. n. Lilior. Convall. ā ʒß. Tinct. Castor. ʒjß. m. pro Spinâ Dorfi. *In Apoplexiâ.*
- ℞ N. M. ʒij. Sem. Cubebæ. ʒj. m. f. Pulvis pro suffitu. *In Uteri Flatu.*
- ℞ Allii, ʒj. infundatur in Spiritu Vini, q. s. capiat horâ somni. *In Arthritide vagâ.*
- ℞ G. Carann. Ammon. ā. ʒj. Merc. Viv. (Terebinthin. extinct.) ʒß. m. f. Emplastr. *In Mesenterii Tumoribus.*
- ℞ Mastich. Oliban. Myrrh. Ammon. Opoponac. Bdelii, ā. ʒj. Mell. lbj. Tartar. ʒvj. Sp. Vin. lbij. destillentur f. Spiritus in Arthritide frigidâ admovendus.
- ℞ Vin. Absinth. ʒjv. Tinct. Sal. Tartar. gtt. xxx. m. *In Arthritide vagâ.*
- ℞ Ol. Succin. ʒij. Lavendul. ʒj. Bals. Peruv. ʒß. m. *Pro Aridurâ.*
- ℞ Sal. Calc. Sal. fim. Columbin. ā. ʒij. Sterc. Caprin. q. s. m. *Pro Verrucis.*
- ℞ Sal. Armon. in Aq. solut. q. s. m. *Pro Verrucis.*
- ℞ Emplastri Vigon. cum Mercurio. *Pro Verrucis.*
- ℞ Emplast. Diachyl. ʒj. Sal. fimi Columbin. ʒij. m. *Pro Clavis.*
- ℞ Unguent. de Nicotian. q. s. *Pro Callis.*

- ℞ Sp. Tereb. ℥j. Camph. ʒj. m. *In Nevus, Ephelide, Lentigine.*
- ℞ Milled. viv. contus. n^o. C. Croc. ʒij. Vin. alb. ℔ij. m. f. Expressio. *In Asthmate humido.*
- ℞ Aq. Hyssop. Menth. Fœnic. ā. ʒj. Tinct. Propriet. ʒiſ. Syr. Nicotian. ʒβ. m. detur cochleatim. *In Asthmate humido.*
- ℞ Cinnam. ʒj. Spic. Nard. ʒx. Agaric. alb. ʒvj. Mastich. ʒij. m. f. Pulvis cum Melle f. Electuarium; (Dosis ʒij. quotidie.) *In Cataractâ.*
- ℞ Sem. Bardan. ʒβ. Rad. Bardan. ʒj. coq. in Aq. co-latur. ℔ij. add. Syr. è Cort. Citri ʒij. m. *In Colicâ Acidâ Scorbucâ.*
- ℞ Spir. Volat. Oleos. ʒj. Elix. Prop. sine Acido ʒij. m. *In Cruditare Acidâ.*
- ℞ Sal. Nitri, Piper. alb. ā. ʒij. Euphorb. ʒij. Spir. Vin. ʒiv. m. *In Tumoribus aqueis.*
- ℞ Aq. Lact. Alex. ʒij. Bryon. c. Pæon. c. ā. ʒj. Cort. Peruv. opt. subtiliter Pulv. ʒj. m. capiat. mane & vesperi. *In Asthmate Sicco.*
- ℞ Ol. Amygd. amar. ʒβ. Sp. Salviæ ʒj. Tinctur. Ca-stor. ʒij. m. *Pro Tinnitu.* (Auri instilletur.)
- ℞ Ciner. Lign. Juniper. ʒj. Thym. Rorismarin. ā. ʒβ. Vin. ℔ij. m. *In Stupore.*
- ℞ Aq. Puleg. ʒjv. Sp. C. C. ʒj. m. capiat. *In Tinnitu.*
- ℞ Rad. Raphan. ʒij. Ellebor. alb. gr. ij. Castor. Pyreth. ā. ʒβ. coq. in Vin. modice, instilletur gr^{ss}. j. (ij.) Auri. *In Surditate.*
- ℞ Sal. Toft. q. v. admoveatur Auribus. *In Tinnitu.*
- ℞ Spir. Urin. parum in Bombace, indatur Auribus. *In Tinnitu.*
- ℞ Sp. Salv. rectific. ʒj. Tinct. Castor. ʒij. m. *Pro Sur-ditate.*
- ℞ Sal. Viperar. vol. gr. iv. Conserv. Flor. Anth. ʒj. m. capiat. *In Favo.*
- ℞ Ciner. Clavellat. fact. in Lixivium cum Vino albo; add. Fol. Major. Abrotan. a. m. j. Capill. Vener. m. iβ. Flor. Rosar. r. p. ij. coq. caput lavetur ter in sep-timanâ. *In Favo.*
- ℞ Ol. Tartar. per Deliq. q. v. *Pro Faciei asperitate.*

℞ Aq.

- ℞ Aq. Menth. ℥j. Cort. Citri ℥℞. Sp. Sal. Armon. gr̃.
x. Sal. Absinth. gr̃. v. Ol. Menth. gr̃. j. Syr. Fœnic.
℥vj. m. *In Atrophia Infantili.*
- ℞ Decoct. Guaiac. Saffaf. Xylo - Aloes, Flor. Lillor.
Convall. Salv. Beton. Pæon. Tiliæ (a. ℥ij. ad lbvj.
Aq.) pro potu. *In Bronchocele.*
- ℞ Spong. opt. in Carbones ust. Pulv. Div. Decoct. Lign.
nor. ℥xj. Syr. Mart. ℥j. m. capiat cochl. j. omni mane.
In Bronchocele.
- ℞ Vin. Chalybeat. ℥iv. Sp. Sal. Armon. ℥j. capiat. bis
de die. *In Cachexia, Liene obstructo.*
- ℞ Fim. Pavon. ℥ij. Aq. Pæon. C. ℥vj. m. capiat. cochl.
iv. semel. *In Tremore Senili.*
- ℞ Spir. Vin. r. ℥vj. cep. n°. j. infund. m. *Pro Cephalæa.*
- ℞ Emp. è G. Heder. ex ammon. a. q. f. *In Concussione.*
- ℞ Vin. alb. ℥ij. Amygd. amar. n°. viij. infundantur. *In
Stupore Dentium.*
- ℞ Spirit. Vin. rect. ℥j. Tinct. Piper. ℥j. m. *In algore
Dentium.*
- ℞ Ol. Anis. Chymic. gr̃. x. Vin. Chalybeat. ℥ij. m. *In
Mensium difficultate.*
- ℞ Caryophyll. ℥j. coq. in Vino. *Pro dolore Auris frigido.*
- ℞ Sterc. Pavon. ℥ij. Vin. alb. lbij. infundantur. *In Vertigine.*
- ℞ Absinth. Aneth. a. m. ℞. Sem. Anis. Cumin. a. ℥j. coq.
in Vino. *Pro Enchymosi.*
- ℞ Infus. Lign. Sassafr. in Vino. *Pro Dolore Ventriculi.*
- ℞ Elix. Prop. ℥℞. Ol. Caryoph. gr̃. iv. m. capiat. in
Vino. *Pro Dolore Ventriculi.*
- ℞ Vin. Viperin. ℥iv. bis in die. *In Elephantiasi.*
- ℞ Spir. Vin. ℥ij. Theriac. Andr. ℥ij. *In Erysipelate.*
- ℞ Aq. Fœnic. d. ℥j. Sp. Vol. Oleos. gr̃. ij. Syr. Fumar.
℥ij. m. *In Pustulis rubris Infantum.*
- ℞ Vin. calid ℥iv. Sp. Theriacal. ℥ij. m. *Pro Pustulis Infantum externè.*
- ℞ Vin. Absinth. ℥iv. Elix. Propriet. ℥℞. Sal. Card. b. gr̃.
vj. m. *In metu Recidiva.*
- ℞ Ent. Vener. gr̃. v. (x.) Conf. Violar. ℥j. m. *In Lunibris.*

- ℞ Borac. Venet. Troch. de Myrrh. a. ʒβ. Cinnam. ʒj. Aq. Cinnam. h. ʒij. m. *In Fœtu mortuo, Partu difficili, molâ.*
- ℞ Ciner. absinth. Centaur. min. a. ʒjv. Urin. q. f. coq. *In Gangranâ.*
- ℞ Decoct. Lignor. ʒjv. Bals. Peruvian. ʒβ. cum Sacch. *In Gonorrhœâ virulentâ.*
- ℞ Tinct. Gum. Lacc. ʒss. Sp. Cochleariæ, ʒij. m. *In Gingivis tumidis, flaccidis.*
- ℞ Sal. Vol. Oleof. ʒβ. (ʒj.) in Vino calido. *In Horrore.*
- ℞ Spir. Vin. rectific. ʒij. Aq. Calc. ʒβ. m. *In Hydrocephalo. Hydrocele.*
- ℞ Sal. Vol. Viperar. gr. vj. (viij.) in Aq. Theriacal. ʒiv. *In Hydrophobiâ.*
- ℞ Allii ʒj. Sal. culinar. q. f. m. admoveatur. *In Morfu rabido.*
- ℞ Ciner. Genist. ʒβ. Syr. de Eupator. q. f. m. *In Hydrope.*
- ℞ Emplastr. è Cinerib. q. f. *In Hydrope.*
- ℞ Vin. alb. ℥ij. Ciner. Genist. ʒj. filtretur. add. Tinct. Lign. Sassa. ʒβ. m. *In Hydrope.*
- ℞ Galban. Tacamahacc. a. p. æ. Bals. Peruvian. ʒj. Ol. Succin. ʒj. m. f. Emplastrum umbilicale. *In Hystericis.*
- ℞ Castor ʒβ. Bals. Peruv. q. f. f. Pilul. *In Hystericis, Dolore Capitis Hysterico.*
- ℞ Vin. Marrubiat. ʒjv. Pulv. rad. Gentian. ʒj. m. *In Ictero.*
- ℞ Stercor. Anserin. ʒj. Lumbric. terrest. ʒij. Vin. alb. ℥j. infund. *In Ictera.*
- ℞ Sp. Sal. Arm. C. C. a. ʒβ. Sal. Vol. Oleof. ʒj. Aq. Cinnam. h. ʒv. Sp. Flo. Rorism. ʒj. *In Incubo.*
- ℞ Rad. Ireos ʒij. Summ. Absinth. flor. Chamom. Melilot. a. p. j. rad. Bryon. ʒj. Incis. coq. in vin. cum farin. Hord. f. Cataplasma Discutiens. *In inflammatione, Talpâ.*
- ℞ Eleosacch. Nucist. ʒij. Vin. in quo Cardamom. infund. ʒjv. *In Flatu ventriculi.*
- ℞ Ol. Absinth. Fell. Taur. a. q. f. m. admoveatur umbilico. *In Vermibus.*

- ℞ Decoct. flor. Chamom. ℥jv. Eleofacch. Anif. q. f. m. *In Terminibus Infantum.*
- ℞ Sem. Anif. Pulv. ℥j. Conf. Absinth. ℥jβ. Syr. Caryoph. q. f. m. *In Lactis Defectu.*
- ℞ Vin. Camphorat. ℥ij. Pulv. Scordii. ℥β. *In Vermibus.*
- ℞ Fol. Thym. Epithym. a. ℥ij. Croci gr. ij. Cinnam. ℥j. Sacch. ℥j. Dos. ℥j. *In Melancholiâ, Palpitatione Cordis.*
- ℞ Chalyb. cum Sulphur. pp. ℥j. Sacch. ℥ij. f. Pulv. Dos. ℥β. *In Mensibus suppressis, Chlorosi.*
- ℞ Scor. Regul. Antimon. Pulv. Ciner. fagi. a. q. v. Vin. alb. q. f. m. funde super Silices pro suffitu. *In Mensibus suppressis.*
- ℞ Decoct. Guaiac. ℥jv. Tinct. Sal. Tartar. ℥j. Sal. Vol. Oleof. gr. x. Syr. Mart. ℥β. m. *In Melancholiâ, Paralyfi.*
- ℞ Succ. Nasturt. aquatic. ℥iij. Sacchar. q. f. m. *In Philtris.*
- ℞ Dictamn. alb. ℥jβ. Croc. ℥β. m. f. Pulv. (Dos. 3.) *In Partu difficili.*
- ℞ Æthiop. min. ℥β. (j.) Conf. flor. Anthos ℥j. m. *In Hystericis, Vermibus.*
- ℞ Cort. aurant. p. Sem. Cumin. a. ℥ij. Castor. elect. ℥j. m. pro Dosi. *In Colicâ (cum Vino.)*
- ℞ Cepar. Allii, no. x. Raphan. ℥ij. Baccar. Junip. ℥j. contus. affund. Vin Malvat. lbj. diger. Dos. cochl. ij. iij. *In Nephritide.*
- ℞ Camph. ℥j. Ol. Petrol. q. f. m. *In Ganglio, Callo, Clavis, verrucis & omnibus Tumoribus duris.*
- ℞ Aq. Rut. ℥xj. Sp. Castor. ℥j. Tinct. Ejusd. ℥ij. Sp. C. C. ℥j. (Ass. foetid. in Nodul. suspens.) ℥j. Sacch. Crystal. q. f. m. f. Julap. *In Hystericis, in venenatis ab opio.*
- ℞ Sp. C. C. Succin. seu Liquor. C. C. Succinat. (z. fact. ex Sp. C. C. cui affunditur Sal. Vol. Succin. donec cessat effervescentia) ℥β. ter de die in decocto enulæ campanæ vel alio; aliquandiu detur; efficacissimus est spiritus. *In Tussi contumaci, à viscido inductâ (uti patet à sibilo, viscido excreto, Respiratione difficili, & Raucedine) modò absint irritatio, vel fluxio nova.*

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Aq. Abrotani, Absinth.
Absinth. minus comp. Absinth. magis comp. Agrimon.
Anethi, Angelicæ, Angelic. comp. Anthûs, Apij. Ar-
temisiæ, Asparagi, Atriplicis olidæ, Aurantior. Barda-
næ, Beccabungæ, Betonicæ, Bryon. Bryon. comp. Ca-
mamenth. Calendulæ, Cardui bened. Cardui Mariæ,
Caryoph. hort. Centaur. min. Ceparum, Chærefol. Cha-
mædryos, Chamæmeli, Chamæpytyos, Chelidonii, Ci-
chorei, cochlear. hort. Cœlestis, Cordial. Saxonix, Cor-
nu Cervini, Cotulæ foetidæ, Dracunculi, Enulæ, E-
pidemia, Euphrag. Fœniculi, Fragar. Fraxini, Fuma-
riæ, Galegæ, Genistæ, Gentian. comp. Gilberti, Heder.
terrest. Hirund. Hormin. Hungarica, Hyperic. Hyssop.
Imperialis, Irid. nostrat. jugland, jugland. comp. Ju-
niper. Lact. alexiter. Lamii, Lavendul. Levistic. Lillii,
convallium, Limac. magistral. Lumbricor. Lumbricor.
magistral. Lupuli, Majoran. Mariæ, Matricar. Meliloti,
Melis. Mell. Menthæ, Mentrastri, Mirabil. Naphæ, Na-
turt. Aq. Nummulariæ, Ocimi, omnium florum, Ono-
nidis, Petasitid. Petasitid. comp. Petroselin. Picarum,
Pæon. Pæon. comp. Porr. Prassii, Protheriacal. Puleg.
Raphan. comp. Rorismarin. Rosar. alb. Damasc. Ru-
brar. Rutæ, Sabinæ, Salviæ, Sambuci, Satureiæ, Sa-
tyrii, Saxifrag. Scabios. Scord. Scord. comp. Scrophular.
Serpilli, Stephani, Tamarisc. Tanacet. Taraxac. Tere-
binthinata, Theriacal. Thymi, Tiliæ, Tunicæ, Vale-
rian. Verben. Veronic. Ulmar. (*Aquarum Simplicium*
3jv. *Compositarum*, 3j. 3j. 3jß. *Spirituum* 3j. 3j. 3ij.)
Aromaticum Caryophyllat. 3ß. 3ß. *Aromatic.* Rosat.
3ß. 3ß. Balf. Hyperici. Balf. Lucatelli 3ß. 3j. Balf.
Polychrest. gr. xx. Balf. Vulnerar. Ceratum de Galba-
no Cerat. œsypat. Chalyb. pp. 3ß. 3ß. Chalyb. cum
Sulph. pp. 3ß. 3ß. *Condita* Radic. Caulium, Cortic.
Flor. Fruct. Amar. Acrium, Arom. foetid. q. v. Conf.
de Thure 3ß. 3j. *Conservæ* Amararum, Acrium, A-
romaticarum, foetidarum plantarum, q. v. Coriand. pp.
3j. 3ß. *Croc.* Mart. aperitiv. 3ß. 3ß. *Cymini Semen*
3j. 3ß. *Decoct.* amar. alterant. 3ij. iv. *Decoct.* trau-
matic.

matic. ζ iv. Diacalaminth. simp. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diacalaminth. comp. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diacapparis. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diacinnamom. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diacrocuma, $\zeta\beta$. ζ j. Dianifum. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diarrhod. abbat. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Diaspoliticum $\Theta\beta$. Θ j. Diasatyr. ζ j. ζ j. Elect. amar. minus Θ j. ζ j. Elect. de Bacc. Laur. Θ j. ζ j. Elect. de ovo $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Elect. è Saffaf. $\zeta\beta$. ζ j β . Elix. Prop. gr. x. xxx. Emp. ex Ammon. de Bacc. Laur. Barbarum magn. de Betonicâ, Cephalic. Cephalic. cum Euphorb. è Cinnabar. è Cymin. Diaphœnic. calid. Divinum, Flos unguentor. è Gratia Dei, Hysteric. de Januâ, de Melilot comp. Nervin. Oxycroc. Sicyonium, sine pari. *Σταφαιαίων*, Sticticum, Stomachic. magist. Tonforis; Extract. Ecphractic. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Extract. Gentian. $\Theta\beta$. Extract. Hysteric. $\Theta\beta$. j. Flor. Benz. gr. iij. viij. Flor. Sal. Armoniac. gr. ij. vj. viij. Flor. Sulphur. $\Theta\beta$. j. $\zeta\beta$. Fæcul. Ari $\Theta\beta$. j. Julap. Alexand. ζ jv. Rosat. ζ jv. Lætificant. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Liquamen Tartar. gr. 30. Lohoch. è Passul. ad libitum, Mel. Anthosat. $\zeta\beta$. j. Millep. pp. $\Theta\beta$. ζ j. Moschelæum coch. β . j. Ol. Chymica à gr. j. ad vj. (Absinth. z. Ammon. Anethi, &c) *Olea expressa* (Amygd. amar. Anthin. Anisi, Avellanar. Aurant. benedict. de Castereo, de Castereo comp. Cerasor. Chamæmel. Cheirin. Chrysomelin. Citri, Costin. Crocin. Enulat. Euphorb. Excestrens. Formicar. Hirund. Hyperic. comp. & magis comp. Jasmin. Irin. & comp. Laurin. Lumbric. Mac. Majoran. Melilot. Menth. Myrrh. per deliq. Narcissia, Nardia, & comp. Nicodemi, Nicotian. N. M. Perficor. Petroselin. Pincar. Prunor. Raphan. Rutace, Sabinæ, Sambucin. Scorpion. Sefamin. Sinap. è Styrace, Verbenaceum, Vulpin.) *sunt pro usu externo.* Pleres Archonticon $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Pulv. Antilyssus Θ j. $\zeta\beta$. Pulv. Ari comp. Θ j. $\zeta\beta$. Rob. Sambuc. ζ j. Salia fixa $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Sal. Volat. gr. j. iv. Spec. Cordial. temp. Θ j. ζ j. Spec. Diacalaminth. comp. $\Theta\beta$. ζ j. Spec. Diamosch. dulc. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Spec. Dianthus $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Spec. Diatriw. Piperew. gr. iv. vj. Spec. Diatriw. Santalw. Θ j. Spec. Elect. Rosat. Novell. $\Theta\beta$. $\zeta\beta$. Spir. Absinth. & alii spiritus hîc ut ante. Succus Absinth. Eupator. Fumar. gr. iv. x. Syr. de Absinth. simp. comp. de Armoniac. de Anis. de Artemisiâ, de Beton. & comp. Botryos, Byzantin. comp. Cardiac. Caryoph. de Caryoph.

oph. Arom. Card. Chamæmel. Chamæpityos, Cichor. de Cinnam. Cort. Citrior. de Erysim. comp. Fœnic. Fumar. simp. & comp. Heder. terrest. Hyperic. de Hyssop. Lupulor. Melissophyll. de Menth. de Pilosellâ, Pæon. simp. & comp. de Prassio, è 5. Rad. Raphan. comp. Salv. Sambucin. Scabios. f. &c. de Scolopendrio, de Scordio, de Stœchade, Veronic. ZZ. (3ß. j. jß.) Theriac. Diatessar. ʒj. 3j. Tincturæ 3j. 3ij. Troch. de Absinth. Alexiter. Alipt. Moschat. de Camphor. de Cappar. de GalliâMoschatâ, Hysteric. de Myrrh. de Vipera ʒß. 3ß. Valentia Scabiosæ; *Vinum* Absinth. Anthosat. Chalybeat. Euphragiat. 3ij. iv. Unguent. amar. ex Apio, Apostolor. Aregon. ex Bdellio, Enulatum, è Gum. Elemi, Laurinum vulg. Martiatum, Mastichin. Nervin. è Nicotian. Rutaceum, Splanchnicum, Splanchnic. magist. è Succ. Aperitiv. Usquebach. 3j. 3ij.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Allium cond. ʒj. 3ß. In Colicâ flatulentâ, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide. Aq. Animalis 3jv. In Pleuritide, Doloribus, Rheumatismo. Aq. Antiscorbuticæ 3ß, j. ij. Aq. Bechica; Aq. Benedicta 3iij. iv. In acidâ visciditate, vel acrimonia sanguinis acida, unde in faciei rubore, Pustulis, Strumis, Asthmate, Phthisi, Empyemate, Dysenteria, malignâ, Tumoribus Scroti aquosis, Profluvio albo, Arthritide vagâ, Ephelidibus, Herpete, Gangrænâ, œdeme, Tumoribus Genuum & Tibiarum, ulceribus omnibus cum affluxu humorum &c. Diabete (viz. ubi adsunt aciditas, visciditas, acrimonia acida, Aquositas, obstructio ab acido.) Aq. Bened. comp. 3iij. iv. ut in Aq. benedict. at efficacior. Aq. Caryoph. 3ß. j. ij. Ad humorum attenuationem, &c. Aq. Cephalica, coch. ij. In Cephalalgia, (attrahatur in nares) frigidâ. Aq. Chamæm. 3ß. j. ij. In Flatu, Colicâ, Calculo, Mensibus obstructis. Aq. Cinnam. Cardiaca. 3jv. In Syncope, Animi deliquio &c. Aq. Cinnam. h. 3j. cum Oxymel. Scillit. ana. In Asthmate. Aq. Digital. cochl. ij. iij. iv. In Asthmate, ad expectorandum. Aq. Embryon. 3ij. In gravidis ad nutriendum. Aq. Epidem. 3ß. 3j. In Languore. Aq. Hirund. 3ß. ij. In Epilepsiâ. Aq. Hormin. 3ß. j. In Profluvio albo, ad abortum præcavendum. Aq. Hungarica cochl. j. In Arthritide vagâ, Ischiade. pro

*facie lavandâ; attrahatur in nares in Cephalalgia. Aq. Lact. Alex. ʒjv. In Languore. Aq. Lact. Scorbutica, ʒj. ij. In Scorbuto frigido. Aq. Odorifera, ʒiv. In Languore. Aq. omnium Florum ʒjv. In Arthritide vaga, Rheumatismo, Calculo, Urinâ suppressâ. Aq. Pectorali. ʒij. In Asthmate, Dyspnœâ, Tussi, Tartaro Pulmonum ac Renum. Aq. Picar. ʒjv. In Epilepsiâ. Aq. Pneumonica cochl. j. In Colicâ intestinorum, Dolore ventriculi, Inappetentiâ. Aq. Prolifica, cochl. ij. Ad Conceptum juvandum. Aq. Sarf. comp. ʒj. ij. Ad Aciditates, Visciditates. Aq. Siphylica. ʒj. In Lue. Bals. Apoplecticum internè gr. iij. iv. externè. In Apoplexiâ, Syncope, Paralyti. Bals. Lucatelli, ʒj. ij. In Contusionibus, Ulceribus Renum, Calculis Renum ac Vesicæ; externe ad ambusta, ulcera, Inflammationes, Vulnèra. Bals. Magistrale ʒiij. In vulneribus internis, Colica, Calculo, Vermibus; externè, in Vulneribus, Combustionibus, Contusionibus Doloribus nervorum ossium, Cephalalgia, doloribus flatuosis, Callis pedum, Hemorrhagiâ, Coctione ventriculi debili. Bals. Nucist. ʒʒ. Ad fœtum mortuum & secundinas expellend. Dolores Splenis, Capitis; externè ad dolores frigidos. Bals. Paralytic. Internè & externè ad Paralytin. Bals. Spinale, externe in Rachitide, Bals. Succin. Affectibus nervinis frigidis auxiliatur, Diureticum. Bals. Spleneticum. In Doloribus frigidis. Bals. Sulph. Antimon. gr. x. Ad Ulcera, Fistulas. Bals. Sulph. Anisat. ʒj. In Catarrhis, Tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colicâ, Peste, Epilepsia, Apostematibus. Bals. Sulph. Batean. ʒj. ʒʒ. Ad Ulcera externa vel interna. Bals. Sulph. Benzoinat. Asthmatic. Catarrhos sistit. Bals. Sulph. Mineral. Externe ad podagram dolentem. Bals. Sulph. Ruland. Externè Anodynum, digestivum; Aurium dolores tollit. Bals. Sulph. Succin gr. vj. x. Internè in Colicâ. Bals. Sulph. Tereb. ʒʒ. j. v. Bals. Sulph. Anisat. Bals. Tartar. ʒʒ. Interne in Arthritide, Calculo, Astrictione; Morbis chronicis. Externe Anodynum. Bolus Alexiter. ʒj. ʒj. In Morbis malignis. Caryophl. odorat. Ad odorem gratum in Cubiculo fumigando excitandum. Cataplasma Apoplectic. Capiti admo-
vendum raso. Cataplasma Cephal. Capiti admo-
vendum in morbis frigidis. Cataplasma Pestilential. Ad Bubones
rumpendos.*

rumpendos. Cataplasma. Solec. In Febribus malignis. Cerevisia Butleri, ad libitum. In morbis frigidis melancholicâ, Scorbuto Tartareo, Diuretic. Pulmonic. &c.) Cerevisia Oxydorcica, ad libitum. Ad visus hebetudinem. Cerevisia Scorbutica, ad libitum. In Scorbuto frigido. Conf. Aurant. q. v. In Colica, flatu. Corvus Epileptic. 3j. In Epilepsiâ. Decoct. amar. alterans 3jv. In Morbis frigidis, chronicis. Decoct. Ambrosian. lbß. Diaphoretic. Hydropic. Arthrit. vag. Podagric. in Febri malign. Decoct. Diuretic. augen. 3vj. Diuretic. Decoct. Icteric. 3v. In Ictero. Decoct. ad Mors. Can. Rabid. cochl. vj. In Rabie & magma externè admoveatur. Decoct. ad Rachitid. cochl. 2. 4. In Rachitide. Decoct. Rubiæ Tinctor. 3jv. In Rubore, Pustulis Faciei, &c. Decoct. Scorbutic. 3jv. In Scorbuto frigido. Decoct. ad Strumas 3iij. iv. In Strumis. Decoct. traumat. 3jv. Ad vulnera, Ulcera. Diachyl. odorat. Ad Fontanellas (fuit in usu apud Drem. Radcliffe hujus gratiâ) Tumores. Elæosacch. Cardiac. Carminativ. Fœnic. Nucist. Sassa. (3ß. 3j.) Ad Flatus, Colicas. Elect. Astmatic. 3iij. In Asthmate. Elect. Caryoph. 3j. ij. In Anorexiâ, ventriculi dolore. Elect. Ducis Subaudiæ 3iij. In Arthritide, per annum. Elect. Epilept. 3j. Elect. Juniperin. 3j. Stomachicum, Diuretic. Elect. Macis 3ß. j. In morbis malignis, Peste. Elect. Oxydorcic. 3iij. Ad acuendum visum. Elect. Paralytic. 3ß. In Paralyti. Elect. Piperin. 3ß. 3j. In Colicâ, Dolore ventriculi, mirè efficax. Elix. Camphorat. 3j. In Peste, tam eam curando, quam ab ea preservando. Elix. Propriet. 3j. 3j. In cruditate, Anorexiâ, in Hypochondriacis, Uterinis, malignis. Elix. Prop. Pestilential. 3j. 3j. In malignis. Elix. Prop. Tartar. 3j. 3j. In morbis frigidis. Elix. Vitæ coch. 3ß. j. Ad Languores. Emp. Burgund. In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, Vaporibus (Nucha) Emp. Camphorat. In Suffocatione, Vertigine (Umbilico.) Emp. Diagalban. Ad Nodos, scrophulas, tumores duros, anodyn. verrucas, clavos tollit, Nervos roborat. Emp. Diasulph. Ruland. Ad ulcera, vulnera infallibile. Emp. Febri-fug. Ad Tertianas, Quartanas (carpis ante accessionem). Emp. Laterale. In doloribus Pleuriticis. Emp. Nuchale, Ad defluxiones in Oculos, Dentes, &c. (Nucha.) Emp.

Paralytic.

Paralytic. *Pro membris Paralyticis (optimum.)* Emp.
 Scorbutic. *In Ulceribus, Tuberculis Scrophulosis.* Emp.
 Soleare. *Ad Arthritiden.* Emp. Spasmicum. *Pro Convulsionibus.* Emuls. expulsiva cochl. iij. *Ad variolas expellendas.* Emuls. Pæoniat. cochl. iij. *In Epilepsiâ, Vertigine, Hæmicraniâ.* Enema Alexiter. *Ad extrahendum venenum ab intestinis.* Enema Hysteric. Enem. Tereb. *In calculi dolore.* Enem. Vinos. *Ad Tormina.*
 Ens Vener. gr. iv. xij. *In Rachitide, Vermibus, Pleuritide, Suffocatione Uterinâ, obstructionibus, anodynum.*
 Epicarp. Febrifuga, *Ante Paroxysmum.* Essent. Absinth. ʒj. ʒj. *In morbis frigidis.* Extract. Absinth. ʒss. *In morbis chronicis.* Extract. Diatesaron. ʒss. j. *In morbis frigidis, Paralyti, flatu, bradyepesiâ, Hydrope, Cachexiâ, obstructionibus, moribus venenatis.* Extract. Ecphractic. ʒss. ʒss. *In morbo Virgineo, Scorbuto, obstructionibus ubique.* Extract. Febrifug. ʒss. ʒss. *Ad Febres intermittentes, remittentes.* Extract. Fellis ʒj. ʒss. *Ad Menses suppressos, sedes movet.* Extract. Icteric. ʒss. *In Ictero.* Extract. Pectoral. cochl. ss. j. *In pituita pulmonum.* Fl. Benz. gr. v. xij. *Asthmatic.* Bechic. Catarrhos sistunt, Sudorific. Fl. Sal. Arm. gr. v. xv. *Diuretic.* Diaphoretic. Fl. Sal. Arm. Martiat. gr. v. xv. *In Quartanâ Cruditatibus ventriculi. In Colicâ.* Flos Cordialium ʒj. ʒj. *Cardiacus.* Fetus Arthriticus. *In Arthritide.* Fetus Scorbuticus. *In dolore Scorbutico.* Galbanet. Hartmann. Galbanet. Sennert. *Ad membra paralytica.* Gargarifina Apoplectic. Garg. Scorbutic. *Ad gingivas putridas.* Infusio Arthritica. *Admoveatur in Arthritide declinante ad dissipandos crassos humores.* Infusio Cachectica ʒjv. *In Cachexiâ, Chlorosi, Dyspnœâ.* Infusio, Ictericâ ʒjv. *In Ictero.* Infusio Ireatâ ʒvj. *In Scorbuto, Hydrope.* Infusio Sancta ʒvj. *Obstructiones, Putrefactiones tollit; in Scorbuto, Hydrope, Febribus, Lue, Arthritide, morbis Tartareis.* Julap. Asthmatic. coch. 2. Julap. Hysteric. Camph. ʒij. iʒss. *In Paroxysmo.* Julap. Hysteric foetid. cochl. j. *In initio Paroxysmi & ipso finito (hoc fuit maximè in usu apud D^m. Radcliffe.)* Julap. Hysteric. Mithridatic. cochl. j. ij. *In Languoribus.* Julap. Tartaris. ʒij. *In Ictero.* Juniperi bacc. candefact. ʒj. ʒss. *In Nephritide, Hysterica passione.* Lac Ammon. cochl.

cochl. j. *In Dyspnœâ.* Lac Benz. cochl. j. *Asthmatic. Pectorale.* Linteum crocatum. *Sub mento in variolis.* Liquamen Silicum gr. xx. xxx. *Ad Tartarum, ergo obstructions tollit.* Liquor Cephalalgicus. *Fontale in Cephalalgia.* Magister. Benz. ℥ss. j. *Pectorale.* Mars Diaphoretic. ℥ss. j. *In Quartana, Melancholia Hypochondriacâ, Diaphoreticus, Diureticus.* Mars Fulminans. ℥j. *Menses movet, & urinam.* Mars Potabilis. *In Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quartana.* Miva Satyrii q. v. *Venerem stimulat.* Mixture tubularis. *Ad Catarrhos siccandos, defluxiones sistendas, Tussim.* Nitrum Hermophraditicum ℥j. ʒss. *Ad humores crassos, tartareos, obstructions, calculum & urinam provocandum, febres putridas malignas.* Nodulus Hystericus. *Ad odorandum in paroxysmo.* Oleum Balsamicum ℥j. ʒj. *In frigidis morbis, flatibus, Paralyti, Surditate, Otagiâ, Spasmo, Colicâ, Hydrope, interne, externe.* Ol. Camphor. gr. x. *Hystericum, Diaphoreticum.* Ol. Ludi ℥j. ʒss. *Ad Tartarum, Calculos, obstructions.* Ol. Lumbricor. *In Paralyti.* Ol. Milvin. *In Paroxysmo Epileptico (Plantis, Naribus, Nucha.)* Ol. Paralytic. *In Paralyti (Spina.)* Ol. Sacch. Ol. Sacchar. comp. cochl. j. ʒss. *Ad Tussim, Asthma.* Ol. Scorbutic. *Ad partes affectas.* Ol. Tabac. *In Podagrâ, Arthritide vagâ, Odontalgia, Vermibus.* Ol. Τερχοφύς. *Ad Alopeciam.* Ol. Viperar. *In Impetigine, Podagrâ, Leprâ.* Orvietan. ʒss. ʒij. *In malignis, Peste.* Pedilavium Emmenagog.— Pedilavium Podagricum — Pedilavium Scorbuticum — Pil. Æthiop. ℥ij. *In Hydrope, Scorbuto, Lue.* Pilul. Anticolic. ʒss. *In Colicâ probatissima.* Pil. Antipodagric. ʒss. *In Arthritide.* Pil. Hysteric. ℥ss. gr. xv. *In Paroxysmo vel extra eum.* Pil. Lithontriptic. ℥ij. ʒj. *In Calculo.* Pil. de Pice ʒss. *In Phthisi, Tussi, purulenta excreatione, & extussendi difficultate, efficacissima.* Pil. Sinapin. *Pro Tussi, Asthmate (in ore tenenda.)* Pilul. Styraclinæ ℥j. ʒj. *In Asthmate, Dyspnœâ, Catarrho suffocativo efficaces.* Pleres Archonticon. *Tabula pro Stomacho ad libitum capiende.* Pomum Amibræ. *Pro odore, in Epilepsiâ, Apoplexia, Aurâ Pestilentiali.* Pulv. Æthiopic. ʒss. *In variolis, Hydrope.* Pulv. ad Calculum ʒij. Pulv. Cibarius cum Cibo. *In suffusionibus, memoriâ perditâ.* Pulv.

238 *Pharmacopœia Practica.*

Pulv. Cinnab. comp. ʒj. ʒß. *In Epilepsiâ.* Pulv. Criminalis. Pilos reproductit, cerebrum, memoriam confortat (*inspergatur Capiti*) Pulv. Cucuphalis. *Ad dolores capitis frigidos, diuturnos, Catarrhos absumendos (insuatur pileolo serico, & capiti superimponatur.)* Pulvis Febrifugus certus ʒj. *In spatiis paroxysmi intermediis.* Pulv. Hysteric. ʒj. *In Paroxysmo & 4ta quaque hora.* Pulv. Icteric. ʒj. *in Vino. Pro Ictero.* Pulv. Martial. comp. ʒj. ij. *In Cachexiis virginum, mulierum, virorum, juvenum, Senum, optimum.* Pulv. odorat. *Pro vestimentis à tineis preservandis.* Pulv. Ophthalmic. cochl. j. v. Pulv. Cibar. Pulv. Oxytocus ʒjv. *Ad partum, menses provocandos.* Pulv. Peptic. ʒj. *A pastu pro coctione lesa ab humore frigido.* Pulv. Sellaris. *Ad soles pro podagricis admoveatur.* Pulv. Stomachic. ʒj. ij. *Ad ventriculi tormina.* Ranar. Hepata ʒß. *Ad Epilepsiam, Quartanam, &c.* Rosa Solis ʒj. ij. *Ad Phthisin. Cephalalgiam, Pestim; Cardiaca est.* Sacchar. Caryoph. q. v. *Cardiacum, Cephalicum, Stomachicum, in Vertigine, Cruditate Ventriculi.* Sacch. Sambucin. q. s. *Ad flatum, colicam, calculum; laxat.* Sal. Absinth. ʒß. ʒß. j. *In morbis chronicis, frigidis.* Sal. Alkali ʒß. ʒß. j. *In morbis chronicis.* Sal. Armon. fix. gr. v. x. *Sudorificum, aperitivum, putredini resistit.* Sal. Armon. Vol. gr. iij. x. *In cruditate ventriculi, arthritide.* Sal. Armon. Vol. Oleos. gr. x. xv. *In morbis capitis, ventriculi, Lienis, uteri, &c. frigidis, colica, tremore cordis, optimum.* Sal. C. C. Succinat. gr. x. ʒj. v. Sp. C. C. succinat. Sal. Diuretic ʒß. ʒß. *In intermittentibus, Ictero, Scorbuto, Hydrope, obstructionibus.* Sal. Febrifug. ʒ. *Ante Paroxysmum.* Sal. Philosophor. gr. iv. xij. *Ad coctiones, cruditates.* Sal. Spong. Vol. gr. v. xij. &c. *Ad calculum, strumas.* Sal. Tartar. gr. v. x. ʒj. *In ulceribus, serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. externe & interne.* Sal. Tartar. Vol. gr. x. ʒj. *Diureticum, aperitivum optimum, malignitati resistit, acidam tollit.* Sal. Viperar. Vol. gr. iij. v. *Putredinem arcet, aperit, febrifugum; in melancholia, podagra, calculo renum, vesica, optimum.* Sal. Urin. Vol. gr. xv. 20. *Anodynium, externe; interne aperit; in Scorbuto, Cachexia, Ictero utroque, calculo, vesica, renum; Secundin. præpar.* ʒj. *In Epilepsia, utero strangulato, partu difficili.* Se-
rum

rum Hepatic. ℥j. In Ictero. Serum Scorbuticum, ℥j. Serum Sinapin. ℥jv. In Tussi, Asthmate. Silices præpar. gr. x. 2c. Diuretici, in Hydrope, calculo, Ischuria. Spir. Alkerm. ℥ij. Spiritus recreat, vapores discutit. Sp. Ambr. gr. vj. In Deliquio. Sp. Benz. ℥j. ij. Pectoralis. Sp. Camph. ℥ß. Ante paroxysmum in Tertiana, Diaphoreticus, Anodynus. Ceraf. nig. ℥ij. ℥j. In Hystericis, Epilepticis, Flatibus, Convulsionibus. Sp. Cochlear. gr. xx. xxx. In morbis hypochondriacis, Tartareis, Scorbuticis. Sp. C. C. succinat. gr. v. xv. &c. Sudorificus, Diureticus, Hystericus, Epilepticus, Antiasthmaticus. Sp. Dracunculi ℥jv. Sudorificus. Sp. Embryon. cochl. ij. iij. In gravidis languidis, inflationibus, Epilepsia, Ligamentis uteri laxis. Sp. Hyssop. ver. cochl. j. ij. Pectoralis. Sp. Juniper. verus cochl. j. ij. Carminativus, arenulas, Menses movet, prolificus. Sp. Milleped. gr. x. ʒj. Diureticus, Aperitivus, Ophthalmicus, Rachitidi prodest, surditatem tollit auri inditus. Sp. Sal. Armon. gr. vj. xij. &c. Diureticus, Diaphoreticus, incidens, Febrifugus. Sp. Sal. Arm. Tart. v. Sp. Armoniaci. Sp. Armoniaci succinat. v. Sp. Armoniaci. Sp. Armoniaci Martiat, gr. v. xv. Aperit, menses, urinam, sudores movet. Sp. Sambuc. cochl. j. ij. Alexipharmacus, Cardiacus, Sudorificus, Uterinus. Sp. Sanguin. gr. x. xx. &c. In Epilepsia, Paralysi, Apoplexia, pulmonem ulceratum (hoc autem quam maximè dubitamus, quoniam particule volatiles adeo fibras saucias vellicarent, ut tussis continuò egrotos exinde infestaret.) Sp. Spongiar. gr. x. xx. Lithontripticus. Sp. Theriacal. Camph. ʒj. ℥j. Sudorificus, Alexipharmacus. Sp. Vin. Succinat. cochl. ß. j. Cephalicus. Sp. Vin. Tartaris. cochl. ß. j. jß. Scorbuticus. Sp. Viperar. gr. iv. x. Penetrat, putredinem arcet, aperit. Febrifugus, Quartanas abigit. Suffiment. Hysteric. In paroxysmo hystérico, vapor ore hiante recipiatur. Syr. Balsam. cochl. ß. j. ij. In Tussi viscida. Syr. Chalyb. ℥ß. ℥jß. In Cachexia. Syr. Lumbricor. ℥j. In Scorbuto. Syr. de Myrrh. ℥j. ℥ij. Pectoralis, Asthmaticus, Aperitivus, Emmenagogus, &c. Syr. Siderus ℥ij. vj. Aperit. Syr. Totulan. magistral. ℥ß. ℥j. Pectoralis, Asthmaticus, Phthisicus. Tabul. Absinthia. q. s. Stomachica, Hepatica, Splenetica. Tabulæ Amygdaloides,

daloides, q. v. In Asthmate, Tussi, Phthisi, optime. Tabul. de Angelic. q. v. Bezoardica, Cardiaca, Traumatica, Emmenagoga, &c. Tabul. de Aurant. q. v. Antiscorbutica, Cardiaca, Carminativa, &c. Tabul. Carminativæ, q. v. In flatu optime. Tabul. Diamb. q. v. Cardiaca, Cephalica, Stomachica. Tabul. Foeniculin. q. v. Ad flatum, colicam, &c. Tabul. Gryseæ 3j. ij. Cerebrum confortant, Spiritus reficiunt. Tabul. Helen. q. v. In Tussi, Asthmate, valde conducunt. Tabul. Lenthale q. v. Pectorales. Tabul. de Pipere q. s. Cephalica, Stomachica, Carminativa. Tartar. Chalybeat. ʒj. 3j. In morbis chronicis, obstructionibus, Quartana, Ictero, Cachexia, Hypochondriacismo. Testes equi pp 3j. In Epilepsia, calculo, dolore penis, sterilitate, mictione purulenta, colica, uteri strangulatu, foetu mortuo, lochiis suppressis, partu difficili. Tinctura Absinth. gr̃. vj. In ventriculi cruditate, morbis frigidis, acidis. Tinctur. Amygdaloid 3j. vj. Pectoralis, Catarrhalis, Asthmatica, Nervina, Sudorifica. Tinctura Armoniaci. gr̃. vj. In obstructionibus, Melancholia, hypochondriaca, Quartanis, Cachexiis, Hydropse (Anasarca) Chlorosi, Scorbuto acido, Mensibus suppressis. Tinctur. Ass. foetid. 3j. ij. Uterina, Traumatica, Splenetica. Tinctur. Asthmatica cochl. ij. h. s. & 4 mane. In Asthmate, Tussi viscida. Tinct. Bezoardic. ʒiij. 3j. In Peste, malignis, Spiritus recreat. Tinctura Cardamom. 3j. iij. Carminativa, Confortat cerebrum frigidum. Tinct. Carvi 3j. iij. v. Tinct. Cardamom. Tinct. Cochlear. comp ʒiv. In Hydropse cum Scorbuto optime. Tinct. Coral gr̃. xxx. xl. Cardiaca, Diuretica, Vermifuga. Tinct. Ferri coch. ij. v. In obstructionibus. Tinct. Guaiac. ʒvj. ʒiij. Sudorifica, Luem curat, pulmonica, Catarrhalis, Odontalgica. Tinct. Galbanet. gr̃. x. xx. xxx. Hysterica, Paralytica, Scorbutica, Emmenagoga. Tinct. Junip. cochl. ij. In Colica, Calculo, Hydropse. Tinct. Mart. v. Tinct. Armoniac. Tinct. Mart. Tartaris. 3j. ij. Aperit, aciditates tollit. Tinct. Melampod. cochl. ij. h. s. & 3 mane. In intemperie frigida, Cephalalgia, Melancholia, Asthmate. Tinct. Mell. cochl. j. ij. Cardiaca. Tinct. Myrrh. Vulneraria, Traumatica, Deterfiva. Tinct. Paralyt. Ad fricanda membra paralytica. Tinct. Piper. v. Tinct. Cardamom. Tinct.

Tinct. Saffas. cochl. ij. *Lenit Arthritidem vagam.* Tinct. Scorbutica ʒj. ij. *In Hydrope, Scorbuto.* Tinct. Serpyll. gr̃. v. xv. *Diuretica, Hysterica, Stomachica.* Tinct. Succin. ʒj. ij. *Cephalica, Hysterica, Colica, Nervina.* Tinct. Virginiana ʒj. iij. *Alexipharmaca, Cardiaca, Sudorifica, Scorbutica.* Torquis Infantum. *Dentitionem faciliat, Convulsiones præcavet.* Turundæ acousticæ. *In Surditate optima.* Vinum Arthriticum ʒij. Vin. Chalybeat. cochl. iij. vj. *In chlorosi, Hydrope, Ictero, Mensibus obstructis, Quartanis.* Vin. Ecphractic. ʒiij. *Diureticum.* Vin. Hippocratic. ʒiij. iv. *In Languoribus.* Vin. Scelotyrbicum. *In doloribus crurum Scorbuticis.* Vin. Viperin. ʒiij. iv. *In Leprâ Gracorum, Sterilitate, Peste.* Ung. Crinificum. Ung. Digitalis. *Pro Scrophulis ungendis.* Ung. Faciale. *Ad faciei ruborem.* Ung. Piperin. *In Scabie, Pruritu optimum.* Ung. Soleare. *Pro plantis in Tussi.* Ung. Virilitat. *Ad ungendas partes enervatas, actui venereo ineptas.*

Ex Pharmacopœiâ Fullerii. Aq. Balsamic. cochl. j. ij. *In tussi pulmonali, Phthisi incipiente, siccata.* Aq. Barban. comp. ʒiij. *In Cancro, Scrophulis, morbis obstinatis ab acido viscidoque ortis.* Aq. Chalybeat. nostra cochl. vj. *In obstructionibus, morbis frigidis.* Aq. Fimi. ʒiv. *In affectibus pectoris, Scorbuto frigido, doloribus vagis.* Aq. Junip. comp. cochl. j. ij. *Carminativa, Stomachica, Splenetica.* Aq. Limac. Scorbutic. ʒjv. *In Febre erraticâ, Scorbuticâ, doloribus vagis, marasmo, sudoribus nocturnis, acorem in sanguine emendat tam dilutione quam salibus volatilibus.* Aq. Milleped. ʒiv. *In morbis nervinis, Arthritide, Hypochondriacismo, Asthmate, Phthisi, Scrophulis, Diuretica.* Aq. Scelotyrbica, ʒj. ij. *In Scorbuto, Diuretica.* Balneum. *In Paralysi.* Bals. Mirab. gr̃. x. *interne. In Contusionibus, Phthisi, nervorum affectibus (at nollem in Hemorrhagiis exhibere;) externe in vulneribus, ulceribus phagedenicis.* Bals. Schefferi gr̃. xx. xxx. *In affectibus frigidis, Nervinis, Gravedine, Paralysi, Palpitatione, affectionibus Hypochondriacis, Hystericis.* Cataplasma amarum. *Contra vermes (umbilico)* Cataplasma Diasinapios. *In Apoplexiâ, Paralysi, Febribus pestilentialibus.* Cataplasma Hydropic. *In Hydrope.*

Cataplasma de Rapis. *Ad membra Paralytica, ad tumorem testium.* Cataplasma Theriacal. *In morsibus venenatis, Gangranâ, Febre malignâ.* Cerevisia amar. Arom. ℥ss. j. *In ventriculo frigido, flaccido, crudo, carminans, nauseam tollit, ac vomitum; in sanguine crasso, obstructionibus.* Cerevisia Antimonialis, ℥ss. *In affectibus cutaneis.* Cerevisia Arthritica ℥ss. j. *In Arthritide, doloribus vagis, Catarrhosis morbis, Hydroke, acrimonia acida.* Cerevisia de Baccis, ℥ss. *Carminans, arenulas expellit.* Cerevis. ad Cancrum ℥ss. *Ad humores acidos, Cancrum, &c.* Cerevis. ad Cancrum ℥ss. *In Scrophulis.* Cerevis. Cephalica ℥ss. *In Soporosis, Convulsivis, Paralyti.* Cerevis. Chalybeat. ℥ss. *In obstructionibus, sanguine pituitoso, crasso.* Cerevis. Chlorotica ℥ss. *In pituitosis morbis, obstructionibus, chlorosi.* Cerevis. de Dauc. ℥ss. *In Arenulis, Diuretica.* Cerevis. Diuretic. ℥ss. *Diuretica, Hydropica, Scorbutica, Paralytica; in Arenulis.* Cerevis. Epileptic. ℥ss. *In Epilepsiâ, Vertigine.* Cerevis. Hydropic. ℥ss. *In sanguine crasso, pituitoso, obstructionibus, anasarcâ, aepsiâ.* Cerevis. Hysteric. ℥ss. *In Hystericis.* Cerevis. Icteric. ℥ss. *In obstructionibus, Crassitie Sanguinis, Cachexiâ, Ictero.* Cerevis. Scorbutic. calid. ℥ss. *In Scorbuto frigido, in aciditate, pituitâ.* Cerevis. Scorbutic. extemporan. ℥ss. v. Cerevis. Scorbutic. calid. Cerevis. ad Scrophul. ℥ss. *In scrophulis, cancris, affectibus cutaneis.* Cerevis. Splanchnic. ℥ss. *In acido ac atra bile, in Hypochondriacis.* Cerevis. Splanchnic. ℥vj. ℥ss. *In morbis hypochondriacis.* Cucuphæ. *In affectibus capitis frigidis, pituitosis, in doloribus diuturnis (qui frigidi sunt.)* Decoct. Allii ℥ij. *In Hydroke.* Decoct. Amar. Arom. ℥iv. *In morbis frigidis ventriculi, &c.* Decoct. Bardan. comp. ℥iv. *Ad Arthritidem.* Decoct. Berber. ℥iv. *In Ictero pessimo.* Decoct. Cephalic. ℥iv. *In affectibus frigidis Nervorum, Apeplexiâ, Paralyti, Torpore.* Decoct. Chamæpyt. ℥iv. *In Arthritide.* Decoct. Emmenagog. ℥iv. *In obstructionibus uteri &c.* Decoct. Febrifug. Amar. ℥iv. *In febribus remittentibus & intermittentibus.* Decoct. Febrifug. Magistral. ℥iv. *In febribus remittentibus & intermittentibus.* Decoct. Febrifug. Sals. ℥ij. *extra paroxysmam febris.* Decoct. Hysteric. cochl. y. *In Passione Hystericâ.* De
coct

coct. Icteric. ℥iv. *In Ictero, obstructionibus.* Decoct. Cort. Jugland. ℥iv. *Splanchnicum esse asserit; quâ vero medicamenta viscus unum præ alio afficiunt, aliis intactis, nos etiamnum latere fatemur; nisi ista, pyrobolorum more, certis spatiis ex improviso in medium prodeant, hinc enim fieri potest, ut particulis viscidis, quibus aciores aliquoties implicantur, tandem attenuatis, acres istæ confestim vires suas exerant; siquidem verò medicamenta non agunt, nisi per particulas sensibiles; illud remedium quod unam partem roborat, laxatve, alteram quam longissimè dissitam etiam roborabit laxabitve, paulò tamen lentius præ spatio unico interjecto.* Decoct. Juniper. ℥ij. iv. *Stomachicum, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum.* Decoct. Juniper. comp. ℥ij. iij. *Flatus, Colicam, Hypochondriacismum, Calculum, Menses suppressos juvat.* Decoct. ad morsum can. rabid. ℥iv. *In morsu quovis venenato.* Decoct. Neurotic. ℥iv. *Ad nervos laxos.* Decoct. Pæon. comp. ℥j. *Ad morbos spleneticos, acidis.* Decoct. Scelotyrb. ℥iv. *In sanguine crasso, obstructionibus.* Decoct. ad Scrophulas ℥iv. *In obstructionibus, aciditate sanguinis.* Decoct. Splanchnic. ℥iv. *In Sanguinis crassitie, coagulationibus.* Decoct. Splenetic. ℥iv. *In morbis à pituitâ, & acido.* Decoct. Tartarifat. ℥ij. *In Ictero, obstructionibus.* Decoct. Tolutan. ℥iv. *Pulmonicum, pituitam incidit.* Decoct. Trifol. ℥iv. *In Scorbuto frigido, Arthritide.* Decoct. urtic. alcalifat. ℥iv. *Diureticum.* Elect. Apophlegmatic. (q. s. in ore volutetur.) *Ad salivam educendam, in columella Tumore, anginâ, Gravedine Capitis, Cephalalgia, Soporosis, Epilepsia, Paralyse, morbis frigidis.* Elect. Cardiac. Cal. ℥ss. *Reficit vires, flatus discutit, frigidis opitulatur morbis.* Elect. Carminat. ℥ij. iv. *In frigidis morbis, flatibus.* Elect. Cephalic. ℥j. ℥ss. *In Convulsionibus, Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia.* Elect. Cinnabarin. ℥ss. *In sanguine crasso, Scabie, Tuberculis pulmonum crudis, scrophulis, ulceribus, convulsionibus.* Elect. de Curcum. ℥j. ij. *In obstructionibus Hepatis, Ictero, morbis à crasso.* Elect. Hysteric. ℥j. *In Hystericis.* Elect. Icteric. ℥j. *In Ictero.* Elect. magn. ℥j. *Cardiacum.* Elect. Mart. ℥iij. *In obstructionibus, Chlorosi, morbis frigidis, Ictero, Hydropse, Cachexia.* Elect.

Elect. de Menth. ʒj. ij. In vomitione, anorexia. Elect. Peruvian. Epileptic. ʒʒ. ʒj. Antepilepticum præstantissimum, anticonvulsivum. Elect. Pæon. ʒʒ. j. In Epilepsiâ. Elect. quadrat. ʒʒ. j. In morbis frigidis capitis, pectoris affectibus. Elect. de Satyr. ʒij. iij. Aphrodisiacum. Elect. Scorbatic. calid. ʒʒ. In aciditate, coagulationibus, obstructionibus, Ictero, Hydrope, Paralyfi. Elect. de Sinap. ʒij. In Scorbuto frigido, Hydrope, Soporosis, Paralyfi. Elect. Spirituos. ʒʒ. j. In tremore, paralyfi, spirituum imbecillitate. Elect. Splanchnic. ʒij. iij. v. Decoct. Splanchnic. Elect. Stomach. ʒʒ. j. In morbis frigidis, ventriculo, flatu, &c. Elect. è Zedoar. ʒij. In Colicâ præcipue Hystericâ. Elix. Cinnam. Stomach. gtt. xv. xx. In ventriculi cruditate. Elix. Garyophyllat. gtt. xv. xx. In ventriculi morbis frigidis. Elix. Stomachic. gtt. xv. xx. In Apepsiâ à frigidis. Elix. Volat. gtt. xx. In ventriculi morbis frigidis, flatu, &c. Emp. Aloetic. Super umbilicum contra vermes. Emp. Apoplect. In Soporosis, Paralyfi. Emp. Armoniac. v. Emp. Volatile. Emp. Carminativ. Crassos humores impactos alicubi discutit. Emp. Cephalic. In morbis capitis frigidis. Emp. excitans. In capitis dolore, soporosis. Emp. Febrifug. In paroxysmis febrim. Emp. Ischiatic. In doloribus Arthriticis crassos attenuat humores. Emp. ad Languores. In Hystericis. Emp. Laterale. Flatus, crassos humores discutit. Emp. de Majoran. Ad Catarrhum, Odontalgiam, Ophthalmiam, Uvula Inflammationem (nucha vel pone aures.) Emp. Mastichin. In frigidis pericranii, capitis morbis (seu doloribus, &c.) Emp. è Merc. viv. Ad tumores duros, dolores profundos. Emp. Nuchal. v. Emp. de Majoran. Emp. de Pyrethr. In Paralyfi calescit. Emp. Roborans. Ad fibras laxas supra ventriculum gestitatur. Emp. Splenetic. 1, 2. Viscidos stagnantes humores circulationi reddit, in affectibus spasmodicis. Emp. Suppedal. In torpore, deliriis, febribus. Emp. de Thure. In febricitantibus ad carpos. Emp. Volatil. Humores crassos impactos dissipat, dolores profundos tollit. Emp. Volat. foetid. Hystericis opitulatur. Emulsio Asthmatic. cochl. j. In Asthmate. Emulsio Brunner. cochl. ij. In suffocatione asthmaticâ. Emulsio Cordial. cochl. ij. iij. In febribus malignis. Emulsio Hy-

sterica cochl. j. In *Hysteriis*. Enem. amar. In *Ascaridibus*. Enem. Apoplectic. In *Soporosis*. Enem. Corrobor. *Flatus discutit*. Enem. *Hysteri*. In *Paroxysmo*. Epithem. Cordial. In *Palpitatione*. Essentia Cordialis *Hysterica* gr̃. iij. in Saccho. In *Languore*, *Stomachica*, *Carminans*, *Diuretica*, *Cephalica*. Expressio *Asthmatica* cochl. j. In *Paroxysmo*. Expressio *Ictérica* ℥iij. In *Ictero*. Expressio Millep. simp. ℥iij. In *obstructionibus*, *arenulis*, *Hydrope*, *Ictero*, *Scrophulis*, *Asthmate*, *Tussi*, *Phthisi* incipiente, *Cancro*, *visus debilitate*, &c. Expressio Millep. *Icteric*. ℥iij. In *Ictero*. Expressio Millep. ad Portuſſim cochl. j. In *tussi Infantum*. Expressio pæoniata ℥iij. In *morbis Convulsivis*, *Cephalalgia*, *Vertigine*, *Paralyſi*, *Hysteriis*. Expressio *Scorbutica* calida cochl. iv. In *Scorbuto frigido*. Fetus *Amaric*. *Umbilico*, in *vermibus*. Fetus ad *Colic*. In *Colicâ quâvis humoral*. Fetus *Emmenag*. In *obstrutto utero*. Fetus *Podagric*. In *Podagrâ discutit*. Fetus *Roborans*. In *dolore frigido*. Fetus *Spirituosus*. *Discutit*, *aperit*, in *Paralyſi*, *doloribus articulorum*, *Colica*, *Iliacâ*, *Gargarism*. contra foetorem. In *ore*. Garg. ad *pituitam*. In *affectibus frigidis ac diuturnis capitis, oris, uvulæ*. Haustus *Amar*. v. Decoct. *sacrum*. Haustus ad *Arenulas*. *Tartarum*, *Arenulas*, *calculus expellit*. Haustus *Hystericus*. *Inter*, *ante*, *post Paroxysmum*. Haustus *Peruvianus*. In *intermittentibus*. Haustus è *Sal. Vol.* In *spiritibus lapsis*, *Gravedine*, *Lethargo*, *Paralyſi*, *Cordis tremore*, *Plenritide* (decreſcente) *Hydrope*. Infus. *Amar*. cochl. vj. viij. In *ventriculi &c. morbis frigidis*, ab *acido*, *pituitâ*, *fero*. Infus. *Amar*. *chalyb*. v. Infus. *Amar*. Infus. *Anthelmintic*. cochl. ij. In *Vermibus*. Infus. *Araldinum*, cochl. j. ad v. In *Convulsionibus*. Infus. *Arthritic*. ℥iij. vj. In *Arthritide*. Infus. *Cephalic*. ℥iv. In *capitis morbis frigidis*, *cephalalgia*, *vertigine*. Infus. *Chamæm*. v. Decoct. *Febris*. *Amar*. Infus. *Colic*. ℥iij. Infus. *Epilept*. ℥iv. Infus. *Zedoar*. ℥ij. *Stomachicum*, *Cephalicum*, *Colicum*, *Arthriticum*. Julap. *Camphorat*. ℥ij. iij. *Hystericum*. Julap. *Carminat*. ℥iij. iv. In *flatibus*, *morbis frigidis*, *torminibus*, à *partu*, *vertigine*. Julap. de *Castor*. cochl. v. In *Hysteriis*. Julap. *Cephalic*. cochl. v. In *Epilepsiâ*, *Convulsivis*, *Soporosis*,
Y 3 *Vertigine*

Vertigine, &c. Julap. Crocat. cochl. iv. v. *In cordis palpitatione, &c.* Julap. Diuret. Aromat. ℥iv. vj. *In arenulis, in constitutione frigidâ, Hydrope, obstructionibus.* Julap. Emmenag ℥iij. *In obstructionibus Mensium, &c.* Julap. Epileptic. ℥iij. Julap. Hysteric. ℥ij. iij. *Ad spirituum lapsum in Hystericis.* Julap. Moschat. cochl. v. *In Languoribus, Singultu.* Julap. Moschat. Infant. ℥ij. iij. *In Convulsionibus.* Julap. Pectoral. cochl. ij. *Thoracicum calidum, pituitam educit.* Julap. perlat. cordial. cochl. v. vj. *In spiritibus lapsis.* Julap. perlat. Hysteric. cochl. v. *In vaporibus Hystericis, Convulsivis.* Julap. Propriet. ℥ij. *In Coctione lasâ à frigido.* Julap. Scorbutic. ℥iv. *In Scorbuto frigido.* Julap. Splanchnic. ℥iij. iv. *In Scorbuto, Hypochondriacismo, frigidis.* Julap. Stomachic. ℥iij. iv. *In ventriculo frigido, flatuoso.* Julap. Succinat. ℥iv. *In anasarcâ, aperiens.* Julap. Volat. cochl. j. iv. *Cardiacum, Cephalicum, Stomachicum.* Liniment. Cephalic. *In morbis capitis frigidis, pituitosis.* Linim. Paralyt. *In Paralyti, fibris laxis.* Lixiv. de Calce, ℥iv. *In sanguine salso, diureticum.* Lixiv. Hydropic. ℥iv. Lohoch. de Alho; q. s. *Pituitam expectorat, non datur in Catarrho tenui, acri.* Lohoch Apophlegmatic. q. s. *Pituitam ex ore elicit.* Lohoch Asthmatic. q. s. *Expectorat pituitam.* Lotio Aromatic. *In frigidis capitis morbis.* Lotio Cephalica. *In Balbutientibus.* Mistura Acoustica, gr̃. iij. *In Tinnitu, surditate, optima.* Mistura Alcalifat. cochl. ij. *In dolore ventriculi.* Mistura Apoplectica, cochl. j. Mistura Arom. gr̃. xx. xxx. *In flatibus, cruditate.* Mistur. Balsam. Cephalic. cochl. iv. *In tussi, morbis capitis frigidis.* Mistur. Cardiac. Aquos. Cardiaca. Mistur. Carminat. cochl. v. *In flatibus.* Mistur. Colic. 2. Mistur. Consolans ℥ij. *In Languoribus.* Mistur. Diuretic. ℥iij. *Urinam movet.* Mistur. Ephractic. ℥iv. *In sanguine vapido, obstructionibus.* Mistur. Expectorans. cochl. ij. *In pituita tenaci expectorandâ.* Mistur. Expector. 2. ℥j. ij. *In pituitâ tenaci.* Mistur. Hysteric. Aquos. ℥iij. Mistur. Hysteric. Spirituos. gr̃. xx. xxx. *In Hystericis.* Mistura Juniperin. cochl. j. *In flatibus, arenulis.* Mistur. Moschat. cochl. iij. *In Stomachi dolore.* Mistur. Paralytic. gr̃. xxx. *In Paralyti frigidâ.* Mistur. Peruvian. ℥iij. *In intermittenti-*
bus,

bus, periodicis. Mistur. Plateri. *Ad aurium tinnitum.*
Mistura Salina cochl. j. *In vomitu, quia acidum corro-*
sivum irritans absorbet. Mistur. Scorbutic. g^{tt}. xxx. *In*
Bradypepsiâ, laxitate ventriculi. Mistura Succinat. ℥iv.
Diuretica. Mistura Tartar. cochl. j. *In Colicâ.* Mi-
stur. Volat. cochl. j. *In ventriculi, cerebri morbis frigi-*
dis. Nodulus Hysteric. Naribus in Hystericis. Ol.
Acoustic. g^{tt}. ij. iij. *In Surditate, Tinnitu.* Ol. Ce-
phalic. *Externe ad capitis morbos frigidos.* Ol. Paralyt.
Pro frictione, in Paralyti. Petum Phthysic. *Pro fumo,*
in Catarrhis frigidis, ubi adest irritatio. Pila Emme-
nagog. *Pro nascali, ad menses provocandos.* Pila O-
dontalgic. *In odontalgia in dentem intrusa.* Pilul. A-
lexit. ℥j. *In Languore febrili.* Pilul. de Allio. ℥ss. j.
Ad expectorationem promovendam. Pil. de Apibus, ℥j.
Diuretica. Pil. Arthritic. ℥j. *Diuretica, pepsin juvant.*
Pil. Asthmatic. iij. *In Asthmate.* Pil. Balsamic. iij. *In*
Phthysi chronicâ. Pil. Carminativ. v. *In flatu, Pituitâ.*
Pil. de Castor. ℥ss. *In Hystericis.* Pil. Cephalic. iij. *In*
morbis capitis frigidis, Paralyti, &c. Pil. Chalyb. foetid.
v. *In Hystericis frigidis.* Pil. Chalyb. volat. v. *In mor-*
bis frigidis, chronicis. Pil. è Cinnab. iv. *In morbis Con-*
vulsivis, Epilepsiâ. Pil. de Coccinel. v. *In Diarrhœâ*
Symptomaticâ in malignis. Pil. Craton. ℥j. *Centra A-*
poplexiam. Pil. Diaphoretic. v. *In Febre malignâ.* Pil.
Diuretic. 1. ℥j. *Urinam movent in Aquarum Spadana-*
rum potatoribus, ubi stagnant ea, Carminantes. Pil. Diu-
retic. 2. (n^o. iij.) *Urinam potenter movent, propter Can-*
tharidas. Pil. Emmenag. n^o iv. *In tempore mensium.*
Pil. Expectorantes n^o. v. *Ad expectorationem promoven-*
dam. Pil. Febrifug. n^o. v. *In intermit. entibus, extra*
paroxysmum. Pil. Gentian. n^o. v. *In intermittentibus,*
in ventriculo laxo, debili, frigido. Pil. Gileadens. n^o. v.
In Tussi chronicâ, Tuberculis. Pil. Hysteric. ℥j. *In Hy-*
stericis. Pil. de Myrrh. ℥j. *Stomachica, pectorales, alexi-*
pharmaca, emmenagoga sunt. Pil. Nigræ n^o. vj. *In pituitâ*
crassa expectorandâ optime, at non conducunt, ubi catar-
rhus est tenuis, seu defluxio seu irritatio molesta, continua
est. Pil. de Oliban. ℥ss. *In doloribus flatulentis, frigidis la-*
teris. Pil. Pectoral. n^o. *In phlegmate viscido expectoran-*
do conducunt. Pil. Piceæ. ℥j. *In Pleuritis Crisi seu*
tussi

tussi purulenta expectorandâ optima, ubi venâ sectiones debite præcesserunt, vel etiam ubi posthabita fuerunt, modo expectoratio deficit. Pil. Pleuritic. ʒj. v. Pil. Picea. Pil. Puerperar. ʒj. 3ʒ. In Lochiis, partu, secundinis promovendis. Pil. Salin. n^o. ij. In Ructu, flatu. Pil. Sanct. 3ʒ. Sudorifica, in Lue, Arthritide, Rheumatismo spurio (sine Febre, vel Tumore.) Pil. Splenetic. 1. & 2. (n^o. iv. n^o. vi.) In Lienis morbis frigidis, Hypochondriacismo. Pil. Stomachic. n^o. iij. In coctione lasâ à frigido. Pil. Syncopales n^o. v. In spiritibus lapsis. Pil. Tolutan. ʒj. In tussi viscidâ. Pil. Volat. n^o. v. In paralyssi ac morbis nervorum frigidis. Pil. Volat. Oleos. n^o. v. In paralyticis, flatibus, morbis frigidis. Pulv. Anis. comp. 3ʒ. j. In flatu. Pulv. Arom. 3ʒ. v. Pulv. Peptic. Pulv. Arthritic. 3ʒ. In Arthritide præcavendâ. Pulv. Aurant. comp. 3ʒ. In flatibus, pituita ventriculi. Pulv. Balsamic. 3ʒ. In Tussi sicca, Tuberculo. Pulv. Capillar. Pro Cucupha. v. Cucupha. Pulv. Carminativ. ʒj. v. Pulv. Peptic. Pulv. Chalyb. 3ʒ. In Cachexia, morbis frigidis. Pulv. Colic. 3ʒ. In Colica. Pulv. Contrayerv. comp. ʒj. In Febre maligna. Pulv. Dentalgic. Pro Er-rhino. Pulv. Diaphor. ʒj. In Febre maligna. Pulv. Diuretic. 2. ʒj. Pulv. Emmen. 3ʒ. Pulv. Epidemius ʒj. ij. In Febre maligna. Pulv. Euphragii comp. ʒj. ij. In Cacitate. Pulv. Febrifug. 3ʒ. Pulv. de Guttet. ʒj. 3ʒ. In morbis Convulsivis. Pulv. Hysteric. 3ʒ. In Hystericis, Epilepticis. Pulv. Majoran. comp. gr. xv. In flatu, Pituita, Paralyssi, obstructionibus. Pulv. Millep. comp. ʒj. In orthopnea frigida, pituita tenaci. Pulv. Myrrh. comp. ʒj. v. Pil. Puerperar. Pulv. de N. M. comp. 3j. In Pepsî à frigido lasa. Pulv. Odorifer. ʒj. 3ʒ. In spiritibus recreandis. Pulv. Odor. Damascen. Pro Deliciis. Pulv. Pavon. ʒj. In vertigine. Pulv. Peptic. ʒj. In ventriculo frigido, pepsî lasa. Pulv. Pestilential. ʒj. Pulv. Pæon. comp. ʒj. In Convulsivis. Pulv. Salin. maj. ʒj. In Febribus malignis. Pulv. Sinap. 3ʒ. In ventriculo frigido. Pulv. Splanchnic. ʒj. In Hypochondriacismo frigido. Pulv. Stomachic. ʒij. v. Elect. Stomach. Pulv. Stomach. Amar. ʒj. In pituita, flatu ventriculi. Pulv. ad Strumas 3ʒ. Pulv. Viperar. comp. ʒj. In Ictero. Sacch. Antiscorbutic. q. s. In Scorbuto.

buto frigido. Sacc. Aromat. *Ventriculo admoveatur, in pepsî leſa à frigido.* Sacc. de Cymin. *Ad inflammationem amygdalarum, &c.* Saccul. Lateral. *In dolore Lateris.* Scut. Cardiac. *Admoveatur regioni cordis.* Scut. Pectoral. *In Tussi frigida.* Scutum Stomachic. 1. & 2. *In ventriculo frigido.* Serum Scorbutic. lbß. Spirit. Antiscorbutic. ʒj. 3j. *In scorbuto, acido, frigido.* Spir. Carv. comp. 3j. ij. *In flatu.* Sp. Vin. Camph. *Externe dissipat, interne Diaphoretic.* (ad ʒj.) Succ. Cochlear. Vinos. ʒiij. iv. *In Scorbuto frigido.* Suffit. ad Catarrhum. 1. & 2. Suffit. Odorif. *Pro fumigandis cubiculis.* Suffitus Phthific. Syr. de Allio cochl. j. *In tussi frigida.* Syr. de Ammon. f. Cochl. j. *In tussi frigida, pleuritide inclinante, empyemate.* Syr. Asthmatic. cochl. j. Syr. Balsam. cochl. j. *In tussi expectoranda.* Syr. Chalybeat. cochl. j. *In Cachexia.* Syr. de Helen. cochl. j. *In tussi tenaci, orthopnœa.* Syr. de Myrrh. cochl. j. *In Asthmate, tussi pituitosa contumaci.* Syr. Nicotian. cochl. ʒß. *In tussi à viscido.* Syr. de Sassa. cochl. j. *In tussi à viscido.* Tabul. Cardiac. q. f. *In palpitatione, tremore cordis.* Tab. Hyſteric. q. f. *In Hyſtericis.* Therm. Sulphur. *Pro Balneo, in frigidis.* Tinct. Alexiter. 2ß. j. *In febre maligna.* Tinct. Aromatic. gtt. xx. *Cephalica, Stomachica, Cardiaca.* Tinct. Balsamic. gtt. xxx. *In pituita pulmonum, nephritide.* Tinct. Cantharid. gtt. iv. xx. *In urina cienda, Gonorrhœa.* Tinct. Epileptic. ʒj. 3j. Tinct. Gentian. ʒiij. *In vermibus, colica, febre, morſu venenato.* Tinct. Hyſteric. gtt. xx. xxx. Tinct. Odontalgic. *Pro lavandis dentibus, tantum.* Tinct. Pectoralis gtt. xx. xxx. *In tussi à viscido expectoranda.* Tinct. Stomachic. gtt. xx. xxx. *In ventriculo frigido.* Troch. Apoplectic. 3j. *In apoplexia prœvenienda.* Troch. Cephalic. 3j. *In morbis capitis frigidis.* Troch. Moschat. *Pro anhelitu fœtido.* Troch. Peruvian. 3ij. *In Febre intermittente, Hæſtica, Phthiſi.* Troch. Phthific. *Pro Suffitu.* Troch. Stomach. 3ß. *In ventriculo frigido.* Vapor ad Anginam. *In Angina dissipanda.* Vapor Auricularis. *In Surditate.* Vapor Emmenag. *Ad menses provocandos.* Vapor Pectoral. *Saburram viscidam expectorat.* Vapor ad Urin. ciendam. *Meatus aperit, stimulat.* Vin. Amar. v. Infus. Amar. Vin. Amar. chalyb.

chalyb. ℥iv. *In Cachexia.* Vin. Chalyb. ℥iij. *In sanguine pituitoso, acido, chlorosi, cachexia, &c.* Vin. Diuretic. ℥iv. vj. *In Hydroke, &c.* Vin. Enulat. ℥iij. *Pituitam viscidam è pulmonibus exantlat.* Vin. Icteric. ℥iv. *In Ictero.* Vin. Mirab. ℥iv. *In spiritibus lapsis.* Vin. Pectoral. ℥ij. *Incidit pituitam.* Vin. Stomachic. ℥iv. *In Ructu, Flatu.* Ung. aperit. Tumores dissipat. Ung. de Bills. *Ad faciei pustulas.* Ung. Cordial. Ung. Crinific. Ung. Diffipans. Vng. Salino-Volat. *Ad dolores Arthriticos, Rheumaticos.* Ung. Splanchnic. *ad Tumores abdominis.* Ung. Splenetic. v. Ung. Splanchnic. Ung. Stomachic. *Ad ventriculum à frigido læsum.*

S C H O L I A.

Remedia hæc attenuantia non solum in varios ordines, sed gradus etiam ritè diffinduntur; vel è salibus constant fixis, vel volatilibus, vel oleoso-volatilibus, vel demum ex particulis ponderosis. Pari quidem ritu, at non perinde quam evacuantia per irritationem effectus fortiuntur suos; ita parum enim stimulant, ut vasa teneriora ac sensilia, sanguinea, energias eorum tantum percipiant; siquis igitur hac in re animi pendeat, attenuantia in auctiori dosi modò exhibeantur; ex improvviso nausæ, vel vomitiones confestim suboriantur; vel ex *Hoffmani* sententiâ humores per anum deturbantur. Hinc evenit, ut emetica vel cathartica fiant attenuantia, ac vice versâ, attenuantia emetica vel cathartica, variatâ dosi, eodem artificio evadant.

De attenuantibus lenioribus inter quæ *amara* primas tenent, sermonem habeamus; quæ an *amara* nuncupantur ab Hebræis vocibus, מרה *amarities*, an à מרורה *fel*, nobis parum equidem refert, cum hic res non verba spectentur: Per salium autem fixorum virtutem agunt *amara*; hinc experientia sola nos erudit, ac evicit, quòd *amara* humoribus acidis prorsus adversentur; inde est, quòd humores pituitosos attenuent, incidunt, necnon dispergant, ac eos in tenuitatem aqueam, uti fit in albuminis ovi conquassatione eliquent: Inde etiam est, quòd obstructions referent; quippe cum massa talis lenta, præ particulis suis apprimè viscosis, facilè vasculorum capillariorum parietibus adhærescere.

rescere soleat; ac proinde sanguinis ibidem, à tergo pressi, circuitui moras injiciat: Siquidem verò remedia hujusmodi attenuantia offam jamjam enatam denuò liquefaciunt, fieri vix potest, quin impedimenti causâ proximâ demum amotâ, necnon tam velocitate pressivâ primævâ, quam materiâ ac mole in statum pristinum revocatis, motûs momentum tantoperè impofterum vindicetur, ut meatus ferè qualis qualis exindè referetur, ac illico dehiscat: Quocirca cum amara cohæsiones (utpote quæ sunt aciditatis, sanguini fluidisque cæteris præsidentis, fermè sequaces) humorum impendentes præripiant; istas etiam genitas ac fixas, modo diu propinentur, ex integro subducent: Massæ putredinem ideo antevertunt, quia terram in *composito* damnatam sat ubertim possident; hinc fit, ut sulphurum evectionem necnon nifum ad avolationem omnino præcidant: Inde fortassis est, quod ubi hujusmodi feбри decumbentibus exhibentur, particulæ nonnullæ putridæ in urinæ imo subsidere conspiciantur; dum residuæ interea sanguini adunantur ac assimulantur. Hac itidem de causâ, *terrâ* nimirum, *damnatâ*, fit, ut fibras passim corroborent; proinde combibonum, ex liquorum è bine confectorum perpotatione, ventriculi, uti in emporiis plerisque recepit usus, laxati haud parum inde sublevantur: Quippe cum primum saburra ibidem defixa exhauritur, mucus in ventriculi plicis residuus inde tenuatur, necnon fibræ, tonum naturæ specificæ consonum, præ particulis, quibus scaturiunt, terrestribus, confestim recolligunt. *Ulcerâ* detergent, ista, putâ, præ proritatione ac titillatione fibrarum sauciarum miti, addè istas identidem ac alternatim crispant, ut particulas suas saniosas libenter seponant; necnon particularum acido-corrosivarum residentiam super partem ulceratam prævertant. Suprà *amara* tam diuretica quam diaphoretica esse, notavimus: Idcirco tam hydropi anasarçæ quam cachexiis conducunt, quod pituitæ atque acido magnopere adversentur, quodque vasculorum minutulorum rimas ferruminent. Cum adhæc lumbricos e-necent, non alio ex fonte, quam observatione unâ, effectûs hujus ratio hauritur, ubi notandum est, quòd lumbrici remediis vel cibis dulcibus continuò irretian-tur,

tur; è contrario verò à medicamentis vel cibis infra vel supra dulcia (cum sapor dulcis sit quasi in saporum medio positus) abhorrent, ita ut foetida, aromatica, acria, ac amara, perinde atque acida, austera, acerba ac styptica in odium habeant, necnon oleosa quam maximè averfantur, utpote quæ annulorum rimulas, eorum perspiracula, obturant; utut à normâ hâc generali parum nobis aberrandum est; ex eo, nempè, quòd quoties lumbrici his saporibus sensim antea consueti fuerint, toties hæc regula nos fallit: Hocque facilè concedent omnes, qui antra unquam perspexerunt, quæ vermes in navium, ab Indiis solventium, carinis sibi excavaverunt: Sat bene nôstis undam vermes isti non consuetos penitus conficere; hujusmodi autem in undâ, sale onustissimâ, exclusi, eâ quam optimè foventur; hinc affirmandum est, quod consuetudo in medicamentorum administratione valdè præsideat; adeò ut quam sæpissime eveniat, ut specifica ipsa magis efficacia pro minus efficacibus aliquoties variare, saltem eorundem dosin augere, cogamur; sententiæ hujus pars palam fit in opio, cui si quis se aliquandiu assueverit, dosin augeat, necesse est; si velit, profit; chirurgi prætereà jam pridem tradiderunt, remedia sua balsamica, vel efficacissima, ulceribus phagædenicis admota, adeò interdum pigrescere, ut ulcus iis unis neutiquam omnino cedat, nisi alia ejusdem speciei adhibeant, eorumque vice substituant.

Attenuantia *amaris* fortiora, quæ constant, nempè, ex particulis volatilibus, pari cum amaris ritu energias suas exerunt, majori vero cum impetu; hinc est, quod putredini adversentur, utpote cum sanguinem in gyrum flectant, atque hunc in modum particulas, cæteroque substituras, adeò adurgeant, ut non detur accumulationi in quovis membro locus, neque verò, vel putrefactioni. Istiusmodi sanguinem siccare feruntur, ubi nimîa propinantur in dosi; quoniam diaphoretica vel diuretica fiunt. Fibras idcirco rigidas conficiunt, quòd particulas aqueas evaporent; incidunt etiam tenuantque humores. Aciditates, aquam, ac pituitam immutant. Potenter detergent, ex eo quòd particulæ eorum tenues cum sanguine confundantur, ac proinde

partes

artes ac fibras materiam saniosam continentes irritant; x quo fit, ut cum sanguinis particulas attenuent, fibrasque vibrent, tumores idcirco dissipant: Siquidem acidum resorbent, grumos solvent; si igitur medicamenta oleosa unà exhibeantur, adhæsiōnem extirpabunt, ac grumi quam efficacissimè dissolvent. Astringentia per improprium audiunt, ex eo quod quando particulas aqueas exhalant, fibræ perinde siccantur, ac si astringentia introsumerentur; hincque est, quod apud *Sylvium*, *Doleum*, cæterosque medicos paulò consultiores, spiritum salis armoniaci faustò in raucedine cum ussi exhibitum reperiatis, qui particulas aqueas, viscidas sanguini rursus committendo, fibras teniores, rigidiores reddendo, laxos ac patientiores glandularum meatus contractiores ac minores conficiet, ita ut cum portio sanguini recommitatur, fibræ vero tonum suum pristinum recipiant, fieri non potest, quin raucedo, causis ejus hoc pacto amotis, tandem dispareat.

Aromatica, seu *foetida* ex particulis volatilibus oleosis, plus minus evectis, constant; particulas spirituum consimiles adjiciunt; quod ni ita se haberet, quâ fieret, ut medicorum turba toties hunc in finem foetida ac aromatica seorsim vel unà exhiberent? ut enim primùm spiritus volatiles, volatilésve oleosi intus sumuntur; iis, qui antè sub umbras ituri fuerunt, vix dum propinquantur, cum pandiculentur, cum, calore nativo denuò accenso, spiritus ad munera pristina confestim se conferant. Pituitam efficacitè incidunt; hinc fit, ut carminantia evadant, utpote quæ, massam agitando, eamque tenuando, flatu è bullis viscidis nimis, atque nimis tenacibus, sat expeditè eliciunt. Ad summum, amarum potentius incidunt, attenuant, obstructions referant discutiuntque: siquidem verò foetida extremos nervorum tubulos cæteris longè facilius ac citius penetrant, eorum laxitatem immutant, tonumque restituant, ac succum nervosum, lentore inquinatum, emendant, eas ob causas *nervina* ac *hysterica* speciatim audiunt.

Ponderosa sunt etiam attenuantia; quæ medicamenta; puta, præ solius ponderis causâ vires suas exerunt (aliis energiarum causis, ipsi non acceptum referentibus, im-

præsentiarum indictis): huic sententiæ *Sennertus*, in capite de *hypochondriaca affectione* aperte jamdudum astipulatus est; cum *Chalybem* à pondere operari, ac partes obstruētas permeare multò antè asseruerit. Quî istiusmodi sanguinem imprægnant, hic non est disceptandi locus; supra enim particulas mercuriales, cum sanguine confusas, lumbricos enecare advertimus; unum & idem in medicamentis ex antimonio paratis evenire solet; quæ sive in liquore acido, sive acidulato infusa, seu chymicè parata, atque propinata, ex æquo vomitionem cient: Chalybeata liquori fermentescenti adjecta, luctam intercludunt; quocirca à medicis hoc obiter observatu dignum est, quod ubi medicamenta allæ injicere velint, durante luctâ immiscenda sunt; quòd si chalybs seu ferrum una præscripta fuerint, ista non nisi luctâ finitâ addenda sunt. Quî verò solertius ac scrupulosius quæstionem hanc persequi voluerit, atomorum, gravium ac superficierum mechanice consulat iste, necesse est: Ipsique dilucidè constabit, particulas corporis cujusvis, gravitate specificâ alium transcendentis, imò longo intervallo præeuntis, ita posse in minutias rapi, ut neutiquam alteri, leviori licet, pondere præcedat, seu, ut ita dicamus, prægravet, quin in illo fluitet; esto, gravitas eadem permaneat, at discerpto corpore superficies augeſcit, quocirca & in eadem ratione renitentia crescat, necesse est; discriptio enim gravitatem omnino non afficit, at superficiem ampliat; ex quo fit, ut superficie tantoperè ampliata, gravitate verò non mutata, superficiei valor (progrediente discriptione) gravitatis valorem tandem æquet; ac proinde corpus quanquam altero longe gravius, sed superficie in immensum dilatata, liquori leviori, præ resistentiâ auctâ, innatat; his prælibatis, mirari definamus, quî martiata, mercurialia ac his consimilia liquores ac sanguinem imprægnant, ac fluidis seu solidis nostris vires suas actutùm impertiunt. Quocirca, quî remedia hujusmodi morbis medentur, paulisper perpendamus.

In apoplexiis, lethargis, cæterisque morbis soporosis sanguinis massa ex pituitâ, ac sero principiisque inertibus præcipuè constat, eisque adeò opprimitur, ut segniter in orbem pellatur; velocitasque ipsius tanto-

perè

perè in vasculis capillaribus minuitur, ut non pedis spatium, non digiti, quinimo vix fili serici latitudinem intra horam percurrat; enim vero passim subsistit; præsertim ubi vasa perquam flexilia sunt: Hinc est, quòd cum cerebrum sit substantia mollis, in tubulis nervosis humores nidulantur ac tandem gradum sistunt, ac proinde functiones animales, sensatio ac motus, non possunt non, pro humorum quantitatis ratione, minui vel aboleri: Humorum igitur plenitudine depleta, per emetica, venæ sectiones, cathartica, epispastica ac his similia; attenuantia exhibita, cum fluida circumagant, ac motum denuò invigorent, morbis somnolentis finem statuunt. Non morbis solum soporosis, à fluidorum vapiditate excitatis, verum iisdem etiam ab opio incautè propinato inductis, experientia duce, maximoperè profunt: Nos interea haud latet, aucthores nonnullos eosque serios, *Doringium*, puta, *Sennerium*, *Pitcairnumque*, *opium* ex particulis calidis constare per amaritiam, per flammam, quam igni admotum concipit, per salia volatilia, necnon oleum foetidum, quæ destillatum præbet; hoc autem mirum est, quòd ii ipsi aucthores sibimet repugnent, cum castoreum, rutam, assam foetidam tanquam opii correctoria deprædicent; quì enim fieri potest, ut salia volatilia ac olea foetida, quibus medicamenta hujusmodi foetida scaturiunt, salibus ac oleis confimilibus in opio contentis (uti affirmant ii) adversentur? Si igitur opium revera corrigant, ejusque effectus certò præripiant; non dubium est, quin *opium* constet particulis, si minus in totum, at maximam partem viscosis, ramosis, flexilibus.

Quoties morsos hydrophobia affligit, saliva canis venenosi ac rabidi cum sanguine confunditur, ibiq; tragoedum agit: Puerulo decenni à cane rabido morso jampridem accersebamur, qui *υδροφοβία* laborabat; sex antè septimanis vulnus in crure receperat, quod ex chirurgi incuriâ nimium sanabatur citò: Quantum per tempus, quo vitam traduxerat, observare licuit; pulsus erat tardus ac debilis, calor nullus infestabat præternaturalis, os salivâ copiosè madefactum est, quam undique digitis temerè projecit; quoties potabilia illi obtulimus, intremuit, profiliit, ac torvè oculis astantes spectavit, imò bolum alexipharmacum

cum non sine labore devoravit: Quatuor post, ab adventu nostro, horis ad plura migravit: nec à parentibus nec à Tremulorum cœtu, quam Sectam pater sequebatur, veniam impetrare potuimus, ut corpus cultro subjiceretur: Utut res se habeat, proculdubio sanguis, veneno corruptus hujusmodi, tam subsistere quam in tumorem inflammatorium elevari potest, uti historiæ hâc de re editæ sat abundè testantur; cæterum si inflammatio esset unica deglutitionis difficilis causa, potum longè expeditius cibo deglutirent; cum è contrario verò, cibum solidum vixdum recusent, cum liquores autem averfentur; constat ergo gulam aut partes contiguas non continuò tum inflammari; palam igitur est, quòd causa cur potum in odio habeant, est, quòd fastidium istud sit in appetitu irascibili, sit delirium melancholicum, sit mentis alienatio sola; quî verò sit, ut hydrophobiâ constanter afficiantur, hoc curiosis permittimus. A Græcis canis rabiosus *λυσώδης* appellatur, ex eo, quòd vermis, qui sub canum rabiosorum linguis, ex *Plinio*, reperitur, *λύσα* nuncupetur: Cæterum cum hoc non adeò certum sit, quin in dubium vocetur canum possessores viderint, ne ipsi mortis istiusmodi ac, vermem istum non extrahendo, modo ita sit, culpæ infimulentur, Quantum ad morforum medelam; iis internè attenuantia, fixa, vel volatilia sedulò exhibeantur; externè verò venenum extrahatur causticis admotis, vel scarificatione ac attenuantium spirituosorum adhibitione, vulnus apertum per septimanas sex servetur, fluat ulcus copiosè, cæteroquin in summum vitæ discrimen conjicientur morfi.

In *Raucedine* ac *Asthmate*, pituita, è bronchiarum glandulis exudans, canalem pulmonalem massâ vapidâ oblnit; hinc est, quòd aspera arteria multum laxetur, ac elongetur, quodque vox exinde rauca fiat; patet enim in fistulâ pro tonorum mensurâ constructâ, (anglicè, *a Pitch-Pipe*;) quòd quò magis elongetur ac ampliatur ipsius canalis, seu quò magis epistomium ejus à fistulæ rimulâ recedat; eò gravior fiet tonus; quò propius autem istud apici accedat eò acutior erit, quia quo brevior, ac magis tensa, est chorda; quo etiam foramen fistularum vicinius rimulæ, eò acutior erit sonus

nus, cum hic vibrationes sint celeriores ac incitatiores; quo verò longiores vel minus tensæ sunt chordæ, vel quo foramen fistulæ, è quo prorumpit sonus, à rimulâ magis distat, eo gravior; ex eo quod vibrationes hic tardiores sint; ita ut in digitorum sex vel septem longitudine, toni tam pleni, quam hemitoni, obtusi acutique, hoc artificio optimè notentur: Hoc in rerum statu, attenuantia cum sanguine commista, è bronchiis etiam extillant, fibrasque longitudinales circularesque adeò irritant, ut contractio semel inchoata, ad plenariam pituitæ evacuationem usque protrahatur; necnon serum in arteriis evanescentibus subsistens, ubique densatum, denuò circuitui committatur.

In *Tumoribus*, à viscido inductis; per lentorem stat, quod sanguis parietibus vasorum capillarium extremis adhærescat; quòque in horas aucto fibræ propinquiores ab eo comprimuntur; ac uti plus materiæ jugiter ad *impedimenti puncta* appellit, ita partes circumpositæ in immensum intumescunt; quemadmodum igitur materia viscida fibris impacta sit tam causa tumoris antecedens quam conjuncta, sic attenuantia exhibita ac adhibita, lentorem incidunt, ac fundunt; particulis lentis denuò fufis, tantum abest, ut ultra subsistat, ut promptè rursus circumagatur, tumorque subsidere cernatur. Quod ad *Tumores duros*, attenuantia his etiam aliquatenus profunt, quippe quæ fibrarum oscillationem, quâ circumaguntur fluida, redintegrant; quoniam verò humores impacti fibrarum parietibus firmitè adhærescunt, necesse est, porrò remedia flexilia simul admoveantur, ut particulæ impactæ oscillationi aliquanto expeditius cedere cogantur: Hinc est, quòd, quo tenuior materia fibris impingitur, eo discutientia uberius admovenda sint; quò verò lentior, præcipuè ubi adest tumoris durities, eò emollientia cumulatiùs adhibeantur.

In *Anomalia* quâvis, quando nempè, humores noxii, intus forinsecus expulsi, denuò retrocedunt; medicamenta introsumpta, quæ motum progressivum instaurant, particulas istas morbificas, in sanguine latitantes, vehementèr protrudunt; adeò ut cum miasma istud noxium partes extremas rursus invisat, symptomata gravia actutum præcidantur; quoniam quod sanguini

antè infestum fuit, jam non ampliùs ibidem moram trahit; inde fit, ut arthritides, elephantiafes, aliive morbi anomali, tam atrocia aliquoties usque inducant symptomata, quoad, rursus per medicamenta attenuantia propulsi, levamen subsequatur.

Quandoquidem dolores quidam sunt terebrantes ac rodentes; iique ab acido plus minus acri pendere censentur; quid impedit, quo minus attenuantia acido isti repugnantia doloribus hujusmodi opem ferant? ut enim primum acidum immutatur, mucus inciditur, erosio aboletur, ac dolor, qui à materiâ acido-acri ortum ducit, confestim auferetur: causâ enim sensionis istius molestæ amotâ, quiescit dolor.

Cum emaciatis subinde nutritiva parum profint, constat marasmi causam aliquoties ab obstructionibus exordium sumere; uti fit in lienterîâ; quandoquidem enim vasa lactea maximam partem obturantur; necesse est, prius impedimentum hujusmodi tollatur, quam reficiamur; hoc demum amoto, vasisque referatis, nutrimentum, quod per anum deturbaretur, jam istis proderit: Idem fere fit in *aridura*, quæ plerumque ac potissimum à nervorum obturatione oritur; quæque remediis attenuantibus facillimè cedit; hic autem non est sermo de membro arido, à fracturâ malè reductâ oriundo; quamvis etiam hic attenuantia suum habent usum.

Corollarium.

Electuarium Cardiacum.

℞ Conf. Absinth. Roman. ʒj. Conf. Anth. ʒβ. Spec. Diamb. s. o. ʒj. Chel. Cancror. Oc. Cancror. pp. ana ʒiβ. cum s. q. Syrup. de Atriplic. m. f. Electuarium molle, de quo capiat quantitatem N. Moschat. horâ unâ vel duabus ante decubitus, superbibendô cochl. iij. vel iv. *Julap. Choric.* (z. R. Aq. Lact. Alex. Ceras. n. ana ʒiv. Aq. Pæon. C. ʒij. Sacch. q. s. m. f. *Julap.*)

OBSERVATIONES.

Cum electuarius hocce acidum immutet, flatus inde ortos etiam dissipat; spiritus insuper lapsos erigit: Hinc est, quòd languores hystericos minuat, dematve: Quando adhæc anorexia, spirituum languidorum comes, necnon ab eorum lapsu orta, ægrotantes infestat, maximopere prodest; brevi appetitum acuit, languores aufert, ructus acidos ac cardialgias inde ortas, tollit, hystericisque potissimum auxiliatur.

Aqua Nephritica.

℞ Flor. Oxyacanth. cong. β. Vin. alb. cong. ij. n. m. ras. n^o. iv. destillentur ad cong. iβ. Dosis cochl. iv. horâ somni, &c.

OBSERVATIONES.

Titulo *Aqua Nephritica* propterea insignitur, quòd arenulas deturbet; siquidem verò aromatica est, satius *Aqua Carminativa* quam *Nephritica* nomine gauderet; cum salium volatiliū oleosorum, in eâ contentorum, energia in ventriculi ac intestinorum mucō potissimum exhauriatur, flatus, mucō incubantes, dissipat; quippe quæ bullas incidunt, vapores in eis conclusos evaporant, ac crepitus deorsum pellunt. Hoc verò de *Carminativis* notatu dignum est, quòd non antè exhibenda sunt, quam mucī copia redundans educatur; quippe quæ cæteroqui massam intestinorum lentam adeo tenuarent, ut intestina molem rarefactam haud fere continerent; quin illa rumperentur: Quod si emetico leni, ac cathartico mitiori, pituita canalis parietibus laxius adhærescens exhauriretur; quanquam carminantia residuum in bullas exhalarent, sed per anum vel os quàm facillimè, necnon cum levamine prorumpunt flatus. Eximius vir aquam hanc tanquam arcanum deprædicavit.

Tinctura Stomachica.

℞ Absinth. Roman. ʒβ. Rad. Gentian. Sem. Coriand. Cardamon. ana ʒj. infund. simul in Aq. font. lbβ. f. colatura; cui adde Aq. Nephritic. ʒiij. m. f. Tinctura; capiat cochl. iij. horâ unâ ante prandium.

OBSER-

OBSERVATIONES.

Tinctura hæc concinna est, pituitam flatusque sat idoneè emendat, expellitve; ac proinde doloribus ventriculi tensivis, ructibus, anorexiæ, aciditati, lacteorum obstructioni, cachecticis, morbis frigidis, scorbuto frigido opem fert; quippe quæ attenuat, incidit, calefacit, rarefacit.

Julapium Pyreticum.

℞ Aq. Lact. Alex. ʒiβ. Ceras. n. ʒiβ. Cort. Peruv. subtiliss. pulv. ʒβ. Aq. Pæon. comp. ʒj. Syr. Capill. Vener. ʒij. m. f. haustus 3. vel 4. quæque horâ sumendus, ad octo vices, extra paroxysmum.

OBSERVATIONES.

Februm intermittentium ac remittentium paroxysmos cortex peruvianus tollit; corticis vero hujus semuncia in adultis non febrem intermittentem, multò minùs remittentem propulsabit; quinimò ægroti caco-chymici uncias duas sæpiùs prius devorant, quam febris ex integro abigetur.

Qui laborantium vitas plurimi faciunt, in corticis electione adeò sint cauti, ut optimum excerpant; quî enim fieri potest, ut cortice putrido, annofo, marcido, febris auferatur; notandum enim est, quòd cùm per salia sua fixa ac volatilia potissimum agat; quî fiet ut istis everfis pellatur febris? Constat autem salia corticis putridi propterea avolasse; quòd ex ligno, radice, vel plantâ putridis salia fixa vel volatilia prorsus elici nequeant, siquidem ex *Tachenii* sententiâ, in auram avolarint. Hinc fit, ut febres toties reduplicentur, ut ex intermittentibus in remittentes, ex remittentibus in continuas quàm sæpissimè migrent: Ut pharmacopœi, medicinam facitantes, febres citiùs ac feliciùs aliquoties quam ipsimet medici abigant, ex eo quòd corticem selectiorem in usum proprium asservent, nec eum, nisi medicis sibi probè notis, omnino largientur; excusatos nos lectores habeant, quòd paulò vehementius illos de noxis, per corticis spurii exhibitionem illatis moneamus,

moneamus, quandoquidem eos nostro periculo, at Deo grates, jampridem elapso hortamur.

Corticis exhibitio non febribus solum periodicis opem ferre reperitur, verum etiam epilepsiis, convulsionibus, asthmatibus siccis, hysteriis, opitulatur; quinimò morbis quibuscunque *periodicis* ita subsidio venit, ut, siue intra horarum, dierum, mensium, seu anni *ταγπός* recurrant, magnopere profit. Hoc autem notandum est, quòd *evacuantiis prius exhibenda sint*, seu, quòd idem est, *humores prius sudoribus, diarrhœis, ceterisque fluxibus spontaneis extrusi sint*, (uti morbis hujusmodi diu afflictatis solenne est) seu, *periculum ideo sit in morâ, quia spiritus maximopere exhauriuntur*; quàm corticem intus propinemus; quippe cum cortex plethoram excitet metaphoricam, necesse est igitur, prius evacuationi operam navemus; demum etiamsi, spiritibus vel lapsis, humores redundant, tamen febre semel depulsâ nocumenta, quæ corpori non purgato vel aliquo modo depleto iste intulerit, viribus tandem recollectis, facile præcaventur.

Julapium Stomachicum.

℞ Aq. Lact. Alex. ℥viij. Cinnam. h. Absinth. mag. comp. ana ℥iv. Sacch. albiss. q. s. m. f. Julap. cujus capiat cochl. iv.

OBSERVATIONES.

Quandoquidem cardiacum ac stomachicum est, tam spiritus languentes erigit, quam introsumpta coquit: Quoties Diarrhœa ideo introducitur, quia intestinorum fibræ aliquantò laxiores sunt, quæcunque intra eorum parietes amplectuntur, præ onere uno dilabi sinunt, toties julapium hoc fibris spiritus suppeditans, eas denuò ita tendit, ut contenta ad tempus debitum usque retineant: Spiritibus vinosis hoc solenne est, ut cum sero admisti, serum in offam abeat albam; hinc fit, ut spiritus vini admotus hæmorrhagiæ opem ferat; hincque est, quod à *Bohnio vulnerum hæmorrhagiis* tantoperè deprædicetur, hinc forsitan est, quod arcanum *ixamov* Tasburghense solvatur in spiritu vini, quoties admovendum est; ac denique hinc erit, quòd julapium hujusmodi

jusmodi Diarrhœis auxilio fit, cùm serum tenue nimis inspisset.

Electuarium Scorbaticum.

℞ Conserv. Absinth. Roman. Rosar. Rubrar. ana ʒij. Spec. Diamb. s. odor. ʒj. Pulv. Ari comp. ʒj. Chel. Cancror. oc. Cancror. pp. ana ʒiβ. cum s. q. Syr. è Cortic. Citri, m. s. Electuarium molle, de quo capiat quantitatem Castaneæ manè & vesperi & cubitum iturus, superbibendo cochl. iij vel iv. julapii proprii.

OBSERVATIONES.

Præscriptum hoc pituitam, serosos humores ac aciditates immutat; quoties igitur materia hujusmodi morbifica in ventriculo, vel intestinis, cardialgias, colicas anxietatesque inducens, hospitari solet, toties id ægrotis emolumento erit: Cum singultus ab acido plerumque initium sumat, necesse est, cum acidum exinde immutetur, remedio cedat huic: Salia, sanguini præsentia, quæ fluorem adepta sunt, quæque vibices, gingivas putridas, dolores vagos, spirationem à motu acclivi anhelam, pectoris constrictionem, palpitationem, febres erraticas, sudores profusos, vertigines, vigilias vel somnum, perturbatum, ac, brevi, scorbuti frigidi symptomata residua induxerunt, electuario huic diu exhibito locum dant: Nulli autem dubitamus, quin scorbutus, iste salibus mineralibus quibusdam magis pertinacibus oriundus, huic remedio cedere recuset; quique propterea usque durabit, quoad salia specifica affatim exhibeantur: Neque quivis unus nos inscitæ vel incuriæ hâc in re incuset, quoniam in libello, cui titulus erit *Prælectiones Pharmacomathicæ*, apertè demonstrabimus; medicamenta quædam proprietatibus aded potiri individuïs, ut sal v. g. nitrosum magis per unum quam alterum idcirco immutari cernatur; quî fieret alias, ut ptyalismus diutius protractus, citius à floribus sulphuris, quam decoctis ac bochetis maximè pomposis, intercipiatur ac tandem ex integro sistatur. Quocirca medicorum munus est, ut telluris indolem exactè caleant, ut salium, quibus aquæ loci istius imprægnantur,

natura

natura specifica ad amussim perquiratur; ita enim fiet, ut sanguinis vitia certius dignoscantur, ut ii remedia apodicticè præscribant, ut morbos, quibus istius urbis vel pagi incolæ affligantur, chronicos, quam efficacissimè depellere sciant: Quippe cum morbo cuivis contrarietas remedio fit, antidotum tantum, sine magno labore, salvi viroso accommodandum est; hinc fit, ut eximius ac nobilis *R. Boyle in aëris historia* salium subterraneorum genium nobis indagare jampridem consuluerit.

Infusum Cardiaco-Stomachicum.

℞ Absinth. Roman. ℥℞. Flor. Anthos. p. j. Rad. Gentian. Sem. Coriandri ana ℥j. infund. simul in Aq. Bullient ℥℞. f. colatura; cui add. Aq. Pæon. C. Aq. Nephritic. ana ℥iij. m. f. infusum.

OBSERVATIONES.

Cum infusum hocce sit *Tinctura Stomachica* consimile, vires easdem at majores quam ista obtinet: Hinc fit, ut efficacius aliquantò cardiacum ac carminativum sit; ut ventriculis frigidioribus melius aptetur; ut pituitam vel saburram lentam ac viscidam, in intestinorum canali diversantem, colicas doloresque flatulentos fuscitantem, potentius incidat, ac attenuet; dosis ipsius est cochlearia tria vel quatuor ante prandium; quod si simul appetitus prosterneretur, aquarum spadananum Germanicarum, prope Leodium, selibram superbibendam idoneè satis præscribere solebat.

Electuarium Ecphrasticum.

℞ Conf. Ros. Rub. Absinth. Rom. ana ℥i℞. Chel. Cancror. pp. ℥ij. Spec. Diambr. sine Odor. ℥j. Chalyb. cum Sulph. pp. ℥j. cum f. q. Syr. è Cort. Citri; m. f. Electuarium molle, de quo capiat quantitatem castaneæ mane, vesperi & horâ decubitûs quotidie superbibendo cochl. iij. vel iv. *Infus. amar. Stomach.*

OBSERVATIONES.

Medicamentum hoc obstructions vasorum reseat; quocirca mensium suppressionem revocat: Quippe cum tam

tam pondere quam salibus scateat fixis; composito agendo modo aperiet; quoniam cum salia fixa lentorem tenuent, chalybs autem gravitate potitur ingenti, refectionis momentum ponderis ac potentiae sequax, contingat, necesse est; si tamen solidorum vitia eximamus, quæ uti signis patent pathognomonicis, ita volumus, medela vitio fibrarum peculiari repugnet.

Electuarium sequens à patre meo cum eventu prospero in mensibus suppressis sæpius usurpatum novimus.

℞ Limatur. Martis cum Aceto pp. ℥j. Cinnam. Nuc. Moschat. ana ℥j. Rhabarb. elect. ℥j. Aromat. Rosat. ℥ij. Mell. optim. despumat. Sacch. albissim. ana ℥vj. m. f. Electuarium, cujus capiat magnitudinem castaneæ horis medicis (10^{ma} sc. mane, & 5^{ta} pomer.) superbibendo infus. cujusvis amari vel Vin. Absinth. cochl. vj. vel haustulum.

Hoc autem notandum est, quod ægrotulæ robustæ emeticum ex vino benedicto filtrato (uti antimonialia debent) constanter prius propinabant, quam illud exhibuit; emetico exhibito dein electuarium hoc devorabant foemellæ ad modum præscriptum; statim ab electuario sumpto, exercitium adhibebant strenuum, motum sc. acclivem, aliumve mochlicum; triduo emenso; die deinde quarto, primâ luce, eis extracti panchymagogi ℥j. vel quantum secessus quinque vel sex promoveret, dedit; die quinto necnon quotidie ex isto die denuo electuarium horis medicis sumi iussit; cavendo, ut alvus extracto panchymagogo horâ decubitus exhibito bis in die responderet, ad sextum usque, ante periodum, diem; sexto autem ante fluxum die, vena, *Saphena* dicta, incidebatur, fluebatque sanguis ad uncias quinq; deinde capiebant bis in die semiscrupulum pilularum ex quantitate castorei ac myrrhæ anaticâ cum balsamo quovis confectarum, quibus superbibebant feri sabinati haustulum; necnon sub idem tempus pelsum vel nascale, ex succo mercurialis & felle bubulo, gossipio exceptis, ac syndoni circumvolutis, quâque nocte vaginæ intrudebatur. His confectis, menses, qui

longè

longè ante substitissent, certo ferè certius haud multò post ex voto prorumpere observabantur: notandum autem est, nos hic sermonem de mensibus, in emaciatis, suppressis non habere; quippe cum *Forestus* scitè jamdudum advertit, *menes in extenuatis provocare niti empiricum esse*; utpote cum fluxus iste in infantulis, gravidis, lactantibus, extenuatis, ac vetulis sit revera symptomaticus; cujus anomalix mensuram noxæ inde ortæ testantur.

Quò chalybeata in hepate obstructo deprædicant nonnulli, hoc alii illa vituperant; novissimi ista præ particulis suis stypticis viscus istud nimium indurare affirmant, primi verò illa præconiis efferunt, propterea quòd præ pondere, una cum sulphure admisto, vascula minutula referent: Eximius practicus *Jac. Waldschmidtus* chalybeata in scirrho hepatis certè defamat: Siquidem igitur parum abest, quin obstructions hujusmodi à quovis regimine perperam instituto in scirrhos quam expeditissime evadant; practici hujus sententiam honore prosequamini, volumus.

Quoties tam spiritus desunt, quam corporis adest habitus laxus, uti mulierculis hystericiis passim obvium est, toties præscriptum hoc utramque facit paginam.

Quànquam chalybeata summentibus hoc solenne sit, ut spatia aliquot conficiant, vel semet postea corporis labore parum defatigent; sed *Claudinus* in lecto ista exhiberi jubet, præsertim ubi labor iste turbas cieverit; hocque semel verum esse in adolescentulâ reperi, quæ chalybeata, quoad à motu se continuit, benè tulit; quæ tamen à labore anxietudines, palpitationes, dyspnœas ac symptomata varia induxerunt.

Quoniam chalybs ac martiata vim possident astrictoriam, idcirco fibras pulmonum adeò crispant, ut ii humoribus oppleti, veluti Catarrhosis, Dyspnœicis, Tussientibus, ac Asthmaticis solenne est, magis idcirco sufferciantur, quòd pituitæ expuitio, quadantenus critica, exindè multum inhibeat; asthmati vero hysterico, subsidio veniunt, quòd acidum nervis infestum obtundant ac absorbeant.

Primrosius p. 126. de morb. mulier. jamdudum nos monuit, ut chalybeata retenta per anum clysterum ope
A a deturbaremus;

deturbaremus; retineri autem tum patet, cum fæces non sint, ab eorum ulu, nigrore vel virore tinctæ: Num verò idcirco in periculum, ab eorum retentione, venimus, quòd particulæ chalybeatæ perinde intestina erodant, atque cribrum, per quod colantur, dilacerent, uti Pharmacopœo *St. Quintin* in tractatulo suo videtur, litem hanc componere nobis haud omnino vindicabimus.

Sennertus aperientia cum astringentibus continuò commisceri jubet; exemplum in chalybe quam maximè illustratur; quî verò styptica apertioni conducant, non adedò constat; nisi quòd vasorum parietibus sibi invicem propius accedentibus, liquores contenti celeritùs circumagantur, uti *hydrostatices* periti probè nôrunt.

Pilula Febrifuga.

Rx Cort. Peruv. optim. subtiliter pulver. $\frac{3}{4}$ ℔. Ol. Cinnam. gr^{ss}. ij. Syr. Capillor. Vener. q. s. f. Pil. minores, obruente pulvere Corall. r. pp. quarum octo capiat horis alternis, vel horâ quâque tertiâ, in cochl. Vini aquâ admisti alexiteriâ, superbibendo haustum ejusdem.

OBSERVATIONES.

In febris intermittens vel remittens intervallis, seu *Ἀρυεξίας* exhibendus est cortex; ac usque repetendæ sunt doses ex eo, quoad febris conquieverit.

Asthmati Hysterico, modò prudenter exhibeatur, quàm maximè opitulatur; venæ sectio igitur, ubi plethora adest, iteratò celebretur; epispastica, pro indicationis mensurâ, admoveantur; opiata intus sumantur pro spirituum *Ἀλαξίας* modulo; demum paroxysmi asthmatis istius sæpius repetentis corticis exhibitione intercipiuntur.

Epilepsiæ corticem opem tulisse certum est, si tamen evacuationes debitæ præcesserint; dummodò annum vigesimum quintum nondum superaverint: Id autem ex hoc præcipuè fit, quòd epilepsiæ periodicè recurrant.

Hæmoptoi subsidio venit, si venæ sectio prius celebretur, ac sanguis, pro viribus ac impetu, extrahatur; si dein agglutinantia (qualia sunt amyllum, gumm arabicum, albumina ovorum, syrupus è symphyto, &c.

seu styptica (ea sunt sanguis draconis, acacia, bolus vera, crocus martis astringens, tinctura antiphthifica, saccharum saturni, &c.) seu acidulæ; ac demum cortex ritè exhibeantur. Num cortex in *hæmoptysi* idcirco solummodò præscribatur, quod sit stypticus, jure meritò ambigimus: Quippe cum plùs amaritie quam stypticitate polleat, magis idcirco sale suo fixo vas jam disruptum dehiscere cogeret, quam particulis suis terrestribus illud oclcluderet: Quamobrem cùm hæmoptysi febricula plerunque periodica adjungatur; necesse est, cortex potius sanguinis fluxum ex eo reprimat, quòd periodum antevertat, quam quod vasculi disruptionem agglutinet; hinc fit, ut geminâ de causâ hæmoptysi conveniat; primùm ac præcipuè quòd febrem depellat; deinde quòd vas apertum etiam ferruminet.

Electuarium Latifcans.

R Conf. Rosar. Rub. Absinth. Rom. ana $\frac{3}{4}$ ℔. Anthos $\frac{3}{4}$ j. Spec. Diamb. f. o. $\frac{3}{4}$ j. Chalyb. cum Sulph. pp. $\frac{3}{4}$ j. oc. Cancror. pp. $\frac{3}{4}$ ℔. cum f. q. Syr. è Cort. Citri, m. f. Electuarium, de quo capiat quantitatem Castaneæ horâ decimâ mane, & horâ sextâ pomeridianâ, superbibendo Julap. alicujus cochl. iij.

OBSERVATIONES.

Hoc parum ab *Electuario Ecphrastico* discrepat, ut idem ferè fit; propter flores tamen anthûs adjectos ac chalybis quantitatem majorem, magis efficacitè aperit; sequens vero illi longè præcellit.

R Conf. Flor. Absinth. Flor. Tamarisc. Enul. condit. Cort. Citri cond. ana $\frac{3}{4}$ ℔. n. m. in Indiis condit. $\frac{3}{4}$ iij. Spec. Diarrhod. Abbat. $\frac{3}{4}$ j. Chalyb. pp. $\frac{3}{4}$ j. Sal. Absinth. $\frac{3}{4}$ j. Croc. $\frac{3}{4}$ ℔. Amb. gryf. gr. v. Syr. è conditur. Citri q. f. f. Electuarium, cujus capiat magnitudinem castaneæ bis de die superbibendo Vin. Martial. cochl. ij. Aq. Rut. $\frac{3}{4}$ j. Sacch. Cand. q. f. m. f. Haustus.

Quòd novissimi hujus electuarii ingredientia universa *aperientia* sint, hinc fit ut obstructions lacteorum, hepatis, lienis, uteri, vel uspiam potentè referent: Cùm

in chalybis autem præparatione variæ avolent particulæ, circuitui sanguinis circumagendo idoneæ, ac motui ipsius intestino instaurando utiles, ferrum eum virtute longè præcellere asseritur: Quippe quod proximè mercurium ipsum, uti fertur, attenuet, aperiat, incidat, pituitam ac serios humores immutet, acidum absorbeat, fibrasque potro præ stypticitate suâ corroboret: *chalybs* autem cum ad ferrum sit 7852 : 7643. seu 1, 209 : 1. cum etiam propter præparationem magis fiat ferro elasticus; quid est, cur ferro, tam sanguini circumpellendo, quam motui intestino renovando, ineptior sit? quippe cum præ pondere suo ac gravitate relativâ majori, sanguinem ferro magis adurgeat, necnon cum lucta semper eo major sit, quo corpora, inter se contraria, celerius mutuo sibi accedunt, ac statim resiliunt; inde erit, quod ferro hæc de causâ etiam longè præeat; quinimo cum mercurii vires ponderi ferè soli tribuantur, chalybis autem efficaciam non solum à pondere, verum etiam ab elasticitate metiamur; mercurii momentum istud chalybis vix superabit, cum $14 \times 1 = 14$: at $7 \times 2 = 14$: quia quantò mercurius chalybem pondere præcellit, tantò chalybs mercurio vicissim elasticitate præit: Hinc erit, quòd perinde, si non magis, aperiat, quàm vel ipsemet mercurius.

Infusum Bechicum.

℞ Sem. Sinap. ʒβ. allii ʒiij. infund. in Vin. alb. opt. lbij.
m. f. infusum, de quo bibat haustum ad libitum.

OBSERVATIONES.

Præscriptum hocce asthmaticæ cuidam exhibuit egregius vir. De respiratione jam paulisper sermonem habeamus; actio est ex centripetâ ac centrifugâ mixta; expiratio cum sit potius actionis cessatio, ceu actio centripeta, nullo certè sit negotio; quoniam gravium descensus, vis corporibus innata, facile perficitur; cum inspiratio verò sit actio centrifuga, sine conatu gravi non efficitur; hoc enim constat, quòd quo majorem ac obtusorem angulum costarum peripheria cum axe sphæroidi pectoris fictitio sub se contineat; eo major vis motrix sit, necesse est: Ac proinde eo difficilius inspiratio

inspiratio conficietur; quod si resistentiæ huic insitæ externa etiam superinjiceretur, inspiratio ita non deinceps perficietur, ut ægroti sæpius in suffocationis periculum exindè venire cernantur: Hinc fit, ut cum asthmaticus nemo evadat, nisi postquam fluida vel vasa malè afficiantur; nocumenta ista paululum expendamus, deinde finatis.

Ut respiratio igitur ritè peragatur, necesse est, musculi, nervi, arteriæ, venæ, vasa lymphatica, glandulæ, seu partes similes; costæ, pulmones seu organa; quam optimè se habeant; sanguis, lympa, succus nervosus ac cætera fluida ritè circumagantur; quoties enim vel vasa vel organa vel fluida quantitate, qualitate, motu, situ, substantiæve peccant; quid mirum, si morbi tum aliquoties immedicabiles subsequantur?

Interdum fit, ut musculorum adsit inflammatio, uti ferè in pleuritide evenire solet; ubi serum rheumaticum seu lentum ita parum musculorum fibrillas pervadit, ut ipsarum parietibus firmiter adhærescat, ac deum subsistat; hinc fit, ut eæ intumescant, ac dolor inflammatorius, ac pulsatorius, quamprimùm subsequatur; qui cum in horas augeat; necesse est, abscessus tandem pone subeat; hoc in rerum statu, statim ut vasa deplentur, sanguisque paulo uberius subtrahitur; inflammationis fomite hunc in modum subtracto, organa fluidorum impetu vacant, ut fluida placidius impotenter circumagantur; sanguinis extrahendi autem mensura dolori, respirationi difficili, ac viribus accommodanda est; his ita confectis, refrigerantia ac diluentia deinceps idè propinentur (qualia sunt aquæ papaveris rhæados, lactucæ, portulacæ, paralyseos & similia, sal prunellæ, &c.) quia motum progressivum eviter refrænant; aperientia porro mitiora idcirco exhibeantur, (ea sunt infusiones stercoris equini non catrati, antimonium diaphoreticum, margaritæ, Densipri, mandibula lucii, &c.) quòd concretum solvant sanguinem, ac motum progressivum lenitè promoveant; opiata leniora propterea intusumantur, (quæ sunt syrupus papaveris rhæados, de meconio, tinctura papaveris rhæados mynsichti, quinimo quandoque laudanum)

num) quod spasmos dolorificos compescant, nec non vigiliis abigant; oleosa etiam tam internè quam externè usurpentur; ea enim laxando, materiam bronchiis adhærescentem ita extergent, ut ista promptius aliquanto expuatur; partes nimium tensas ita ampliant, ut fluida multò expeditius circumpellantur; hisque peractis, inflammationi, imò vel abscessui, finis aderit.

Quoties nervi laxantur, paralyfi hujusmodi laborare constat; hoc in casu spiritus ita parum nutritionis muneri sat sunt, ut functionibus peragendis omninò desint; quocirca muscoli costarum levatores (subclavi, ferrati, ac diaphragma) spirituum suppetias nec à colli pari tertio, à decem thoracis paribus ultimis, nec à lumborum pari primo, ob eorum inopiam vel obturationem prorsùs recipiunt: Hinc fit, ut *asthmata nervina* subinde oriantur: Talia autem asthmata citra aperientia, salia volatilia, salia volatilia oleosa, cardiaca, ac ea quæ motum invigorant, irritant, quæque obstructions referare certò scimus, non cedunt.

Costæ quandoque luxatæ vel fractæ asthmati ansam præbent, quæ chirurgorum ope repositæ, morbo huic finem statuunt; quæ tamen adeò sæpè coaluerunt, ut sint ferè immobiles, nec igitur asthmati huic cura præsto aderit.

Pulmonum glandulæ inflammatae ægrotantes asthmaticos reddunt; quippe cum moles eorum hunc in modum amplietur, aëris ingressui vix datur locus; quocirca sanguis vel subsistet vel segnitè nimis circumagetur; quæ de pleuritide effati sumus, hic etiam valent; cum sit inflammatio verò minuta, parcius evacuandum est.

Quotiescunque vasa humorum sarcinâ onerantur, pulmones semet sat explicare nequeunt; ubi enim arteria seu vena pulmonalis inflatur, bronchiis quamvis vel strenuè inflatis, vix aut ne vix pulmones explicantur; uti *Blancardus Prax. Medic. p. 118.* apertè demonstravit: Hinc fit, ut cum scorbutici, chlorotici, hypochondriaci, asthmatici evadant, necesse est, plethora ista particularis venæ sectione, cucurbitulis scarificatis, catharticis, epispasticisve priùs exhauriatur, quam humorum vitia emendentur: Repletio verò à *Platero* m. morata, quæ sæpius in praxi occurrit, quæque mor-

ribundis

ibundis evenire solet, evacuantibus abigi nequit; emendare enim horum vitæ curriculo, quorsum famæ periculum moliremur? Siquidem enim asthmatis hujus causa humorum stagnatio est, hujusmodi haud multum ab interitu absunt; quinimo humores hic tantoperè subsistunt, ut ægroti vel astantium accessum procul amovere aveant. Asthma hoc cachecticis è vita migraturis solenne novimus.

Vasa lymphatica quam sæpissimè ita obturantur, ut periodus ejus redux, si minus impediatur, at certè, retardetur; atque peripneumonia notha exindè subsequetur; quæ asthma etiam inducit; quæque iisdem methodis, quibus pleuritidi medemur, auferri solet; nisi quòd tùm febris ac respirandi difficultas non adeò urgeant, proinde venæ sectio parcius celebranda est; necnon lenientia hic idcirco conveniunt, quòd serosorum humorum copiam tam minuant, quam alio devocent; quibus si porro aperientia paulò fortiora exhibeamus, obstructio quam citissimè cedit. *Catarrhus suffocativus* his ipsis remediis methodisque, si tamen citò ac sedulò adhibeantur, abigi poterit.

Ætate paulò provectiores, ita sanitate quam facillimè excidunt, ut vasa sanguinis circumpellendo ineptant; spiritibus insuper istiusmodi adeò cæsi sunt, ut sanguinis motus progressivus nimis segniter perficiatur: Hinc fit, cum fluida eorum ferè effœta, ac lenta sint, ut, passim in fibris subsistant; inde est, quòd bronchiæ eorum laxatæ nimis serum expeditè admittant, quòd adhæc crura eorum sub idem tempus œdematosa evadant, quòd demùm senes plerunque asthmatici ac hydropici simul sint. Siquidem autem hujusmodi ut plurimum febre vacant remedia calefacientia audactius aliquanto istis propinamus: Quocirca statim ut evacuationes magis universæ præmissæ sunt, ac pro viribus repetuntur; diuretica posthac cum emolumento ægrotis exhibemus; propterea quòd non glandulas solum renales efficaciter proritent, verum etiam bronchiarum fibras ita fodient, ut eæ pituitam quam citissimè excutiant; ex quo fit, ut causâ asthmatis conjunctâ etiam expugnatâ, respiratio mox liberior exinde fiet. Infusum hoc paralyticis etiam, asthmate

laborantibus, egregiè propterea proderit, quòd in intimos nervorum tubulos penetrare eosque promptè satis referare queat.

Electuarium Hystericum.

℞ Conf. Absinth. Roman. ℥ij. Conf. fol. Rut. ℥j. Chalyb. cum Sulph. pp. ℥ij. Zinzib. in Indiâ condit. ℥ij. cum q. s. Syr. è Cort. Citri f. Electuarium molle, de quo capiat quantitatem juglandis mane & vesperi quotidie; & superbibendo cochl. tria vel quatuor
Infusi Cardiaco-Stomachici.

OBSERVATIONES.

Si cum *Highmoro* remedia, quæ passioni hystericae subsidio veniunt, lustremus; bezoardica ac alexipharmaca eatenus illi utilia esse comperiemus, tam quoad humorum motum à centro ad peripheriam ab intus, extrinsecus, adurgent, quàm quoad spiritus erigunt: Cum corpora enim mulierum *δυοδιαφορέα* ferè sint; istiusmodi remedia perspirationis mensuram intendendo, humorum cumulum imminuunt: Foetida adhæc necessariò exhibentur, non quoniam spiritus figunt, sed quia eos revera suppeditant: Quando igitur electuarium hoc particulis constat ejusmodi, paroxysmis hystericarum alleviamento erit: Quòd si paulò accuratius morbi hujus causas perpendamus; æquo feratis animo, petimus.

Ut morbum igitur hystericum melius capiatis, symptomata hysterica inter se dissidentia paulisper contueamur: Hæ autem somno perturbato, Diarrhœis, vomitione, convulsionibus, asthmatibus siccis, ptyalisms, sudoribus colliquativis, palpitationibus, cephalalgis, ac febre erraticâ, anguntur, neminem verò reperietis, quæ non sit continuò convalescentiæ prorsus exspes; quoties utique urinæ copia debita non excernitur, vomitio vel Diarrhœa ejus vice funguntur; quibus itidem quiescentibus, asthma ficcum aliquoties pone subit: Quod superest, hoc notandum est; hunc in modum laborantes ita symptomatum angustia diversitate, ut longè aliis cras quam hodie jugiter affligi soleant. Illæ verò colicis, sudoribus glutinosis ac frigidis, virium prostratione

stratione summâ, suffocationibus, capitis gravedine, ventriculi inflatione, necnon symptomatibus cachexiam denotantibus laborant, quæ ita procul febre abfuerunt, ut vel calor defuerit naturalis ac pulsus tardus ac debilis fuerit. Jam quisquis symptomata hæc multifaria serio contemplatur, promptè fateatur, necesse est; passionem hylericam haud ab unâ eâdemque causâ constanter oriri, verum tamen ex variis, eisque toto inter se diffidentibus cœlo, statibus omnino pendere liquido constare; ex quo fiet, ut morbi hujus depulsio neutiquam iisdem jugiter remediis abigi queat, quin totis aliis auferri debeat: Ast ne multa, quam brevissimè vobis methodos, quibus passionem hanc faustò depulimus variis in sanguinis genis, nunc delineabimus.

Hæc cum ita sint, atque sic se habere experientia nostra quam sæpissimè nos edocuit: Morbi hujus causas longè inter se diffidere concludamus, necesse est; quamobrem fieri non potest, quin medela etiam haud parum discrepet. Priori igitur sanguinis temperamento depravato in sequentem morem rectè occurritur; cum sub acidi, quam maxime corrosivi, ditione sit sanguis, remedia diluentia intus exhibeantur, propterea quòd salia ipsius septica multum exinde segregentur; alcalina mitiora ac testacea propinentur, ex eò quòd illa resorbeant ac obtundant; necnon opiata sumantur, quoniam punctiōis cujusvis sensum, imo sensuionem quamcunque molestam retundunt, quinetiam *Αλαζίας* irritatione satas, omnino compescunt: Cùm posteriori autem, quippe quòd acidum sit, ex *Sylvii* sententiâ, austerum, diluentibus, particulis calorificis onustis, alcalinis volatilibus, opiatisque, solùm resinosâ opii parte gaudentibus, obviam eamus: Hinc est, quòd temperamento calidiori, aquas Spadanas Pauhontii, Saveniri, Tunbrigiæ, Islingtoniæ, lac asininum, vaccinum, caprinum, aquam fontanam, vipâ calefactâ, pulvres testaceos (ea sunt oculi cancrorum, chelæ eorundem, margaritæ & similia) syrupum de meconio ritè accommodemus; cum frigidiori verò, Thermas Somersetenses, aquas Granatenses, Bourbonenses, Patavinas, aliasve, sal volatile cornu cervini, salis armoniaci, spiritum cornu cervini, salis armoniaci, sal volatile

latile oleosum, chalybeata, ac demum Laudanum Londinense, Laudanum Tartarifatum, Sydenhamii, tantummodo exhibeamus. Jam, quisquis Sydenhamii de Passione hysterica diatribas unquam pervolverit, profiteatur, oportet, quandam ipsius speciem ex spirituum vallatione ac vappâ omnino pendere; siquidem verò scrutinio hujus morbi omnibus numeris absoluto exciderit, ita remedia indolis calidæ semper exhibere inaptum esset; maximè, quid est, cur ipsemet vir nullo non honore prosequendus, aquas Spadanas, lac, necnon corticem in mulierum hystericarum solamen tantoperè deprædicaverit; nisi quòd instituta longè aliâ præter debiliorem spirituum crasin sibi proposuerit: Quis enim fiet, ut lac crasin hanc everfam in meliorem converteret? At ipsius verba regeramus “ Si quæ verò ex
 “ remediis supra recensitis minùs convenient, quòd
 “ temperamento bilioso ac tenui præditis sæpè accidit,
 “ tunc DIÆTA LACTEA possit usurpari. Etenim
 “ mulieres aliquot (quod prima statim fronte mirabi-
 “ tur quis) cum affectibus hystericis diu conflictatæ,
 “ etiam iis qui omnes medicorum conatus spreve-
 “ rant, eluserantque, tandem lacte solo aliquandiu
 “ vescentes convalescere. Id verò in hac curandi me-
 “ thodo præcipuè mirandum, quòd cum lac frigidum
 “ tantum crudumque alimentum præbeat, spiritus nihil-
 “ ominùs ejus usu corroborentur invigorenturque. Nec
 “ tamen hoc à ratione abhorre illis videbitur, qui
 “ secum reputaverint, lac, cum simplex omninò nu-
 “ trimentum suppeditet, naturæ minus in coquendo
 “ negotium facessere, secus ac solent cibi ac liquo-
 “ res magis compositi, quodque perfectissimam illam
 “ concoctionem equalis sanguinis spirituumque crasis
 “ necessariò sequatur. Illud etiam est advertendum,
 “ quòd non nuda spirituum debilitas, per se confi-
 “ derata, sed eorundem debilitas ad sanguinis statum
 “ comparatorum, atque æquæ quam patiuntur, causa sit. Qui
 pote, ut ipse medicus, qui in præfatione suâ quali-
 tates primas ac secundas ita contemptui habuerat,
 hic cum istis rursus in gratiam redeat? Quid est,
 quod lac haud perinde pituitosis ac serosis hystericis
 atque biliosis spiritus suppeditaret, crasinque emenda-
 ret?

et? “ Cum podagrâ v. g. laborans calefieri aut refrigerari possit, vigente adhuc podagrâ, necdum devictâ: Cum methodo hac quâ diversæ tantum qualitates introducuntur, morbi specifici non magis immediate perdomantur, quam ignis gladio extinguitur. Quid enim obsecro, calor, frigus, humidum, siccumve aut è secundis qualitatibus, quæ ab his pendent, alia aliâ qua ad morbi curationem faciet, cujus essentia in harum nullâ consistit? Morbi species destruenda, qualitates spernendæ sunt. Quid igitur tantoperè incumbit, ut lac passionis hystericæ specificum, temperamento tam nugatoriè accommodet? Num necesse est, sanguinis statum, quem in præfatione susque deque habendum inculcaverat, ad spirituum crasin emendandam, advertamus? Palam igitur hîc recognoscit, quod in Præfatione tantopere defamâset; *bonus dormitat Homerus!* Cum ipso igitur inficias non ibimus, passionis hystericæ speciem, temperamento bilioso oriundam, lactis ope abactam iri; illam alimento frigido crudoque depulsam iri fatemur, quam chalybi cessuram prorsus abnegamus. Quam facile igitur hallucinantur ii, qui principiis universalibus immorari præ se ferunt; morbis itaque *specificis* affigere futile est, ast qui *illa* causis delegare dignantur, prudenter agunt. Morbi enim essentia causarum variarum seriem denotat, ceu aggregatum est ex variis causis simul connexis conflatum: Quocirca non pote est, ut remedium simplex tam multis indicatis continuo accommodari queat, quin, quoties causa una vel altera variatur, remedium energiâ suâ excidat, necesse est: Adhæc *non morbus* vox est prorsus æquivoca, quippe cum passio, scilicet, hystericæ non causam solum antecedentem designet, verum varias etiam conjunctas sub se comprehendat, remedia causæ antecedenti perutilia, istis, conjunctis medicamentibus, aliquoties omninò repugnant: Quot autem eventus infausti sæpenumero ægrotis obtingunt, causâ antecedente licet devictâ, conjunctis etiamnum posthabitis? Pari fere ritu, etiam si periodo cortex adversari comperiatur, cephalalgîis tamen, diarrhœis, doloribus, vomitionibus symptomatisque multifariis inde oriundis, citra causarum horum symptomatum conjunctarum

ani-

animadversionem, parum conferre sciatis; quoties enim symptomatum atrocitas, febre licet demptâ, seu evandâ, laborantes trucidaverit? Cortex igitur non est febris intermittens collectivè sumptæ, verum periodi solius antidoton seu specificum: Hinc constare arbitramur, vix aut ne vix morbo, cæterum *causis* dari antidota nec in posterum igitur *morborum* specifica tam sedulo perquirenda sunt, quàm *causarum* depulsio unice indagari superest: Non igitur *morbi* sed *causæ* species destruenda est: Quinetiam quid est, cur causas remotas tantopere infamet, conjunctarum autem medelam solummodo inculcet; hoc enim est sibi non constare: Quandoquidem causa remota ac conjuncta inter se in inaginatione solâ dissident, cum conjuncta sit causa remota fibræ impacta: paulò autem infra *remotam* in alio longe sensu intelligit; cum eam *primo primam* ac *remotissimam* nuncupet; neminem, nimirum, tam incuriosum reperiemus, quin pituitæ, cum sit morbi cuiusvis causa, texturam adeo indagaverit, ut eam ex feri copiâ, sulphuris exiguo, cum acidi pauxillo coagulati, ac terrâ conflatam exacte noverit; ac ejusmodi morbis sinapi, nasturtium ac consimilia idcirco opem ferre, quod acidum demoliendo coagulationes, inde oriundas, subsistentias & alia auferre comperiatur: Ii vero, qui acidi in pituitâ, ac salis volatilis in sinapi texturam ac crasin intimam seu essentiam perscrutari volunt, ex omnium medicorum sententiâ plane ineptiunt: Egregius autem vir in præfatione nec *essentiam*, nec *secundas qualitates*, verum *species* solas destrui præcipit; quâ autem ea, causâ proximâ ac remotâ non cognitâ, quæ à qualitatibus secundis, &c. initium sumunt, auferri queat, nos etiamnum latet; quinimo apud ipsum in praxi tacitè in confesso est, non tam species quam causas morborum diruendas esse: Hanc autem excursionem excusatam habeant lectores benevoli; proptereâ quod tanti viri allucinationes avidè foveantur tirones; atque uti morbi speciem, citra causarum comprehensionem, indagare nequimus; ita, causarum indagine ab ipso spretâ, morbi species nunquam non percontantibus hujusmodi delitescet, neque tales unquam, quin autoritate solâ freti, morbos depellent; quàm

eliciter autem hi praxin exercebunt, perpendant melici; cum methodus hæc sit omnium longè fallacissimæ.

Quod ad præscriptum hoc, passioni hysteriæ, statu vitioso, acidove prognatæ, quàm optimè accommodatur, quodque eventu fausto rarò destituitur; cumque exercitium à chalybis introsumptione peropus sit, huiusmodi verò sint spirituum exortes, equitatio ambulationi longè præit: Quippe cum spiritus exinde minùs evaporentur, at exercitii ope chalybs sat expeditè circumPELLITUR. Cathartica fortiora nunc certè evitanda sunt, ast lenia in usum vocentur; ex eo quod fortiora *ἀραιῖας* cieant, mitiora verò alvum subducant, quam chalybeata reprefferint.

Quæ de passione protulimus hysteriâ, de malo etiam hypochondriaco vera sunt: Quippe quæ parum vel nihil inter se dissident.

Hiscæ in morbis igitur ubi spirituum crasis evertitur, evacuantia propinare ineptum esset; quoniam eos magis exinde profterneremus; remediis idcirco hic allio-ticis unis omnino fidendum est.

In chachexiis, sanguis particulis vapidis ac effœtis valdè oneratur; atque subsistentiæ passim aptus est: Sed num quia

Ὅτι γὰρ εἶπον ἔδωκεν ἡ πίνυς ἀποπαθεῖν

Τὸν ἀναιμόνους εἶσι.

Hom. Il. E. v. 341.

an quia nimium biberunt, hic non disceptandi locus est; hinc autem est, quod crura ac femora œdematopla fiant; hinc etiam evenit, ut ductus plerique secretorii obturentur; hinc enim fit, ut renes urinæ non multum secernant; ut hepar bilis exiguum segreget, quoniam particulæ viscidæ glandulas hepaticas obstruunt, icterumque exinde introducunt; hinc est, quod ventriculus saburrâ viscidâ sufferciat, tam ab alimentis, nimirum ingestis, quam à glandulis, quæ succum seu fermentum nullum, præterquam quod viscosum est, quodque parum aut nihil vel fami vel alimentorum coctioni conferre reperitur: Hinc est, quod chloroses idcirco nonnunquam introducantur, quod uteri glandulis

dulis, ex lentore obturatis, sanguinis motus, exindè segnior factus, deoppilationi parum conferat: Hinc fit, ut menses vel parcius fluant, vel omninò subsistant, vel pallidi sint; imò toti sanguinis massæ lentor præest; pulmones itidem phlegmate viscido adeò redundant, ut glandulæ ipsius laxentur, intumescant, ac steatomatosi tandem evadant; necnon vasa ibidem sanguifera iisdem humoribus, qui bronchiarum parietibus adhærescunt, ita opplentur, ut sanguinis gyrus multum indè interpelletur; præcipuè verò hujusmodi à motu acclivi asthmaticæ fiunt; ex eo, quòd exercitium motum sanguinis acceleret ac vasculorum furculos dispanat, ita ut, cum vesiculæ inflari nequeant, aër non irruat, nec inspiratio ritè perficiatur: Quando verò causa ita permanentè affligit, ut nusquam remediis cedat, præsagium durum prædicamus, necesse est. Præscriptum hocce, massam lentam tenuando, motum progressivum intendendo, ac secreta urgendo, pròderit: Quinimo istud cachexias ex integro auferre comperiemus, si tamen cautè ac tempestivè exhibeatur: Quoties autem virgines ita chlorosi laborant, ut obstructions inveterascant, ac per moras invaluerint, remedia chalybeata ita parum conferre affirmamus, ut symptomata dira, quinimo mortem ipsam urgeant.

Vinum Aperitivum.

℞ Rubiæ Tinctur. ʒj. infund in Vin. Hoccomorens. ad ℥iiß. f. colatura, de quâ bibat haustum ad libitum.

OBSERVATIONES.

Vinum hoc, unà cum pilulis infra præscriptis, obstructions reserat.

Pilule Deoppilantes.

℞ Pulv. Ari comp. Rad. Gentian. Rhabarb. opt. Chalyb. cum Sulph. præp. ā ʒj. cum q. f. Syr. de Chalyb. m. f. Pilul. minores, quarum quatuor capiat mane quotidie, & tres vesperi, & superbibat haustum *Vini Aperitivi.*

OBSERVATIONES.

Vinum hoc unà cum pilulis hisce hepatis obstructions ac proinde icterum referare idoneè satis comperitur: Quippe cum humorum lentor sanguinem in vasis capillaribus subsistere cogat, ac eam ob causam, bilem intra vasa retineat, ita ut in hepate secerni nequeat, necesse est, chylus bile non irroratus sit moles indigesta; hinc fiet, ut cibi deglutiti crudi deorsum ferantur; hincque erit, quod cutis, oculorum album, ac urina flavo, nigro, viridive tingantur colore, qui copiae retentæ ita congruit, ut color eo magis vel minus intensus sit, quò major vel minor bilis retineatur quantitas; lassitudines etiam spontaneæ, deliquia, sapor oris amarum laborantes conflictant; quando enim sanguis qualitatibus suis balsamicis excidit, quæ fiet, ut spiritus sani secernantur? Cumque bilis sit quàm maximè oleosa, ita ut lintheamina tam istâ quam sapone munden- tur; necesse est, fibræ adeò laxentur, ut robur, fibris rigidis perindè ac circuitu placido ortum, omninò desit. In ictero igitur ubi primum vasis secretoriis hepaticis impulsus sat validum impertivimus, offamque congelatam solvimus, cedit obstructio, ac evanescit icterus: Si igitur emetica ac cathartica primum laborantibus exhibeamus, ita elidentur vasa, ut obstructio defodiatur exindè; vinum autem ac pilulæ hæ deinceps humorum cohæsiones ita diriment, ut ii tenuiores facti circumpellendo magis fiant idonei; nisi quod ita invaluerint icteri, ut in scirrhus ac hydropes tandem evaserint. Vos autem monemus, ut caveatis, ne pulveres, ex particulis volatilibus constantes, diuque in officinis asservatas, ad obstructions referandas exhibeatis; quippe cum plantæ volatiles exiccentur, parum idcirco morbis frigidis conducunt, quòd partes earum volatiles multò ante avolârint. Rheum huic præscripto consultò propterea adjicitur, quòd cum humores deorsum ferat; irriter, necesse est; quando aperientia ac cathartica parum inter se discrepant, cum, auctâ remedii deoppilantis dosi, humores per anum ferantur; catharticum igitur in dosi minutâ exhibitum aperiat, necesse erit.

Hydripes, anasarcae nuncupati, tam à sanguine lento quam fibris laxatis oriuntur; quippe cum fibræ sero pituitoso diù immergantur, magis in dies ampliantur, atque magis fiunt inde flexiles; ex quo fit, ut vasorum lymphaticorum ora ita non lympham recipiunt, ut subsistat; hincque œdemata passim, præsertim in cruribus, cæterisque partibus pendentibus, oriuntur: Jam, tametsi cathartica ideò conducunt, quia serum redundans ac lentum fundunt, exhauriuntque; sanguinis tamen lentī *παλιγγενεσία* vix, citra attenuantium administrationem, præciditur; quæ per particulas volatiles perinde motum invigorant, particulas activas passivarum vice adjiciunt, perspirationem provehunt, ac urinam per renes rursus in copiâ debitâ propellunt: Hoc inter salia fixa ac volatilia interest quod hæc vixdum cum sanguine confunduntur, cum evaporentur; illorum verò effectus diutius fluidis immorantur: Hinc est, quòd salia fixa urinam certius quam volatilia proritent.

Obstructionem qualemcunque præscripta hæc aperiunt; quocirca quando uteri vel vaginæ glandulæ materiâ lentâ ita obturantur, ut fluxus menstruus emanare nequeat, quin sanguis tantoperè depravetur, ut symptomata multifaria, æsthmata, nimirum, colicæ, cachexiæ cum aliis quamplurimis inducantur, mensium fluxus prius redux fieri nequit, quam vires recolligunt, ac morbi ascititii auferuntur: His confectis, vinum ac pilulæ meatus tandem aliquando referabunt.

Quantum ad modum, quo emmenagoga effectus sortiuntur suos; multum certè inter emeticorum seu catharticoꝝ ac emmenagogaꝝ operationem interest; cum illa per immediatam tunicarum ventriculi ac intestinorum proritationem humores exhauriant; hæc verò quanquam vasa parùm irritent, præcipuè tamen sanguinem tenuando, motumque ejus instaurando agunt; ex quo fiet, ut idcirco fluxus subsistat, quod sanitate exciderint; rursus autem promanabit, quòd temperamentum justum redierit.

In lienis obstructione *Henricus ab Heers* chalybeata multum, his verbis, deprædicat, “ Chalybeatis autem
“ lienes quosvis obstructos, feliciter curari, in ascle-
“ piadarum lycæo, tam tritum est, ut gannire videatur,

“ tur,

tur, qui de eo dubitat, potius quam philosophari & cum ratione loqui. Hoc verum esse in melancholiâ hypochondriacâ in temperamento frigido affirmamus; in hujusmodi enim, cum fluida vasa majora segnitèr tranent; necesse erit, illa vascula capillaria multò torpidius permeent; hincque fiet, ut concretiones immedicabiles frequentèr exoriantur: Quinimò non obstructions tantum visceri superveniunt huic, verum cerebrum ipsum; non multò post, deliria contumacissima frequentèr invadunt; quæ laborantium vitas ærumnis afficiunt, quinimò obruunt.

Ex *Joëlis* observatione, incommoda chalybe oriunda, ex eo quòd ea uberius aliquanto exhibuerimus, hæc sunt, *cephalalgia* nimirum, *linguæ ac corporis totius siccitas, viscerumque dolores*; sub hoc tempus, siquidem metam, temperamentum, nimirum, justum attigerimus, chalybi valedicendum est; quoniam *omne nimium vertitur in vitium*; quando enim aliqui temperamentum, quo exciderant, sanum receperunt, remediis ulterius justo non sunt fatigandi, quippe cum hunc in modum temperamentum aliud ex æquo inimicum introduceremus; esto igitur cujusquam sanguini acidum præesse, à quo medici industriâ adeò laborans vindicatur, chalybeatorum, nempè, salium volatilium fixorumque testaceorum, consimiliumque ope, ut sanus jure merito habeatur; quid est, cur hujusmodi remediis injuriosè lassemus; cum enim nunc redierit sanitas, iisdem ea remediis, quibus illam recollegimus, diutius exhibitis, certò dirueretur; paradoxon autem hoc ne videatur vobis, quoniam acido ad gradum quendam offendente, at dirempto, totidem gradibus alcali corpus nostrum affligeret, quot temperamentum naturæ amicum exuperaret: Hinc in medicando medio tutissimi imus.

Vinum Rhenanum, quo vir utitur egregius, haud multum deprædicamus; quoniam, etiamsi genuinum sit, est tamen acerbum, ac proinde tantum abest, ut aperiat, ut meatuum occlusioni potius accommodetur; quinimo non tantum vinis aliis dilutius est, verum præterea tempore æstivo etiam necessariò acefcit, ex *Dris Merret* sententiâ, nec, nisi oinopolarum artificiis vili-

bus, usurpatur; à quibus num corporibus insanis tum usui erit, medici saniores pro nobis sententiam ferant.

Sterilitati chalybeata maximè conveniunt; siquidem autem aliquoties ista muneri huic deesse compertum habuimus; liberum nobis sit, aliquantisper expatiari, quî operi huic sat esse desint. Sterilitas à tubarum distantia ab ovario nimia orta, ideò curari recusat, quia cum pendeat à conformatione partis malâ, perinde remediis atque digitorum exuperantia cedit: Neque medicamenta balsamica tubarum ulceri multum conducent, utpote quod tubas sæpenumero coalescere efficiet, ac proinde conceptioni spem omnem adimit. Quando fluida autem aliquo vitio laborant, medicus exspes non fit; esto igitur quanquam fluore laborare albo; quoties ægrotantes eo, per phlegmagoga, quæ pituitæ redundantiam exhauriunt, per amara, chalybeata, salia fixa ac volatilia, quæ pituitam emendant, perque remedia tandem styptica ac glutinosa, quæ meatus glandularum laxatos apertosque constringunt occluduntque, expeditivimus, viris aptæ evadunt, ac ad conceptionem, à coitu valido, idoneæ fient. Fluxus menstruus immodicè emanet, quamdiu perstat nec remediis cedit, tamdiu prolis spe, nec injuriâ, dejiciuntur. Cum appetitus fœminarum venereus plerunque vigeat, nisi si sanguis sit sale omnimodo cassus; hujusmodi sanguinis statui medicari perrarè accersimur; experientia autem propria nos edocuit, tale quid aliquoties in praxi obtigisse; evacuantia hic massæ vapidæ ac effoetæ necnon viribus congruant; alterantia exhibeantur ea, quæ partium tonum laxatum roborent, motum sanguinis progressivum instaurent, salia activa adjiciant, ac motum intestinum restituant (hæc sunt chalybeata, salia volatilia ac fixa, amara, acria & similia;) hinc fiet, ut, secretionibus pristino more peractis, sanitas redeat, appetitusque haud multo post ex voto reviviscat. Mensium suppressione, à remediis aperientibus, vel etiam coitu valido sublatâ, conceptioni habiles deinceps fiunt; dubium autem non est, quin mulieres, menses nunquam expertæ, concipere valeant; quandoquidem hoc non tantum experientiâ *Liberii Histor. navigat. Brasil. c. 7.* necnon *Georgii à Torre*; verum nostrâ

nostrâ etiam patet; scœminam enim quandam viro nobis probè noto nuptam meminimus, cui menses ante nuptias nunquam promanaverant, quæ nihilo secius sæpius peperit, cujus menses itidem à primo partu regularitèr fluxerunt. Non ita pridem cadaver, à furcâ emptum, cultri anatomici ope perlustravimus; cujus tubæ fallopianæ utrinque ita steatomatibus obturabantur, ut nunquam idcirco in conceptionis discrimen, quanquam illi millies coirent hominès, venire potuisset; hoc autem illi ità fuit, quòd pergræcabatur; meretrix etiam fuit perdita, nunquam autem concepit nec uti demonstravimus potuit unquam; spiritus enim vini, quem continuo uberrimè ingurgitavit, serum ita coagulat incrassatque, ut motui in orbem tandem ineptum fiat; ac proinde demum alicubi subsistit, ac vel polypos vel tumores generat.

Hauſtus Ecphrasticus.

℞ Millep. contuf. n°. xxx. Vin. aperitiv. ℥iij. m. f.
Hauſtus bis in die fumendus.

OBSERVATIONES.

Millepedes vino loti ac ficcati, more folito, nimirum, parati, parum ideò conferunt, quia falia eorum volatilia in auram avolant; cùm succus eorum ab infectis vivis expreffus iisdem ubertim ſcaturiat, ac proinde morbis pituiſis acidisque magis conveniat.

Millepedes cum *vino aperitivo* propterea admifcuntur, quòd meatum obſtructum longè efficacius aperiant; hinc miſtura hæc hepatis obſtructo ſeu ictero faciet fatiſ, utpote qui à ſero congelato, arteriarum hepaticarum extremis adnaſcente, plerunque exoritur; qui ab huiusmodi volatilibus, amarisque à coagulo hoc cito vindicatur, ac ruruſum motui circulari redditur: Hoc autem ſeriò inculcamus, ut remedia tam alterantia quam evacuantia pedetentim, non confertim propinentur; quippè cum natura ſenſim remediis conſueſcienda ſit.

Cum ophthalmiis millepedes ſubveniant; notandum eſt, quòd non ejuſmodi ſubſidio ſunt, quibus genarum excoriationes adſunt, verum iis unis opem ferunt,
quorum

quorum palpebræ humoribus gummosis agglutinantur, quibus etiam vinum ex *Hippocratis aphorismo* 31. *Sect.* 6. prodest; cum ejusmodi enim sanguis tenuetur, necesse sit; remedium hoc his utile erit.

Asthmati humido millepedes auxilio sunt; quoniam bronchiis pituitâ lentâ oppletis, citra medicamentorum irritantium opem, eæ vix aut ne vix istâ expediuntur; hinc fiet, ut anhelî evadant laborantes, nisi si *Lac Ammoniâci*, succum mellepedum, aquam hyssopi, oxymel scilliticum, crocum, ac confimilia istis propinemus.

Millepedes, ex eo quod sale constant volatili, melancholiæ hypochondriacæ aliquoties opitulantur frigida; quoniam uti morbus hic ex authorum plerorumque sententiis ab acido austero initium facit, ita isto everso symptomata dira evanescent; non enim acidum immutat modò, sed, diuresin etiam promovendo, ab humorum cumulo subtrahit; ii autem, quorum morbus ab *atra bile* exordium sumit, à medicamentis volatilibus omnino abhorrent; verum enimvero ex *Theod. Craanen in medicamentorum examine*, hujusmodi venæ sectiones, victus refrigerans, plantæ filicæ, ceterach, &c. aquæ spadanae ac similia medicantur; ex eo quod ità *acidum corrosivum* immutando morbo finem dabimus; huic autem quàm optime edulcorantibus, ac diluentibus, occurritur; hisce enim salium corrosivorum aculei obvolvuntur, ea itidem per aquea ab invicem sejunguntur; chalybeata porro vitriolica ideo prosunt, quia obstructions referant; hisce addendum est, monemus nempe ut inter remediorum usum sedulo se exercent laborantes, utpote cùm exercitio, equitatione præcipuè, sanguinis motus æquabilis fiat; fluida hoc modo ultro citroque ex facili urgentur.

Julapium Thoracicum.

Rx Aq. Ceraf. n. Absinth. mag. comp. Tinct. Croc. Vino Canarino præparat. ana ℥iv. Rad. Gentian. nodulo inclus. 3℔. m. f. julapium, de quo capiat cochlearia tria mane, & ad libitum, urgente dyspnœâ.

OBSERVATIONES.

Asthmata sæpenumero à spirituum inopiâ pendent; nam si costæ in inspirando ad digitos usque tres in sublime tollerentur; spiritus autem adeò muneri huic defunt, ut ultra unum elevari nequeant, respiratio parva ac frequens sit, necesse est, ac proinde *Tachypnœa* laborant decumbentes: Hoc in casu, remedia cardiaca, pro eo ac usurpantur, spiritus erigendo, ac vires adjiciendo, asthmati huic auxilio sunt, cum hujusmodi paulò post, aërem multò liberius inspient.

Ubi combibones ita liquoribus omnigenis sanguinem suum inquinaverunt, ut spiritus eorum fere obruantur exinde; julapium hoc, suppetias spirituum novas superinjiciendo, symptomata dira, mutuo se inferentia, efficacitèr depellit.

Asthmata ista vitæ coronidi supervenientia evacuantibus haud ideo cedunt, quia spiritus jam exhalatos ulterius exhaurire insanire esset; neque alterantibus locum dant, quoniam alterantium operatio segnitèr perficitur; cæterum cardiacorum energiæ sat cito cedere comperiuntur, quippe quæ statim, ac sumuntur, spirituum cumulo adjiciunt.

In variolarum malignarum declinatione laborantes sæpe fiunt anhelii, non ex eo quod pituita lenta bronchiis adhærescat, sed quod hystericarum more suffocari videantur; cum autem suffocatio hujusmodi à spirituum *arægia* plerunque pendeat; prius suppeditentur ii, necesse est, quam anhela talis respiratio releveatur; quocirca julapium hoc symptomati huic subsidio veniet.

Crocus ab authoribus *anima pulmonum*, nec injuriâ, nuncupatur; his, nimirum, de causis, quippe cum particulis constet mucosis, pituitam glutinosam bronchiarum parietibus affixam extricet, par erit: quippe particulis oleoso-volatilibus aliquammultis gaudeat; hinc fiet, ut respirationi difficili, quæ à spirituum penuriâ pendet, ex facili occurrat; ideo sensionem molestam alleviat, quia particulæ ejus mucosæ acrimoniam obvolvunt, ac opiatorum more quanquam non perinde, titillationibus ac irritationibus, tussi oriundis præsto

sto est. Hyſtericis, ac proinde convulſivis quibuſcun- que dyſpnœis opem feret julapium hocce; quippe cum particulis conſtet volatilibus oleoſis, ſuccos ſanguinis ſpirituumve congelatos ruruſum fundendo, eos in orbem denuo pro more ſolito flectet: Tabidis auxilio eſſe fertur *crocus*, quo ſenſu autem hoc capi debet, alibi demonſtrandum ſupereſt.

Quandoquidem vero à croci uſu appetitum proſterni comperimus; gentianæ pulvis huic incommodo faciet ſatis: Hinc forſan eſt, quòd egregius vir gentianam nodulo incluſerit. Ut dicendi finem faciamus, notandum eſt, quòd *crocus* deliquiis, melancholiis, morbis ſoporofiſ, ſpirituum inopiæ, ſanguinis motui circulari deficienti ideo proderit, quod cardiacus ſit; *crocus* equidem ſpiritus erigit, ſi tamen modicè exhibeatur; quòd ſi nimia in doſi propinetur, ægrotantes deli- roſ efficit: Quemadmodum vinum modicè epotum bibentes exhilarat, ita homines cum eo inebriatos, proter- vos facit.

Haufus Amarus.

℞ Elix. Proprietat. tartariſat. gr. xx. Aq. Lact. Alexi- ter. ℥ij. Aq. Epidem. Abſinth. mag. comp. ana ℥j. m. f. Hauſtus mane ſumendus.

OBSERVATIONES.

Hauſtus hicce quàm optimè vermes adverſatur, ac proinde ſymptomatiſ, inde oriundiſ, ſubſidio venit.

Quoniam hauſtus hic concretiones ſolvit, idcirco fluidiſ, in vaſiſ evaneſcentibuſ ſubſiſtentibuſ, paſſim motum impertit; hinc eſt, quòd utiliſ erit in rachitide, in quâ ſpiritus, ex *Mayow & Gliffonio*, viſcoſiſ im- plicantur particulis, unde ſit, ut in nervorum ramuliſ ſubſiſtant; atque parteſ, ſucco hoc nervoſo caſſæ, ex- inde non irradiantur; hinc, ex *Waldſchmidio*, ſit ut parteſ nonnullæ nutritione priventur, dum aliæ ſuppetiaſ ſolito majoreſ recipiunt; atque hinc erit, quòd oſſibuſ nimium in rachitide nutritiſ, muſculiſ autem, præ nu- trimenti penuriâ, exuccis, oſſa incurventur; quemad- modum enim neceſſe eſt, ſarmentum iſtud curvum fi- at, cui funiſ ita affigitur, ut tamdiu illi alligetur, quam

crescit;

rescit; ita musculis ossibus affixis at parum nutritis, ossibus autem quotidie elongatis, necesse est, ossa curva sint: Hoc in casu, cum causa nutritionis inæqualis sit humorum lentor, eorundem copiâ primum depleta, per evacuantia nimirum, mistura hæc vel alia quævis sibi consimilis lentorem tenuando, motum progressivum æquabilem rursus sanguini conciliat; ex quo fit, ut obstructions, vel ipsis nervis insidentes, ex integro auferantur; infantulorum, rachitide multatorum, capita, propterea solito majora sunt, quod nutrimentum uberius huc affluat, dum reliquæ partes debita privantur copiâ.

Quoties infantum ventriculi saburrâ acidâ lentâque, quæ colicas, convulsiones, concretiones, vomitiones, diarrhœas, ac varia symptomata introducit, suffercitur; toties emetico miti, ex oleo amygdalarum dulci, oxymelite scillitico cæterisque, propinato, cathartico leni exhibito, horum symptomatum fomes primum subtrahatur; deinde hæc vel aliâ misturâ simili aciditas residua emendetur; ex quo fiet, ut symptomata conquiescant.

Anorexiæ plerunque à materiâ lentâ, glandularum orificia operiente, oriuntur; quod si qui spiritum vini vel frumenti ingurgitant, ideò morbo huic obnoxii sunt, quia ventriculi muco spiritus hujus ope in offam congelato, glandulis materia hæc ita insidet, ut fermenti esurini secretio prorsus impediatur; causa hujus appetitus prostrati procatactica externa in posterum evitanda est; causa ejus conjuncta emeticis ac catharticis exhaustiunda superest; demum amara mucum residuum tenuant, glandulas referant, acidum latens adjiciunt, ac famem revocant.

Anasarcis amara conducunt; quippe cum isti à vaporum lymphaticorum obstructionibus oriantur; istis per amara referatis, lymphæ in orbem rotatur; nec ultra in fibris extremis subsistere quit.

In malo hypochondriaco amara pro virili agunt; nam humores segnes tenuant, ductuum secretiorum obstructions referant, fibras passim firmant, motum oscillatorium redintegrant, acidum immutant, urinam proritant, motum progressivum, ac proinde subsidentias anteverunt,

antervertunt, adurgent : Quocirca sanguinis ac fibrarum vitiis emendatis, victu eupepto ac euchymo exhibito, hujusmodi in temperamentum justum redeunt; siquidem verò morbus hicce sit contumax ac chronicus, necesse est, istis longanimitatem laudibus efferamus. Nam *cunctando restitues rem*.

Ex Dris. *Fulleri* sententiâ, stomachica citra vehiculum exhibenda sunt; quomodo autem vehicula non sunt adhibenda, vix percipimus; esto, unamquamque ventriculi glandulam muco oblitam esse, medicamentum singulas glandulas tangat, necesse est; quemadmodum enim topica eo certius effectus suos, in tumoribus ac ulceribus sortiuntur, quo plures partes obstructas vel faucias co-operiunt; ita stomachica certiori erunt subsidio, si vehiculi ope ventriculo ingerantur: Hic tamen monemus, ut caveatis, ne vomituriens vel liquores, vel remediorum doses largiores exhibeatis unquam; cujus causam posthac subnectemus.

Ii, quorum ventriculi muci farcinâ onerantur, allevamentum perinde promptum non recipiunt, atque ii, qui saburrâ istâ vacant: Hinc est, quod combibones remediis cardiacis, parcâ in dosi exhibitis, vix reficiuntur; tum consuetudo hoc efficit, ut ea citra tumultus ullos ferre queant; muco autem in totum, per emeticum, amoto ventriculi hujusmodi fortiora usque ferre recusant, quoad mucus de novo in ventriculum expuitur.

Sydenhamius nostras in arthriticis, extra paroxysmum, amara magnoperè deprædicat; utpote cum arthritis à coctione depravatâ exordium sumat, amaris ista cedat, necesse est; cæterum hæsitamus, num à malâ qualitate solâ, an etiam à quantitate humorum initium faciat? Num' amara arthriticis biliosis congruat? Hoc autem pro comperto venditamus, quòd, *Bruelem* imitando, successu non sumus destituti; ipse enim catharticum lene tum exhibet, cum arthritici ventriculi tensionem seu inflationem, quam ineunte paroxysmo plerunque experiuntur, percipiant; hâc methodo arthriticis quamplurimis opem tulimus; declinante etiam paroxysmo, idem catharticum repetendo residuum totum abegimus. Quâ arthritidis autem paroxysmus ita ante-

verti

verti poterit, ut nunquam pedem reterat, arcanum hoc medicis etiamnum latet, quanquam empirici illud, in novellarum montis, vili certè vendant pretio! Homuncionum istorum nos mileret, tanta arcana in eorum scrinia unicè concludi! O foelices! qui citra laborem improbum victum quæritant ac vitam tolerant!

Ictericis amara subsidio sunt; ex eo, quòd cum ii à sanguine lento, segnitèrque circumpulso, necnon à vesicæ felleæ obstructione exordium sumant; emeticis ac catharticis primùm eò exhibitis, ut obstructio impetui ab his communicato aliquantulum cedat, dein amara partes tuentur suas; quippe, concretionibus solutis fluida rursum ex ordine circumaguntur.

Cum acida ventriculi doloribus sæpenumero ansam præbeant, ista amara quam optimè adversantur; nam, experientià necnon experimentis ducibus, amara acidis repugnare edocemur: Quà de causâ, Horstius elixir proprietatis hisce in doloribus exhiberi idcirco præcipit, quòd acido semel everso, cum sit doloris causa conjuncta, dolor conquiescat.

Elixir proprietatis coctioni læsæ isti auxilium fert, quæ à ciborum indigestâ mole, necnon à succorum ejus lentore pituitoso pendet; quippe cum ventriculi fibras laxas nimis ita cingit, ut cibum devoratum validè satis premat, ac succum ex eo alimentarium extrahat, bilis in morem, luctam cum chylo init, eumque in tincturam sat evectam exaltat; ex quo fiet, ut nec lentore, nec acore, nec alio vitio chylus peccet.

Febres à vermium putrilagine exordium sumentes, elixiri plerunque cedunt; quippe cum ii primùm enecti, deinde expulsi fuerint; symptomata, quibus ansam præbuerant, quamprimùm reseinduntur. Prætereà remedia drastica mortem, ex *Foresti* observatione, adurgere solent, utpote quæ convulsiones, syncopes, atque alia symptomata dira introducunt: Quocirca cum elixir hoc sit amarum, sitque catharticum lene; lumbricos enecat, expellitque, causâ igitur febris hujus sublatâ, effectus tollatur necesse est: Diæta etiam, ex quâ ova plerunque excluduntur, evitanda est.

Animalium virosorum morsus nocumenta dira læsis inferre solent; quippe morsis tremores, vomitiones,

dolores, gangrænæ, deliria & similia statim adfunt; cum amaris autem coagula solvendi potestas insit, huiusmodi opem ferant, necesse est: Mistura igitur hæc, quando sit tam amara quam cardiaca, morbis subsidio veniet, quippe quæ perindè spiritus *νεκρώσεως* quasi affectos instaurabit, atque concretiones fundet.

Medici antiqui de *intemperie sine materiâ* multa sanè effutierunt; sensum autem hac de re prolatorum ab hoc diversum non esse testatur experientia, quod fibræ ex antiquioribus *laxæ vel strictæ*, seu ex Baglivio, *laxæ vel tensæ* nimis sint; quæ fibræ tamen laxitate citra fluidorum internè vel externè admotorum opem laborare queant, haud capimus: Inde erit, quod, quoties viscera plus justò laxantur, sero viscido sufferciantur, necesse est; fibrarum laxitas autem id efficit, ut fibræ longiores ac largiores solitò evadant. Quando igitur fibræ ita laxæ sunt, ut œdemata, memoria deperdita, impotentia, habitûs *δύσχεστια*, ac alia plurima affligant; amara tam lentorem emendando, quam fibras firmando, morbis à *laxo* oriundis præstò erunt.

Febrium intermittentium paroxysmis amara jamdudum opitulari nôrunt medici; hinc est, quod flores chamæmeli, sal absinthii, centaurium minus, gentianam, olim exhibuerint; quinimò, febres intermittentes quæ cortici peruviano non cesserunt, decocto, ex floribus chamæmeli viij. salis absinthii ʒj. aquâ pœoniæ ʒj. Absinthii magis compositi ʒʒ. saccharo edulcorato, conflato, sæpenumerò depulimus; imò quandam, cui cortex magna in quantitate exhibebatur, quem tamen aversata fuit, uti postea subaudivimus, eodem decocto, cum per quinque menses febre laborâisset hæc, ad valetudinem revocavimus.

Hypochondriorum inflationi, quæ olim *inflatio lienis* audiebat, elixir proprietatis allevamento erit, uti *Harsenius* advertit; cum flatus hypochondriacus enim sit ætè in intestina conclusus, humore acido inter luctam ortus, bullas materiâ lentâ implicatas rarefacit mistura hæc, deinde sursum aut deorsum in crepitûs vel ructûs formâ flatus hic in auras avolat. Tensio autem ista hypochondriorum permanens ac fixa, morborum epilogi comes ferè assiduus; à remedio isto vel altero quippe

quippe cum huic humorum subsistentia immedicabilis ortum dederit, vix vel ne vix alleviari, nedum huic cedere potest.

Amara obstructionibus pancreatis Asellii finem statuunt; si tamen glandulæ non nimium obturentur: cum glandulæ verò adeò induruerint, ac materiâ caseosâ ita turferint, ut liquores ductum thoracicum attingere nequeant, macies necessariò ponè subeunt, nec passio ista cœliaca unquam auferri potest, uti in infantulo septenni jamdudum experti sumus, cujus mesenterium ita scirrhis occalluerit, ut vel ductûs fellei communis orificium ipsum præ istis ex toto obturaretur.

In mensium *emansione* elixir proprietatis alia medicamenta virtute longè præcellit, ex *Doleo* p. 625. quando enim fluxus hic paulò parcius à lentore sanguinis fermè oriatur; ubi primum lentor ab amaris tenuatur, & temperamentum, quò exciderant, justum pedem refert, menses, ad tempus à naturâ præstitutum, copiâ ac colore debitis, promanant; causâ emansionis enim evanidâ, periodus revertitur.

Chlorosi idcirco elixir hoc opem ferre comperimus, quòd cum morbus, pituitosi temperamenti proles sit; motu tam intestino quam progressivo restituto, necesse est, chloroseos symptomata, quæ stagnationes passim evincunt, penitus evanescant.

Asthmata humida extra paroxysmum à misturâ hâc sublevantur, ex eo quòd sanguinis massam lentam ac pituitosam in statum meliorem provehat; necnon extillationes futuras è bronchiarum glandulis ac proindè suppetias novas exinde præoccupat: Hincque est, quod *P. T. prax. chymiatric. rational.* Decoctum huic analogum hoc in casu deprædicet: Quoniam, uti massa sanguinis effœta segnitèr in vasis circumpellitur, particulas suas passim deponit; quâ particulis autem activis locupletatâ, ac motu ejus instaurato, parcius in glandulas sejunguntur; ita cum mistura ejusmodi particulis fixis ac volatilibus scaturiat, necesse erit, massa invigoretur, motus celerior vigorem excipiat, ac tandem morbus hic evanescat.

Ex *Jac. Waldschmidii* observatione, ii, qui se misturis, ex elixire proprietatis conflatis, nimis sæpè assue-

verunt, in hæmorrhagiæ discrimen conjiciuntur; ejus prognosticon ex copiâ metimur: Hinc est, quod *J. Dolens* illud in fluxu mensium suppresso vel pariori valdè deprædicet: Hoc autem notandum est, quòd myrrha vix aut ne vix solvetur, nisi priùs cum oleo tartari miscetur, ac aliquandiu in cellâ usque reponatur, donec mistura in mollaginem abeat, è quo pulmento, cum spiritu vini rectificato superaffuso, igni commisso, fit *tinctura myrrhæ* optima.

Elixir hocce non menses modo proritat, verum istud etiam lochia, secundinas, ac partum ipsum promovere experimur; *Elixir Proprietatis* autem *Paracelsi*, quippe quod cum acido paratur, non adedò confert, ac proinde hisce in casibus non est propinandum.

In vertigine spiritus in nervorum parietes vehementer arietant; neque ii in directum, verum in obliquum feruntur; hinc fit, ut, thalamis nervorum opticorum vibratis, objecta circumagi videantur; quid sit autem, cur spiritus ita ἀνομάλως moveantur; nisi quod ii sint flatulenti: nam ex *Hippocrate* ἀπαντα πνέουσι (Cύμπλεον ἐστίν· flatus enim sunt agiles, tripudiant, ac passim velivolant; atque quemadmodum spiritus flatulenti sanguinem vehementer circumagitant, sanguis tenuior multò sit exinde necesse est; hinc fit, ut, cum flatus particulis lentis minùs intersepianur, furiosè in vasorum latera variis directionibus calcitrent, *vertiginemque* introducant, quicquid igitur chylum priùs flatibus expediet, quam sanguinem appellit; motus hujusmodi irregulares feliciter antevertet, ac vertiginem in ipso germine præcidet. Nequis autem miretur, quòd spiritus flatulentos, qui sanguinem tenuant, remedio attenuante abigamus; quandoquidem, istis tandem evaporatis, sanguis deinceps ex ordine solito circumpelletur.

Tam ob myrrham quam ob aloën, elixir hoc ulceribus externis ideo proderit, quia fibras faucias pure turgidas ita proritant ea, ut eæ particulis suis noxiis prompte satis expediantur: Quantum ad ulcera interna autem, cum sanguinis crasin corroborent, necesse est, nonnihil istis etiam conferant.

Ex *Hunnio* Elixir Proprietatis colicis, flatibus malignis prognatis, subsidio veniet; propterea quòd *colica*, febribus malignis oriundæ, seu *flatus*, humorum malignorum comites, perinde leniter materiam flatuum nocuam deorsum pellendo atque bullas, ex *Albrechti* sententiâ, disrumpendo, feliciter exinde averruncarentur.

Anicula quædam iliacâ passione, vermium causâ, laborans, uti jampridem *Joannes de Muralto* etiam observavit, opiatís ac misturâ huic non absimili ita sublevabatur, ut æque deliquia, strangulatus hysterici ac dolor immanis simul conquieverint.

Infantum tormina elixiri proprietatis quàm citissimè cedunt, uti sæpius experti sumus.

Lumbrici dysenteriam, ex *Brandii* observatione, introducere queunt; nam jamdudum lumbricum ipsum umbilicum perforasse meminimus; quid mirum, cum proboscidi os trifidum insideat, quicum terebræ in modum fibras molles, cum lubeat, pertundunt: Dysenteria autem hujusmodi remediis usitatis cedere nequit, quin vermibus amara, ac profluvio specifica unâ exhibeantur, necesse erit.

Eximius vir *Lewenhoeck* p. 37. de *structurâ cerebri*, de quodam à convulsionibus confecto mentionem facit, cujus substantia cerebri cineritia materiâ gelatinæ instar sufferciebatur; *Anhornius Carolus Pisonem* æmulans, cerebrum in convulsionibus seri colluvie oppleri affirmat; nosmet etiam puerulum septennem probè meminimus, cujus nares ita muco oppleti fuerunt, ut eos continuò emungere coactus fuerit; cujus mater medicum ordinarium accersivit, ut infantem hoc expediret incommodo; mercurio dulci cessit *Coryza*; quid fit? non multò post, capitis dolor immanis hunc excepit *catarrhum*; quo remediis nequaquam devicto, convulsionibus tandem universales & vel ipse putapismus insecta sunt: Symptomatum atrocitate debilitatus, è medio sublatus est: Cranio avulso, meningibus apertis, seri copia profiliit. Convulsionibus evacuantibus, alterantibus, opiatís cedere comperiuntur; quando mistura hæc leniter alvum proritat, pituitam exhaurit, eamque immutat, evacuationis atque alterationis vicibus

fungitur; cui si cum *Metskero* spiritum anticonvulsivum, necnon cum *Hegnere* opiata adjiciatis, medelam absolvetis; breviter, cunctis infantum morbis, fere accommodatur mistura hæc: nam, ex *Sylvii*, *Etzmulleri*, *Dolai*, *Waldschmidii* ac *D^{ris} Harris*, sententiis, plerique infantum morbi à pituitæ acidæ saburrâ oriuntur; in *Pavore*, ubi ejulantes ac trepidantes infantes expergiscuntur, spiritus segniter circumacti, ac in cerebri anfractibus firmè subsistentes vel saltem tumultuariè moti, insomnia exuscitant; quibus symptomatis hæc vel simili misturâ probè occurritur; in *Hydrocephalo*, fibræ pituitâ nimîâ obruuntur; cùm lymphâ extremis quasi adhærescat, nec ritè in gyrum flectitur; cutis igitur intumescat, necesse est; atque uti à pituitâ tumor hic initium facit, ita mollis, ac cuti concolor est, ac pastæ instar digito pressus, foveam à se relinquit, cujus vestigium diutius restat. Causâ morbi per mercurialia exhaustâ, mistura hæc pituitam evehet, sanguinis motum rursus instaurabit, ac morbus hic conquiescet.

In *Catarrhis* tempestatum vicissitudo poros aliquo immutat modo; nam ex *Hippocratis aphorismo primo sectione tertiâ*, αἱ μεταβολαὶ τῶν ὁρίων μάλιστα τίησι νοσήματι; quocirca si obstructio, alicubi nata, novas seri effervescentis suppetias adjiciat, fieri vix potest, quin pulmones isto repleantur; seri redundantia primùm exhaustiatur, deinde mistura hæc vel similis eò exhibeatur, ut pori rursus perspirationem obeant; his peractis, hechicis specificis facilè cedit *tussis infantilis*.

Mistura demum hæc *maciei*, vermibus oriundæ, *lienteria*, *scabiæ humide* idcirco proderit; quòd vermes enecando, alimentum, non amplius ab ipsis devoratum, vel ipsorum causâ per anum detrusum, in nutrimentum abierit; quòd, cibo bene cocto, vasorumque lacteorum obstructionibus sublatis, desinat profluvium hoc; quòd salibus acidis semel everfis, à quibus eruptio hujusmodi pendere plerunque censetur, desinat morbus necesse erit.

Vinum Stomachicum.

℞ Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gentian. ʒj. Sem. Coriand. ʒiſs. Nucem molchatam unam. m. infund. simul in Vin.

Vin. Hoccomorenf. opt. ℥ij. coletur usûs tempore, capiat haustum ad libitum.

OBSERVATIONES.

Ubi quis perpotatione sanguinem effœtum ventriculūque laxum effecit; ibi, evacuatione præmissâ, vinum hocce rite usurpatur, quòd mucum passim incidat, fibrasque rigidiores efficiat; adhæc urinam proritando, motum progressivum instaurando, flatusque exhalando; humores lentos tenuat, educitque; hincque erit, quòd bibulorum valetudo pristina quamprimum pedem referat.

Sinapios semina, cum sint irritativa valde, perinde vasa atque os fodicabunt; inde fiet, ut serum copiosius multo ab eorum usu per renes & vesicam expellatur, hydropibusque manus porrigant auxiliares.

Quando paralyseos causa ex spiritibus lentis ac torpidè motis pendet; idcirco motus ac sensus aliquo offendent modo; si vino huic salia adjiciatis volatilia, epispastica adhibeatis, urticationem in usum vocetis, laborantes sensim motum ac sensum recolligent.

Hecticæ hydropibus oriundæ, propterea à medicis posthabentur; quòd hecticæ medela, ita hydropi repugnet, ut eâ eversâ laborantes de vitâ migrent; hydropem igitur unicè auferre studeamus, qui vino huic aliquantulum, si quando tamen, cedit.

Wedelius olim atténuantia viscerum tonum labefactare asseruit; quibus igitur astringentia jugiter adjici præcipit; quid sit autem, cur ista sola exhiberi nequeant? quandoquidem enim sanguis tenax ac glutinosus inde tenuatur, partes magis serosæ foris amandantur, fibras roborant ac invigorant, nec astringentia continuò cum atténuantibus admiscenda sunt.

Tempus alterantia exhibendi non adeò strictè observandum est, ut horis medicis semper propinentur; quippe cum victus contrarius sit morbo, necesse est; quid impedit, quo minus alterantia vel cum cibo ipso devorentur.

Julapium Aperiens.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥℥. Aq. Absinth. comp. ℥j. Rad. Gentian. ʒj. Tinct. Mart. Mynsicht. gr. xxiv. m. f.

Julap.

Julap. è quo cap^t. cochl. iij. vel iv. mane quotidie
& horâ ante prandium.

OBSERVATIONES.

Chalybeata fibras firmant; non autem meatus occludunt; nam eos quàm optimè referant; quanquam alia cum calore, alia citra eum effectus fortiantur suos; chalybeata vel vitriolica sanguinem ita parum coagulant, ut sanguinis motus progressivus æquabilis ipsorum impulsu fiat: Quando enim particulis sulphureis, ac stypticis constant, necnon præ pondere suo agunt; fore affirmamus, ut obstructions lienis, uteri, quinimo eas passim referent; hoc autem adverti volumus, quòd viscera alia longè facilius aliis indurari assoleant; cum uterus igitur, cerebrum, renes, lien, ac alia particulas lentas, ac aquosas. secernant, hepar autem bilem seponat; constat, cur hepar istis citius ac frequentius in scirrhum abeat; inde erit, quòd aliorum viscerum obstructionibus tutius quam istis hepatis adhiberi soleant chalybeata.

Cùm acido tantoperè repugnent; malorum myriades præcidunt; quot enim & quanta nos impetunt incommoda, acido solo orta? advertamus autem, acidum æque sanguinis temperamento *frigido*, ac *fervido* aliquoties præesse; huic tincturæ martis, sal seu vitriolum martis, necnon acidulæ opem ferunt; *illi* vero aquæ. martiales atramentosæ, chalybs cum sulphurè præparatus, ferri rubigo & similia conferre reperiuntur.

Hydropi anasarcæ chalybeata profunt; ex eo, quòd fibræ laxatæ, propter particulas chalybis astrictorias, rigidiores ac contractiores evadunt; necnon particulæ ejus sulphuræ simul cum ponderosis unitæ particulas sanguinis lentas tenuant; adhæc, si unâ cum his infusa amara necnon salia volatilia laborantibus propinemus, morbus his remediis quamprimum cedit.

Multoties passionem hystericam febre erraticâ, ac temperamento præfervido stipatam observavimus; cui chalybeata sulphurea, assa fœtida, galbanum, ammoniacum adeò non contulerunt, ut symptomata dira adurserint; quæ martialibus verò vitriolicis, testaceis, ac opiatis ita conquievit, ut sudores colliquativi, ptyalismus,

mus, urinæ pallidæ profluvium diabeticum, vigiliæ, deliria hysterica, despondentia, ac cætera cuncta mala haud multo post decesserint.

Liquorum hordeaceorum bibaces misturâ hâc vel aliâ sibi consimili sublevari queunt; quippe cum hordeum sit ex particulis ramosis conflatum; accadat, necesse erit, ut ventriculi fibræ tam circulares quam longitudinales elongentur ac laxentur; humoribus igitur viscosis per emetica ac cathartica elutriatis, necnon eorum residuo per amara immutato; mistura hæc fibras laxas nimis ita firmabit, ut ventriculi parietes sibi propius accedentes, necnon fibræ firmiores inde factæ, alimenta ingesta in posterum pressius amplexaturi sunt: ex quo fiet, ut tinctura alimentaria deinceps longe facilius ac certius extrahatur.

CAP. III.

Refrigerantia, Incrassantia.



Conf. Ros. r. Rad. Symphyt. Condit. a. ʒj. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit. a. ʒʒ. Tinct. Sulph. Vitriol. ʒʒ. Syr. Myrtin. q. s. m. *In mictu sanguineo.*

℞ Aq. Sperm. Ranar. ʒij. Sacc. Saturn. ʒʒ. m. *Pro Epiphorâ, Ambustis in primo gradu.*

℞ Ros. Sic. ʒij. Cort. Thur. ʒʒ. Pompholyg. Acaciæ a. ʒiʒ. cum Gum. Tragac. solut. q. s. f. Trochisci in Aq. Ros. solvend. *In Mydriasi.*

℞ Cerus. ʒʒ. Ol. Nuc. avellan. q. s. m. f. linimentum. *Pro Papillis fissis excoriatis.*

℞ Alum. q. v. alb. Ovor. q. s. m. simul agitentur. *In Erysipelate ulcerofo.*

℞ Conf. Ros. r. ʒiv. Corall. r. ʒij. Miv. Cydon. q. s. m. *In mictu sanguineo, Diabete.*

℞ Aq. Ferrat. lbij. Gum. Arab. ʒj. Syr. Myrtin ʒiʒ. m. *In Diabete.*

℞ Corall.

- ℞ Corall. r. Ebor. a. ʒj. Terr. Japon. ʒj. Sacch. Ros.
q. f. m. *In Diarrhœa, mictu sanguineo.*
- ℞ Aq. Lactuc. ʒiv. Sp. Sulph. q. f. ut acuatur. m. *In
Paroxysmo Asthmatis.*
- ℞ Karab. Mastich. a. ʒij. m. *In Abortu.*
- ℞ Decoct. Rad. Tormentill. ʒiv. Syr. Myrtin. ʒiij. m.
In Abortu.
- ℞ Mastich. Terr. figillat. Thur. alb. a. ʒj. Sang. Dra-
con. Bol. ver. a. ʒʒ. *In Abortu.*
- ℞ Bol. ver. Sang. Dracon. Thur. Farin. volat. cum A-
ceto & alb. Ovor. m. admoveatur. *Aneurismati.*
- ℞ Fol. Plantag. Bellid. maj. a. p. ij. Flor. Ros. r. p. j.
Balauft. Gallar. a. ʒʒ. Sem. Cydon. ʒj. coq. in Aq.
colatur. ʒj. add. Syr. Diamor. ʒj. f. Gargarisma. *In
Anginâ incipiente.*
- ℞ Conf. Ros. r. veter. ʒj. Sal. Prunell. ʒj. m. teneatur
in ore. *In Anginâ ruptâ.*
- ℞ Aq. Plantag. cum Sp. Vitriol. acuat. m. *In Aphthis
malignis, ne serpent.*
- ℞ Aq. Paralyf. ʒiv. Sal. Prunell. ʒj. Syr. Violar. ʒʒ.
m. *In Asthmatis Paroxysmo.*
- ℞ Aq. Hord. ʒvi. Sp. Nitri gr^{tt}. 10. m. *In Cruditate
Nidorosâ.*
- ℞ Conf. Ros. r. ʒiʒ. Troch. de Karabe ʒiij. Syr. Cy-
don. q. f. m. *In Bubonocèle.*
- ℞ Aq. Cichor. Endiv. Acetofell. a. ʒiij. Syr. è Rub.
Idæo, Berber. a. ʒj. Sp. Vitriol. q. f. ad gratum Aco-
rem. *In Cephalalgia calidâ.*
- ℞ Aq. Rosar. acet. Rosac. a. ʒj. Opii in aceto sol. ʒʒ.
Camph. gr. ij. m. Fronti admov. *In Cephalalgia
calidâ.*
- ℞ Mucilag. Rad. Alth. q. v. Sacch. q. f. m. *In Catar-
rho calido.*
- ℞ Extract. Glycyrrhiz. Mucilag. Sem. Cydon. a. ʒij.
Sacch. Rosar. ʒʒ. Aq. Rosar. q. f. f. Trochisci. *In
Catarrho calido.*
- ℞ G. Arabic. Tragac. a. q. f. indantur. *Denti sanguinem
effundenti.*
- ℞ Aq. Ros. Phlegmat. Alum. a. q. f. *In Dolore O-
culi.*

- ℞ Vin. rub. ferrat. ℥iv. G. Arabic. ℥j. m. *In Lochiis nimis, Fluore albo.*
- ℞ Bol. Armen. q. v. cum album. ovor. q. f. m. *In Fracturis, Luxationibus.*
- ℞ Sem. Agni Casti q. v. Aq. Nymphææ q. f. f. Emul-
sio, colatur. add. Sacch. Saturn. ℥j. opii gr. ij. Sacch.
q. f. *In Furore Uterino.*
- ℞ Pulv. Sacch. Saturn. ℥j. Extract. Tormentill. ℥ij. m.
f. Pil. *In Gonorrhœâ, Hemorrhoidibus.*
- ℞ Aq. Rosar. ℥ij. Sacch. Saturn. ℥j. m. *In Guttâ Ro-
sacâ, Labrisulcio.*
- ℞ Flor. Balauft. p. β. Alum. ℥β. Mell. Rosar. q. f. *In
Gingivis Sanguinolentis.*
- ℞ Conf. Ros. ℥ij. Bol. Armen. ℥j. Succ. Hypocyst. ℥j.
Syr. Myrtin. q. f. m. *In Hemoptoë.*
- ℞ Lohoch. de Papav. Errat. ℥ij. Mastich. ℥j. Corall. r.
Succin. a. ℥ij. m. *In Hemoptoë.*
- ℞ Sacch. Ros. ℥j. album. ov. agitat. ℥ij. Amyl. ℥ij. m.
In Hemoptoë.
- ℞ Vitriol. Calcin. q. v. cum album. ovor. q. f. m. pro
Turundâ. *In Hæmorrhagiâ.*
- ℞ Vitriol. ust. Alum. Calc. a. ℥β. Test. ovor. ust. Gal-
lar. a. ℥β. m. *In Hemorrhagiâ.*
- ℞ Vin. rub. ℥iv. Sp. Sal. q. f. ad gratum acorem. *In
Herniâ.*
- ℞ Pulv. rad. Bistort. q. v. cum album. ov. q. f. m. *In
Herniâ.*
- ℞ Aq. Ros. album. ov. agitat. a. q. f. m. *In Hydatide
oculi, postquam secatur; Ophthalmiâ.*
- ℞ Vin. rub. ℥ij. Alum. ℥j. m. *Pro auribus Humidis.*
- ℞ Aq. ferrat. lbj. vin. rub. ℥iv. m. pro potû. *In incon-
tinentiâ Urinæ, Lochiis nimis.*
- ℞ Succ. Plantag. q. f. cum Bol. arm. Gall. a. ℥j. Cort.
Granat. Thur. a. ℥β. m. f. Pessus. *In mensibus im-
modicis.*
- ℞ Conserv. Rosar. ℥ij. Spir. Vitriol. q. f. ut acuatur. m.
In Nauseâ.
- ℞ Sacch. Saturn. Sacch. Jovial. a. ℥j. Aq. Rosar. ℥ij.
m. *In Ophthalmiâ.*
- ℞ Aq. Rosar. ℥j. Calc. ℥β. Aluminos. ℥ij. m. *In Exco-
riatione Papillarum.*

- ℞ Fol. Querc. Mespilor. Plantag. a. m. β. Rad. Bistorti
 ℥ij. Alum. ℥β. vin. rub. q. f. Coq. *In Procidentii.*
Uteri, Ani, Gurguleonis.
- ℞ Mastich. G. Tragac. Arabic. a. 3β. Pulp. Pass. ℥j. Syr.
 Dialth. q. f. m. *In Raucedine.*
- ℞ Bol. Armen. Mastich. Sang. Dracon. Sarcocoll. farin.
 volat. Pomphol. a. ℥j. Resin. Pini & album. ovor. a.
 q. f. m. f. Gluten *Ruptura vulvæ admovendum.*
- ℞ Tinctur. Antiphthific. gr. xv. Aq. Lactuc. ℥ij. Syr.
 Myrtin. ℥ij. m. *In Sudore nocturno.*
- ℞ Lacc. r. usneæ Cranii Human. a. ℥j. m. *In Synoviâ.*
- ℞ Aq. Plantag. ℥vj. Cinn. h. ℥j. Acet. stillat. ℥ij. Co-
 rall. r. 3β. Sang. Dracon. gr. x. Laud. Lond. gr. ij.
 Syr. Myrtin. ℥j. *In vomitu sanguinis.*

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Acida, Acerba, Aca-
cia Germanica, gr. x. xv. Acetum distillatum, Ace-
tum Radicatum, Æs ustum, Alumen ustum, Aq. Alu-
minosa magistralis, Aqua fortis, Condita Fructuum ac
Conservæ eorundem (Berberum z. Cydoniorum, Cy-
nosbati, Prunorum Sylvestrium, &c.) Corallium pp.
Cremor Tartari, Diacydonium simplex & magistrale
comp. Diamoron, Emplastrum album coctum, Gelatina
Cydoniorum, Lapis Prunellæ. Oleum Salis, Oleum
Sulphuris, Oleum Vitrioli, Rob. de Berberis, Rob. de Ce-
rafis, Rob. de Cornis, Rob. Cydoniorum, Rob. Pruno-
rum acidorum, Rob. de Ribes, Sal Vitrioli, Syrupus
Acetosæ simp. Syr. Aurant. Syr. de Berber. Syr. Ce-
raf. à Syr. è Succ. Citri, Syr. è Corall. f. & comp.
Syr. Cydon. Syr. Fragor. Syr. Granator. Syr. Li-
mon. Syr. Lujul. Syr. Oxalid. Syr. è Pom. alteran.
Syr. de Ribes, Syr. è Rub. Idæo, Tartarus vitriolatus,
Trochisci de Berberis, Vitriolum album, Unguentum
Nutritum. Austera, Astringentia, Bolus Armena pp.
Crocus Martis astringens. Emp. Cæsaris, Emp. Ca-
tagmaticum, Emp. Diacalciteos, Emp. Diaphœnicon
frigid. Emp. ad Herniam, Emp. de Mastiche, Emp.
Μηλεγγρεγγρωλιδόν, Emp. de minio simp. & comp. Lac
Virginale, Lohoch de Portulacâ, Sacch. Saturni, Syr.
de

de Agrestâ. Syr. Myrtin. Syr. Plantag. Syr. è Ros.
Sicc. Troch. Ramich. Troch. de Spodio, Troch. de
Terra Lemniâ, Vitriolum Martis, Ung. Astring. Ung.
Comitiss. Ung. de Minio, Ung. desiccativ. rub. Ung.
de Sumach. Ung. de Oxylapatho. *Viscosa, Glutinosa.*
Emp. de Mucilaginibus, Lohoch de Farfarâ, Lohoch,
è Pulmone Vulpis, Lohoch Sanans, Sacch. Penidi-
um, Sacch. perlatum, Saccharum Tabulatum simp.
Diatragacanth. frig. Succ. Glycyrrhiz. simp. & comp.
Syr. è Mucilagin. Troch. alb. Rhafis, Troch. Bechic.
albi & nigri, Ung. de Mucilaginibus. *Aquea, Aq. A-*
cetosæ, Cydonior. Endiv. Equiset. Gramin. Plantag.
Pomor. Germin. Querc. Rub. Idæi, Tormentill. vitis.
â Zij. iv.

Ex Pharmacopœia Bateanâ. Acida, Acerba, Acetum
Lithargyrites (externe) *In faciei Rubore, Pustulis; Ace-*
tum Mellis. Lapidés solvere fertur; at qui hoc fiat, hæ-
sitamus; nobilis verò Boyle tale quid de spiritu panis se-
calini asserit; subinde revera medicamenta menstrui in
modum operantur, uti in PHARMACOMATHIA nostrâ pa-
lam vobis faciemus; hæc autem experienciâ solâ detegun-
tur. Aluminatum. In Rubore faciei, Pustulis. Aq. A-
luminosa. Ad Ulcera, Vulnera, Fistulas, cicatrifanda.
Aq. fortis duplex. Aq. fort. aluminata. Aq. Herpe-
tica, externè ad Herpetem. Aq. Mercurialis. Ad Ru-
borem faciei, Pustulas certissima. Aq. Regia. Solvit Au-
rum. Aq. Salivalis. Aq. Sulphurata Stimmios (ad A-
corem) Diuretica. Aq. Venusæ. Externè ad Pruritus,
furfures. Aq. Vermifuga, cochl. iij. Aq. Vulneraria
℥ss. j. Ulcera, Vulnera sanat. Bez. Mercurial. gr. iij.
vj. In Lue. Bezoart. Saturn. In Hystericis, Lienis Af-
fectibus. Bezoart. Solar. gr. iij. viij. In Lue, Peste, Po-
dagrâ, Hydrope, Febribus, &c. Bezoart. Vener. gr. vj.
Interne in Leprâ, morbis capitis, cerebri, externè in fistu-
lis, impetigine, ulceribus antiquis. Cauterium Lunare.
Causiticum, verrucas tollit. Calcanthum Rubefactum.
Interne in Dysenteriâ, Hemorrhagiis, &c. Externè ubi
sanguis à dente evulso emanat. Clyffus Vitrioli, gr. ij.
iv. roborat, motusque inordinatos sistit; ast qui perspi-
rationem augere poterit, nisi stimulando? Colcothar.
Vitrioli. Vid. Calcanthum rubefactum. Croc. Vene-

ris. $\mathfrak{D}\beta$. Febrifug. uterin. Diuretic. Crystal. Mineral.
 $\mathfrak{D}j$. $\mathfrak{Z}j$. In siti, æstu febrili, urina ardore. Decoct. ad si-
tim q. v. Emp. Tibial. Ad nodos, cutim ulcerat. Flor.
Vitriol. Externe ad ulcera cicatrifanda. Julap. Purpur.
q. v. In Siti. Lac alum. coch. ij . In fluore albo, Go-
norrhœâ, mensibus nimiiis, tertianâ. Lapis medicamen-
tosus. Externe ad ulcera, vulnera cicatrifanda, scabie,
tineâ. Lap. Salut. v. Lap. medicamentos. Marcasit.
Bismuthi. Externe ad cutis vitia (Lichenes, Impetiginem)
Magister. Saturn. gr. iv . vj . In Hæticâ, Phthisi, Febre
ardente, inflammationibus, quartanâ, Lue; externe in
ulceribus malignis, Pustulis, Ambustis. Merc. præc.
alb. correct. & cætera mercurialia. Nitrum Cachectic.
gr. vj . xx . In Anorexiâ, Cachexiâ, Febribus, Scorbuto
calido, Catarrho. Nitr. Corollat. $\mathfrak{D}j$. In febribus. Nitr.
fixat. v. Crystal. Miner. Nitr. nitrat. $\mathfrak{Z}\beta$. Nitr. Satur-
nif. gr. v. vij . In Asthmate; quaritur autem cui ast-
matico istud proderit? quia, cum sit acerbum, asthmati-
cos anhelos reddet. Nitr. Sulphurat. v. Lap. Prunell.
Ol. Mart. gr. iv . v. Astringit valide in Gonorrhœâ, &c.
Ol. Vitriol. dulc. $\mathfrak{D}j$. In Calculo, Catarrho tenxi. Pulv.
Sympathetic. Externe, ulcera sanat ungendo Telum; cre-
dat Judæus Apella, non ego. Ros. Vitriol. $\mathfrak{Z}j$. In san-
guine bilioso, Cephalalgia calidâ. Sal. Aceti essential.
gr. v. x. In calore & sanguine fervido. Sal. Alum. gr.
 iv . x. Febrifugum. Sal. Lithargyrit. $\mathfrak{Z}\beta$. In Diarrhœis,
Dysenteriiis. Sal. Sulphur. gr. v. x. In Verminatione.
Ser. Alumin. gr. In febrili æstu. Sp. Alum. d. gr. iv .
v. &c. Diureticus, calculum pellit. Sp. Nitri $\mathfrak{D}j$. ij .
Diureticus in æstu febrili usurpatur. Sp. Nitri d. $\mathfrak{z}j$. Diu-
reticus, mitè irritat. Sp. Sal. Martiat. gr. v. xv. Diu-
reticus. Sp. Vener. gr. v. x. Ventriculū roborat, Diu-
reticus, Antepilepticus. Sp. Vitriol. Sp. Vitriol. coa-
gulat. q. s. ad acorem. In siti, febre ardente. Sp. Vi-
triol. Philosophic. gr. v. xv. Febrifugus. Styptic. Re-
gis gr. x. xx. Interne & externe sanguinem sistit. Sup-
positoria Aluminos. Ad anum irritandam. Tabul.
Prunell. q. v. In Siti. Terr. Vitriol. d. $\mathfrak{D}\beta$. $\mathfrak{Z}\beta$. In
omni Hemorrhagiâ. Tinctur. Saturn. gr. j. xv. In
Phthisi, Maniâ, Quartanâ. Austera, Astringentia. Alum.
dulc. $\mathfrak{D}\beta$. In Pectoris morbis ex minerarum halitu con-
tractis;

tractis; quæritur autem, quænam mineræ odorem sulphureum noxium aëri impertiunt? Carbonum fossiles certe mephitide suffocatoriâ infestantur; quinimo flammulis è sulphure exhalantibus sæpius quam miserrimè vel fiderantur vel dilaniantur; hujusmodi igitur pulmonibus læsis hoc proderit. Alum. Febrifug. ʒj. *Ante Febris intermittentis paroxysmum.* Aq. Styptic. *Externè.* Arcan. Aluminat. v. Alum. dulc. Arcan. Scriptor. *Ad Scribendum*; *externè in Hemorrhagiis.* Cashew q. v. *In Catarrhis (in ore.)* Emp. Hæmorrhoidale. Pil. restringent. ʒʒ. ʒij. *In Gonorrhœâ.* Pulv. Antipyretic. ʒj. *In Tertianâ ante paroxysmum.* Pulv. Hæmoptoic. ʒiʒ. *In Hemoptœ.* Sacch. Tormentill. ʒj. *In abortu præcavendo.* Viscosa, Glutinosa. Butyr. Cer. ʒj. *In Dysenteria.* Emp. adhæsiv. *Pro Fontanellis.* Extract. Maltæ ʒij. *In Phthisi.* Gargar. alb. q. v. *In Aphthis.* Gelatin. C. C. q. v. *In Tabæ.* Gelatin. Icthyocoll. lbʒ. j. *In fluore albo, Gonorrhœa.* Juscul. Galli q. v. *In Tabæ.* Linctus Hæmoptoicus cochl. ʒ. *In Hemoptysi.* Liquor Limacum gtt. xx. xl. *In Tussi infantum convulsiva*; *externè ad Podagram, Ariduram.* Miv. Consolid. q. v. *In Hemoptysi, Rupturis.* Miv. Dialth. q. v. *In ardore Urinæ.* Mucilag. Nephritic. ʒiv. Nodul. faccial. *Ad faciem conspergendam in variolis, ut defendatur à foveis.* Syr. Lymac. cochl. j. *In Phthisi.* Tabul. Dialth. q. v. *In Tussi acri.* Tabul. Diatragacanth. q. v. *In Tussi acri.*

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Acida, Acerba, Acet. Chalyb. *Pro Oxymelite Chalybeato conficiendo.* Decoct. Coccin. ʒiv. *Fervores compefcit, sitim fallit, Diureticum est, inflammationibus internis convenit; Diarrhœis obest.* Decoct. Lusitanic. q. v. *Pro siti, fervore, Diuresi.* Decoct. Tamarind. q. v. *In siti, fervore; Laxat.* Elect. Acid. v. Julap. refriger. Epithem. Aluminos. *Externè in Odontalgia ab humoribus, repellit.* Epith. de Sacch. Saturni. Cordi, *in Hemorrhagiâ.* Garg. Prunellor. *Astringit, fœtorem tollit, erosionem emendat; hemorrhagias sistit, firmat dentes, ulcera cicatrifcat, glandulas constringit & effluxum salivæ cohibet.* Garg. de vite. *Astringit, emungit sordes ex ore; quæ verò aluminata, glandulas constringendo, salivæ fluxum uberiores pro-*

licerent, nos nescire fatemur: Quòd aliquantisper salivæ effluxum invitent, non negamus, ex hoc, quòd acerbitas medicamentorum hujusmodi usque irritet, quoad eluatur; glandulis tamen validè constrictis, saliva haud multo post valdopere cohibebitur. Julap. acido dulc. ℥iv. Biliosis convenit; non inflammationibus autem internis, aut ulceribus; Hemorrhagiis profunt. Julap. refocillat. q. v. In siti, fervore. Julap. refrigeran. ℥iij. iv. In fervore febris, siti; at excoriant acida, sibi nimium usurpantur. Julap. de Sed. ℥iij. iv. Sitim, fervorem, alleviat. Litus Aluminos. Ad Gingivas putridas, cruentas in Scorbuto. Lotio ad Eruptiones. Lotio facialis. Ad maculas, & cutis vitia. Lotio Mercurialis. Ad omnia cutis vitia, Pustulas, Ruborem; at cavendum est, ne nervis obsit. Mistura ad oris ulcera. Pulv. acidus. In Biliosis morbis. Serum Diætic. ℔j. In sero mariatico, atrabilario, calido juvat. Serum Tamarindinat q. v. Sitim tollit, sanguinem refrigerat, laxat. Troch. è Tamarind. q. v. In Siti. Astringentia, Austerà; Cataplasma vomitum sedans. Cerevis. astring. ℔j. Sanguinis compagem laxam obfirmat, vasa ferumminat; ulceribus prodest Ichorosis, uteri Rheumatismo (Fluore) Hemorrhagiisque, Decoct. Catech. simp. ℥ij. iv. In Laxitate, Catarrho. Decoct. Equiset. q. v. In vesicæ ulceribus. Decoct. Mastichin. ℥iv. In nausea, vomitione, Diarrhœâ. Decoct. Millefol. ℥iij. Ad fluxorem album. Decoct. Quercin. (Haustul.) Ad ventris profluvia. Decoct. Rosar. q. v. In sero salso, acri, & Tussi exinde tenui. Decoct. Styptic. ℥iv. In sanguine acri, tenui, fervido; vasa consolidat, sanguinem firmat, Hemorrhagias sistit. Elect. contra abortum, ℥ss. Ventericulum, uterumque laxum firmat. Elect. Astring. ℥ss. Viscera laxa firmat, Diarrhœam comprimit; quî tormina sopiat, aut acorem concentret, sub judice lis est. Elect. ad Hern. ℥iij. Elect. Styptic. ℥ij. Fluxus sanguinis sistit. Emplast. Gravidar. In abortu precavendo. Emp. ad Lumbaginem. Humores influos intercipit. Enem. de malicorio. In Diarrhœa ab intestinorum laxitate orta. Express. Styptic. ℥ij. In Hemoptysi, Hemorrhagia, astringit. Fetus astring. In inflammatione incipiente, œdemate; vomitu, Diarrhœa, Mensibus, Hernia

à Repositione. Garg. Mastichin. *Ad excoriationem, inflammationes oris.* Gargar. Rosat. *Ad Laxitatem Glandularum oris.* Garg. de Sedo. *Refrigerat, repellit.* Haustus Japonicus. *In sanguinis vomitu, sputo, fluxu omni.* Haustus Stypticus. *In vomitu, & fluxu sanguinis omni.* Infusum rosatum. ℥iv. *In aestu febrili, siti, fluxu omni sanguinis.* Infus. rosat. comp. ℥iij. iv. *In Diarrhœa, Hemoptysi.* Julap. astring. ℥iij. *In Diarrhœa, Symptomatica.* Pilul. astringent. n°. iv. *In Diarrhœa, Dysenteria, vomitu sanguinis & omni sanguinis fluxu.* Pil. Diacalcit. n°. ij. *In mensibus immodicis.* Pilul. Japonic. ℥j. *In vomitione, Diarrhœa, fluxibus sanguinis.* Pilul. è sang. Dracon. n°. iv. *Sanguinem, fluxus sistunt.* Pilul. Styptic. n°. iij. *In fluxu mensium, Lochiorum.* Pulv. contra Abort. ℥ß. Pulv. Gravidar. ℥j. *In abortu futuro.* Pulv. contra hæmorrhag. ℥j. Rob. Acaciæ ℥ß. *Potenter astringit.* Succ. Hæmorrhoidal. ℥iij. *In fluxu Hæmorrhoidum immodico.* Tinctura Antiphthifica gr. xx. xxx. *Seri extillationem præpedit, Rupturas vasorum resarcit, putredinem arcet.* Trochisc. Hæmoptoic. pp. *In Hemoptoe.* Ung. refrigerans. *In dolore, aestu, pruritu.* Viscosa, Glutinosa. Decoct. Incrassans ℥iv. *In acri humore, ardore urina, tussi acri, Diabete.* Emuls. Arabic. ℥iv. vj. *In urina ardore, vel ab humoribus vel epispasticis, vel arenulis orto.* Gargarisma refrigerans. *In lingue fervore, ariditate, in febribus ardentibus, in oris erosionem.* Haustus contra fluorem *In fluore albo, ubi dolor lumborum comitatur.* Lohoch Incrassans. *In Catarrho tenui, acri, calido, continuo irritante.* Lohoch mucilaginos. *In Tussi, acri, tenui.* Pulv. Arabic. vid. Emuls. Arabic. Pulv. ad Herniam ℥ß. *Partes consolidat, in fluxu Hæmorrhoidali usurpatur.* Pulv. Incrassans, ℥j. vid. Decoct. Incrassans. Syrupus Incrassans. vid. Decoct. Incrassans.

SCHOLIA.

Experimenta quamplurima nos erudiunt, *Acida* bilem, lac, serum, chylum atque lympham continuo congelare; ac proinde istiusmodi succos nostros refrigerare planè constat; quocirca cum acidorum indoles hæc sit, ut motum sanguinis intestinum, sibi à naturâ

assignatum, reprimant; inde eveniet, ut bilem ac humores acres alcalinos refrænent ac obvolvant, ut sitim fallant, ut ardores ac æstus febriles tollant, ut fluxus hinc oriundos (sive sint sanguinei, sive humorosi) comprimant; hinc etiam erit, quòd obstructions generent; quippe, cùm nimium usurpentur, fluida coagulant, adeo ut circulando inepta sint.

Siquidem verò sale gaudent punctorio, idcirco adeo irritant, ut Diuresin promoveant; ut pituitam incidunt eamque è pulmonibus elutrient: Dentibus autem incommoda multa inferunt, quippe qui sunt ex particulis alcalinis fere conflati, quibuscum acida exhibita quam maximè colluctantur: Ita sunt acres etiam, ut pulmonum bronchias aliquoties excorient.

Acerba, non alio modo quam acida ac astringentia agunt; quod si medicamenta sint insignitèr acerba, tam evacuant quam cauteria evadunt; hoc autem liquidò constat in *Vitriolo*, *Sale Vitrioli*, *Turpeto Minerali*, *Mercurio sublimato*, *Caustico Lunari*, *Crystallis Lunæ*, *Butyro Antimonii*, ac aliis quamplurimis; cujus phænomeni causa in *Pharmacomathia* nostrâ patebit.

Austera, componuntur ex salibus acidis fixisque simul unitis; humores autem congelant, ac densant, hincque refrigerant; tumores etiam intercipiunt, seu humorum influxum liberiores præcidunt, ex eo quod fibras crispent; obstructions generant; inflammationes, si intus sumantur, anticipant, ex eo quod tam humores coagulent, quam fibras constringant; hæc autem propter salium acidorum virtutes eveniunt; siquidem vero sale etiam gaudent fixo; hinc fit, ut ulcera detergeant, ex quo fit, ut ea saniem libenter ac expeditè deponant: *Bezoardica* ideo appellantur, quia cum putrefactio in salium volatilium ac sulphurum evectione nimia consistat, austera verò sanguinem putrefactum densent, ac compagem ejus laxam nimis adunent; alexipharmaca, bezoardica vel alia salutifera meritò audiunt.

Astringentia, ex multâ terrâ damnatâ, atque acidis pauxillo constant; quamobrem humorum seu sanguinis fluxus reprimunt; ex eo quòd tam densent humores, quam fibras contractiores efficiant: Inde est, quòd dentes

dentes laxos firment, vulnera cicatrissent, fibras corroborent, humores incrassent. Febribus idcirco profunt, quod particulas putridas, cum sanguine non miscibiles, deorsum pellant ac præcipites dent; repellunt, quia fibras ita comprimunt, ut humores parcius exinde influant, quocirca *intercipientia* audiunt.

Glutinosa, constant particulis ita lentis, ut vasorum parietibus adhærescere soleant; hinc fit, ut sanguinis effusiones auferant; ut fluxus reprimant; ut saniei effluxum minuant, ex eo quod aliquid ab humorum influorum copiâ subtrahant, saltem eam præoccupant; vasa etiam erosa feruminant: Hinc cum gluten sanguini suppeditent, fluxilitatem ejus minuunt, lentorem introducunt, ac motum idcirco segniorem multo efficiunt: Cum idem fibris gluten ista præbeant, istarum orificia erosa claudunt.

Aquea, humectant, diluuntque; quocirca sanguinem ac fluida reliqua refrigerant: Hinc est, quod talia digregent, variosque morbos inde oriundos averruncent.

In *mixtu sanguineo*, vasa sanguifera vel sanguinis momento, maximè aucto, cedunt; vel, erosis ab humorum acrimoniâ, sanguis profilire cernitur, vel ab ictu rumpuntur; quantum ad causas internas, ex evacuationibus cedunt; quod autem ad vasorum rupturam, ea vel stypticis vel glutinosis seorsim vel conjunctim exhibitis aufertur.

In *Aneurismate*, Arteriæ tunica interior vel laxatur vel dilaceratur; hinc fit, ut sanguis ibidem subsistat; cum primum tunica, stypticis ac glutinosis adhibitis satis firmatur ac constringitur, sanguis imperturbatò denuò circumagitur: Nisi si nimium laxetur vel dilaceretur vas; quia tum arteria incidi debet, uti chirurgi probè norunt.

Aphthæ in febre malignâ serpunt vel repullulant; his acida quam maximè adversantur.

Brevi, medicamenta acida, acerba, austera, ac astringentia luctas anticipant, fibras corroborant, disruptiones sanant, laxitatemque tollunt.

Corollarium.

Emplastrum Corroborans.

℞ Emp. ad Herniam. Emp. de minio ana p. æ. m. f.
Emplastrum Lumbis applicandum.

OBSERVATIONES.

Emplastrum hocce lumborum regioni, ubi abortum imminetem metuimus, admovendum est; quam multum autem emplastra vel unguenta adnota fini huic conferre queunt, ratiocinando liquidò constabit: Topica hoc in casu usurpata ex particulis viscosis ac terrestribus potissimum consistere reperiuntur; quæ, cum admoventur, partes quibus adhærescunt, adeo constringunt ac coarctant, ut fluida parcius ibidem circumagantur; hinc eveniet, ut ista, cum isthinc avertantur, alibi circumumeant, ac aliorsum se conferant; ex quo fiet, ut eâ ratione vasa sanguinea repleantur, quâ illinc arcentur: Si igitur vasa uterina copiâ superfluâ, topicorum vi retroactâ, sufferciantur; vix ullo pacto fieri potest, quin hæmorrhagia ac tandem abortus huic distensionis supervenire valuerint: Quamobrem emplastra hæc ita parum aliquoties voto respondent nostro, ut infortunium ipsum, quod avertendum erat, eorum adsit: In his igitur unis fiduciam reponere, esset reverâ nihil sapere; venæ sectione autem, vel aliâ evacuatione ostensâ, prius adhibitâ, necnon remediis stypticis intus exhibitis, abortus, vel mox futurus, certius longè præcavebitur; topicis autem fidere, est sane ineptire.

Electuarium corroborans.

℞ Corall. r. pp. 3℥. Ter. Japon. gr. iij. cum q. s. Syr. de Mecon. m. f. Bolus horâ somni sumendus quotidie, superbibendo cochl. iij. vel iv. Julap. (quod vocatur *Julapium Hysterico-Stypticum*, quod vide.)

OBSERVATIONES.

Electuarium hocce lenitè astringit, sanguinem ac fluida reliqua incrassat, fibras corroborat, ora vasorum aperta ferruminat; hinc est, quòd sanguis, vel etiam partes

partes ejus magis tenues, non exudare poterint; hincque erit, quod abortus mox eventuri præcaveantur; nunc in modum porro in eundem finem præscribere solebat.

Conf. Rosar. rub. ʒj. Corall. r. pp. ʒß. cum q. f. Syr. Caryoph. m. f. Bolus hac nocte, horâ somni, fumendus, superbibendo, &c.

Apozema Rubrum.

Decoct. alb. ℥ij. Aq. Cinnam. h. ʒj. Sacch. Rosar. q. f. m. f. Apozema, de quo bibat haustum mane & vespere & ad libitum.

OBSERVATIONES.

Potus hic erit, Diarrhœis, Dysenteriis, sanguinis fluxibus omnigenis laborantibus, gratissimus; quoniam vasorum aperturæ faciet satis; prius autem evacuationes requisitæ adhibeantur, nisi periculum sit in morâ, quàm apozema hujusmodi præscribatur.

Bolus Astringens.

Confect. Fracastor. sine melle ʒj. Rhabarb. opt. torrefact. gr. iv. Syr. Caryophyll. q. f. m. f. Bolus cras mane fumendus.

OBSERVATIONES.

Mos apud virum eximium incescit, ut *Diascordium* mellis vice cum syrupo de meconio conficeret; quandoquidem enim mel quibusdam imo plerisque sit in odio, ac uti illud alvum laxare comperimus; ita remedium stypticum cum melle conficere parum convenit: Nam cum medicamentum est styptico-diaphoreticum, diaphoreseos vice alvi laxatio suâ inde ponere subiret: Quoties enim mel temperamento cuius peculiari adversaretur, deorsum humores ferret, ac diaphoresin certò certius anteveniret: Satiùs igitur ac consultius cum syrupo de meconio quam melle conficietur.

Humores igitur leniter per poros avehit, astringitque potenter; hinc est, quòd sub idem tempus humores

mores tam aliò devocet, quam glandularum ac vasorum ora claudat; atque, hunc in modum, fomitem morbificum ita subtrahit, ut morbi quamplurimi præoccupentur exindè; ac uti Rhei torrefactio particulas Catharticas exhalat, ita *torminibus* medebitur bolus hic, non solum quoniam astringit, verum etiam, quia opiatum est, dolores leniet.

Electuarium Japonicum.

℞ Corall. rub. pp. ʒss. Terr. Japonic. ʒj. Confect. Fracastor. sine melle ʒj. Syr. Caryophyl. q. f. m. f. Electuarium, de quo capiat quantitatem Nuc. Moschat. vel Juglandis, horâ decubitûs, superbibendo, &c.

OBSERVATIONES.

Hujus præscripti materialia sunt absorbentia ac styptica; hinc erit, quòd dysenteriis, Diarrhoeis, vomitionibus, ac cunctis humorum vel sanguinis effusionibus passim obviam eant; quoniam, acrimoniâ primùm emendatâ, vasorum ora facile deinceps resarciri queunt.

Pilula Restringentes.

℞ Terr. Japonic. Gum. Arabic. Terr. Lemniæ ana ʒj. Tereb. ad duritiem coct. ʒij. Gum. Tragacanth. ʒj. cum q. f. Syrup. è Symphyto simp. m. f. Pilulæ minores; obruantur pulvere Corall. rub. pp. quarum sex capiat mane quotidie & vesperi; mane superbibendo, &c.

OBSERVATIONES.

Pilulæ hæ fluori propterea conducunt albo, quòd perindè humores incrassent, motumque paulò vividiorè interpellent, qui, cùm adeò in cursu suo præpediantur, ad glandularum ac vasorum orificia segniùs appellant, ac demum extillatio præcavetur; verum & insuper glandularum orificia ac fibras ipsasmet contrahunt ac corrugant, ac hunc in modum fluxum minuunt; quod si fibrarum crispatio sola in causâ esset, cur fluxus quiesceret; metus esset, ne fluida more solito circumpulsa in vasorum orificia valdè arietarent ac proinde vice fluxûs emanationis suppressæ inflammatio introduceretur;

duceretur, aut saltem rursus reverteretur fluxus; nam hoc in Gonorrhœis virulentis tritum est, ut, siquando intempestivè sistantur, vel citò reproducantur vel alibi humores injuriosè infideant: Quocirca primum evacuandum est, deinde fluxus sistendus est; atque hoc ita fieri debet, quia evacuando non tantum plenitudinem demimus, verum humorum motum vitiosum aliò etiam devocamus; ex quo fiet, ut remediis stypticis deinceps facilius longè cedant fluxus hujusmodi; quamobrem esto, mulierem fluxu laborare albo, humorum pituitosorum copiâ oriundo, qui cum uteri glandulas laxaverint, ubertim ex uteri vaginâ emanant, viresque laborantium quam maximè prosterunt; corpus humorum sarcinâ, pilulis ex rudii extracto ad scrupulum unum, ex mercurio dulci ad grana decem, ex resinâ julapii ad grana quatuor, ac ex oleo juniperi ad guttas aliquot, primâ luce devorandis, cum custodiâ debitâ; atque intra triduum quatriddumve ad tres vel quatuor vices repetendis primum expediatur; deinde decocto guaiaci ad uncias quatuor mane & vesperi per dies triginta utantur; demum gelatinæ iethyocollæ cum radice anchusæ coctæ cochlearia aliquot quotidie exhibeantur; cui si pilulas has adjiciatis, glandularum ora adeo refarcientur, ut nil liquaminis supervacanei deinceps extillet. In gonorrhœâ virulentâ sæpius evacuandum est, quia ex *Waldschmidio*, *Qui benè purgat, benè sanat*; posthac balsamica intus exhibenda ac extrinsecus admovenda vel injicienda sunt, quæ sunt terebinthina, balsamum Gileadense, balsamum peruvianum, balsamum copaibæ, ac similia; ulcus deinde probe detersum ac mundificatum cicatrice obducendum est, ac proinde astringentia hujus gratiâ in usum vocantur. Fluor autem muliebri ac gonorrhœa multum à se dissident; cum in gonorrhœâ ulcus adsit, quod rarius in fluore accidere solet; hinc est, quod balsamica prius gonorrhœâ laborantibus exhibenda sint, quam astringentia vel glutinosa propinemus.

Terebinthina cocta est remedium astringens, quocirca non modò in uteri fluore, verum etiam in aliis passim usurpatur: Non enim fluxum uterinum tantum

comprimet,

comprimet, verum alios etiam passim ubique reprimet: Medicamenta enim vi gaudentia astrictoria, istam virtutem non fibris uteri solis, verum aliis etiam, usquam sitis, eandem impertiunt energiam; quamobrem quod uterinum est, cephalicum etiam erit; quod nervos cingit, uteri fibras etiam tendet; quod vasa lymphatica superiora ferruminat, eadem infra rupta refarciat; quod demum uteri profluvium sistit, fluorem alium, usquam introductum, cohibebit.

Collyrium Refrigerans.

℞ Aq. Spermat. Ranar. Plantag. ana ℥iij. Aq. Aluminos. ℥iij. Aq. Medicamentos. ℥iij. Troch. alb. Rhas. ʒj. m. f. Collyrium.

OBSERVATIONES.

Quoties ophthalmia quemvis infestat, quæ idcirco adoritur, quod sanguis lentus, arterioli impactus, tunicæ adnatæ ita hæreat, ut rubra passim appareat; toties collyrium hocce admotum, ita vasa contrahit, eorumque diametrum minuit, ut color iste quamprimum evanescat, quoniam auctâ fluidorum, ex diametro minutâ, celeritate, impedimenti punctum amovebitur: Quod si nec venæ sectio, nec cucurbitularum admotio, nec cathartica præcesserint; nec revulsiones moliti sumus, collyria parum valebunt: Quippe quæ humores repellunt tantum; ex quo fiet, ut cum ille hand procul amoveantur, Guttam serenam frequentius introducant. Antispasmi igitur nusquam magis ostenduntur, quam in oculorum ac capitis morbis; hic fit, ut ille topicis raro, citra setacea, vesicatoria, Fontanellas, cucurbitulas, venæ sectiones (præcipuè in jugularibus) cathartica, cæteraque stimulantia admota vel adhibita, quinimo repetita, cedere soleant: Cum morbi enim huiusmodi contumacissimi fermè sint, quod semel depulsi ocyùs revertantur; jure merito hæsitamus, quid causæ sit, quæ istiusmodi introducant; quid sit, quod sæpiùs ægrotos, semel captos, invisant? sanguis cum sit gravis, cum difficiliùs ad superiores quam ad inferiores terminos vehatur; necesse erit, humores longè expeditius per revulsoria desuper ad infra trahantur,

trahantur, quam ex inferis ad supernas regiones, atque hinc fieret, ut morbi capitis citius revulsioni, quam isti crurum locum darent; cùm hoc tamen aliter longè eveniat; inferre licet, morbos capitis à causis infra fitis exordium sumere; exemplo rem illustremus; pulmones à motu acclivi adeò subinde opplentur, ut dyspnœa aliquantisper laborent collem scandentes; quid sit, cur ita sint anhelii, nisi quòd femorum muscoli, nimum à motu compressi, sanguinis descensum paulisper interpellent; qui hunc in modum præpeditus regiones supernas ita opprimit, ut respiratio ad tempus quam maximè interturbetur: Quidni & oculi idcirco inflammationentur, quod partes infernæ aliquo modo malè afficiantur: Quocirca pedilavia hisce in casibus sæpius in usum trahantur.

Hoc autem à vobis adverti volumus; caveatis nimirum ab emeticis in oculorum morbis; quippe quæ humorum cursum jam præpeditum ulteriùs justo interpellarent, ex eo, quod, cum ii sint validè impacti, obicem ultra ponerent. Jampridem nos consuluit quidam, cujus filio, ophthalmiâ laboranti pharmacopola, medico, jubente, emeticum propinabat; huic remedio ita parum ophthalmia cessit, ut inflammationi hypopyon successerit; quo inscitè tractato, cancer oculum ac paulò post vitam sustulit. An canceri sanati exemplum ullum, præter istud in actis philosophicis *Londinensibus* memoratum, proferri poterit, nescimus sanè; eximius autem vir *D. Turbeville* methodum in istis delineat, quâ oculorum canceri sectione auferri queunt, quæ consulatis.

Electuarium Conglutinans.

& Conserv. Rad. de Symphyto, Conserv. Rosar. rubr. ana \mathfrak{z} ij. Corall. rub. præp. $\mathfrak{z}\beta$. Pulv. Haly \mathfrak{z} ij β . Croc. Mart. astringent. \mathfrak{z} iss. cum f. q. Syrup. è symphyt. m. f. Electuarium molle, de quo capiat quantitatem castaneæ, mane & vesperti quotidie; superbibendo Aq. Spadan. $\mathfrak{lb}\beta$, $\mathfrak{lb}\beta$. post. Dofin matutinam & & vespertinam.

OBSERVATIONES.

Electuarium hoc abortum idcirco antevertet, quod sit tam astringens, quam glutinosum, necnon quod humiditates aqueas resorbeat; ex quo fiet, ut succi ac fluida inspissentur ac ora glandularum vel fibrarum rupta etiam ferruminentur, tametsi, ex *Homero* canente

Ἐξόμῃ δ' ἐπὶ γυναικὶ κελαϊνεφὲς αἷμα' ἀπέμεσεν.

Hinc autem fiet, ut placenta refrigeretur, ac abortu subsequatur: Cavendum autem est, ut hujusmodi motum, deambulationem, cum viris suis consortium evitent; quoniam his non observatis, astringentia parum valebunt.

Jamdudum matronam quandam novimus, cujus colliquamentum ita ubertim promanavit, ut astringentia parum ipsi profuerint; postura autem sola, ipsissime nota, huic malo contulit: Morbus hic, quod scimus nullibi in authoribus locum etiamnum reperit: Hoc autem ter nobili huic obtigit; cumque placentam, abortu facto, serio lustravimus, facile deteximus, membranas ad placentaë oras disruptas fuisse; ex qua rupturâ colliquamentum ad quantitatem satis ingentem jugiter ferè effluxit: Cum ipsi astringentia ac glutinosa plurimum incassum adhibuerimus, nutrimento, facile coctu, ad posturæ soli imperavimus; quibus infantes duos, at debiles, at strigosos, peperit: Nec aquæ *Tunbrigenses* ne *Bristolenses*, quibus ante conceptum ex præscripto *H. C.* diu usa fuerat, ipsi hilum, ne gry quidem profuerunt.

Collyrium certum.

℞ Aq. Plantag. Euphrag. Ros. ā. ℥j. Troch. alb. Rhamn. ℥ij. Lap. Tutiaë ℥ij. Vitriol. Rom. gr. ij. misce pro Collyrio, quo frequenter utatur.

OBSERVATIONES.

Quibuscunque collyria hujusmodi in usum traherimus, animus est, memoriâ teneant, se tantisper à liquoris instillatione, supinos cubare; oculosque deinde suos pluri-

rimur

num circumagitare, adeo ut liquor ambos oculi can-
hos pertingat.

Parti affectæ collyria frigidiuscula admovēantur; quicquid enim calidum oculis adhibetur, si in nimio eccetur, humorem aqueum vel exhalat vel incrassat; hinc cataracta pessimæ notæ, vel in temporis puncto, introduceretur.

Præscripti hujus portio humorum acrimoniam minuit, eosque incrassabit, ita ut ii non ultrà oculos eruant; hinc erit, quod inflammationes à bile ortæ facile depellantur; vitriolum autem, cum parùm incusat, humores subsistentes denuò circumagit: Serio autem monendi estis, ut evacuationes prius adhibeantur, quam topica admoveantur; & ut topica diutinè applicentur: Vir egregius *Sydenhamius* fertur morbos capitis parum ideo illustrasse, quia istos se nescire ingenuè profitebatur: Ægrotos autem apertè certiores faciamus, istiusmodi morbos febri vel phthisi vel morbis periculosis longè curatu difficiliore esse.

Pilula Styptica.

2 Corall. rub. præp. Croc. Mart. astring. Gum. Arabic. Tragacanth. ana ʒj. cum. f. q. Syr. è Symphyto m. f. Pilulæ minores (obruantur pulvere oculorum Cancror. pp.) quarum sex capiat mane quotidie, & vesperi, in Cochleari Julap. &c.

OBSERVATIONES.

Quandoquidem suprâ de electuario conglutinante, pilulis restringentibus, necnon bolo astringente multa effati sumus; hic manum è tabulâ traheremus; nisi quòd cum *Riolano* addere liceat, styptica meatui aperto, glutinosa vero vasi eroso jugiter accommodari; hinc est, quòd gummi arabicum ac tragacanthum vasis pulmonum ab acribus humoribus erosis conducant; hincque fiet, ut crocus martis astringens necnon corallium diarrhœis conferant; cùm autem hæc symptomata simul occurrant, pilulæ hæc specificè istiusmodi opem ferent.

Electuarium Pectorale.

℞ Conf. fruct. Cynosbat. ℥iij. Conserv. Rosar. rub. ℥j.
 Pulv. Haly ℥j. Spec. Diatragacanth. frig. ʒss. cum
 q. s. de Rubis Idæis m. f. Electuarium molle, de quo
 capiat quantitatem juglandis mane & vesperi quoti-
 die, & mane superbibat ℥ss. vel ℥bj. Aq. Spadanæ,
 & vesperi haustum ejusdem.

OBSERVATIONES.

Electuarium hocce ex medicamentis refrigerantibus,
 acidis, ac viscosis planè constat; quocirca salia septica
 quæ sanguini præsumt, obvolvunt, irritationes immanes
 aliquantulum alleviat; hinc fit, ut tussi acri auxilium
 præbeat; quæ verò acida ac styptica tussi phthificæ,
 cum sputum purulentum sit, præstò sint, uti eximio
 viro *Paxtono* videtur, nescimus sanè: Estò, quòd irri-
 tatio sedetur, hæctica compescatur, ac puris secretio u-
 berior præcidatur exindè; quid de ægrotis fiet? auscul-
 tetis parum, quæsumus; ulcere externo laboret quis,
 inflammatione non sublatâ, ulcere non deterso, cica-
 trisetur ac claudatur ulcusculum; cum primum saniei
 effluxus præciditur, inflammatio increbrescit, & alibi
 abscessus, ac tandem ulcus alio in loco propinquo in
 lucem prodibit, graviusque nunc quam ante grassabitur:
 Quidni & hoc in pulmonum ulceribus obtineat? Cum
Hippocrates Aphor. undecimo, *Sect.* septima hæc habeat,
Quum vero sputum sistitur, moriuntur; cum *Sylvius*
 etiam hæc habeat, *cessant fluere* (ulcera) *ante mortem.*
 Videtis igitur, quæ styptica vel opiata phthificis in sta-
 dio phthiseos ultimo obesse queant; quandoquidem e-
 nim experienciâ erudimur, remedia ejusmodi asthma-
 ta, sputi suppressionem ac tandem mortem ipsam ad-
 urgere; necesse erit, ab istorum exhibitione nosmet
 contineamus: Quando pulmones inflammentur exinde,
 quando respiratio quam maximè lædatur, ac demum
 quando mors sit in ollâ: Prudentè igitur hic proce-
 dendum est.

Tussi igitur acri, tenui, subsidio venire poterit; ac
 dummodo aquæ spadanæ simul exhibeantur salia disjun-
 guntur, irritationes sedantur, hæctica quiescit, appeti-
 tus

tus dejectus restituitur, ac sudores nocturni cohibentur; si insuper noctu opiata (uti sunt pilulæ è styrace, audanum) propinentur, evacuationibus magis universis præmissis, phthisis nondum confirmata evanescet.

Electuarium Bechicum.

℞ Conserv. Rosar. rubrar. ℥iij. Ol. Sulphuris per Campanam q. s. ad gratam aciditatem, m. f. Electuarium. de quo capiat quantitatem Castanæ frequenter, urgente tussi.

OBSERVATIONES.

Electuarium hoc tussibus ab acrimoniâ alcalinâ, biliosâ, ortis propterea aderit, quòd glandulas constringat, extillationemque præcidat, quodque demum bilem ipsam immutet: Inflammationi autem ita parum proderit, ut pleuritidi, peripneumoniæque obsit, ac proinde tussi exinde ortum capienti, præ acidorum principio congelante, maximè oberit. Authores nonnulli acidum sulphuris sanguinem coagulare negant, quod certè, experientiâ duce, falsum esse profitemur. Quia tamen asthmatum paroxysmi subinde ab ephemera seu temperie febrili initium faciunt; idcirco spiritus hicce introsumptus paroxysmum istum minuit; quippe cum humores denset, adeò ut fluida, præ luctâ immaniori vasa tendentia, detumescant; necesse erit, vasa etiam concidant, ac respiratio ideò multo liberior sit, ac asthmata hujusmodi quiescant.

Acida in convulsionibus ab authoribus nonnullis ideò reprobantur, quia acrimoniam salinam alcalinam ac biliosam emendant, necnon quia spirituum *Ataxias*, commotiones, tumultus, explosionesve sedant; hinc est, quod spiritus vitrioli præscriptis convulsioni accommodatis adjiciatur.

Cephalalgis immanibus, à bile ortis (uti à calore præternaturali, corporis totius, plantarum ac volarum tetegitur) acida prosunt; quoniam bile immutatâ, evacuationibus (venæ sectione nimirum, ac cholagogis) præmissis; dolori, quia causæ, finis aderit.

CAP. IV.

M E D I A.

I. Scabra, Testacea.



Ocul. Cancror. gr. xij. Cinnab. Antimon. gr. iv. m. *In Epilepsiâ, Febris Infantum continuis.*

R Corallin. ʒß. Sacch. Mercurial. ʒij. m. *In Vermibus.*

R Cinnab. nativ. gr. vj. (viij.) Conf. Borag. q. s. m. *In Cephalalgia Hysterica.*

R Decoct. C. C. q. s. *In Diarrhœâ, Cholerâ, Dysenteria, Lienteria.*

R Oc. Cancror. ʒj. Marg. pp. ʒß. Testar. ovor. ʒj. m. *In Colica scorbutica, Empyemate, Bulimia.*

R Cinnab. nativ. gr. vj. Crystal. pp. gr. iv. Pulv. Pannon. gr. vj. m. *In Colica Infantum.*

R Bezoar. oriental. gr. iij. Oc. Cancror. gr. iv. m. *In Colicâ Infantum.*

R Cinnab. nativ. gr. vj. Rasur. C. C. gr. x. m. *In Epilepsia.*

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Antimonium cum nitro præparatum, Bezoartium minerale, Calx abluta, Confectio de Hyacintho, Ebur. præparatum, Emplastrum è Cretâ, Lapis calaminaris præp. Lapis contrayerva, Magisterium Perlarum, Margaritæ præparatæ, Oculi Cancrorum, Ossium præparatio, Plumbum lotum, Plumbum ustum, Plumbum crudum pulveratum, Pulvis Bêzoardicus Magistralis, Pulvis Cardiacus Magistralis, Pulvis è Chelis comp. Tutia præp. Unguentum de Calce, Unguentum Diapompholygos. Unguentum Ophthalmicum, Unguent. è Plumbo, Unguentum Tutia.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Antefebriale Concharum ʒj. Febrifugum, Diaphoreticum. Antimon. Diaphoret. ʒj.

j. 3j. In Cachexia, Hydrope, Scorbuto acido, Lue. Antimon. Diaphoretic. fixum ʒj. 3j. vid. Antimon. Diaphoret. Antimon. Medicamentos. ʒj. 3j. vid. Antim. Diaphoret. Arcanum Cosmeticum. Externe ad faciem calbandam. Aurum Mosaicum, gr. x. xii. Diaphoreticum. Bezoarticum Joviale gr. iij. vj. Diaphoreticum, Febrifugum, Scorbuticum, Antipestilentielle. Bezoarticum Lunare gr. vi. xij. Sudorificum, Epilepticum, Anapoplecticum, Cephalalgicum in dolore. Bezoartic. Minerale gr. vj. xij. Alexiterium, Sudorificum in Pestilentialibus. Calx Jovis ʒss. In utero strangulato. Calx Lunæ ʒss. In Apoplexia, Epilepsia, Hystericiis. Cerussa Antimon. vid. Antimon. Diaphoretic. Cerussa Martis. vid. Antimon. Diaphoret. Crocus Jovis gr. iv. x. Sudorificus, in Lue, Podagra, Peste, utero strangulato. Externe ad ulcera inveterata, Cancros, fistulas. Decoct. album q. v. In Siti, in Diarrhœis. Dentifricium Dominarum. Pro dentibus fricandis. Diacreta 3j. In ardore ventriculi, optima. Electuarium album 3j. iij. vj. In Cachexia, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lue. Emulsio Cretacea q. v. In Cardialgia. Julap. Cretaceum ʒiij. In Cardialgia. Lapis contrayerva ʒss. ʒss. Cardiacus, Alexiterius. In variolis, morbillis, Febris malignis. Lapis de Goâ. vid. Lap. Contrayerva. Magister Antimon. Diaphoret. ʒss. j. vid. Cerus. Antimon. Pulv. Cantianus ʒss. ʒss. In variolis, morbis malignis. Pulv. Cardiac. rubens 3ij. In Cardialgia. Pulv. Pannonic. rubens. ʒj. 3j. In febris malignis, &c. Pulv. Purpureus ʒj. ij. In variolis, morbillis. Sacchar. eborat. Sal. Corall. ʒss. j. In febris mali moris.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Bolus Cardiacus ʒss. In Febris continuis, spiritus recreat, sudores movet. Electuarium Cinnabarinum. Sanguinem depurat, obstructions reserat; valet in Scabie, ac cutis turpitudinibus, in doloribus articulorum, tuberculis pulmonum tridis, scrophulis, ulceribus, convulsionibus (quoniam acidum tollit;) at in tremoribus ac paralyti vult ut evitetur. Pulv. Alexipharicus ʒj. In Febris mali moris, sudores ciet. Pulv. Cardialgic. ʒj. In Cardialgia. Pulvis Edulcorans ʒij. Acidum in ventriculo ac intestinis emendat, puerulis conducit. Pulv. perlat. ʒss.

S C H O L I A.

Quandoquidem medicamenta *Testacea* subinde sanguinem *tenuant*, aliquoties autem eum *incrassant*; ideo à nobis *Media* audiunt. Cum autem paradoxon sit, ut virtutes in se quasi contrarias possideant, necesse est explicemus, quæ hæc fiant.

Testacea igitur tam humiditates absorbent, quam acida immutant, saltem obvolvunt; cum sanguis, si redundans, sit idcirco aquosior ac paulò tenuior; feri redundantia per *testacea* præcisâ, necesse erit, sanguis crassior longè evadat; quocirca hoc in sensu *incrassantia* jure merito nuncupantur: Cum acidum ventriculi ac intestinorum succis, ac proinde sanguini, tantum non statim imperet ac præsideat, offæ quamplurimæ exinde passim generantur, adeò ut sanguis alicubi in subsistendi periculum veniat; sanguis hujusmodi crassus, limosus ac lentus, nec injuriâ, vocatur; cum primum autem acidum hoc, quocunque modo, evertitur, sanguis fundatur, ac idcirco tenuior fiat, necesse est; quòd acida verò *testaceis* cedant, adeò non ambigimus, ut certo certius destruantur exinde, quocirca *attenuantia* tum appellari merentur.

Externè admota, ulcera vel maximè saniosa, cicatrificant, quippe quæ acidum septicum, ulcera introducens, efficaciter absorbent. Internè etiam exhibita valde profunt, uti fusiùs dicturi sumus.

Corollarium.

Pulvis Paspharmacus.

℞ Chel. Cancror. pp. Oc. Cancror. pp. Marg. pp. Sacch. perlat. ana ʒj. m. f. pulvis; divid. in octo Chartulas, quarum unam capiat mane quotidie & vesperti (in Cochl. Lact. Asinini, superbibendo ita ejusdem.)

OBSERVATIONES.

Vocatur hic pulvis paspharmacus, non quòd omnibus inserviat usibus, sed quia frequentius a viro egregio

io in usum traheretur; ut verum fateamur, morbi contumacissimi quibuscum in *Angliâ* fermè affligimur, b acido initium faciunt; qui idcirco testaceis, calcibus, unà cum lacte exhibitis facillimè cedunt: Hinc est, quod phthisi allevamento sint efficaci, si cum lacte administrentur, his nempè de causis, quoniam salia ponica, vel etiam septica, præ copiâ ac acrimoniâ suâ, vel ulcera introducere solent, vel hecticas ac sudores obliquativos; ac proinde mortem adurgent: quibus obvolutis, his nocumentis finis aderit. Lactis item coagulationem anticipat; calor enim ventriculi secessionem in partes, uti fit in lactariis, promovet; quam pulveres hujusmodi præripiunt.

Eruptionibus, à salibus acidis concentratis ortis, quæ calore volaram ac plantarum & pruritu ingenti digosci queunt, subsidio veniunt. Item stranguriis opem ferunt, quoniam salia obvolvunt. Scorbuto acido cuius auxiliantur, præmissis universalibus, ita ut symptomata dira sensim evanescere percipiantur. Mensium luxui immodico manus ideò porrigunt auxiliares, quia à sero ortum suum ducant, illud absorbent; si ab acido corrosivo vero initium faciant, hoc immutato metu apertus, posthac facillimè claudetur.

Siquando igitur morbi acido oriundi corpus humanum infestent; medici est indagare, quænam acidi species, quodnam individuum corpori insit: Quoniam hoc non detecto, morbus usque permanebit.

CAP. V.

2. *Ramosa, Flexilia, Molliâ.*

Fol. Hyoscyam. m. j. coquantur in Lacte.
Pro Pruritu ullibi.
 R Ser. Lact. lbij. C. C. ras. ʒj. coq. colatur. add. Syr. Dialth. q. s. *In hecticâ, Febre erraticâ.*
 & Sem. Melon. ʒij. Aq. Lact. ʒvj. tundantur, f. Emulsio;

fio; add. colat. Sacch. Perlat. q. f. *In Hæcticâ, inflammationibus internis.*

℞ Ranar. virid. ficcât. p. n^o iij. Sacch. perlat. ℥iij. m. *In Hæcticâ.*

℞ Emulsion. 4. Sem. frig. maj. lbij. cum Amygd. & Sem. Papav alb. a. q. f. *In Phrenitide, Vigiliis, Rheumatismis, Inflammatione omni internâ.*

℞ Farin. Avenac. ℥ij. Hord. Perlat. ℥j. coq. in Aq. colatur. ℥vj. add. Sacch. Cand. q. f. pro Gargarismate. *In Inflammatis Variolis.*

℞ Butyr. insulf. ℥β. Sacch. Cryſtall. q. f. m. *In Pustulis Pharyngis inflammatis in Variolis.*

℞ Decoct. Malvæ ℥vj. Syr. Violar. ℥β. m. *In Dysuriâ.*

℞ Bals. Copayb. gr^{ss}. x. (in Saccharo) capiat. cum Vino. *In Gonorrhœâ virulentâ.*

℞ Ol. Violac. ℥ij. Lillior. alb. ℥j. m. f. Enema. *In Hæmorrhoidibus dolentibus.*

℞ Cepar. cum Butyr. insulfo coctar. q. v. admoveantur. *In Hæmorrhoidibus cecis dolentibus.*

℞ Ol. Amygd. ℥j. Mann. ℥iiss. Vin. Malvatic. ℥j. m. capiat. *In Iliacâ.*

℞ Rad. Alth. m. j. Sem. Lin. Fœnugræc. a. ℥vj. Flor. Melilot. ℥iv. Farin. Hord. ℥xij. Mell. Comm. ℥ij. Axung. Porc. q. f. m. f. Cataplasma. *In inflammatione.*

℞ Cepar. tost. ℥iij. Fic. n^o. x. tundantur, add. Basilic. ℥iij. Mell. Virg. Farin. Sem. Hord. Fœnugræc. a. q. f. m. f. Cataplasma, *suppurans.*

℞ Ung. Dialth. ℥j. Ol. Amygd. d. ℥β. m. *Pro dolore Pectoris.*

℞ Passular. Exacin. ℥iv. Hord. ℥ij. coq. in Aq. *In Inflammatione internâ.*

℞ Sperm. Cet. ℥ij. Ceræ q. f. m. f. Emplast. *In Ischiade.*

℞ Decoct. Sars. & Chin. cum Syr. Dialth. edulcorat. ℥iv. internè. *Pro Ischiade.*

℞ Herb. Parietar. in Butyr. frix. m. admoveantur ad Pubem. *In Nephritide.*

℞ Rad. Alth. ℥ij. Malv. Parietar. a. m. ij. Sem. Lini ℥j. coq. in Lact. pro Fotu ad Lumbos. *In Nephritide.*

℞ Ranar. Virid. Verm. terrest. Limac. a. q. v. coq. in Ol. *In Contracturis.*

- ℞ Ol. Lin. rec. Syr. Liquorit. Mell. Violar. a. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
Sacch. Cand. $\mathfrak{z}\text{ss}$. m. *In tussi acri, tenui.*
- ℞ Ol. Amygd. d. Syr. Capillor. Vener. a. $\mathfrak{z}\text{ss}$. Sacch.
Cryстал. $\mathfrak{z}\text{ss}$. m. f. Linctus. *In Tussi acri.*
- ℞ Pulv. Haly. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Linctus.
In Tussi acri.
- ℞ Crass. rec. ext. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Ol. Amygd. d. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Syr. Dialth.
 $\mathfrak{z}\text{j}$. m. *In Calculo Renum.*
- ℞ Flor. Unguentor. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Pulv. Glycyrrh. $\mathfrak{z}\text{j}$. m. *In Ul-
cere Renum.*
- ℞ Axung. Porcin. $\mathfrak{z}\text{ij}$. cum Opii gr. j. (ij. iij.) m. pro
Glande. *In Tenesmo.*
- ℞ Diachyl. cum Gum. $\mathfrak{z}\text{j}$. Axung. Porcin. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Ceræ q.
f. m. *In Scirrho, Scrophulâ.*
- ℞ Flor. Verbaſc. & Chamom. a. q. v. coquantur in
Lacte. *Pro Tenesmo.*
- ℞ Butyr. infuſ. $\mathfrak{z}\text{j}$. Mell. opt. $\mathfrak{z}\text{ss}$. Troch. Bechic. alb.
 $\mathfrak{z}\text{iiij}$. m. *In Tussi acri.*
- ℞ Syr. Ballam. $\mathfrak{z}\text{ij}$. è Sympht. $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Balſ. Lucatell. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
m. *In Tussi ulcerosa.*
- ℞ Butyr. non ſalit. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Mucilag. Sem. Lin. Fœnug.
rad. Alth. a. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. m. *In Pectore dolente à Tussi.*
- ℞ Mic. Pan. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Pulp. rad. Althææ, cum Mucilag. add.
Ol. Lilior. alb. q. f. m. f. Cataplasma. *In Tentigine
venerea.*
- ℞ Balſ. Sulph. gr. x. Conf. Flor. Malv. $\mathfrak{z}\text{j}$. m. *In ulcere
Uteri.*
- ℞ Decoct. Hord. $\mathfrak{t}\text{bij}$. Syr. Balsam. $\mathfrak{z}\text{ij}$. m. *In ulcere
Renum.*
- ℞ Lact. $\mathfrak{z}\text{iv}$. Troch. Gordon. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Opii gr. ij. m. pro
injectione. *In ulcere Vesicæ.*
- ℞ Tereb. (in Vitell. Ov. solut.) q. f. m. *Pro Digestivo.*
- ℞ Conf. Flor. Malv. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Pulv. Rad. Symphyt. maj. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
G. Arabic. $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Syr. Dialth. q. f. m. *In ardore Urina.*
- ℞ Fic. Ping. $\mathfrak{t}\text{ss}$. Rad. Alth. rec. cont. $\mathfrak{z}\text{ij}$. coq. in. f. q.
Aquæ ad mollitiem, Dein. contuſ. add. Farin. Tri-
tic. q. f. m. f. Cataplasma. *Suppurans.*
- ℞ Rad. Alth. Mundat. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Lilior. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$. Fol. Malv.
Violar. a. m. ij. Flor. Chamom. Melilot. a. m. j.
coq. ad mollitiem; coct. & colat. add. Farin. Fœ-
nug. Tritic. a. p. j. Ferment. acris $\mathfrak{z}\text{ij}$. Ping. Porc.
Butyr.

- Butyr. a. ℥ss . Ol. commun. q. f. Croc. ℥ss . m. f. Emplast. *Suppurans*.
- ℞ Diachyl. cum Gum. q. v. Pingued. Anserin. Medul. Crur. Vitul. & Cer. q. f. m. f. Emplast. *In Scirrhus Hepatis vel Lienis*.
- ℞ Cepar. q. v. coq. cum Lact. contus. frignantur in Sartag. applicentur calidè supra Ventrem. *In Dolori à Partu*.
- ℞ Ol. Scorpion ℥j . Amygd. d. ℥ss . m. instilletur. *Auribus dolenti*.
- ℞ Ung. pectoral. ℥ss . Resumptiv. ℥ij . Ol. Amygd. d. ℥iiij . Sperm. Cet. ℥ss . m. *In Dolori Pectoris à Tussi*.
- ℞ Capit. & Ped. Vervec. q. f. Herb. emollient. q. f. coq. in Lact. Abdomini admoveatur. *In Atrophia Infantum*.
- ℞ Mic. Panis in Lacte contemperat. Vitell. Ov. adject cum Ol. Rosar. Croco & Opio mist. *In Dolori Virga, ullibi*.
- ℞ Flor. Sulphur. Pulv. Glycyrrh. Sacch. Cand. a. ℥ij . Bals. Sulph. Anis. q. f. m. f. Pilul. (Dof. ℥j .) *In Tussi Asthmaticâ humidâ*.
- ℞ Cass. rec. ℥ss . Tereb. ℥ij . Pulv. Glycyrrh. q. f. f. Bolus. *In Calculo Renum*.
- ℞ Lact. Vaccin. ℥vj . Vitell. Ov. n^o. j. Sacch. alb. ℥iiij m. capiat. *In Glottidis Constrictione*.
- ℞ Sem. 4. frigid. major. Papav. alb. Portulac. Cydon. a. ℥j . G. Arab. Amygd. d. a. ℥ij . Sang. Dracon. ℥j . in Mucilag. Psyll. q. f. m. f. Pilul. capiat. vj. in Lacte. *In ardore Urine*.
- ℞ Aq. Lactuc. Limac. a. ℥ij . Mucilag. Rad. Alth. ℥j . Alb. Ov. conquassat. n^o. j. m. injiciantur. *In Stranguria*.
- ℞ Succ. Malv. ℥j . Butyr. insuls. ℥ij . Vitell. Ov. β . m. *Pro Gingivis duris*.
- ℞ Lact. ℥viiij . Ol. Lilior. ℥iiij . Cass. rec. extract. ℥j . m. f. Enem. *In Calculo Renum*.
- ℞ Pinguedin. Ursi ℥iiij . Ol. Mastic. ℥ij . m. *In Contracturis*.
- ℞ Ol. Amygd. d. Sevi Porci a. q. f. m. *In Fissuris Mammarum preveniendis & curandis*.

- ℞ Aq. Lactuc. Papav. Rhæad. a. ʒiʒ. Laudan. Lond.
gr. j. Syr. de Mecon. ʒij. m. *In doloribus, Vigiliis.*
- ℞ Pomor. affator. n^o. ij. Alb. Ov. n^o j. m. *Pro Ambustis primi gradus (viz. ubi ardor tantum adest.)*
- ℞ Balf. Sulph. ʒij. Ung. Dialth. ʒij. m. *In Ambustis (ubi ardor & inflammatio) in secundo gradu.*
- ℞ Ol. Lini ʒj. Nucum ʒʒ. m. *In Ambustis, in primo gradu.*
- ℞ Ung. Dialth. ʒj. Ol. Lin. ʒij. m. *Pro Crustis auferendis, & in 4^{to} gradu Ambustionis.*
- ℞ Ol. Olivar. ʒij. Cer. Citrin. ʒʒ. Thur. Mastich. a. ʒj. Vitell. Ov. n^o j. Butyr. q. f. m. *Pro Digestivo.*
- ℞ Mell. ʒj. Butyr. ʒij. G. Elemn. ʒiij. Tereb. solut. ʒʒ. m. *Pro Digestivo.*
- ℞ Jur. Vitulin. ʒx. Ol. Hyperic. ʒj. Balf. Lucatell. ʒj. Opii gr. iv. m. f. Enema. *In Dysenteria.*
- ℞ Decoct. Rapar. ʒʒ. Sacc. Cand. ʒj. Ol. Amygd. d. ʒj. m. *Pro Calculo.*
- ℞ Fol. Semperviv. maj. (ablatâ Cuticulâ) contund. admoveantur. *In Cornubus pedum.*
- ℞ Rad. Alth. ʒʒ. fol. Malv. m. ʒ. capit. Papav. n^o. j. Sem. Lin. Fœnug. a. ʒij. coq. in Lacte pro Fotu. *In Dolorē ullibi, Aure dolente.*
- ℞ Ol. Violar. Lilior alb. Amygd. d. Butyr. insuls. a ʒj. Mucilag. Sem. Psyll. Farin. Alth. a. ʒiʒ. Croc. ʒ. Ung. Basilic. ʒiʒ. m. *In Ambustis in tertio gradu (vesiculis sectis) ubi Ulcus; item, in 4^{to} gradu, ubi Crusta.*
- ℞ Caric. Ping. q. v. tost. tene in Ore. *Prope locum ubi Angina ruptura est.*
- ℞ Furfur. q. v. coq. in Aq. donec lactescit, colatur, add. Mell. q. f. m. *In Aphthis.*
- ℞ Fic. Rad. Alth. Croc. Farin. Hord. Sem. Lin. Fœnug. cum Melle m. f. Cataplasma. *Ad suppurandam Anginam.*
- ℞ Sperm. Cet. gr. v. (ʒj. ʒj.) Jusculi ping. q. f. *In Catarrho tenui.*
- ℞ Pulp. Sed. maj. q. v. tundat. add. Aq. Ros. Sacch. q. f. *Pro Aphthis.*
- ℞ Opii gr. ij. mitte in Dentem. *In Odontalgia.*

- ℞ Lact. Ibj. Croc. ℥j. add. Ol. Ros. q. f. *Pro Dolore Aurium.*
- ℞ Lact. Vaccin. ℥j. Opii gr. iij. m. instillentur Guttæ aliquot in Aurem. *In Dolore.*
- ℞ Cepar. tost. Butyr. rec. ℥ij. Ol. Chamom. ℥ij. Croc. ℥β. Mucil. Sem. Cydon. q. f. f. Cataplasma. *In Dolore Aurium.*
- ℞ Lact. Caprill. Asinin. q. f. *In Atrophia.*
- ℞ Scorzoner. ℥ij. coquat. in Aq. *Pro Cancro.*
- ℞ Aq. Pull. Ibj. Syr. Violar. ℥j. m. f. Enema. *In Cholera.*
- ℞ Aq. Paralyf. Ibiβ. Mirab. ℥j. Laudan. liq. gutt. xx. *In Cholera.*
- ℞ Decoct. Hord. ℥ix. Theriac. Androm. ℥iij. m. f. Enema. *In Cholera, Dysenteria.*
- ℞ Aq. Lactuc. ℥j. Paralyf. ℥ij. Laud. liq. Cydon. gutt. xx. m. *In Colicâ biliosâ.*
- ℞ Flor. Sulph. ℥β. Conf. Flor. Malv. q. f. m. *In Colicâ ab Acrid.*
- ℞ Oliban. Cer. Virg. Pic. Brutia a. q. f. m. *In Dolore Sterni.*
- ℞ Syr. Diasulph. ℥j. Balsamic. ℥β. Balf. Sulph. gutt. v. m. *In Empyemate.*
- ℞ Raf. C. C. ℥j. Farin. Avenac. ℥β. coquantur in Aq. Font. ad ℥viij. colatur. add. Sacch. q. f. m. *In Cardialgiâ.*

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Adeps, Pinguedo Aq. Althææ, Aftacorum, Consolid. maj. Lactis, Limacum, Malvæ, Nymphææ, Papav. Rhæad. Parietar. Portulac. Ranar. Raparum, Sempervivi, Solani, Tapf Barbati, Tussilaginis, Cassia extracta, Conf. Borag Bugloss. Lilior. alb. Malv. Papav. errat. Paralyf. Tussilag. Violar. C. C. nova præparatio; Decoct. pectora. sine Hyssop. Diapenidion sine speciebus, Ebur. pp Herbæ 5 Emollientes, Liquor Betulæ, Lohoch de Caulibus, Lohoch de Farfara, Medullæ, Mel Mercuriale Mel passulatum, Mel Violaceum, Olea Amygd. d. Avellanar. Balaninum, Cucumerum, Cucurbitæ, Lactu

cæ, Lateritium, Lilior. alb. Lini, Nenupharinum, Oliv. comm. Ovorum, Pinearum, Pistachiorum, Rapi, Pulmones Vulpis, Rob. simplex, Succ. Glycyrrh. simp. Syr. de Aithæa, Syr. Borag. Syr. Buglossi, Syr. Capill. Vener. Syr. Endiviæ, Syr. de Glycyrrh. Syr. Jujubin. Syr. Mercurial. Syr. Nymph. f. & c. Syr. Paralyf. Syr. Portulac. Syr. de Sempervivo, Syr. Tussilag. Syr. Viol. Ung. Anodynum, Ung. Dialth. Ung. Hæmorrhoidale, Ung. Pectorale, Ung. Potabile, Ung. Resumptivum.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Aq. Lact. Nephritic. Itß. Circa Plenilunium, & Novilunium. Aq. Lactis Pectoralis Itß. Ad Tabem, Phthisin. Balsamum verum. Externe ad variolarum foveas. Butyrum Amygdalinum. Anodynum, leniens, maturans, ad Tormina ventris. Cataplasma ad Paronychiam. Admoveatur loco affecto. Caudela Amygdalina Itß. Pro Puerperis Diarrhœâ laborantibus. Caudela Nenupharina Itß. In Gonorrhœâ, Profluvio albo, abortu præcavendo. Clyffus Portulacæ, Cremor. Hordei, q. v. In Siti. Decoct. Limacum ʒvj. In Tabe, Phthisi. Emulsio de Avellanis Itß. In ardore Urinæ. Emulsio Dactylorum Itß. In abortu, Gonorrhœa, Tabe, Tussi, Macilentia. Enema Dysentericum. Flores Sulph. alb. ʒß. ʒß. Julap. Hysteric. Farinaceum. Coch. 4. in Paroxyfmo. Liquamen Sulphuris, gr. xx. xxx. In Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide. Lohoch. album, q. v. In Tussi. Lohoch. domesticum, q. v. Ad expectorationem promovendam. Miva Boraginis. Ol. Cremoris. In Combustionibus, Erysipelate optimum. Ol. Ranar. Ad faciei ruborem, Impetiginem, Erysipelas, &c. Ol. Tritici. In manuum fissuris, pedum ulceribus, Labiorum rimis, Herpete, Cutis Scabritie, optimum. Pasta Hypoglottida. In ore, ubi lingua arida. Serum de Sedo ʒvj. In Siti, ardore febris. Syrupus ad Fissuras. Externè ad Mammæ fissas. Syrupus de Rapis cochl. j. ij. In acri, tenui Tussi. Tabulæ Farfareæ q. s. In Tussi acri, tenui, ferinâ. Tabulæ Lenthales, q. v. Pectorales in Tussi tenui. Trochisci Pectorales, q. v. In Tussi tenui, acri, titillante.

Ex Pharmacopœiâ Fullerii. Cataplasma de Cassia.

Contra Anginam celebre. Cataplasma Laterale. Anodynum, vel in Pleuritide notha. Cibus albus. In Tabe, Gonorrhœa. Decoct. edulcor. ꝑss. Acorem emendat, Phthisi prodest, Doloribus, Ulceribus, morbisque cutaneis. Decoct. Malacens. ꝑss. Obtundit acres humores, incrassat tenues, levigat asperos. Decoct. Malv. Magistral. ꝑss. Acrimoniam emendat, incrassat, refrigerat, humectat, lenit, ardorem urina minuit, calculosis confert. Decoct. Passulat. q. v. Morbis Pectoris ab acri medetur, sitim sedat. Decoct. Pectoral. ꝑss. vj. Incrassat, obtundit, lubricat, humectat, demulcet, hinc est pectorale, pleuriticum, Rheumaticum, Nephriticum, variolis medetur. Decoct. Phthific. ꝑss. viij. Salia demulcet, Phthisi, Hectica, sudoribus nocturnis prodest. Decoct. Rapar. ꝑss. vj. Pectorale, temperat, incrassat. Decoct. Sarsæ ꝑss. Acres humores lenit, dolores vagos abigit. Electuar. de Malv. ꝑss. Tussi prodest sicca, acrique; calculoque renum. Emp. Farinac. Ad Dorsi dolorem. Emulsio commun. q. v. Lenit, refrigerat, humectat, acres corrigit humores, Hecticis medetur, feбри inflammatoria ac Deliriis aliisque symptomatis inde; erosiones sanat, sitim tollit. Emulsio edulcorans q. v. In acris humoribus. Enem. Balsamic. In Dysenteria, Erosionibus, cruciatibus Intestinorum. Enem. Emolliens. Alvum lubricat. Enem. laxans. Facies emollit, educit. Enem. de Verbasco. Dolores Hemorrhoidum demulcet, ulcuscula sanat, &c. Fotus ad Inflammationes. Emolliens, Anodynus. Gargarisma Emolliens. In Lingua arida, fissa, in febris malis moris. Gargarisma Lævigans. Lenit, humectat. Haustus ad Catarrhum. In Tussi, acri, gutturali, prodest; in Tussi pectorali, non item. Haustus lacteus. In atrophia, humoribus acris, sudoribus nocturnis. Jusculum Cancrorum 1. 2. Nutrit. Jusculum consummatum, Galli, Phthificum. Omnia nutriunt. Litus Infantum. Ad Aphthas, oris Erosiones. Lohoch. Bechic. Acre obvolvit, tenue incrassat, tussi continuo irritanti succurrit. Lohoch. commune, refrigerat, humectat, lubricat, obvolvit acres humores. Lohoch. Lævigans. Lingua, faucium, Gutturis excoriationem tollit, acre obvolvit. Lohoch. Oleosum. Lohoch. Vitellinum. In erosionem, fissuris, raucedine, Catarrho à tenui, acri. Mel passulat.

passulat. *Incrassat, pectorale est.* Mel passulat. *Sitim alleviat.* Mistura Oleosa ℥iij. iv. *laxat, lubricat, obtundit, calculo prodest.* Pasta ad Aphthas. Pil. Halosanthinæ ʒss. *In Puerperis contusis ob partum.* Ptisana q. v. *Sitim tollit, fervorem mitigat, acre in pulmonibus demulcet.* Syrup. de Malvâ. Syrup. de ovis cochl. j. ij. *In Tussi, acri, tenui.*

SCHOLIA.

Medicamenta hæc oleosa, flexilia, acriores sanguinis aculeos æquè recondunt, ac proinde graviore indè noxas prævertunt, atque fibras rigidiores aliquanto discingunt, ac proindè eas multùm dilatant. Propter sanguinis implicationem, venenis perindè metallicis ac mineralibus, atque vegetabilibus medicari cernuntur; per fibrarum autem dimensiones auctas stat, quòd ista do- o- res, ex eo quòd fibras nimium tensas laxent, sedare comperiamus: Ulcerum itidem digestionem idcirco ad- argent, quòd fibras latiores ac proinde proniores longè id fluidorum saniosorum levi quâvis de proritatione epositionem efficiant: Hincque fit, ut, fibris laxatis ac unâ fodicatis, *digestio* ritè progrediatur.

Si cui igitur animus pependerit, quî morbi à salibus opticis prognati, depellentur; ex hoc, quòd, sint aci- a an alcalina, ipsos penitus lateat; medicamenta hu- ismodi flexilia intus utilitèr usque sumi poterint, do- ec certo constet, quodnam salis genus sanguini præfi- eat. Intus exhibita calculo renum propterea subve- iunt, quippe cum ureteres lubricent, eos ampliant exinde, ac proinde calculo deinceps locum cedunt; hinc fit, ut enemata, è medicamentis flexilibus con- fla- ti, calculi paroxysmo se adjutores præbeant. Mate- am quamvis, bronchiarum parietibus, ac glandularum ificiis adnascentem, efficacitèr excutiunt ac proinde tuitæ *Ἀναστυλὴ* feliciter impellere, uti omnibus sat- utum est, experimur: Non bronchias à sordibus sibi ihærescentibus solum expediunt, verum humores e- am aculeatos nimis ita ramosis suis particulis irretiunt, : incommodis, irritationi, nimirum, molestissimæ, coriationi, inflammationi, ac demum ulceribus certò ndem exinde certius eventuris, feliciter occurrant.

Siquidem utique nutrientia ac reficientia, maciei mendentia, potissimum ex *flexilium* censu petenda sunt; hinc fit, ut victus saluberrimus sint ramosa, lactea, nempè amygdalata, gelatinæ ac similia; horum enim adjumento fit, ut vel marasmo occubituri mox his aliquandiu exhibitis, rursus ægrotos *δισπασίας* ac vitâ donemus. Inde igitur est, quod profluviis quibusvis à salis acrimoniâ ortis, adsint, ex eo quòd salium congestionem seu vicinitatem sejungant, aciesque eorum obvolvunt: Tumoribus duris opem suppeditant, quando fibras tam leniunt, quam humores ab adhæsiōe extricant. Calculo ideo conducunt, quia ureterum diametrum multum ampliant; in ulceribus digestionem sunt auxilio, atque inflammationes, quæ dissipari nequeunt, in abscessus abire cogunt: Nutrimentum marcidis præbent; irritationibus quibusvis, sive in tussibus, sive in pruritu, sive in doloribus, obviam eunt: Febri hecticæ ideo consilio sunt, quâ salia quam maximè aculeata obvolvunt; articulis contractis subsidio veniunt; quoniam humoribus ita pertinacitè impactis primum à fibris extricatis, eæ deinceps quamprimum discinguntur, laxantur, ac muneribus usitatis tandem adsunt.

Flexilia vero non perinde præconiis efferimus, ac si nunquam aliquibus nocumento essent: Nam ubi largâ manu distribuuntur ac exhibentur, præcipuè si sint oleosa, nauseam introducere advertuntur: Hâc nimirum de causâ; quandoquidem musculorum, uti ex istis antagonistis expertibus liquidò constat, est, jugiter semet contrahere; proinde intestina, quorum tunica interna ac media musculosa est, ex trito naturæ more contrahantur, necesse est; inde erit, quòd edulia in temperamento sano segniter protruderentur, nisi quòd tam propter motum eorundem vermicularem, quàm alimentorum pondus contractionis inferioris resistentiæ fermè ita vincantur, ut chylus, ut fæces tandem deorsum ferantur: Esto igitur, fibras musculares superiores, per medicamenta oleosa paulò uberiùs sumpta laxari; quo major istarum laxatio est, eo languidior erit alimentorum protrusio; quinimo tandem adeò laxabuntur fibræ, oleosis madefactæ, ut resistentiæ momen-
tum

tum in fibris inferioribus, isti in superioribus longè prius fit, ut chylus ut scybala ibidem moras trahant, ut auctâ ab inferis resistentiâ, fibris autem supernis magis in horas etiam locum cedentibus, nausea ac vomitus horrendi frequentius obtingant; hinc fiet, ut olea sepiusculè ac ubertim propinata emetica evadant.

Galenus l. 5. c. 9. de Medicam. Facultat. Emollientium in cancris usum vituperat; *Hildanus* insuper *Cent. 1. Obs. 89.* tria exempla in hujus sententiæ ratificationem in medium affert; quocirca rem hanc aliquantò penitius perpendamus; in modum igitur sequentem argumentari nobis liceat; ex *Hippocrate*, cum *contrariorum contraria* debeant esse remedia, tumores duriores emollientibus seu flexilibus medicari oportet; cæterum cancri sunt tumores omnium durissimi: Oportet ergo eos emollientibus remediis sanare. Quandoquidem autem cancri sunt tumores adeò contumaces, ut nullatenus vel remediis qualibuscunque cedere comperiantur; necesse est, nosmet ab eorundem admotione prorsus contineamus; nam uti pars sana, non autem tumor iste Scleroticus medicamentorum adhibitorum efficaciam experitur, ita pars sana adeò ampliaretur exinde, ut ista tumoris ponderi tantoperè locum daret, ut mox increbresceret ipsius ambitus, veluti experientiâ quotidianâ erudimur. Hinc fortean est, quòd saturnina, quippe quæ fibrarum, cancrum circumdantium, tonum laxiorem prævertunt, cancris opem ferant.

Flexilium seu emollientium usum, in ophthalmiis ficcis seu inflammatis, deprædicat eximius vir Dr. *Coward in ophthalmiatriæ p. 163.* eorumque utilitatem hoc in casu quam sæpissimè nosmet experti sumus; quando enim hujusmodi remedia fibras nimium tensas discingunt, humidi mucosi secretionem denuò incitant, ita ut palpebræ rursus promptè moveantur.

Corollarium.

Decoctum Phthismicum.

℞ Rad. Chin. in taleolas sciss. ʒiſs. Rasur. C. C. Eboris. ana ʒj. Fol. Capillor. Vener. p. ij. infundantur per noctem

noctem in aq. bullient. lbxii. mane coquantur ad medias, m. f. Decoctum, cujus capiat lbß. cum Sacchari pauxillo, vel Rad. Eryng. Condit. q. f. vel Lact. Asinin. Cochl. vi. mane & vesperi.

Bochetum, fit herbas & ingredientia reliqua recoquendo in Aquæ fontanæ lbviii. ad iv.

OBSERVATIONES.

Ubi lac asinum parum cuiquam prodesse reperitur, decoctum hocce, humores noxios, acresque, qui pulmones exulcerant, obvolvendo, maximopere proderit: Quocirca seri acrioris stimulos obtundit, heclicasque inde ortas aufert; ast ut vera fateamur, nos nescire apertè profiteamur, quid fiat, ut ulcus pulmonum grande ullo modo remediis quibuscvis cedat; cum inspiratio ipsa unioni repugnet: Nam uti inspirationis causâ fit, ut vesicularum ipsarum parietes immane quantum distrahantur, ita ulceris, istis locis alicubi insidentis, labia eadem distrahentur ratione, nec idcirco unquam claudi poterint.

Linimentum Anodynum.

℞ Bals. Lucatell. ℥ii. Ol. Amygd. d. ℥i. Ol. Macis per Expressionem, Ung. Flor. Aurantior. a. ℥ii. m. f. Linimentum parti affectæ illinendum, Chartam emporeticam superimponendo.

OBSERVATIONES.

Linimentum hoc ab ipso præscriptum faustò novimus, cum thoracis muscoli, præ tussis vehementiâ, dolorosi fuerint; quando enim oleosum ac molle est, fibrarum tensionem nimiam laxat, ita ut cum tensio cedat, cum vasorum diametri amplientur, cum liquores, à tergo pressi, motus præpediti resistentiam vincant, cum demum fibrarum crispatio de viâ decedat; necesse erit, liquida denuò in motum cieantur, vasa subsidant, ac tandem dolores quiescant.

Unguentum Pacificans.

℞ Unguent. Sambucin. Butyro Maiali pp. ℥i. Ung. Populn.

Populn. ꝑ. Ol. Mac. ꝑ. m. pro Linimento, quo partes affectæ illinantur.

OBSERVATIONES.

Quòd unguentum hoc particulis oleosis potissimùm constet, humoribus in fibris passim subsistentibus idè motum conciliat, quia istas tam retundit, quam lenitèr usque adeo titillat, ut cum fibrarum emollitione, cum earundem stimulatione, humores ab ulteriori residentiâ expediantur: Tensione hunc etiam in modum sublata, dolores ferè confident.

Linctus Incrassans.

℞ Syr. Dialth. Ol. Lin. S. igne extract. Amygd. d. ana ꝑ. Sacch. Cand. ꝑ. m. f. Linctus, de quo capiat Cochl. unum vel duo frequenter. Vel,
℞ Ol. Amygd. d. ꝑ. Syr. de Alth. Capillor. Vener. ā. ꝑ. m. f. Linctus, de quo capiat cochl. i. frequentèr, urgente tussi.

OBSERVATIONES.

Veterum medicorum sententia linctus in Bronchias irrepsisse tulit, quem errorem facilè expunxit anatomia; cum enim aquæ tantillum, quinimo vel guttula, asperam subierit arteriam, quantos conatus, quàm magnas anxietates ciere cernitur? certò tamen constat tusses, linctibus devoratis, sedari; quî verò hoc fieret, paucis explicare lubet: Tusses ab humoribus aliquatenus pungentibus, vel laryngis seu asperæ arteriæ rimulæ exteriori vel bronchiis incubantibus oriuntur; ubi rimulæ infederint humores, statim ut ingeruntur eclegmata, titillatio quiescit; quod longe secus in tussibus à punctis bronchiarum parietibus evenire solet; necesse est, medicamenta iter in sanguinem prius faciant, quam bronchias contentis suis perquam molestis expediant, ne non fluida antea viribus suis imprægnent, quam fibras pulmonum membranas percellant, pituitamve excutiant. Quocirca quoties pituita glandularum oribus paulò pertinaciùs adnascitur, toties oleosa ac flexilia in-
tus exhibita istam refigunt; ac siquidem contrarietas re-
medio est, ita humores tenuiores tantoperè obvolvunt,
ut

ut crassiores fiant, ut facile deinceps elidantur, saltem ut pulmones à rosione tueamur. Non modò tussibus, sed calculo etiam idcirco auxilio sunt, quòd ureteres valdè dilatent, ita ut trusioni cedant.

Misturæ igitur hujusmodi laxant, lubricant, dolores leniunt, humorumque salinorum aculeos impense obvolvunt. Hunc etiam in modum sæpius eosdem in usus præscripsit.

℞ Ol. Lin. sine igne extract. ℥j. Syr. Balsam. Capill. Vener. ana ℥ij. m. f. Haustus mane & vesperi per triduum sumendus.

Electuarium Lavigans.

℞ Conserv. Flor. Violar. Conserv. Flor. Malv. ana ℥i℔. Gum. Arabic. ℥℔. Corall. r. pp. ℥i℔. cum f. q. Syr. de Symphyt. Simp. m. f. Electuarium molle de quo capiat quantitatem juglandis, horâ decubitûs quotidie (superbibendo cochl. iv. Julap. sequentis. ℞ Aq. Flor. Paralyseos, Lact. Alex. ana ℥vj. Aq. Pæon. comp. ℥ij. Sacch. parum. m. f. Julap.)

OBSERVATIONES.

Compositum hoc adeò est molle ac mucilaginosum ut aciditates ferinas resorbeat, ac proinde symptomata dira inde orta efficacitè prævertere soleat.

Quando sanguis humoribus acribus ita gravatur, ut dyfuriâ laboremus exinde, cum ardore, rosione ac punctione ejus comitibus assiduis; electuarium hocce ardori istiusmodi quam optimè finem dabit; sequens etiam ex *Fallopio* eidem instituto inserviet. z.

℞ Sem. Lactuc. Portulac. ana ℥ij. Sem. Papav. alb. ℥i℔. Endiviæ ac Acetosel. condit. ana ℥j. Sebest. Prunor. ana ℥ij. Amyl. ℥iv. Ebor. ust. ℥j. G. Tragacanth. Arabic. Glycyrrhiz. pulv. ana ℥j. Mucilag. Sebest. lbij. Sacch. Cand. Violac. ℥viij. m. & coq. in Q. S. Succ. Granator. & Sacch. f. Electuar. Dos. ℥ij. in die.

Si membrana ventriculi sensilis alicubi abraderetur, assumpta statim revomuntur; cum res huc pervenerint.

Electua-

lectuarius hoc tam humoris aculeos recondit, quam irritationem sedat; quinimò *Bartholinus* exulcerationi ventriculi gummi arabicum accommodari jampridem advertit.

Hæcicis gelatinosa ac mucosa convenire medicorum communi consensu ratum est; hinc est, quod lac asinum tantoperè istiusmodi laborantibus subsidio sit. Furientibus ideò opem ferunt, quia saliva pruriginem introducentia valdè irretiunt; psoræ vero non cuncta mucosa adeò specifica sunt, quin sulphur vivum vel flores ejusdem hunc in finem requirantur: Quinimò græcorum lepræ seu elephantiasi sulphurea ita parum adjuvant, ut nullis remediis usque huc notis cedere commendantur; ast semel depulsi, mox revertuntur: Quod ad *Rheseldti* specificum ex arsenico compactum, isti fiducia parùm adhibenda est, cùm sit tantoperè corrosivum, ut neutiquam tutò intùs sumi poterit: Ptyalimum etiam sæpius infausito instituimus, quandoquidem mensibus tribus quatuorve emensis, eruptio hujusmodi jugiter pedem referre solebat.

Quòd liquores spirituos, ac ardentes acres valdè sint, combibonum ventriculi adeò exinde ficcantur, ut fibræ ejus maximoperè tendantur ac ustulentur; hinc fiet ut tandem in inflammationes ac abscessus abeat; siquidem igitur flexilia liquorum ac potuum horum aciem refringunt; læsis exindè aliquoties subsidio venerunt: Quoniam muco abraço, fibris tensis, ac fermento deficienti, non aliâ methodo commodius, quam mucosis, occurritur. His autem præcedant evacuantia leniora, ut saburra ventriculo insidiosè incubans extrahatur, quibus coronidis vice, si spadanas exhibeatis, malo finem statuatis.

Mulierum, quarum menses immodicè necnon dolore stipati emanant, corpora bile vel humoribus impensè acribus certè scaturiunt; hujusmodi electuarius hocce, quippe cum fluxus excessum necnon fervorem minuatur, maximo erit auxilio. Cuticulam præ humore acri deglubitam ac derasam gummi arabico cum sero porcinoque misto jamdudum in aniculâ refarcivimus; ista enim propter tussis vehementiam urinam invitò dejecit, quæ tantâ acrimoniâ gaudebat, ut perinæum undique

undique excoriaverit, præ cuius angore dies ac noctes transegit inquietas.

Oculi humore acri in ophthalmiâ sæpiùs vexantur, uti à genarum excoriatione, palpebris erosio liquidò constat; electuarium hocce erit remedium alterans huic sanguinis statui accommodatum acri si; collyria adhibeatis, necnon mercurialia intus exhibeatis, ophthalmia hujusmodi filebit.

Fateamur verò necesse erit, medicamenta mucosa appetitum prostrernere; quando enim ista glandularum oribus quàm maximè adhærescunt, secretionem ventralem interpellant; quod si acidulæ propinentur, noxa hæc facilè præscindetur.

Suprà advertimus *flexilia* calculo renum profuisse; hic autem asserimus vesicæ etiam calculo ideo subsidio esse, quippe cum calculi grandiores aliquanto vesicæ mukum abradant, qui facilè nobis à magnâ mucicopiâ excretâ patefcit, estque mucus hic signum calculi vesicæ pathognomonicon; mucosa, cum mukum adjiciant, leniunt, ac salibus urinæ impedimento sunt, minùs ulcera ibidem introducunt: Quod si adhæc albumina ovorum agitata seu oleum amygdalarum ex syringâ per catheterem in vesicam injiciatis, erosionis discrimen feliciter antevertetis.

Unguentum è Spermate Ceti.

℞ Sperm. Ceti Ung. Aurantior. Ceræ alb. ā ʒij. Ol. Amygd. d. parum, m. f. Unguentum.

OBSERVATIONES.

Quoties variolarum scabies sunt quasi deciduæ, quæ cicatrices indecoras à se reliquerunt; unguentum hocce faciei illitum istas refigit, ita ut placidè posthac decidant; exhinc est, quòd, cum citra dolorem excidant, neque cutis tamdiu rubescat, neque cicatricum foveæ profundæ sint; nam siquid nos conjecturas faciendo valeamus, quum scabies usque eo cuti insederit donec exareat ac coëat, undique induratur; uti durities autem hæc tam altas agit radices, quàm supra cutim eminet, ita cicatrix, pro sanationis modulo, magis vel minus profunda erit: Cum chirurgi verò cicatrice non ante

antè cutim obtegunt, quam superficiei complanetur
ulcus; itaq; caveant medici, ne facies prius excabescat,
quam emineat scabies; in variolis autem malignis, ubi
humores valdè sunt acres, si citò excabescat facies, re-
pullulant pustulæ: Hoc autem in casu, lites inter au-
thores conciri videmus, num pustulæ secari debent;
quippe quòd erosio exinde prævertatur; è contrario
verò quoties materiam acrem ac rodentem diu cuti in-
sistere permittimus, toties tardius aliquanto decidunt
scabies, necnon hinc erit, quod foveæ profundiores
sint: Pustulæ igitur citò excabescentes atque exare-
scentes, vestigia minima; tardius verò exarescentes,
maxima, post tergum, relinquunt: Multis præter *Mayer-*
nium hoc videtur, quòd pustulæ in variolis malignis
secari debeant, hâc nempè de causâ, quòd historiæ
plurimæ testentur, ulcera propter humoris acris moram
sæpius introduci; quî vero hujusmodi tractentur, *Cri-*
ticon consulatis.

Emulsio Amygdalina.

R Decoct. Hord. lbj. Amygd. d. decorticat. n° x. f.
Emulsio, cui adde Aq. Cinnam. hord. ʒj. Sacchar.
parum, de quâ bibat ad libitum.

OBSERVATIONES.

Cùm potus hic diluat, sitim ac fervorem reprimat;
cùm sit dulcis, nutrit; quoties igitur delirii phrenitici
periculum nobis incumbit, sanguinis motum tantoperè
præpedit, ut καύμα, ut plenitudo, ut humorum infar-
ctus præscindantur: Quî igitur *Mortonus* rectæ ratio-
ni fecerit satis, remedia calidiora in febre intensâ ad-
ministrando, vix capi potest.

Stranguriæ febrili, ab epispasticis admotis excitatæ,
opem feret emulsio hæc, cui si semina papaveris albi
adjiciatis, longè erit efficacior; quippe cum opiata do-
loribus sublevandis clueant, additamentum hoc consul-
d fiet: Quantum ad ardorem, à gonorrhœâ virulentâ
excitatum, huic pauxillum salis prunellæ, vel etiam
spiritus salis additio, utramque faciet paginam; cavete
amen, ne spiritum acidum emulsioni adjiciatis.

Enema Emolliens.

℞ Decoct. commun. pro Clysterib. Emollient. ℥x. Syr. Violar. Mell. Mercurial. ana ℥i℥. m. f. Enema statim injiciendum.

OBSERVATIONES.

Parum discrepat enema hoc ab *enemate laxante*, quod videatis p. 96.

Ptisana.

℞ Passular. ℥ij. coq. in Aq. Hordeat. ℥i℥. Colaturæ fervid. affunde Liqueor. contus. ℥℥. iterum coletur, f. Ptisana, de quâ bibat ad sitim restinguendam.

OBSERVATIONES.

Quid sibi velit *Hippocrates* in libro de victûs ratione per τὴν Ptisanam (πρωάνη) parum ultra intelligimus, quam quod vox πρωάνη sit hordeum decorticatum à πρωσῶ decortico; quippe verò Ptisanæ hîc delineatæ vires æmulator, cùm perinde atque hæc febribus propositis ardentibus, morbisque acutis: lubricet, humectet, sitimque sedet; hujus ptisanæ vices geret.

Radix glycyrrhizæ plerisque ideò damno erit, quia præ dulcore suo ingrato, nauseam parit, quinimo sæpenumero anorexiam.

Ptisana *Luje* nobis hâc magis aridet, quæ hunc in modum conflatur.

℞ Decoct. Hord. cum Corn. Cerv. ℥vj. Decoct. alterant. ℥iij. Tinct. Flor. Violar. Bellid. ana ℥i. Syr. Cannel. C. ℥j. Julap. Rosar. ℥℥. m. f. Ptisana.

Item Apozema sequens *Morelli* hunc in finem proderit, quod est.

℞ Rad. Borag. Bugloss. ana ℥j. Fol. Lactuc. Portulac. Violar. ana m. j. Flor. Nymph. p. iij. Sem. iv. frigid. major. ana ℥ij. coq. in f. q. Aq. simp. colatur ibi℥. add. Syr. de Portulac. ℥ij. Acetos. simplic. ℥ij. Sp. Vitriol. ℔j. m. f. Apozema.

Apozema

Apozema hoc, cùm februm ardorem reprimat, sanguinisque motum refrænet, ejusmodi proderit; quoniam ubi primum motus efferus confidet, fluida pacatius in orbem flectuntur, atque secretiones, exindè subductæ, uberius deponentur; hinc fiet, ut saliva pro solito naturæ instituto rursus effluat, ut fibræ arefactæ humectentur, ut fitis demùm evanescat.

Quod si particulæ aculeatæ tussim urserint tenuem, ac jugiter irritantem, uvæ passulæ necnon glycyrrhiza, quippe quæ aculeos obvolvunt, acrimoniam delent; quando insuper lubricant, adhæSIONem pituitæ facile extergent; siquidem autem asthma oritur fermè à pituitâ vapidâ nimis, atque propterea non satis fibras pulmonales percellit, quod sale vacet; hujusmodi pectoralia his parum equidem conferent, cum fibras laxando, pituita neutiquam omninò excerneretur, quin ibidem suspiciosè pedem figeret.

Quantum ad hordeacea, quanquam aliquoties prodesse comperiantur; ea tamen idcirco incommodo sunt, quòd febre lentâ ac malignâ decumbentes haud impune istiusmodi devorant; quoniam spiritus jam depressi facile exindè obruerentur; præcipuè vero appropinquante crisi, ista quàm maximè evitanda sunt, cum sudores criticos evidenter reprimant: Hinc mirari subiit, quâ de causâ *Smetius in Miscellaneis* undas nivales tum deprædicaverit.

Bolus Hemorrhoidalis.

Rx Pulp. Cassiæ recens extract. ʒij. Flor. Sulphur. ʒß. m. f. Bolus horâ quartâ pomeridian. sumendus, & horâ decimâ mane, & superbibat haustulum, &c.

OBSERVATIONES.

Quòd ad hæmorrhoides cæcas, ubi tumores intus præcipuè elewantur; causæ istas generantes quam sæpissimè à scybalorum in intestinis morâ diuturniori pendere observantur; inde est, quòd, cùm vasa sanguinea premantur, fluida sua in orbem pellere nequeant; quin, uti appulsus fluidorum refluxum superat, ita partes intumescant, inflentur, necesse fit; sanguinis lentor item tumores urget: Tumoribus autem dolores super-

injiciuntur: Hujusmodi dolores, fæces proritando, fluida circumpellendo, quiescunt; cùm bolus autem hic fæces emolliat, necnon foris exhauriat; cùm humorum acrimoniam leniat, necnon istos dissipet, hæmorrhoidibus cæcis subsidio veniet, uti *Pulverino* p. 558. c. 62. jamdudum videbatur.

Colicæ non rarò ab humoribus acribus initium faciunt, five ii sint alcalini five acidi, hic non disceptamus; quando particulæ autem sulphurææ utramque obvolvunt acrimoniam, utrique speciei auxilio erunt; hinc bolus hic tam biliosæ, quam pictonum colicæ ad-erit; necnon uti humores immutatos deorsum fert, ita utramque faciet paginam.

Sulphur in balsamum digestum tumorem huncce tam lenit, quam dissipat; cui ovi vitellus cum spiritu vini mistus olim utilis fuit; quocirca cùm humores à fibris expediat sulphur, atque eos leniat, tumoribus ac doloribus commodo erit.

Secundum *Bohniū* oleosa ac flexilia propterea sanguini acri auxilio erunt, quod aculeos recondant; hinc est, quod nonnulli sulphurea in phthisi valdè deprædicent; quamplurimi enim, parentibus phthificis prognati, acrimoniam innatâ, verbo sit venia, ab infantiâ jam usque primâ infestantur; quæ cum invaluerit, fibras erodit teneras atque adeò pulmones ipsos; his sulphur utile erit, si tamen in hæcticæ discrimen non inde veniant.

Asthmati humido, quando sanguis ad effervescentiam præceps est, quanquam pituita bronchiis firmiter adhærescit, solenne est, ut calor nimius seu periodicus feri partes tenuiores evaporet, adeò ut ejus residuum in gluten fere abeat; cui adhærescentiæ bolus hic ita occurrit, ut pulmonum bronchiæ saburrâ lentâ quam optimè expediantur: Nam veluti naves retinaculis amotis, in undas ex asseribus præ sevo facilè prolabuntur, ita pituita ex glandulis præ oleosis, fursum fertur: Sulphurea non adeo grandes in asthma *ἀσθμία* cient, quin facilè per aquea, mucosa, atque acida compesci queant; hic autem notandum est, quod incidentia cautè exhibenda sint, exhinc, nimirum quod uti supra advertimus, feri copiâ evaporatâ, illius residuum erit lentum.

lentum, ac proinde ad adhæſionem idoneum; è contrariò etiam, ſi remedia nimis aquea frequentiùs ingeramus, pituita eò erit uberior longè, ac proindè bronchiæ ſeri quantitate obruentur; ex quo fiet, ut aſthma diutiùs aliquanto protrahatur; quando, nimirum, partes ſeroſæ ad exudandum è glandulis pronæ ſunt: Humoribus autem nec, ab attenuantibus nimis, incrassatis, nec à ſero nimio tenuioribus factis, aſthma tandem, à Bechicis, lubricantibus nempè ac incidentibus prudenter miſtis, conquieſcet, præcipuè vero ſi his lenientia adjiciamus.

CAP. VI.

Remedia composita, mixta.



Aſtenus de remediis *ſimplicibus* ubertim diximus; jam reliquum eſt, ut de *mixtis* etiam paulisper verba faciamus. Quando igitur per remedia *mixta*, iſta intelligimus præſcripta, quæ non remediorum farraginem, inter ſe virtute cohærentium, ſolummodo capiunt, verum quæ inter ſe longè diſſidere omnes nôrunt medici; neceſſe eſt, præſcripta in infinitum ferè variantur; ſiquidem enim cuique indicato remedium congruum, ſeu potius contrarium, accommodandum eſt; quoties indicata mutari contigit, toties præſcriptum variandum eſt: Nec miretur quis, nos hic per Combinationum normam certò ſcire cauſas viginti & unam 25545471085854720000 viſciſſitudines pati, quot igitur cauſæ 400 variationes ſubire poſſunt, jure merito peti quit; tot certè, quot pagina haud ſufficeret; nec ſigmenta hic apponimus, nec vobis obtrudimus; quoniam hoc veriſſimum eſſe ſanctè affirmamus, ac non modo compertum habemus, verum facilè vobis commonſtrare poſſumus; quippe quæ, experienciâ duce, jampridem exploravimus; quæque non medicorum quiſquam pro-

ptereâ recusabit, quòd argumentis apodicticis, praxi petitis, liquidò demonstrari possint: Hoc autem solaminis tirones potentur, quòd, causis fixis earúmque divisionibus probè notis, morborum vicissitudines facîle elucescant; his autem non cognitis, istis eæ perpetuò delitescent: Quamobrem ut pensum hoc ii commodiùs perficiant, inceptum istud experientiâ fretum jamdudum ab anno nimirum 1696 ad 1717 usque pro viribus meditati sumus, quod aliquandò, juniorum gratiâ, emittemus.

Quandò igitur palam fit, quî remedia composita non simplici at multifariâ gaudent virtute, horum nonnulla ex more nostro ab authoribus excerpta hîc jungemus.

Rx Vin. alb. ℥ij. Ol. Vitriol. gr̃. iij. m. *In Ischuriâ.*

Mistura hæc conflatur ex spiritu empyreumatico acidoque concentrato; quorum uterque glandulas renales ita proritant, ut urina prodeat; hoc autem observatu dignum est, quòd diureticum efficacius nostro julapio diateffaro famoso (*Punch* dicto) vix reperiemus, quod mistura hæc aliquatenus æmulatur.

Rx Rad. Acor. ℥β. Fol. Menth. m. β. Nuc. Cupress. Myrtill. Gallar. Balauft. ana ℥j. Rosar. rub. p. j. coqr̃. in Vin. rub. & Aq. ferrat. ana p. æ. & q. f. f. colatura, cui add. alumin. ℥β. m. f. mistura externè usurpanda. *In Incontinentiâ Urina.*

Mistura hæc est tam aromatica quam styptica; quocirca cum humidatem, per quam laxiores fiunt fibræ, exhalet, tum fibras, præ vi astrictoriâ, constringit; quâ de causâ fit, ut sphincteris fibræ pristinum resumant vigorem, seque solito more contrahant, ac proindè contra urinæ pondus renitantur.

Rx Nuc. Cupress. Myrtill. torrefact. Rasur. Ebor. Coriand. Corall. rub. Karab. ana ℥ij. Spod. ℥j. Rad. Cyperi ℥β. Syr. è Cortic. Citri q. f. m. f. Electuarium. *In Incontinentiâ Urina.*

Præscriptum hoc *Riverii* est stypticum, aromaticum, ac arenotum seu testaceum; exhinc fit, ut fibras contrahat, humiditates evaporet, particulasque magis sero-
sas resorbeat; ac proinde elasticitatem, quam humi-
ditas laxitasque diruissent, resumit sphincter, ita ut
ponderi parum antè cedat, quam vesica satis lotii ac-
cumulaverit.

Rx Vin. ℥vj. Origan. Sinap. ana ℥j. infundr. add.
Sapon. Venet. ℥ij. m. f. Fodus. *In Paralyfi.*

Fodus hic est spirituoso-aromatico-salinus, motum
humoribus passim sustentibus impertit, motum fibris
oscillatorium communicat, ac proinde fluida stagnantia
rursus sanguini committit.

Rx Aq. Cinnam. ℥j. Menth. ℥iv. Syr. de Mecon.
℥iv. Theriac. Androm. ℥j. Corall. rub. ℥β. m.
In Vomitu.

Mistura hæc est cardiaca, absorbens atque opiata;
unde fit, ut spirituum cumulo adjiciat, acida ventriculi
concentrata recondat, sensationemque molestantem seu ir-
ritationem pacet, ac proinde vomitionem, causas ejus
conjunctas amovendo, tollat.

Rx Aq. Foeniculi Melissæ ana ℥iβ. Syr. Dialthææ
℥j. Spir. Terebint. ℥β. m. *In Flatu Splenico.*

Mistura hæc oleosa, aromatica ac volatilis est; ac
proinde fibras rigidas discingit, flatuque exhalat; nam
citra particulas laxas, volatiles vix aut ne vix in inte-
stinorum cellulas penetrarent.

Rx Castor. ℥j. Lact. q. f. m. *In Macie à Vermé.*

Præscriptum hoc *Zacuti Lusitani*, est dulc-oleoso-vo-
latile; ex quo fit, ut, sub nutrimenti specie, vermes e-
necet; quibus semel enectis; more solito nutrantur
infantes, necesse est; ac ita macies nutritioni, accre-
tioni cedit.

Rx Sal.

℞ Sal. Mart. ʒj. Pulv. oc. Cancror. ʒj. G. Tragac.
q. s. m. f. Pilulæ. *In Hypochondriacismo.*

Sanguis melancholicorum ferme acidus est; vel austerus vel volatilis; pilulæ hujusmodi, cum sint testaceæ ac styptico-dulces, luctas ab acido ortas reprimunt, necnon acidum immutant; hinc eveniet, ut effervescentiæ acido prognatæ, pacentur, acidumque ipsum resorbeatur ac retundatur, ac tandem malo hypochondriaco calido finis aderit.

℞ Corall. rub. Limatur. Mart. oc. Cancror. ana ʒß. Croc. ʒß. m. capiat in jusculo pingui. *In Bulimiâ.*

Præscriptum hoc testaceum ac oleosum est; hinc fiet, ut acidum præacutum tam obvolvatur exinde quam retundatur, quod bulimiæ principium dedit.

℞ Corn. Cerv. Ebor. Corall. rub. Sal. Absinth. ana ʒj. Gelatin. Corn. Cerv. ʒv. m. f. Pilulæ. *In Febre Erraticâ, Scorbaticâ.*

Pilulæ hæ sunt alcalino-mucosæ; hinc salia acida perinde obvolvunt, atque immutant; quæ rubores, luctas atque effervescentias scorbuto solennes suscitare solent; quoties enim fit, ut aceto sumpto ex improviso facies exinde erubescat?

℞ G. Galban. Ammon. Opoponac. ana ʒj. Flor. Sulphur. Myrrh. r. ana ʒß. Caphur. ʒj. Ol. Liliior. alb. Axung. Anat. ana ʒvj. Ceræ q. s. m. f. Unguentum. *In Mammis scirrhis, Sarcocèle.*

Quoties particulæ lentæ ac terrestres fibris impinguntur adeo ut fluida ibidem subsistant, toties tumor subsequitur durus, qui *Scirrhus* audit; nisi fibræ, rigidiores factæ, laxentur, succi contenti ab adhæsione expediantur, atque motus progressivus denuò impellatur ac restauretur, tumor istiusmodi haud evanescet; cum
emplastrum

emplastrum autem hoc particulis constet oleoso-volatile; fibras discingent eæ, adhæsioni levamento erunt, fluidis subsistentibus motum reddent, ac proinde scirrhis finem dabunt.

℞ Cepar. tost. Rapar. tost. ana q. v. cum Terebinth. q. s. m. f. Cataplasma. *In Pernionibus.*

Cataplasma hocce oleosum ac attenuans est; hinc cum perniones doloribus slipentur, propter humorum residentiam in fibris tendinosi; particulæ ejus oleosæ doloribus aderunt, atque particulæ ejus volatiles humoribus ibidem stagnantibus motum reconciliabunt; hinc perniones huic remedio cedent; si tamen non multum exulcerentur; quanquam terebinthina insuper ulceri conferet; tamen si valdè ulcerentur, aliæ occurrunt intentiones hæc nobis impræsentiarum supersedendæ.

℞ Flor. Sulphur. ʒj. Pulv. Heder. terrest. ʒβ. Syr. Diasulphuris q. s. m. f. Boli. *In Empyemate.*

Mistura hæc est oleoso-attenuans; inde est, quod meatus lubricet, ac proinde materiæ putridæ ac purulentæ expectorationi adjumento erit; cum particulæ autem attenuantes citius virtutem suam exerant, necesse est, irritatio prius initium sumat, quàm fibræ hospite suo molesto expellantur.

℞ Resin. Pin. ʒj. Ol. Terebinth. ʒij. G. Elem. ʒvj. m. f. Emplastrum. *In ulcere externo.*

Siquidem ulcera non sanantur citra materiæ saniosæ evacuationem; atque uti hoc fieri nequit, nisi emollio unà cum irritatione adsit; ita fibræ irritatis ac humoribus malaxatis digestio perficitur; hos in fines emplastrum hoc valdè conducet; ac proinde ulcerum labiis deterfis, detumescentibusque, ea mox cicatrice obduci queunt.

℞ Emp. de Cicutâ, Melilot. ana ʒj. Sal. Armoniac. ʒj. Labdan. ʒiβ. Bals. Judaic. ʒij. Unguent. de

de Cicut. Hildan. Ceræ ana q. f. m. f. Emplastrum. *Pro Scirrho Hepatis.*

Scirrhus hepatis, qui per moras invaluit, medicamenta ineptè admoveamus; quinimò scirrhis hujusmodi emplastra, unguenta, & reliqua infausstò semper præscripsimus, neque introsumpta his hilum profuere, quin in hydropes jugiter abiêre. Si tamen emplastra unquam conferre queant, huic cum laxet ac dissipet, certè cedent scirrhî.

℞ Colophon. ℥ij. Myrrh. ℥iiss. Opii Thebaic. ℥ij. m. pro Glandibus. *In Ani dolore à Dysenteria introducto.*

Opiata dolores pacant, gummi materiam purulentam educunt; quocirca ulcere deterso ac exonerato, dolore interea quiescente, morbi longè à se diversi remediis his tandem cedent.

℞ Aq. Fœnic. d. ℥j. Antim. Diaphoretic. ℥j. Sacch. q. f. m. f. Haustus. *In Flatu contumaci.*

Misturâ hâc *Hartmanni*, Dominam quandam nobilem flatu contumaciori laborantem sanavimus, postquam tam ab aliis medicis quam à nobis, remediis quamplurimis incassum attentatis iisque pomposis satis, fatigata fuerat; porro adeo intumuit ipsius abdomen ac simul induruit, ut hydropis affuerit metus. Cum flatus idcirco sæpe numero ab acido oriantur, isto everso flatui finis aderit.

℞ Chærefol. Fœnic. virid. ana q. v. Mell. q. f. m. f. Cataplasma. *In Lactis Thrombosi.*

Quoties lac alicubi in mammarum tubulis lactiferis subsistit, toties thrombosis fit; cui occurrendum est per medicamenta volatilia unâ cum mollibus mista; hinc enim fiet, ut fluida denuò in orbem flectantur, ut fibræ laxentur, adeò ut sanguini à retrò pellenti cedant, ac proindè ut lac vel rursus sanguini committatur, vel exugendo aptius evadat.

℞ Elix.

℞ Elix. Propriet. sine acido ℥i℞. Tinct. Corall. ℥ij.
Opobalsam. ℥℞. m. capiat gr^{ss}. xx. *In Lienteriâ.*

Lienteriæ ab obstructione vasorum lacteorum, necnon à fibris intestinorum laxis initium faciunt; cum mistura hæc igitur ex aperientibus necnon stypticis una mistis confletur, perinde obstructions referat, atque fibras laxas nimis tendit.

℞ Syrup. Dialthææ ℥ii℞. Tartar. alb. ℥℞. Aq Petroselin. ℔j. m. capiat cochl. aliquot. *In Nephritide.*

Mixtura hæc est mollis ac salina, ac proinde ureteres patulos efficiet necnon ita proritabit, ut calculum minorem expellat.

℞ Asæ Foetidæ, Castor. ana ℥℞. Sal. Cardui benedict. Croc. Anglic. ana gr. vj. Opii. gr. ij. cum Syr. Artemis. q. s. f. Pilulæ n^o xij. capiat iv. (vj.)
Ad præveniendum paroxysmum Hystericum.

Ex particulis volatilibus, oleosis opiatisque conflantur pilulæ hæ; inde est, quòd spiritibus segnitè circumactis motum concilient, explosiones, si velitis, sedent: Ac proindè paroxysmo hystérico allevamento erunt, imò convulsionibus omnis speciei præstò sunt.

℞ Pulp. pomor. assat. q. v. trajiciantur per Setaceum. add. Camphor. ℥j. Croc. ℥℞. Opii gr. ij. m. f. Cataplasma. *Pro Dolore oculi.*

Dolores fermè oriuntur ab humoribus acribus partes membranofas fodicantibus; hinc fit, ut remedia flexilia ac opiata hanc acrimoniam interea retundant, dum camphora humores ibidem congestos dissipat.

℞ Aq. Chamæmel. Puleg. ana ℥j. Spir. Junip. ℥ij. Tinctur. Castor. ℥j. Laud. opiat. gr. ij. Syr. Artemis. ℥vj. m. detur cochleatim. *In Torminibus à Partu.*

Tormina

Tormina subinde sunt adeo à partu atrocia, & fibras uteri tantoperè corrugant, ut lochia sæpius exinde subsistant; salia igitur volatilia oleosa hujus misturæ interim humorum fluxum revocabunt, dum opiata irritationi ac dolori pro virili medicantur: Hinc erit, quòd, doloribus sedatis, fluxus pedem referat.

Rx Aq. Spadan. Germanic. Pauhontii &c. ℥ij. Bals. Gilead. (in Vitello ovi solut.) ℥ss. Sacch. Crystill. q. s. m. f. Emulsio pro potu communi. *In ulcere Renum.*

Ordo ulcera sanandi hic est, ut detergeantur, digerantur ac cicatriscantur; cum deterfus irritationem sub se comprehendat, necnon emollitionem; fieri non potest, quin humorum saniosorum effusio sat copiosa fiat; cum aqua seu acidulæ, sint stypticæ meatum demum occludent apertum, ac proinde statim ulceri benigno finis aderit.

Rx Porri, Bacc. Myrtill. ana q. s. coq^r. in Vino in Cataplasmatibus consistentiam. *In Bronchocele.*

Tumor iste *Bronchocele* dictus est atheroma seu tumor cysticus asperæ arteriæ cartilaginibus externis insidens; ex caseosâ chyli parte ibidem subsistente prognatus, qui quotidie augefcit; adeoque subinde intumescit, ut palearis bubuli instar propendeat ac diffuat. Morbus inter Alpium incolas epidemicus est, hinc *Juvenalis* Satyrâ 13.

Quis tumidum guttur miratur in alpibus?—

Mistura hæc est oleoso-spirituoso-styptica; quocirca coagulum malaxat, illudque fibris expedit; partes fibrosas tantoperè irritat, ut fluida, subsistendo ferme solida facta, denuo fundantur ac in motum cieantur; ac demum particulis suis stypticis ita omnem fibrarum dimensionem minuit, ut eæ constringantur valdè atque in tonum primævum redeant: Hunc in modum morbus hujusmodi, quamdiu recens est, sublevatur; quoties enim radices egerit paulò altiores, toties medelam
remediis

Remediis externis vel internis frustra molimur, quando operationi ac extirpationi unicè cessurus est.

℞ Unguent. Enulat. ℥j. Camphor. Sulphur. Sacch. Saturn. ana ℥j. Sal. Tartar. ℥ss. m. f. Unguentum. *Pro Favo, Achore, Tineâ.*

℞ Butyr. Salit. Axung. Porc. ana ℥j. Sulphur. ℥ss. Merc. viv. Salivâ extinct. ʒj. Vitriol. crud. ʒj. m. f. Unguentum. *Pro Favo, Achore, Tineâ.*

Eruptiones hujusmodi sunt scalia sanguinis tartarea cuticulæ superficiei adnascencia; quisquis idcirco istis medicari voluerit; necesse est, scalia exhauriat, illa immutet, ac topica simul adhibeat: Remedia autem externa istis auxilio sunt, quòd, cum particulis volatilibus humiditates evaporent; particulis oleosis tubercula refrigerant, ac demum cum particulis stypticis exudationes posteriores præripiant, fibras in tonum primævum convergent.

℞ Decoct. Calc. viv. ℔ss. Aq. Rosar. ℥j. Merc. dulc. gr. xv. Sacch. Saturn. gr. iv. m. f. mistura. *In Scabie.*

℞ Merc. præc. alb. ℥j. Unguent. Pomat. ℥j. m. f. Unguentum. *In Elephantiasi, Pustulis faciei, Herpete, Serpigine, Scabie venereâ.*

Remedia hæc scabies omnigenas eadem methodo inferri nobis patefaciunt; quò cuti verò altius insedunt, eò major oleorum quantitas, ad refrigerandas adnasciones, requiritur, necnon etiam volatilium, eò, nimirum ut humiditas evaporetur; (saltem testaceorum, uti sunt cerussa, creta;) styptica autem continuo eò requiruntur, ut feri falsi extillatio præcaveatur; mercurialia igitur, cum styptica sint valdè, maximoperè conducunt.

℞ Aq. Mirab. ℥ij. Theriac. Androm. ʒij. m. f. mistura. *In Singultu.*

Quòd singultus sit motus convulsivus, nulli dubitamus; quî autem fiat, paulisper perpendendum est; inter singultiendum fortitèr ac ex improvîsò inspiramus; hinc fit, ut diaphragma deorsum nonnihil feratur; cùm singultûs autem causa conjuncta in ventriculo plerunque deliteat, œsophagus motu convulsivo deorsum ferri videtur; cum per diaphragma igitur œsophago transitus pateat, isto nonnihil retracto diaphragma isti parum cedat, necesse erit, atque hinc erit, quòd singultientes, inspirantes, invitò pronomen *hic* pronunciare coacti sint.

℞ Decoct. Cicer. rub. ℥iv. Aq. Vit. ℥ij. Pulv. Miliped. ʒβ. Sacch. q. s. m. f. mistura. *Pro Calculo.*

Mistura hæc à D. *Chesneau* mutuata, est flexilis, spiritiosa & volatilis; hinc est, quòd perinde meatus lubricet ac dilatet, atque adeò proritet, ut calculo minori exitum paret.

℞ Mell. Rosar. ℥j. Spir. Sal. q. s. ad acorem gratum. m. f. mistura. *Pro Gingivis putridis, ulceratis; aphthis.*

Quòd gingivæ putridæ sint simul fungosæ, spiritus falis acrimonia interea carnem exedit luxuriantem, dum mel rosarum per partes suas flexiles ac stypticas fibras exonerat, easque sanie suâ expedit, ac tandem aperturas claudit, & cicatricem inducit. Aphthæ nonnullæ sunt adeo malignæ, ut impensè serpent; quam serpentiam spiritus acidus apprimè reprimat.

℞ Cinnab. nativ. ʒj. Carbon. Silic. ʒij. Benzoin gr. v. Mastich. ʒβ. m. pro suffitu. *In Ozæna Gallicâ.*

Cum suffitus hic sit sulphureo-salino-styptico-mercurialis, fibras faucias irritando exonerat, easque demum claudit, resarcitque; quòd si os cribrosum vel vome fit cariosus, quid suffitûs vel externa efficacissima molimur? osse enim putrido non exempto, frustra melam attentamus.

℞ Spi

Rx Spir. Nitri dulc. ʒj. Spir. Anis. q. f. m. f. mistura, è qua capiat gr̃. xx. xxx. *In Cardialgiâ Calidâ.*

Quoties salia alcalina vel etiam spiritus empyreumatici cardialgias introducunt; toties acida contulisse experti sumus; cum mistura autem hæc sit acido-spirituosa, temperamento alcalino erit utilis, quia per sulphur ac acidum particulas alcalinas obvolvitur immutatque.

Rx Antim. Diaphoretic. ʒj. Theriac. Androm. ʒj. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus, *ὡς τὸ τῆς Ἐπιγαστρὸς Σπασμῶ* (seu, *Colicâ Iliacam emulante.*)

Valdè bolum hunc deprædicat author, è quo excerpimus; colica in Indiis Americanis paulò frequentior est, quòd succum limonum acerbum ubertim propinent; cui aciditati, seu potius acerbitati, bolo hoc optimè occurritur; quoniam antimonium acidum probè resorbet, interea dum opium dolores sedat; hinc est, quòd nonnulli balsamum peruvianum præconiis efferant, ex eo quòd acidum potentèr immutet recondatque.

Rx Unguent. è Plumb. è succo solani ana ʒj. Aq. Rosar. ʒʒ. m. in mortario plumbeo, f. Unguentum. *In Polypo Cancroso.*

Rx Succ. Solan. agit. in mortario plumbeo q. v. Camphoræ parum, m. f. Unguent. *In Cancro ulcerato.*

Quanta chirurgi quidam empirici in cancris pollicentur? at quam impudentèr agunt? *Gendron Des-Haies* anodyna deprædicat; quibus si styptica adjiciatis, quantum in nobis est, in medelam incubuimus: Quid enim superest agendum, cùm dolorem pacaverimus, ac ipsius augmentum præciderimus? an camphora hic admisceatur, quod sit anodynum, haud asserimus. *Hippocrates Aphorismo 38. Sectione 6.* hæc habet verba, *μη διεγερθεὶς βέλτιον* (seu cancris non sanare optimum est;) quis

quis vero cancro confirmato mederi potest? vult igitur *Hippocrates*, canceri medelam moliri ineptum esse; atque idcirco labore hoc certè nobis supersedendum est.

℞ Ol. Tartar, p. del. ℥ij. Ceruss. ℥iij. Ol. Amygd. d. q. s. m. f. Linimentum cosmeticum. *In maculis faciei.*

Macularum materiam viscoso-acidam depellit, nec non faciem colore venusto decorat linimentum hoc.

℞ Terebinth. venet. 2℔. Sulph. viv. 9℔. Sem. Sinap. gr. v. m. *In Asthmate humido.*

℞ Syr. Dialthææ. ℥iij. Flor. Benzoin. 9℔. m. *In Asthmate humido.*

℞ Styrac. Calamit. 3℔. Spec. Diaireos 3j. Extract. Glycyrrh. Oleo Anis. Malaxat. q. s. m. f. Pilulæ. *In Asthmate humido.*

℞ Elix. Mell. cochl. j. Sp. Volat. Oleos. gr. vj. m. f. mistura. *In Asthmate humido.*

In asthmate humido, particulæ viscosæ bronchiis firmiter adhærescunt, nec inde excutiuntur, nisi exhibeantur volatilia ac oleosa; quum hæc fibras ac glandularum ora pituitâ expediunt, illa vero adeo fibras succutiunt, ut expectoratio feliciter progrediatur: Nam pituita incidentibus nimium exhibitis non est incrassanda.

℞ Sal. Vol. Oleos. 3℔. Laud. liq. ℥iij. m. f. mistura. *In Asthmate Sicco.*

Quandoquidem asthmata ficca sunt convulsiva, ac proinde nervi paris octavi ac noni contrahuntur; ista contractio fit plerunque ab acido nervos irritante; hinc fit, ut acido sal volatile conferat, irritationi vero opiatum.

℞ Sal. Mart. oc. Cancror. ana 9℔. Tart. Vitriolat. gr. xv. Sal. Prunell. gr. vj. Spec. Diarrhod. Abbat. 9℔. Sacch. alb. 3j. m. f. Pulvis. *In Astrophia Infantum.*

Cum

Cum pituita acido-viscosa seu vitrea vasa lactea ob-
uret, infantibus nutrimentum deest; remedia absor-
bentia acidum pituitæ obvolvunt; salia mixta pitui-
am incidunt, atque aromatica obstructions aperiunt;
causis conjunctis ita obliterated, ac nutritionis obstaculis
motis, chylus denuò sanguini committitur, & infantes
nox nutriuntur.

℞ Ol. Amygd. d. ℥ij. Bals. Peruv. gr. x. Syr. Di-
alth. ℥j. m. f. mistura. *In Calculo Renum, Sputi
suppressione.*

Ecce exemplum, ex quo patet, quæ meatus lubrici
sunt; quæ irritatio morbis his subsidio veniat; nam
adhæsiōne liberantur humores, vel extranea, perinde
utque sputum ac calculus irritatione urgentur.

℞ Spermat. Ceti gr. x. Flor. Benzoin. gr. v. Sal.
Succin. gr. iij. Laud. opiat. gr. j. Bals. Peruv.
q. s. m. f. Pilulæ. *In Tussi pituitosâ, glutinosâ, at
irritante.*

Pilulæ hæc sunt volatiles, oleosæ necnon opiatæ; quo-
rum circa pituitam refigunt, adeò ut facilè expuatur; irrita-
tionem efficacem interea sustentant; dum opiata tam
irritationem vehementiorem anteverunt, quàm hu-
morum influxum uberiores præcidunt, demumque
dolores pectoris tollunt.

℞ Sem. Melon. Excort. Papav. alb. ana ℥i℥. Sem.
Card. ben. 3v. Aq. Card. ben. Papav. Stercore
equino imprægnat. a. q. s. tundantur simul in
mortario, f. Emulsio. Colatur ℥i℥. add. dent.
Apri mandib. Lucii. ana ℥j. edulcoretur, m. f.
Emulsio. *In Pleuritide.*

Emulsio hæc est aperiens ac opiata; hinc fit, ut
otum intestinum ac luctam pleuritidi solennem sedet,
que ac unâ obstructions lenitèr aperiatur; quibus indi-
cationibus in pleuritide, ex *Waldschmidio*, præcipue no-
is incumbendum est, uti ex infra scriptis patebit, z.

℞ Aq. Card. bened. Papav. erratic. ana ℥ij. Annum
Diaphoret. ℥j. Laud. opiat. gr. j. Syr. Papav.
Erratic. ℥ij. m. f. Julapium. *In Pleuritide, sexta
quâque horâ.*

℞ Aq. Flor. Paralyf. Lactuc. ana ℥iij. Oc. Cancror.
℥℔. Syr. Papaver. ℥℔. m. *In Pleuritide.*

Perinde dolor ab opiatīs compescitur, atque vigiliæ
abiguntur.

℞ Testar. ovor. Calcin. gr. xvj. Vitriol. Mart. gr.
vj. m. f. Pulvis. *In mensibus nimis.*

Eximius vir Theod. Craanen pulverem hunc, octies
repetitum, mensium fluxum immodicum certò refræ-
nare affirmat; quando enim tam resorbet quam con-
stringit, necesse est, sanguinẽm incrasset, ac vasõrum
ora corruget.

℞ Cepar. sub Cinerib. tost. q. v. misc. cum Theri-
ac. Androm. q. s. m. f. Cataplasma. *In Carbu-
culo, Bubone.*

℞ Summit. Rut. m. j. Ferment. acris ℥j. Fic. veter.
nº iv. Piper, alb. ℥j. Sal. commun. ℥℔. m. *In
Carbunculo, &c.*

Tumores vel dissipari vel maturari debent; cum car-
bunculi ac bubones verò sint *tumores venenati*, mate-
riam virosam rursus sanguini committere perniciosum
esset; quocirca cum cataplasmata hæc consistant parti-
culis irritantibus ac oleosis, volatiles interea fibras irri-
tant ac proinde humorum affluxum accersunt, dum o-
leosæ maturationi conducunt; hinc eveniet, ut humo-
res criticè expellantur.

℞ Sulph. crud. Ciner. Sarment. vitis, Sal. Gemm.
ana ℥ij. Farin. Fabar. ℥ij. Acet. ℥j. Tereb. Cer.
ana q. s. cum Ol. Nuc. m. *Pro OEdemate.*

Particulæ salino-sulphureæ humores dissipant, fibras constringunt, easque irritant; ex quo fit, ut humores tenuiores forinsecus evocentur ac in auras avolent; ut reliqui sanguini committantur, ut, fibris constrictis, partium tonus redeat firmus ac primævus.

℞ Spir. Vin. ℥iv. Sapon. Venet. ℥ij. Camphor. ℥j.
m. *In Arthritide vagâ.*

Mistura hæc est oleoso-spirituoso-volatilis; quamobrem humores impactos dispellit, dolores sopit, ac proinde ita causis arthritidis vagæ conjunctis repugnat, ut ea quamprimum huic cedat.

℞ Spec. Diacym. ℥j. Nitri depurat. ℥j. Ol. Cym. gr. iij. m. pro tribus dosibus. *In malo Hypochondriaco.*

Cum sit mistura hæc aromatico-acido-salina, flatus evaporabit, salia aculeata obvolveth, ac proinde contortionibus ac torminibus, flatibus hujusmodi ortis, obviam ibit.

℞ Flor. Lamii alb. m. β. Rad. Cyperi Galang. ana
℥β. Flor. Ros. rub. m. j. coqr. f. Decoct. *Pro fluxore albo.*

Particulæ volatiles decocti hujus massam effoetam, pituitosam tenuant, inciduntque, ac per urinam vehunt; at stypticæ fibras firmant, & glandularum ora occludunt; hinc fiet, ut fluxui huic finis adfuerit: Quod si per semestre spatium duraverit fluxus hic, raro aut nunquam remediis vel maximè pomposis cedit.

℞ Butyr. insuls. ℥ij. Vitriol. alb. ℥ij. m. usurpetur per tres dies; tum eluatur cum lixivio de Beton. Levistic. & Hyperic. m. *In Porrigine Capitis.*

Suprà advertimus olea scabies refigere, attenuantia humiditates exhalare, ac styptica demum partes faucias

cias cicatrice obducere; quocirca hoc superfedeamus labore.

℞ Cran. Human. pp. Ungul. Alc. Corall. rub. Cinnab. Antimon. Diaphoretic. Martial. ana ʒss. Croc. gr. xv. Camph. gr. iij. Opii. gr. iv. m. f. Pulvis. *In Convulsionibus.*

Citra acidum aut acre convulsiones vix aut ne vix introducuntur; testacea ac absorbentia terrea interim acidum resorbent, dum opiata contractiones laxant; ac proinde convulsiones citò terminantur.

℞ Aq. Cinnam. ʒij. Sal. Urin. Vol. ʒss. Syr. Li-
quorit. ʒss. m. *In Catarrho suffocativo, ad Pus
exantlandum.*

Mistura hæc irritat, adhæSIONem extergit; quocirca cum bronchiis hæreat, simulque desit irritatio, valdè expuitioni conferet.

℞ Aq. Sambuc. ʒij. Sp. Vin. rect. ʒss. Troch.
alb. Rhas. ʒss. Camphor. ʒss. m. *In Erysipelate.*

Humorum impactionē necnon dolori per hanc misturam probè occurritur; cūm erysipelas sit humorum biliosorum accumulatio, dissipationi cedit; quòd tensionem introducat, mollibus, flexilibus, opiatīs locum dat.

℞ Sevi ovin. Cremor. Lact. ana. ʒj. Cret. alb. ʒss.
m. *In Excoriatione.*

Excoriatio vel fit à partium affric̃tu, vel à salibus acutis corium dilaniantibus; salia flexilibus obvolvuntur, interea dum creta exiccat, ac cicatrice partim obducit, ac proinde pars derafa sanatur.

℞ Oxymell. Scillit. ʒss. Ol. Vitriol. ʒss. m. *In
Gingivis putridis, ulceratis.*

Ulceribus his fungi seu hypersarcosēs plerunquē comitantur; quæ vitriolo cedunt, ex quo fit, ut non
serpant

serpant ultra; his absumptis, cicatrice obducatur ulcus, quem in finem styptica maximè requiruntur; hisce igitur, fungo abraſo, admoveatis vel mel roſarum ſpiritu ſalis parum acutatum, vel mel cum pulvere mandibulæ lucci calcinatæ, myrrhâ & ſpiritu ſalis miſtum; hinc ulcus abſtergetur, particulæ humidiores abſorbentur, ac fungus abraditur.

Rx Balf. Peruv. $\mathfrak{z}\beta$. Terebinth. in Vitell. ovi ſolut.
 $\mathfrak{z}\text{ij}$. m. *Pro digeſtivo in ulcere.*

Digeſtiva conſtant ex particulis mollibus, oleoſis ac volatiliſimum pauxillo; quamobrem fibras ampliant, ac dilatant, ita ut pus liberius ac uberius promanet, nec non particulæ volatiles irritando manus porrigunt ſaniei effuſioni auxiliares: Hincque fiet, ut partes tumidæ à fordibus expeditæ detumeſcant, ſeu digeſtantur.

Rx Flor. Sulphur. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Myrrh. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Camphor. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Terebinth. venet. $\mathfrak{z}\text{ij}$. cum vitello ovi ſolut. m.
f. Sarcoticum in ulcere.

Fibris à ſanie liberatis, partibus inflatis detumeſcentibus, ſarcoticis utuntur chirurgi; quæ medicamenta ſunt inter digeſtiva ac epulotica media; quæ humilimum exiccando, ac ſaniei acrimoniam emendando, epuloticis aditum parant.

Rx Ung. alb. Camphorat. $\mathfrak{z}\text{j}$. Amalgam. Mercur. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Sang. Dracon. Teſtar. ovor. uſt. ana $\mathfrak{z}\text{j}$. m. f.
Epuloticum in ulcere.

Unguentum hoc eſt abſorbens ac ſtypticum; quocirca ulcerum labiis prope ad invicem accedentibus uris copiâ & affluxu minuto, carne undique lævâ ac um cute pavitâ, epulotica pro virili agunt, meatus pertos reſarciendo.

Rx Alb. Græc. m. j. Nid. Hirund. n° j. Mell. optim. q. ſ. m. *In Angina.*

Tumores remedia emollientia necnon discutientia postulant; quo duriores sunt, eò magis remedia ad-
mota emolliant; quò molliores autem sunt, eò magis
topica discutiant; fibris laxatis ac ampliatis, salia fibra-
rum oscillationem renovant; hoc peractò, stationi
finis aderit, ac proinde tumori.

R Cinnab. nativ. ℥j. Gum. Junip. Labdan. Myrrh.
ana ʒiʒ. m. pro suffitu. *In ulcere colli uteri.*

Cum particulæ balsamicæ sint oleoso-volatiles, facile
ignis ope in auras avolant, ac proinde tam per suffi-
tum quam admotionem ad partem affectam pertingere
queunt.

R Decoct. Traumatic. ℥j. Balf. Peruv. ʒʒ. (solut.
in Sacch. Rosar. q. s.) m. f. potus. *In ulcere ven-
triculi.*

Particulæ balsamico-stypticæ hujus misturæ fibras ven-
triculi faucias detergent, sanantque; cùm, sanie per bal-
samica exclusâ, astrictioni cessurus est, meatus apertus.

R Aq. Chamæmel. ʒj. Spirit. Juniper. ʒij. Vitell.
Ovi n° j. *In Colicâ acidâ.*

Mistura hæc est oleoso-volatilis; per oleosas particu-
las acidum obvolvit, fibrasque rigidas nimis laxat; per
volatiles autem flatus deorsum pellit; ac proinde co-
licæ finem statuit.

R Castor. ℥ʒ. Laud. opiat. gr. j. Balf. Peruv. q. s.
m. f. Pilulæ. *In Colicâ Hystericâ.*

Spiritus debiles erigunt, dolores sedant; ex quo fit,
ut colicæ hujusmodi, morbi hystericici symptomati diro,
medicentur.

R Theriac. Androm. q. v. Ol. Succin. q. s. m. f.
Cataplasma admovendum. *In Convulsione.*

Cùm remedium hoc tensioni opem ferat, idcirco
Convulsiones aufert, si parti affectæ admoveatur.

R Sulph

℞ Sulph. viv. ℥iv. Decoct. Calc. viv. q. v. pro Fotu. *In doloribus Crurum.*

Dolores, sublatâ causâ, tensione laxatâ cedunt; cùm fetus igitur hic humores evaporet, necnon fibras laxas tendat; necesse est, evanescant.

℞ Aq. Vit. ℥iv. Theriac. Androm. veter. ℥ij. m.
In Dolore Brachii.

Dolores tensione ac humorum accumulatione orti, misturâ hujusmodi dissipantur ac auferuntur.

℞ Rad. Gladiol. lut. palust. ℥iij. Diabol. Mors. ℥ij. coq. in Lacte. *In Hydrophobiâ.*

Particulæ medicamenti acres perinde atque molles acidum causam delirii tollunt, ac isti finem statuunt.

℞ Aq. Meliss. ℥β. Sal Mart. gr. j. Sacch. q. f. m.
In Hydrope uteri.

Hartmannus, cujus est Præscriptum hoc, certè fallitur illud tantoperè deprædicando in uteri hydrope; quùm verò laxitati conferat, utero laxato nimis medebitur.

℞ Emplast. Oxycroc. ℥j. Mucilag. Alth. Lin. Fœnugræc. ana ℥v. Sagapen. Ammoniac. Euphorb. ana ℥iij. Resin. ℥vj. Cer. alb. ℥iij. m. f. Emplastrum. *In Ganglio.*

Particulæ volatiles vix fibras sat potenter irritarent, nisi eæ ad impedimenti punctum laxarentur; adsunt igitur hîc tam oleosæ quam volatiles.

℞ Sal. Prunell. ℥β. oc. Cancror. ℥j. Camphor. gr. ij. Sacch. Crystill. ℥β. m. *In Maniâ.*

Quæ bilem acrem obvolvunt, ejus aculeos retundunt, humorumque residuum per poros amandant, maniae conducunt.

℞ Antim.

℞ Antim. Diaphor. ℥j. Myrrh. gr. vj. Cinnab.
nativ. gr. vj. m. pro duabus Dosibus. *In Lochiis*
retentis.

Particulæ Præscripti hujus absorbentes, oleosæ, ac ponderosæ motum sanguini impertiunt, grumos solvunt; grumis autem solutis sanguis denuò in gyrum flectetur.

℞ Spir. Corn. cervin. ℥℞. Ol. Vitriol. ℥ij. m. gtt. xl.
In Maniâ.

Hæc mistura *Jacksoni* est acido-volatilis; atque adeo sal fit mixtum; salia armoniacalia hæc sunt; ac proinde salia acutiora, corrosiva emendant.

℞ Syr. Corall. ℥j. Tinctur. Sal. Tartar. gtt. xx. m.
In fluxu hepatico.

Fluxus hepaticus fit à sanguine tardiùs moto & circumactò, ac proinde in vasis paulisper subsistente; huic occurritur misturâ hæc vel aliâ sibi confimili; ex eo, quòd vasa simul aperiatur, simulque occludatur; ita ut, sanguine vasis rursus commisso, disruptio citiùs ferminetur.

℞ Spermat. Ceti, Antimon. Diaphoretic. ana ℥j.
m. *In Grumo.*

Grumi sanguinis vel lactis optimè, ex *Morello*, per attenuantia ac emollientia solvuntur; ita ut emollientia *ἱχόρδρα* seu contenta à fibris extricent; attenuantia verò *ἱχόρτα* proritent: His peractis, grumi tam solvantur quam in sanguinem urgebuntur.

℞ Unguent. Populn. ℥j. Cret. ℥ij. m. *In Hemorrhoidibus dolentibus.*

Unguentum hocce est molle, oleosum, ac absorbens; quocirca fibras laxando, tensionem alleviat, ac proinde dolorem compescit; creta humiditates acres retundit, ex quo fiet, ut excoariatio præcaveatur.

℞ Farin.

℞ Farin. Secal. q. v. coq. cum cicutæ succo in Pulticulam; add. Rad. Serpentar. Pulv. Cancror. fluviatil. ust. ana q. s. m. *Pro Cancro non ulcerato.*

Est medicamentum absorbens, stypticum, ac anodynum; hinc salia acriora ac corrosiva retundet; serpentiam antevertet, ac demum dolores graves compescet.

℞ Pulv. Limac. pp. ℥j. Pulv. Cancror. fluviat. ℥ss. off. de Cord. Cervi. ℥j. Conserv. Borag. q. s. m. *In Cancro.*

Si tamen ea, quæ acrimoniam immutant, Cancro contulerint, electuarium hoc istis proderit.

℞ Piper. long. ℥j. Succ. Acac. Rad. Tormentill. ana ℥ij. *In Uvulâ relaxatâ.*

Est pulvis styptico-incidens; ac proinde tam humiditates evaporat, humores impactos dissipat, quam partes laxas nimis constringit; atque uvulæ laxatæ medetur.

℞ Ol. Lumbricor. ℥ij. Rorismarin. ℥j. m. *In Ner-vo contuso.*

Hoc damni partibus contusis factum est, ut fibræ comprimantur, ut sanguis ibidem subsistat, ut fibræ supra partem compressam intumescant, ut tandem in inflammationis discrimen veniant; his cum oleosis ac volatilibus optimè occurritur, nam, fibris per oleosa dilatatis fluida per volatilia denuò circumaguntur.

Medicamenta plura composita in medium afferre ideo supervacaneum esse ducimus; quia hic tot ad calcem ex probatissimis authoribus apposuimus, quot omni ferè intentioni facient satis.

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Acetum Anthosatum (acido-aromaticum.) Acet. Caryophyllat. (Acido-aromatic.) Acet. Rosat. (acido-styptico-aromatic.) Acet. Sambucin. (acido-aromatic.) Acet. Scillitic. (acido-
I i volatile

volatile.) Acetum Theriac. (acido-aromaticum.) Acet. Theriacal. Norimb. (acido-aromatico-styptico - opiatum.) Anacardia (acido-aromaticum.) Antidotus Analeptica (styptico-glutinoso-aromatico-opiata.) Antidotum Hæmagogum (dulc.-amaro-aromatico-fœtidum.) Aq. Bezoartic. (amaro-aromatico-opiato-acris.) Aq. Tartarea (alcalino-acida.) Cerat. Santalin. (aromatico-styptico-oleosum.) Decoct. Pectorale (dulc. aromaticum.) Diacaryor. (amaro-dulce.) Diachylon simplex (mucofo absorbens.) Diachyl. Ireat. (mucofo-aromatico-absorbens.) Diach. magnum (mucofo-viscofo-oleoso-aromatico-absorbens.) Diach. magnum cum Gumm. (idem.) Diacorallion (absorbens, astringens, aromaticum.) Diacydon. cum Specieb. (acido-aromaticum.) Diapenidion (muscofo-opiato-aromatico-fœtidum.) Electuarium Diaspermation (amaro-mucofo-acido-dulc. aromaticum.) Electuarium Pectorale (muco-dulc.-amaro-aromatico-acre.) Emplastrum è cicuta cum ammoniaco (fœtido-opiato-acidum.) Emplastrum de Crustâ Panis (amaro-aromatico-oleoso-acidum.) Emplastrum Gryseum de Lapide Calaminari (absorbens-oleoso-amaro-fœtidum.) Emplastrum de Gummi Elemi (oleoso-aromatico-balsamico-acidum.) Emplastrum de Hermodactylis (oleoso-aromatico-acre-amarum.) Emplastrum de Meliloto simplex (amaro-aromatico-mucofum.) Emplastrum nigrum (absorbens-oleosum.) Emp. de Ranis (mucofo-aromatico-acre-amaro-absorbens.) Emplastrum sacrum (oleoso-absorbens-cathæretico - amaro-fœtidum.) Emplastrum de Sandyce (oleoso-absorbens-fœtidum.) Extractum Chalybis (acido-ponderoso-sulphureum.) Lohoch. de Farfara (mucofo-fœtido-dulce.) Oleum Rosaceum Omphacinum (oleoso-stypticum.) Oleum Rosaceum completum (oleoso-stypticum.) Pilulæ de Styrace (aromatico-dulc.-opiatum.) Pulvis Chermes composit. (styptico-aromatico-absorbens-amarus.) Pulvis Saxifragiæ compositus (amaro-opiato-acido-dulcis.) Saccharum Rosatum (dulc.-astringens.) Sief de Plumbo (terreo-cathæretico-opiatum.) Sief de Thure (terreo-mucofo-opiatum.) Sparadrapum pro Fonticulis (balsamico-aromatico-astringens.) Sparadrapum Gualteri (oleoso-mucofo-astringens. Species Liberantis (a-

stringens

stringens-aromatico-terreo-fœtida.) Tapfimel (amaro-mucoso-dulc.-astringens.) Trochisci Alkekengi (acido-viscoso-opiato-terreo-astringentes.) Trochisci Gordoni (opiato-viscoso-amaro-astringentes.) Trochisci Polyidæ (astringentes-cathæretico-amari.) Vinum Cerasorum nigrorum (spirituoso-acidum.) Unguentum Ægyptiacum (cathæretico-acido-dulce.) Unguentum Agrippæ (acre-oleosum.) Unguentum de Alabaſtro (aromatico-ſtyptico-mucoso-amaro-oleosum.) Unguentum album Camphoratum (oleoso-ſtyptico-aromaticum.) Unguentum Anodynum (oleoso-aromaticum.) Unguentum de Artanitâ (acre-salino-oleosum.) Unguentum Aureum (balsamico-aromaticum.) Unguentum Catapſoras (terreo-ſtyptico-oleosum.) Unguentum Citrinum (oleoso-ſtyptico-salino-terreo-mucoso-fœtidum.) Unguentum Neapolitanum (aromatico-balsamicum.) Unguentum Pectorale (oleoso-aromaticum.) Unguentum Pomatum (oleoso-acidum.) Unguentum Populneum (opiato-mucoso-amaro-oleosum.) Unguentum Potabile (oleoso-ſtyptico-fœtidum.) Unguentum Reſumptivum (oleoso-mucoso-aromaticum.) Unguentum Roſatum (oleoso-ſtypticum.) Unguentum è Solano (oleoso-terreo-opiatum.) Unguentum è Succis (oleoso-ſtyptico-amaro-fœtidum.)

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Acetarium Scorbuticum (acre-acidum.) *Pro Scorbuto, Embamma.* Acetum Mellis (dulc.-acidum.) *Lapides ſolvere fertur.* Alkekengi conditum (acido-acre-opiatum.) Amuleta peſtilentia-lia (cauſtico-aromatica.) *Gestanda in tempore Peſtis.* Apozema potentèr expectorans (dulc.-amar-acidum) cochl. iij. *Vomitionem ciēt & pituitam expectorat.* Aqua Antiphthiſica (mucoso-aromatico-balsamica) ℥ij. *Ad pectoris morbos à pituitâ.* Aqua Camphorata (ſtyptico-fœtido-aquea.) *Ulcerâ ſanat, fluxiones tollit, dentes firmat, putredini repugnat; ophthalmiam, epiphoram, ignem ſacrum ſanant.* Aqua Ceraſor. comp. (acido-mucoso-aquea) ℥℥. *In Tympanite.* Quid ſit Tympanites, authores vel conticeſcunt, vel non probè uſque adhuc enarrârunt; plerique inflationem fixam, nonnulli hydro-pem ſiccum, alii alia ſuſpicati ſunt; nos autem expe-

rientiâ freti affirmamus omenti hydropem tympanitam esse; uti jampridem, in *Critico* nostro, orbi erudito patefecimus; quî autem remedia frivola ac inefficacia morbum tam atrocem, tam fixum, tam altè insidentem abigerent, nos omninò fugit; paracentesi enim forsitan cederet, si puncturam tamen variis in locis, multis plagis, infligere liceret: Quî enim gelatina isthæc in omenti cellulas conclusa per remedia rursum sanguini committetur; haud verò simile est, non igitur remediis sed νέμεσις cedere potest. Aqua Cordium composita (mucoso-aromatico-spirituosa.) *In virium dejectione.* Aqua Cosmetica (mucoso-oleoso-amaro-spirituosa.) *Pro facie venustandâ.* Aqua Crinalis (acri-mucosa.) *Valet ad crines regenerandos, ad surditatem tollendam.* Aqua Cucumerum (mucoso-amaro-aromatico-balsamico-spirituosa) ℥ij. *Calculo & arenulis ex eo opitulatur, quòd irriter, irrigetque, ac proinde expellit calculos.* Aqua Cynosbati Comp. (acri-mucosa) ℥iv. *Calculo Renum prodest, quia urinam ciet.* Aqua Febri-fuga (amaro-aromatico-spirituosa.) Aq. Formicarum (acri-mucosa) cochl. j. *Tertianas abigit.* Aqua Melluminata; externe (amaro-styptico-sulphurea.) *Ad Pus-tulas faciei, ulcera oris, gingivarum.* Aq. Ophthalmica Sapphirina (salino-styptico-aquea.) *In oculorum ulceribus, fluxionibus, pustulis, suffusionibus usurpatur.* Aq. Persicariæ comp. (mucoso-acri-aquea) ℥iv. *In Calculo renum arcanum habetur.* Aq. Tussilag. comp. (amaro-mucoso-aquea.) *In Pleuritide, Empyemate, expectorationem promovet.* Aqua Vermifuga cochl. iij. (styptico-mercurialis.) *In vermibus.* Balsamum Anodynum (mucoso-opiato-fœtido-spirituosum) gr̃. 30. ad 50. *Et externè ad dolores arthriticos sedandos.* Balsamum Fœminarum (aromatico-oleoso-viscosum.) *Ad Inungendum perineum in dysoxiâ (partu laborioso.)* Balsamum Saturninum (oleoso stypticum.) *Ad Ulcera inveterata, Tumores, Vulnera, Fistulas, Cancros, Morphaam.* Balsamum Sclopetarium (oleoso-cathæreticum.) *In vul-neribus Sclopetariis, ulceribus veteribus.* Balsamum Sulphuris Knæphelii (oleoso-balsamico-aromaticum) gr̃. 4. 12. *In Catarrhis, Asthmate, Tussi, Phthisi, Colicâ.* Balsamum veneris (balsamico-stypticum.) *Externe in*
ulceribus

ulceribus inveteratis. Bezoarticum Martiale (acido-terreum) ℥ss. *Viscera roborat, fluxum hepaticum optimè sistit.* Cataplasma Podagricum (oleoso-aromaticum.) Ceratum album (oleoso-amaro-terreo-fœtidum.) *Dolores sopit, lenit, emollit, discutit, exanthemata variolarum decidere cogit, Cosmeticum est.* Cerevisia Embryonum (aromatico-astringens.) *Astringit, abortum præcavet, fibras passim firmat, roborat.* Cerevisia Jovialis (astringens-amaro-aromatico-mucosa.) *Hepatica, Splenetica, morbis uteri medetur.* Cerevisia Scrophularia (acri-mucoso-amara) ad libitum. *In Strumis, Scrophulis, ani mariscis, ulceribus mali moris, Scabie malâ.* Cicera Tartari ℥ss. (oleoso-acido-salino-aromatica.) *Ad Podagram præveniendam.* Conserv. Hepatica Corallitana (acido-styptico-aromatico-dulcis) ad libitum. *Refrigerat, Scorbutica frigida, calculum pellit (quî petimus?) urinam cruentam sistit,* Conserv. Nicotian. (mucoso-nauseoso-aromatico-dulcis) ℥ss. *In Asthmate, Catarrho suffocativo.* Decoct. Antiphthificum (mucoso-aromatico-styptico-acidum.) Decoct. Dysentericum (mucoso-styptico-aromaticum.) Decoct. ad Tussim ℥iv. (opiato-mucoso-styptico-aromaticum.) Decoct. Ulmi (mucoso-styptico-acidum.) *In Aphthis, in calidis oris affectibus, ulceribusque; si detur pro potu communi in elephantiasi, bonum, sudores movet.* Dentifricium infantum (oleoso-dulc-terreum.) *Ad Dentes fricandos, & dentitionem faciendam.* Dentifricium Scorbuticum (salino-aromatico-styptico-dulce.) *Ad dentes fricandos, dealbandos.* Dentilavium Scorbuticum (styptico-acre-dulce.) *Ad dentes, à Dentifricio usurpato, lavandos.* Diatesaron Potabile (spirituoso-acido-dulc.-aqueum.) *Ante paroxysmos febriles; quî autem istis proderit, scrutinio dignum reputamus.* Diatrachia (mucoso-terreo-styptica) j. *Ad urinæ incontinentiam.* Electuarium Castitatis iij. iij. (mucoso-opiato-fœtido-dulce.) *Venerem refræ-quare supponitur; petimus num in juvenibus an senibus id efficit? æstrum in juvenibus venereum hujusmodi pernît, senum appetitus ultrò deficit.* Electuarium Lithontripticum ℥ij. (balsamico-oleoso-amaro-acido-terreum.) Electuarium Pectorale (dulc.-acido-styptico-mucosum.) Elixir Vitrioli (aromatico-spirituoso-acidum)

dum) *Ἐβ. j.* *Appetitum excitat, ventriculum roborat; exiccat Catarrhos Pituitosos.* Emplastrum mammillare (oleoso-fœtido-acidum.) *Ad Tumores duros Scirrhosos, Lac concretum, œdemata.* Emplast. Opiatum (balsamico-mercuriale-opiatum.) *Dissipat, lenit; pro doloribus arthriticis sublevandis.* Emplastrum Podagricum. *v. Emplastrum Opiatum.* Emplastrum Saturninum (styptico-terreo-amaro-oleosum.) *Ulcerâ Phagedanica sanat, quàm optimè.* Emplast. Smecticum (styptico-oleoso-salinum.) *Dolores sopit, contusiones dissipat; an emplastra abortui imminenti conferant, vid. supra p. 308.* Emplastrum ad strumas (mucoso oleoso-mercuriale.) *Tumoribus duris scirrhis confert.* Emplast. Vermifugum (amaro-fœtido-oleosum.) *Vermes educit.* Enema Colicum (mucoso-aromatico-catharticum.) *In Colicâ, Passione Iliacâ, Calculo.* Enema Balsamicum (styptico-balsamico-oleosum.) *Ad Dysenteriam, Excoriationes intestinorum.* Enema Dysentericum (mucoso-aromatico-oleoso-styptico-opiatum.) *vid. Enema Balsamic.* Flores Joviales (aromatico-styptico-dulces) gr. ij. vj. *In Passione Hystericâ.* Gargarisma Synanchicum (mucoso-terreo-styptico-acidum.) *Ad Aphthas, ulcera oris cicatrifanda.* Injectio alba (mucoso-opiato-fœtida.) *Dolores mitigat, ulcera virgæ sanat, inflammationes sedat.* Injectio Auricularis (aromatico-salino-styptico-dulcis.) *In dolore Auris, ac Surditate inde.* Injectio benedicta (alcalino-styptico-mercurialis.) *In ulcere virgæ à Lue.* Julap. ac Rachitidem (aromatico-mucoso-acido-terreum) cochl. ij. Lac Mercurii (cathæretico-stypticum.) *vid. Aq. Mercurialis.* Linctus benedictus (oleoso-salino-acris cochl. j. *In expecttoratione suppressâ.* Linctus expecttans (oleoso-salino-dulcis.) *vid. Linctus benedictus.* Linctus Synanchicus cochl. j. (styptico-aromatico-terreus.) *In Anginâ.* Linimentum Melluminatum (aromatico-styptico-cathæreticum.) *Ad ulcera gingivarum, inflammationes, laxitatem.* Linimentum simplex (oleoso-terreum.) *In erysipelate, cancro.* Mel Saponis (oleoso-salino-dulce.) *Manus ac faciem dealbat, in Ambustione, Podagrâ, Inflammatione.* Mixture simplex ʒj. (spirituoso-aromatico-acida.) *Putredini repugnat, valet in Febris malignis.* Oleum Balsamicum (styptico-oleoso-amaro-

amaro-aromaticum) ʒj. ʒj. *Flatibus subvenit, Paralyſi, Surditati, Spasmo, Colica, Hydropi, internè & externè.* Oleum Bufonum (ſalino-oleoſum.) *Conſert ad labi- rum puſtulas, caneros mammarum; ad hydropem, exter- nè.* Oleum Camphoræ (foetido-terreo-acidum) gr. x. *Diaphoreticum, Hyſtericum.* Oleum Chartæ (oleoſo- ſtypticum.) *In Impetigine, Herpete, Alopeciâ.* Oleum Coſmeticum (oleoſo-amaro-ſalino-aromaticum.) *Ad cutim detergendam & à ſpurcitie emundandam.* Oleum Milvinum (aromatico-ſalino-oleoſum.) *Ad pedes ungen- dos, nares & nucham in Paroxyſmo Epilepſiæ.* Oleum Sacchari ſimp. (ſpirituſo-dulce.) Oleum Sacchari comp. (dulc.-aromatico-ſpirituſum.) *In Tuſſi, Aſth- mate, Peſtoris morbis, ubi expectoratio deeſt.* Oleum Saponis (oleoſo-ſalino-ſpirituſum.) *Ad morbos Cepha- licos, Convulſiones, Cephalalgias; Tineas, Contuſiones, Podagram.* Oleum Scorbuticum (acri-aromatico-aci- dum.) *Ad Scorbuti dolores.* Oleum (acido-ſalinum.) *Ad maculas faciei, Lentigines.* Oleum Τειχοφυές (a- maro-oleoſo-ſtypticum.) *Ad Alopeciam.* Panis Dia- ſarſæ (mucoſo-aromaticus.) *In Lue venerea.* Panis de Viperâ (alcalino-mucoſus.) *In Lue, Scorbuto frigido, Le- præâ, Cachexiis.* Pilul. Æthiopicæ (terreo-acri-balsa- mico-mucoſo-mercurialis) ʒj. *In Lue, Hydrope, Scor- buto.* Pilulæ Anticolicæ ʒſſ. (foetido-ſalino-dulcis.) *In Colicâ.* Pilulæ Antipodagricæ (foetido-terreo-amaro- balsamicæ) ʒſſ. Pilulæ Caſtitatis (mucoſo-ſtyptico-ter- reo-foetidæ) ʒſſ. *In Gonorrhœâ, Priapiſmo inde.* Pi- lulæ Cretacæ (terreo-aromatico-balsamicæ) ʒj. *In Pro- fluvio albo.* Pilulæ de Pice ʒſſ. (dulc.-aromatico-balsa- micæ.) *In Tuſſi, Phthiſi, Pure peſtoris expectorando.* Pi- lulæ Sinapinæ (acri-dulces.) *In Tuſſi, Aſthmate.* Pilulæ Styracinæ ʒj. ʒj. (aromatico-ſulphureo-acres.) *In Dy- ſpnœâ, Catarrho ſuffocativo.* Potio Febrifuga (Alcalino- acida.) *Ante intermittentium Paroxyſmum.* Potio Pleu- ritica (alcalino-ſpirituſo-opiato-balsamica.) Pulvis An- ticolicus (terreo-foetidus) ʒj. ʒj. Pulvis Cardiacus co- rollatus (terreo-aromaticus.) Pulvis ad Caſum ʒj. (ter- reo-oleoſo-ſtypticus) Pulvis Cinnabaris comp. ʒſſ. (foetido-terreo-mercurialis.) *Ad Epilepſiam.* Pulvis Crinalis (aromatico-ſtyptico-terreo-mucoſus.) *Ad A-*
lopeciam,

lopeciam, memoriam debilem. Pulvis Gryseus (terreo aromaticus) ℥j. ʒj. *In Diarrhœâ, Calculo, Aciditate* Pulvis Lateralis ʒj. (styptico-aromaticus.) *In flatu, colicâ, Podagrâ.* Pulvis Liliaceus ʒiʒ. (mucoso-terreo-aromatico-balsamicus.) *Ad Urinæ ardorem.* Pulvis Pectoralis (aromatico-oleoso-stypticus) ʒiʒ. *Ad expectorationem promovendam.* Pulvis Pepticus ʒj. (aromatico-alcalino-stypticus.) *Ad Coctionem juvandam à cibo.* Pulvis Pleuriticus (sulphureo-terreo-opiatus) ʒj. *In Pleuritide expectorationem promovet, acidum absorbet, ac dolorem sopit.* Pulvis Solearis (aromatico-salinus.) *Ad soles podagricorum.* Pulvis Stomachicus ʒj. ij. (aromatico-acri-styptico-dulcis.) *Ad Tormina Ventriculi;* quærimus autem, quî pulvis hic ita ventriculi doloribus opprem feret, ut meliorum locum teneat; ventriculi tormina tam frivolis remediis certè non cedunt. Pulvis ad Strumas ℥ij. (terreo-salino-acidus.) Pulvis Vermifugus ℥j. (terreo-amaro-stypticus.) *Vermes necat, si per 3 dies continuos circa novilunium & plenilunium exhibeatur.* Pulvis uvularis (amaro-stypticus.) *Ad uvulam laxatam, elongatam.* Savanetta Cosmetica (oleoso-amaro-acido-salino-aromatica.) *Ad manus & faciem dealbanda.* Serum Hepaticum lbj. (amaro-aromatico-aqueum.) Serum Scorbuticum (acri-amaro-aromatico-acido-aqueum) lbj. Spiritus Vitrioli Tartarificatus ʒj. ʒiʒ. (styptico-spirituosus.) *Sudores provocat, obstructions aperit, sanguinem grumosum solvit, scabiem sanat, cutim levigat.* Succus Scorbutici ʒiv. (acri-acidi.) *In scorbuto calido.* Suffimentum Hystericum (foetido-acidum.) *In Paroxysmo Hystérico.* Sulphur Vitrioli gr. xv. (alcalino-acidum.) *In Epilepsiâ, Vertigine, morbis chronicis, Pulmonum affectibus; externè cicatrificat.* Sulphur. Vitrioli Martiale. *vid. Sulphur Vitrioli.* Sulphur Vitrioli Narcoticum (alcalino-acido-sulphureum) gr. ij. vj. *Catarrhos sistit, refrigerat.* Syrupus Antiscorbuticus (amaro-acri-acidus) cochl. j. ij. Syrupus Chalybeatus (styptico-amarus) ʒiʒ. ʒiʒ. Syrupus Chalyb. corollatus (aromatico-stypticus) ʒiʒ. j. *Astringit, fluxui opitulatur hepatico.* Syrupus de Croco ʒj. iij. (foetido-opiato-acidus.) Syr. Hæmoptoicus (amaro-stypticus.) Syrupus Jovialis (styptico-amaro-aromaticus) ʒj. *In Hypochondriaciismo,*
Chlorosi,

Chlorosi, Cachexiâ, Ictero. Syrupus de Myrrhâ (amaro-fœtido-mucosus) ℥j. ij. *Asthmaticus, Pectoralis, Emmenagogus.* Syrupus de Peto cochl. ℞. ij. (amaro-acido-dulcis.) *In Asthmate, Catarrho suffocativo, Phthisi; dolore Ventriculi, visu recuperando.* Qui autem mira præstaret in ventriculi dolore vel recuperando visu, nos omnino latet. Tabulæ Antisynanchicæ (oleoso-terreo-styptico-mucosæ.) *In ulceribus oris, seu Aphthis.* Tabulæ Embryonum (styptico-terreo-aromaticæ.) *Fœtum roborant, abortum præcavent.* Tabulæ Saponacæ (oleoso-aromatico-mucosæ.) *In expectoratione suppressâ, in Phthisi, Empyemate, &c.* Tabulæ de Styrace (aromatico-styptico-mucoso-dulces.) *Catarrho, Phthisi conducunt.* Tinctura Cerussæ (fœtido-alkalino-acida.) *In cutis fœditatibus, ambustis, &c.* Tinctura Mellis ℥℞. ℥j. ℞. (spirituoso-dulcis.) *In Phthisi.* Tinctura oculorum Cancrorum (alkalino-acida) ℥j. *In ulceribus curandis.* Tinctura Odontalgica (balsamico-opiato-styptico-acri-spirituosa.) *Torquis Infantum (fœtido-opiatus.) Dentitionem promouet, Convulsiones præcavet.* Unguentum Cephalalgicum (opiato-aromatico-oleosum.) *Ad Tempora un-genda in dolore.* Unguentum Digitalis (oleoso-fœtidum.) *Pro Scrophulis.* Unguentum faciale (fœtido-oleoso-acre.) *Ad faciei guttam rosaceam, ruborem.* Unguentum familiare (oleoso-balsamicum.) *Emollit, dissipat, in per-nionibus, ulceribus pedum, usurpatur.* Unguentum ad Fissuras (amaro-aromatico-oleosum.) Unguentum Fus-cum (acido-dulce.) *Ulcera bene mundificat.* Unguen-tum Hæmorrhoidale 2. (terreo-fœtido-opiatum.) *In dolore Hæmorrhoidum.* Unguentum Ophthalmicum (o-leoso-terreum.) Unguentum Piperinum (aromatico-acri-oleosum.) *Ad Scabiem, Pruritus.* Unguentum Soleare (acre-acido-oleosum.) *Ad Tussim.* Unguentum Sympatheticum (oleoso-fœtidum.) *Ulcera sanat, Telum, quocum vulnus infligitur, ungendo.* Sententia hæc vana ac inutilis est. Unguentum Virilitatis (oleoso-aromatico-acre.)

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Balsamum Arthriticum (oleoso-acidum.) *Parti affectæ inungendum.* Balsamum Nephriticum gr̃. x. ad lx. (oleoso-balsamico-acido-fœ-tidum.)

tidum.) *In Renum doloribus, calculos pellit, expectorationem promovet, morbis pectoris medetur.* Bolus Balsamicus (styptico-balsamicus.) *In Tussi contumaci, Hemoptoe, (vix tamen priusquam claudatur vas) Dysenteria Contusione.* Bolus Cardiacus ad Casum (oleoso-alkalino balsamico-opiatus.) *In Puerperis à partu, contusionibus sanguinem grumofum solvit.* Bolus Chalybeatus (balsamico-stypticus;) qui marcori ac languori seu inappetentiæ subveniat, nos fugit; certè acidum in Marte effurinum adeò à balsami oleo obtunditur, ut quò appetitui acidum sit gratius, eò oleum magis istum obtundit. Bolus sudoriferus (amaro-alkalino-aromatico-opiatus) *Febrifugus, Stomachicus, Hystericus.* Cataplasma Anginosum (dulc-mucoso-oleoso-acri-amaro-spirituoso-opiatum.) *Ad anginam dissipandam, dolorem leniendum* Cataplasma de Cymio (mucoso-oleoso-fœtido-aromaticum.) *In Aurium dolore.* Cataplasma de Halecibus (acri-oleoso-salinum.) Plantis admoveatur in deliriis febrilibus, ubi materia sursum tendit; nam partes, quibus admoveatur, emollit, titillatque, adeò ut humores tam aliò devocet, quam istis aditum, fibras emolliendo, paret; quinetiam humores, cùm remedii portunculæ in sanguinem introëat, commovet, ac eos circumcompellit; quamobrem non in omni delirio indiscriminatim ad moveri debet, ast in isto tantum ubi febris mali est moris. Cataplasma de Iride (aromatico-mucosum.) *In Anginâ, dolore Lateris externo, Pectoris morbis Puitosis.* Cataplasma de Ovis (mucoso-oleoso-fœtidum.) *Dolores Hemorrhoidales lenit.* Cataplasma de Pomis (acido-mucoso-opiatum.) *Ad oculi Inflammationes.* Cataplasma de Raphano (acri-fœtido-salino-acido-mucosum.) *vid. Cataplasma de Halec.* Cataplasma Sambucinum (aromatico-mucoso-oleoso-salino-terreum.) *In Erysepelate.* Cataplasma de Sedo (styptico-mucoso-opiatum.) *Oculorum dolores, defluxiones sanat.* Cataplasma Stomachicum (acri-aromatico-amaro-acido-opiatum.) *Ad nauseam, vomitum.* Cataplasma de Succis (acri-mucosum.) *Pubi admoveatur, vel Regioni lumbari, urinam proritat.* Cataplasma Suppedale (acri-aromatico-opiato-oleoso-salinum.) *In sanguinem penetrat; vel stimulat vel demulcet, at vide authorem.*

Cataplasma

Cataplasma de Telis (balsamico - aromatico - alcalino - styptico - acido - oleoso - mucosum.) *Epicarpium est ad bruium intermittentium paroxysmos tollendos.* Cataplasma de Terrâ Cimoliâ, (mucoso - opiato - styptico - aromatico - foetidum.) *Ad Phrenitides, capiti raso admoveatur.* Cerevisia de Dauco (aromatico - mucosa.) *Urinam pellit, meatus lubricat; quocirca calculo, arenulis predest.* Cerevisia pectoralis (mucoso - viscoso - aromatico - amara.) *Attemperat acorem, incidit pituitam, expectorationem provocat; valet in phthisi recente.* Cerevisia ad Rachidem (dulc. - aromatico - amaro - acris.) Cerevisia Scorbatica attemperans (amaro - acris - mucoso - dulc. - aromatico - ponderosa) q. v. *In sanguine acido, in Scorbuto acido, in Hypochondriacismo.* Eximius vir cerevisiam hanc in temperamento calido valde deprædicat; siquidem autem ex particulis amaris, aromaticis, acris ac ponderosis evidenter constat, nos fugit, quâ scorbuto calido rem ferre valet: Est, particulis insuper scaturire mucosis ac dulcibus: Cæterum cum eæ nullam per volatilia rationem habeant, necnon virtutes suas paulo lentius liquori impertiant; exinde fiet, ut cerevisia nonnihil mollis evadat; cum è contrariò verò particulæ sulphuræ, volatiles ac fixæ vix dum liquori infundantur, cum istas sapiant; liquidò constabit cerevisiam vires suas à particulis, quibus maximè scatet, mutuò accepturam iri; quâ de causâ non scorbuto calido citra distinctionem conveniet; siquando igitur sanguini particulæ acido - corrosivæ præsent, salia volatilia, præ acido primas tenente, congruere poterint; ast iis introductis in statu corrosivo luctæ oriuntur adeò diræ, ut hæmorrhagiæ frequentius exinde insequantur; hinc est, quòd alcalina mitiora ac flexilia tum exhibere præstat, quam hujusmodi maximè ferocia. Decoctum Althææ (mucoso - acris - spirituofo - amaro - aromatico - opiatum) ℥iij. *Acorem obvolvitur, arenulas, calculum pellit, dolores sopit.* Decoctum Antiloimicum, cochl. iij. iv. (aromatico - amaro - mucoso - opiato - foetidum.) *In Febre malignâ ubi spiritus exanimantur, non in Febre inflammatoriâ; ast Theriacam omittamus quoties coma vel soporis gradus minimus ægrotos infestant.* Decoctum alstringens ℥iv. (styptico - aromatico - opiatum.) *In Diarrhæa, Dysenteria ventri-*

ventriculum roborat. Decoctum Balsamicum ℥iv. (mucoſo-balsamico-aromaticum.) *In Phthiſi, expeſtorationem promovet, Tubercula diſſipat; vaſa rupta reſarcit, at de hoc dubitamus.* Decoctum ad Cancrum ℥iv. (ſœtido-mucoſo-ſtyptico-aromaticum.) Decoctum Cannabinum ℥iv. (mucoſo-amaro-aſtringens.) *Ad miſctum, leſti involuntarium.* Decoctum Catarrhale ℥iv. (aromatico-acri-mucoſo-dulc.-opiatum.) *In Catarrhis frigidis.* Decoctum Catechu compoſ. ℥iv. (acri-aromatico-ſtyptico-dulc.-opiato-mucoſum.) *Conſtringit ora glandularum, mucus ſupplet, ſpiritus pacat, perſpirationis pondus auget, Catarrhis opitulatur acribus, tenuibus, uti author aſſerit;* malum autem in Catarrho tenui, voſmet ab omni remedio volatili contineatis; quando tantum inferetis damni per medicamenta irritantia valdè; qualia ſunt guaiacum, ſaſſafras, ſalvia ac alia, quantum iſtis commodi conferetis per ſtyptica, mucoſa, ac opiata; ſatius igitur eſſe ducimus poſteriora ſola in Catarrho tenui exhibere, & prioribus prorsus intermittere; decoctum utique hocce non eſt Catarrhi tenuis remedium, cùm maximè proritet, ac proinde Catarrho hujusmodi experientiâ duce, officiat; quòd ſi tuſſis ſit ita compoſita, ut ſalia perinde irritent, atque pituita exantlanda ſit, præſcriptum erit perquam utile, uti palam vobis faciemus in præſcripto cui titulus eſt *Mixtura Expeſtorans.* Decoctum Cereviſiatum ℥iv. (acri-mucoſo-ſtyptico-aromatico-dulce.) *vid. Extractum Peſtorale, aſt magis irritat & expeſtorat, inquit author;* certè *Extractum Peſtorale* eſt potius remedium viſcoſum ac proinde humores acres oblinat ac obvolvât, cùm hoc verò irritet valdè; quâ de cauſâ longè à ſe invicem diſcrepant, Decoctum igitur hoc potius *Decocti Catechu compoſiti* virtutes æmulatur. Decoctum Clyſterifans (mucoſo-amaro-acido-aromaticum.) *Fæces emollit, flatuſ diſſipat, & evocat, ac ſcybala educit.* Decoctum Copragogum (mucoſo-aromatico-purgans) *Scybala educit.* Decoctum Corallinæ ℥ij. (mercuriali-aromatico-ſalino-acidum.) *Ad vermes ante novilunium & Plenilunium.* Decoctum Depurans (acri-aromatico-mucoſo-muriatico-ſalinum) ℥iv. vj. *Urinam movet, arenulas pellit, ſcorbuto prodeſt calido.* Decoctum Diureticum ℥iv. lbß. (aromatico-

ætido-acido-amaro-acri-mucosum.) *Urinam provocat, renulas pellit.* Decoctum expectorans (aromatico-amaro-nauseoso-acido-dulce.) *Tussi à pituitâ bronchias confidente opitulatur, ex eo quod irriteret, ac eam sursum elebat.* Decoctum Fracastorii ℥iv. (opiato-styptico-aromaticum.) *In Diarrhœâ, ventriculi torminibus, in Diarrhœâ in Febribus symptomaticâ.* Decoctum Fracastorii tenue (mucoso-opiato-amaro-aromaticum.) *vid. Decoctum Fracastorii.* Decoctum Glycyrrhizæ (dulc.-alcalino-aromaticum.) *In Catarrho.* Decoctum Libani ℥iij. (mucoso-alcalino-stypticum.) *In affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis: Aqua Calcis falsedinem ac astringentem certè sapit, quæ vobis in Praelectionibus nostris pharmacomathicis palam faciemus; quocirca tam aquosas seu particulas amandando, & acriores acidas obvolvendo, quam fibras roborando, earumque ora impensè erosa erruminando, subsidio veniet: Hinc erit, quòd humorum effluxum immaniore qualemcunque prævertat; & isti, evacuationibus præmissis, opem ferat.* Decoctum à Lignis ℥iv. (acri-aromatico-styptico-mucosum.) *viscat, tenuat, Diaphoreticum est; Catarrhis, Arthritidis, Paralyti, Hydropi Anasarcae, morbis frigidis opitulatur.* Decoctum Nephriticum (mucoso-dulc.-amaro-aromaticum) Decoctum Pacificum Hystericum (opiato-fœtidum.) cochl. ij. iij. Paroxysmis subvenit hystericis, ex eo quòd spirituum motum progressivum adurcat, necnon sub idem tempus motum eorum effectum nimis reprimat. Decoctum Pectorale Balsamicum (mucoso-opiato-dulc.-astringens-balsamico-aromatico-acre;) præscripta talia pomposa ita farraginem faciunt, ut difficile sit dijudicare, cui conducant fini; concedamus enim remedium maximè efficax à medico proponendum esse, quorsum ab isto quicquam subducemus? Quantum enim ab isto subtrahimus, tantum remedium inutilis adjicitur: Quocirca remediorum efficaciorum numerus ita pomposus medicos apud consultos imprimè decrescat, necesse est: Quantum ad Decoctum hoc, irritationem sedat, extillationem antevertit, necnon expuitionem proritat. Decoctum Pleuriticum ℥iv. (mucoso-dulc.-acri-aromaticum) non priùs exhibendum

est, quàm pleuritidis crisis seu anacatharsis coràm adsit; quia expectoratio non antea proritanda est, quàm dies septimus, nonus, aliufve aderit. Decoctum Psoricum ℥iv. (amaro-dulc.-hydrargyreon;) affectus cutaneos ex hinc abigit, quòd acidum destruat, motumque sanguinis desidem adurgeat. Decoctum Sacrum cochl. ij. iij. (amaro-fœtido-acri-opiatum.) *Alexipharmacum* censetur, ex eo quòd sanguinis motum tam intestinum quam progressivum invigoret; ac proinde putredinem arcet, resistencias prævertit, spiritus suppeditat, miasmâque venenosum expellit; hinc fit, ut febribus malignis quibusvis speciei hectica opem ferat; caterùm vobis cura sit. ne somno sepultis ac comate afflictis exhibeatur, ex eo quòd opium istiusmodi detrimento erit: Est etiam stomachicum, hystericum, vermifugum. Decoctum Sacrum Sedativum (amaro-fœtido-acri-opiatum) ℥iij. In Agrypnia febre mali moris oriundâ. Decoctum Sanctum (acri-dulc.-astringens.) vid. Decoctum Lignorum, nam lenit ac demulcet humores, acidosque emendat. Decoctum Scorzoneræ q. v. (mucofo-acidum) sitim reprimat, acre alcalinum immutat, Diuresin provocat. Decoctum Sistens ℥iv. (styptico-testaceo-opiato-aromaticum.) *Diarrhœam* reprimat, flatus dissipat. Decoctum Traumaticum ℥ss. (amaro-styptico-aromatico-fœtido-oleoso-acri-opiato-dulc.-acidum.) Grumos cruoris solvit, ac circulationi denudò reddit; recrementa per urinam & sudorem educit; nec tamen fervorem accendit. Partes lasas roborat, conglutinat, sanat. Decoctum variolosum (mucofo-dulc.-amaro-aromatico-acidum.) Scorzoneram infamat, vultque ut ea ab officinis ac à præscriptis prorsus exulet; cæterùm cum sit mucosa, decoctis particulas molles ac ramosas impertiet: Quando eæ autem particulas acres obvolvunt; quid est, quòd tantoperè vituperetur? Multa, quinimo perplurima pharmaca apud medicos celebriores à præscriptis proscribuntur, nec immeritò; cùm efficaciora adeò faciliè recenseri possint, ut in actum, uti fertur, contrahi valeant. Decoctum Urticæ acidum ℥iv. (acri-acidum.) *Urinam* ciet. Electuari-um Balsamicum (styptico-oleoso-balsamicum) ℥ij. *Phlegma viscidum & crassum* bronchias obsidens dissolvit; meatusque omnes glabros & facile meabiles reddit; pul-

monum vesiculas ultra tonum tumidas & tensas litu balsamico restituit, & sanat; ideoque tussi siccâ & phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Electuarium Boyleanum ʒij. (opiato-mucoso-stypticum.) Sanguinem refrigerat; serum tenue incrassat, acre contemperat; vasorum ora occludit; fibrillarum irritationes & spasmos consopit; catharsi leni, modò necessario requiratur, ac vena sectione præmissis, laudatur à nobili Boyle ad hæmoptoën. Electuarium Camphoratum (fœtido-opiatum) ʒj. iß. Spiritus animales nimis efferos reprimit; eorumque motum anomalum in ordinem redigit; hystericiis apprime opem fert. Electuarium Cardiacum temperatum ʒij. (aromatico-acido-amaro-terreum.) aptè præscribitur febricitantibus de languore & ægritudine querentibus; dum enim fermentationem (passim) restaurat, spiritus animales commovet, citra caloris accensionem. Electuarium de Colophonîâ ʒiij. (fœtido-amaro-opiato-aromatico-glutinoso-stypticum.) Constringit, sanat, consopit, siccatur; & fluori ulli specificè dicatur. Electuarium Creaceum ʒiij. (terreo-amaro-aromaticum.) Inter præstantissima stomachica locum tenere meretur, calefacit, confortat, acidum corrigit; valet contra cardiacam, ventriculi dolorem, rugitum, nauseam, vomitum, inappetentiam, Diarrhœam. Electuarium Diasulphuris ʒij. (styptico-oleoso-balsamicum.) Putredini resistit, mundificat, consolidat, exiccat, roborat, acidum temperat, usurpatur ad catarrhum pectoralem, tussim, phthisin incipientem; non omni certè catarrho opem feret, cæterùm isti qui frigidus vocatur, ubi materia extillat, glutinosa evadit, ac difficultè expuitur. Electuarium expectorans ʒij. iij. (aromatico-acri-oleoso-amaro-dulce.) Pituïtam frigidam concoquit, phlegma viscidum incidit, ductus bronchiales aperit, pulmones irritat, tussim provocat, & expectorat. Electuarium Ictericum (aromatico-acri-amaro-opiato-fœtido-salinum) ʒj. iß. Titulus vires monstrat. Electuarium Lucatelli ʒß. (styptico-acido-mucoso-balsamicum.) Incrassat, restringit, sanat; prodest contra raucedinem, tussim, hæmoptoën, quasunque sanguinis effusiones internas; atque phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Electuarium Minerale (balsamico-oleoso-acre.) Cum successu exhibetur contra noxas

à Mercurii abusu inductas. Electuarium de Myrrha (amaro-aromatico-fœtido-oleoso-mucosum.) *vid. Lohoch Myrrhisatum.* Electuarium Nephriticum (acri-oleoso-mucoso-dulce) $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Optimè & præcavet, & mitigat dolores colicos paroxysmo nephritico supervenire solitos; ad præcautionem assumitur per triduum ante novilunium & plenilunium, superbibendo vini albi haustulum: Ad mitigationem capiat ager eandem dosin cum primum signa aliqua paroxysmi prænuncia senserit, & repetat quartis horis per sex vices, cui superbibantur Decocti Malve Magistralis $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. Electuarium Pectorale $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. sæpius (mucoso-dulc.-oleoso-aromaticum.) Ad tussim molestant à defluxione tenui & acri oriundam. Electuarium Peruvianum (amaro-styptico-aromaticum) $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Specificè valet contra quascunque vel intermittentes vel remittentes Febres: Diarrhœæ opem fert, vel saltem eam prævertit. Electuarium Peruvianum astringens \mathfrak{z} . (amaro-styptico-balsamicum.) Antidotum audire meretur summè efficax contra sputum cruentum; febrites enim fervores extinguit, vasa pulmonaria aperta sigillat, ruptaque consolidat. Electuarium Poterii (terreo-opiatio-mucosum) $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. \mathfrak{ij} . Sanguinis & succorum acres & asperitates quasvis exoticas & corruptivas destruit; atque indolem balsamicam, mollem & oleosam inducit. In febre hecticâ nulli cedit medicamento. Electuarium Regium aromatico-acido-amarum.) Appetitum acuit. Electuarium Rosatum (styptico-oleoso-acri-aromaticum.) Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, & id genus morbos spiritales. Electuarium Sanans (oleoso-glutinoso-styptico-dulce) $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. \mathfrak{ij} . Admodum proficuum est contra tussim acrem, oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam. Electuarium de Sarsâ (mucoso-balsamico-oleosum.) Ad dolores arthriticos vagos. Electuarium Scorbuticum temperatum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. (acido-terreo-mucosum.) Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est; ventriculi fermentum restituit, ejusque & aliorum viscerum, chylosi inservientium functiones juvat; sanguinem & succos adustos temperat, & depurat, obstructions expedit & diuresin concitat. Electuarium Stomachicum $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ij} . (styptico-amaro-aromatico-acri-opiatum.) Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; flatus

flatus discutit, appetitum instaurat, coctionem juvat, vomituritionem tollit. Electuarium Tartarifatum (acidomucosum.) Sitim restringit, fervorem reprimat, appetitum revocat, dolores ventriculi sedat; viscidos humores tenuat, obstructions reserat, flatus discutit, crude humores incidit eosque educit. Electuarium Terebinthinatum ʒij. iij. (styptico-oleoso-balsamicum.) Utilissimum est ad tussim à pituitâ crassâ pulmonibus impactâ ortam, ad purulentas exulcerationes, ubi non datur febris hectica; necnon ad renes detergendos & urinam ciendam. Electuarium de visco (styptico-mercuriali-aromaticum.) Ad affectiones cephalicas, præsertim convulsiones & vertigines. Electuarium de Zedoaria ʒij. (aromatico-balsamico-acri-opiatum.) Auxilio est in colicâ, & exhiberi potest (post purgationem) in ipso paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad præcautionem colicæ hysterica habitualis, ubi ventriculus & intestina sunt frigida, laxa, & imbecilla. Electuarium de Zinzibere ʒj. (styptico-acri-aromaticum.) Ad ventriculum & cor confortandum coctionem juvandam, nauseam tollendam, vomitum sedandum, flatus dissipandos, nativum calorem sustentandum. Emplastrum de Albo (styptico-aromaticum.) Dorso applicetur ad dolorem sedandum & calorem minuendum. Emplastrum Anginosum (balsamico-amarum.) Applicetur gule, adeo ut ad utramque aurem pertingat. Emplastrum Anodynum (styptico-oleoso-balsamico-opiatio-cetidum.) Refrigerat, dolores placat. Hic author eximius sententiam eorum, qui opium calidum reputant, amplectitur; siquis autem principiorum rationes inter se expendere velit, faciliè nobiscum sentiet, opium laxare fibras, lenire humores acres, ac id propter doloris finem statuere. Emplastrum Arthriticum (visco-oleoso-styptico-aromaticum.) Humores acres obtundit, viscidos attenuat, & per diaphoresin foras evocat, fibrillarum spasmum & tensionem dolorificam blandè relaxat, articulos roborat. Emplastrum Balsamicum (styptico-balsamico-aromaticum.) Ad lumborum debilitatem, dolorem & fluorem album, dorso adhibeatur; suprâ ad verimus, quâ emplastra hujusmodi conferant; medici emplastra dorso eò admoventes, ut fluxus hic reprimatur, eorum emolumentum laborantibus afferunt, eosque pom-

posse eludunt. Emplastrum Hydropicum (oleoso-styptico-balsamico-aromaticum.) *Lympham intra corpori habitum aggestam, & coagulata attenuat, commove, & per diaphoresin amandat.* Emplastrum Ictericum (foetido-dulce.) *Infantibus, inquit author, Ictero defœdatis subsidio est; cæterum qui ictero laborantibus opereretur, volumus, explicet.* Emplastrum Nephriticum (opiato-oleoso-styptico-aromaticum) dolores renum sopit. Emplastrum Pectorale (viscoso-aromatico-foetido-acre) calefacit, attenuat, discutit, roborat, musculos thoracicos colluvie viscidâ frigidêque impeditos lustrat, & consolatur; usui est ad tussim cum pectoris gravitate & teneritudine conjunctam. Emplastrum Pleuriticum (styptico-oleoso-opiato-foetidum.) *Valde anodynum est, dolores pleuriticos & podagricos placat, tumores inflammatorios dissipat, anginam solvit.* Emplastrum Puniceum (foetido-balsamico-styptico-aromaticum.) *Hoc elegans emplastrum, caput, stomachum, abdomen, uterum optimè roborat & consolatur.* Emplastrum Spinale (styptico-foetido-oleosum.) *Ad dorsi dolorem, & debilitatem, spinalisque medullæ obstructionem eximie convexit.* Puerulis rachitide laborantibus à nuchâ usque ad os sacrum adhibeatur. Emplastrum Stomachicum comp. (aromatico-balsamico-stypticum.) *calorem & concoctionem juvat, nauseam & vomitum reprimit, ventriculum cruditate & flatibus liberat, ejusque laxitati, imbecillitati & distentioni opitulatur.* 2. Emplastrum Stomachicum comp. (aromatico-styptico-balsamicum.) *Ad dorsum in Stomachi debilitate applicetur.* Emplastrum pro Temporibus (aromatico-opiatum.) *Anodynum est, valet contra vigilias & capitis dolorem; dentium cruciatum tollit, pone vel sub aures admotum.* Emulsio Balsamica (balsamico-mucosa.) *Phthificis aptè præscribitur, lenit enim, demulcet, tubercula discutit, putredinem delet & sanat.* Emulsio de Cornu Cervi (terreo-mucoso-opiato-aromatica.) *Feliciter usurpatur in febribus diarrhœâ symptomaticâ stipatis, pro potu ordinario.* Emulsio Diuretica (acri-aromatico-opiata-terrea.) Emulsio variolosa cochl. vj. (mucoso-opiato-aromatico-terrea.) *variolarum eruptionem juvat, motum sanguinis efferum compescit.* Enema Anodynum (mucoso-spirituoso-opiatum.) *Intestina*

stina mucilagine glutinosâ obliterata, indeque refrigerata & spasmodis, flatibus, torminibusque vexata calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit. Enema Carminativum (aromatico-amaro-spirituoso-oleosum.) Ad colicam flatuosam, hydropem, à coctione malâ ortum. Enema Colicum (spirituoso-oleoso-fœtidum) In intestinorum cruciatibus, & astrictione, flatibus, colicâ flatuosâ; non in hysteriis. Enema commune (mucoso-amaro-oleoso-aromaticum.) Ad intestina exoneranda. Enema confortans (spirituoso-opiato-mucosum.) Intestina refocillat, in febribus maligna nota egregie proficuum est. Enema dulce (mucoso-dulce.) Quando vermes latitant in intestinis tenuibus, dumque morsicando & erodendo ventris torsionem excitant, commodissimè, ante usum enematis amari, in usum accensetur hic clyster. Enema Febrifugum (amaro-opiatum.) Ad febres cujuscunque sortis intermittentes profligandas, patientibus medicamenta assumere respicientibus, puerisq; morosis hacce decocta profuisse reperit. Ab Helvetio clysteres febrifugi primò in usum vocabantur. Enema leniens (mucoso-opiatum.) Locum habet, quando humorum biliosorum acrimonia intestina vehementer stimulat; acorem obtundit, membranas mucilagine oblit, spiritus irritatos compescit. Enema oleoso-amarum (oleoso-amarum.) In colicâ intestinorum crassorum. Enema Saponaceum (mucoso-amaro-aromatico-oleosum.) Flatus discutit, faeces emollit, intestina evacuat, vias urinarias lubricat, arenulas pellit, calculosis dicatur. Enema Terebinthinatum (salino-balsamico-mucosum.) Opem promittit in ventris torminibus, colicâ humorati, Dysenteriâ, Phthisi, affectibus à nervorum oppilatione vel laxitate ortis, Cachexiâ, Hydrope, ulceribus uteri, renum, vesicæ; ad calculi præcautionem, arenulas, mucum expurgandum; in urina obstructione, Dysuriâ, fluore albo, Gonorrhœâ. Enema ad Tormina (terreo-fœtido-aromatico-opiatum.) Acidum corrigit, intestina confortat, flatus dissipat, dolores sedat, spasmos tollit; puerulis vel dentitione difficili vel humorum acrimoniâ apprimè convenit, nempe quando dejectiones virides & torminosæ, vigilie, inquietudines, suffusiones erraticæ febriles &c. adsunt, & convulsiones intentant. Epithema Anodynum (spirituoso-fœtido-opiatum.) Humores dissi-

pat, & per poros evaporat, partes nervosas spasmodicè affectas confortat. Epithema Avicennæ (alcalino-acidum.) Ad affectiones pericranii frigidas. Epithema Cephalalgicum (aromatico-acido-oleoso-viscosum.) Ad capitis dolores ardentes, pulsatiles, vigilias, & deliria in febribus non malignis. Epithema frontale aqueum (fœtido-acido-aromaticum.) Ad symptomata ex febre ardente non malignâ oriunda, deliria, cephalalgias, &c. Epithema Frontale Lacteum (mucofo-viscofo-opiato-fœtidum.) Spiritus consopit, refrigerat, dissipat. Epithema Saponaceum (spirituoso-oleoso-salino-fœtido-opiatum.) Ad Arthritidem, nam sopit dolores, ac dissipat. Epithema Stomachicum (spirituoso-acri-opiato-aromaticum.) Ad laxitatem & frigiditatem ventriculi, nauseam, vomitionem, dolorem. Expressio Beccabung. comp. lbss. (acri-aqueo-acido-styptica.) In Scorbuto; misturæ hujusmodi sunt revera Salso-acida; cùm vires igitur à salium prædominio acquirant, necesse est, quo plus contineant salis volatilis, eo magis calefaciant; & vice versâ; cum expressio igitur acido eo usque saturetur, ut acescat, compositum frigidum nuncupari meretur. Expressio Pleuritica (amaro-acido-salfo-terreo-opiata.) Spirituum ferociam refranat, sanguinis fervorem temperat, visciditates tenuat, Diuresin provocat, dolores sedat. Expressio Rosacea (terreo-styptica.) Ad Diarrhœam symptomaticam, remedium fidum depradicat author. Non enim glandularum ora occludit tantum, verum etiam humores acres resorbet. Expressio Scorbutica temperata (amaro-acido-aromatica) ℥iv. In scorbuto, calido, fervore, macie inde. Extractum Pectorale (viscosomucofo-stypticum.) Pectori ideo succurrit, quia irritationem sedat, ac extillationem prævertit, unde acrimoniam seri obtundit, istud incrassat, catarrho acri opem fert. Fetus ad Articulorum dolores (acido-spirituosus) dissipat ac constringit; ast hæremus, num ob doloris mitigationem à tumore evanido adeo exultare debent, ut nil habeant, quod ultra vereantur. Fetus Camphoratus (acido-salino-fœtidus.) Hemorrhagias sistit, ebrietatem arcet. Fetus Diureticus (aromatico-mucofo-oleoso-salinus.) In cruciatibus à calculo & urine suppressione excitatis, quia emollit fibras, easque stimulat. Fetus ad Hæmorrhoidum do-

orem (mucoso-fœtido-amaro-styptico-opiatus.) *Tensionem laxat, acrimoniam obtundit, discutit, repellit.* FOCUS ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum (mucoso-romatico-styptico-acerbis.) *In omni fluxu astringit.* FOCUS Lateralis (mucoso-opiato-aromaticus.) *Emollit, dissipat, dolores compeſcit; in pleuritide externâ valet, bras laxat, spiritus conſopit, pituitam attenuat; non in internâ.* FOCUS Ophthalmicus (opiato-mucosus.) *Dolores lenit.* FOCUS Pacificus (mucoso-opiatus.) *In febribus ardentibus vigilias compeſcit, deliriis opem fert; non vero in malignis admoventus eſt.* FOCUS Sambucinus (fœtido-oleoſo-salinus.) *Dolorem in Eryſipelate alleviat, & diſſipat humores; Eryſipelati ulcerato non admoventur.* FOCUS Scorbuticus (amaro-opiato-acri-stypticus.) *Dolores lenit, acres humores demulcet, ichorem ſcorbuticum diſſipat, tonum reſtituit.* FOCUS Stomachicus (ſtyptico-pirituoſo-acido-amaro aromatico-opiatus.) *Fibras confortat, diſſipat humores, dolores ſopit.* Num dysenterię, vel Diarrhœę conducat, haud certamus. FOCUS ad Tympanitum (ſalino-ſpirituosus;) quantum emolumenti ſotu hoc in Tympanitide expectandum eſt, vix ſtatui poteſt; cùm nondum Tympanitidem deſinierunt medici. Gargarisma Anginoſum (amaro-mucoso-terreo-alino-acido-stypticum.) *Tam emollit fibras turgidas, quam illas à muco ſalivæ expedit, magis tamen inflammationi accommodatur.* Gargarisma commune (aromatico-acido-styptico-dulce.) *Sitim fallit, mucilaginem oris abſtergit.* Gargarisma ad Hæmodiant (mucoso-terreo-alino-ſpirituoso-aromaticum.) Gargarisma Myrrhiſatum 1. (ſtyptico-amarum.) *Astringit, diſſipat; gingivas ſanguinolentas ſanat, ulcera oris detergit, & ozenam.* Gargarisma Myrrhiſatum 2. (amaro-mucoso-styptico-pirituoſum.) *Ad ulcera detergenda.* Gargarisma Paralyticum (acri-acido-stypticum.) Gargarisma de Pyrethro (acri-opiato-aromatico-ſpirituosum.) *Glandulas vellicat, ſalivam educit, dolores conſopit; tumores diſſipat, dentalgia ſuccurrit.* Gargarisma Scorbuticum (amaro-acri-aromatico-stypticum) *oris partes à ſordibus liberat, ſcruſcula ſiccant.* Gargarisma Sedativum (ſtyptico-acri-aromatico-opiatum.) *Ad dolorem ſedandum, diſſipandum.* Gargarisma Sinapinum (ſpirituoso-acido-acre.)

Ad paralyfin lingue, morbos foporofos. Gargarifma Variolofum (mucofo-acido-flyptico-dulce.) *Partes oris & gula inflammatas, dolentes, emollit, lenit, puftulas maturat, falivationem adjuvat; at ritè obferuat author, falivâ omnino fuppreffâ, acriora ufurpanda effe.* Gargarifma ad ulcera (flyptico-mercuriale.) *Ulcerâ rebellia ficcât, non cancrofa.* Gargarifma pro Uvulâ (amaro-flyptico-acri-fpirituofò-acidum.) *Ad inflammationem Tonfillarum, quia ftimulat, constringit & evacuat.* Haufus Astringens (aromatico-flyptico-opiatus.) *Viscera confortat, tonum eorum roborat, motum dejeftorium reprimat, fpiritus efferos pacat, diaphorefim provocat.* Haufus Bechicus (vifcofo-aromatico-opiatus.) *Serum acre irritans, incraffat, fomnum accerfit, tuffim irritantem fedat.* Haufus Camphoratus (foetido-mucofo-flypticus.) *Stillicidium & ardorem lenit.* Haufus ad Cafum (fpirituofò-balfamico flypticus.) *Hæmorrhagias fiftit, acorem abforbet.* Haufus ad Febrem Vulnerariam (amaro-acido-terreo-balfamicus.) Haufus Febrifugus (amaro-opiato-alcantino-aromaticus.) *In Febre intermittente, ubi albor, Diarrhœa.* Haufus Febrifugus Riverii (amaro-alcantino-acidus.) *In Febre intermittente ante paroxyfmos, durante luctâ inter alcali & acidum, ait author.* Haufus Nitrofus (falino-mucofus.) *Ait, quod fanguinem refrigerio perfundat, ejus lentorem incidat, inflammationes, obftructionesque excutiat; fitim fedet, urinam moveat, valeat contra pleuritidem, Peripneumoniam & Febres inflammatorias malignitatis expertes.* Haufus oleofus (oleofo-mucofo-acris.) *Ad pleuritidem cum fputo cruento, Peripneumoniam & afthma (præmiſſis præmittendis) optimus.* Haufus Pleuriticus (amaro-mucofo-opiato-acris.) *Dolorem fedat, humores foras pellit.* Haufus Saponaceus (mucofo-falinus.) *Ad Ictericum.* Icteri vero adeo à fe difcrepant, ut iſtis non eodem ſemper modo medicemur; quando à vifcido ductum obturante exordium ſumunt, oleoſa perperam exhibentur; quando à ſpaſmo oriuntur, ftimulantia evitanda ſunt; quando autem calculi ictero anſam præbuerunt, oleoſa ac ftimulantia unâ eò exhibenda ſunt, ut meatus amplièntur ac ſimul ftimulentur. Haufus Saturninus (flyptico-acido-opiatus.) *Ad Hæmorrhagias.* Haufus Variolofus (a-

maro-aromatico-opiatus.) Haustus contra vomitum (aromatico-acido-alkalino-opiatus) ʒss. *In vomitione.* Hydrogala chartaceum (mucoso-aromaticum) increffat; sudores matutinos, diarrhœas, mēſium fluxum reprimi. Hydromel Aſthmaticum (fœtido-aromatico-dulce.) *In Tuſſi Aſthmaticâ viſcidâ.* Hydromel Calceum (alkalino-ſtyptico-aromatico-acri-dulce.) *Sal acidum ac muriaticum corrigit, fluxionem minuit, tuſſibus à ſale ſanguinis ortis medetur; necnon ulceribus pulmonum benignis & exiguis.* Hydromel cum Ceraſis (dulc.-acidum.) *In Tuſſi acri.* Hydromel Diureticum (amaro-aromatico-dulce.) Hydromel Diuretico-lævigans (mucoso-aromatico-dulce) ʒiv. Hydromel Joëlis (aromatico-fœtido-mucoso-dulce) ʒss. j. *Pituitam educit, Aſthmati humido ſuccurrit,* Hydromel Pectorale 2. (mucoso-dulc.-aromatico-amaro-acre) ʒiiij. *Incidendo expectorat; lubricat etiam; hinc catarrho tenui non confert, ceterum tuſſim profundam, laborioſam exantlat.* Hydromel de Symphyto (viſcoſo-ſtyptico-opiato-dulce) ʒiv. *In Hemorrhagiis; item in Catarrho tenui, acri, titillante.* Infuſum Hiſpanicum (ſalino-fœtido-dulce) ʒiv. ad ʒss. *Incidit, lubricat; hinc eſt, quod expectoret; quia vero parium incidit, multum autem increffat; catarrho febrili magis quam aſthmatico accommodatur.* Infuſum Reſerans (dulc.-aromatico-ſpirituoso-ſalinum;) *aperit, ſanguinem viſcidum pituitolum attenuat.* Infuſum Rubrum (opiato-ſtyptico-amaro-ſpirituosum) ʒiv. *In Diarrhœis.* Infuſum Traumaticum ʒiv. vj. (opiato-mucoso--amaro-ſpirituosum.) *Ad Caſum, Contuſionem.* Infuſum Urticæ ʒv. (acri-aromatico-viſcoſo-ſtyptico-opiatum.) *Ad urinam cruentam, ulcera renum & veſicæ.* Julapium Antemetikum (aromatico - amaro - acido-alkalino-opiatum) ʒiſſ. *Vomitum ſiſtit.* Julapium Diureticum Acidum (acido-ſpirituosum) ʒiv. vj. *Uſurpatur in conſtitutione, ubi ſal dominatur fixum.* Julapium Diureticum nitroſum ʒiv. vj. (ſpirituoso-mucoso-ſalino-ſaluſum.) *Diureticum eſt in conſtitutione calidiori.* Julapium Idæi q. v. (vinoſo-aromatico-acido-terreſtre.) *Cardiacum.* Aſt peti poteſt, què operatur? Julapium Pleuriticum ʒiv. (opiato-mucoso-ſalſo-acidum.) *Refrigerat, dolores ſopit, coagulum ſolvit, Diureſin provocat.* Julapium Puerperarum. (aromatico-

(aromatico-opiatum) ℥iij. iv. *Ad tormina à partu; ad menses revocandos*: Menses reverà quàm sæpissimè subsistunt, propterea quòd vasa contrahantur, vel spasmus teneantur; quando opiata igitur nervos elongant, laxantque, vasorum parietes quibus nervi affiguntur, longius ab invicem recedunt; ex quo fiet, ut sanguinis momentum in orificia magis arietet, menses denuò profiliant. Julapium stypticum ℥iij. (acido-styptico-opiatum.) *Sanguinis turgescientiam compefcit, acre corrigit, vasa claudit, fluxibus sanguinis prodest.* Lavamentum Hydropicum (spirituoso-aromatico-opiatum.) *Ad tumores molles, gangrenam præcavet.* Linimentum Frontale (terreo-oleoso-opiato-aromaticum.) *Ad somnum conciliandum, dolores capitis sedandos in partibus externis sitos; ait, author ex Foresto Obs. 3. l. 9, in scholio. dolor externus est cum frons caleat, & pulset multum; cæterùm hoc adjicere licet, dolorem, nimirum, parte internâ oriundum, sensum ac motum aliquatenus molestiâ percellere ac interturbare; quinimò, ex Riverio, addamus, dolorem externum vel pericranio infestum, ex his detegi, quod hi non possint ferre manuum compressionem, nec pilorum inversionem; & quod dolor ad oculorum radices (uti fit in dolore interno) non pertingat.* Linimentum Hæmorrhoidale (mucoso-oleoso-styptico-fœtido-opiatum.) *Ad dolorem sopiendum, partes tensas constringendas, humores dissipandos, ac hæmorrhoidibus cæcis finem statuendum.* Linimentum Laterale (oleoso-fœtidum.) *Ad fibras tensas emolliendas, spasmos compefcendos, humores glutinosos dissipandos, inflammationi finem imponit; hinc in pleuritide externâ valet.* Linimentum Spinale (salso-vinoso-oleoso-aromaticum.) *Humores impactos dissipat, adherentes extergit, rachiticis prodest.* Linimentum Volatile (oleoso-volatile.) *Ad dolores compefcendos, impactos humores dissipandos.* Litus ad Aphthas (oleoso-aromatico-terreus.) Litus Facialis (amaro-spirituoso-acido-sal-so-styptico-mercurialis.) *Ad faciei deturpamina quæcunque; nam dissipat, constringit, extergit.* Litus Joëlis (caustico-styptico-acido-amaro-dulcis.) *Ad gingivas ulcerosas, putridas, fungosas.* Litus de Laccâ (amaro-styptico-caustico-aromatico-dulcis.) *Ad gingivas putridas, à carie dentium, &c. ortas.*

Lohoch Anginosum (terreo-acri-dulce.) Lohoch Balsamicum (balsamico mucoso-aromaticum.) *Incidit, sanat, pectorale calidum est.* Lohoch Enulatum (aromatico-styptico-dulce-opiatum.) *Ad tussim irritantem, ac simul crassam; nam irritationem sedat, extillationem præcavet, pituitam educit: Tussi, nempe, à pituitâ falsâ orta medetur.* Lohoch de Lino (oleoso-balsamico-aromatico-mucoso-fœtido-acre.) *Ad orthopnoeam à viscidâ ac crassâ pituitâ adhærente.* Lohoch Lucatelli (styptico-acido-balsamicum.) *Vesiculas sanat, tubercula discutit, tussim gutturalem sistit.* Lohoch Myrrhisatum (amaro-fœtido-dulce.) *Pituitam educit, pulmones sanat, tubercula dissipat.* Lohoch de Olibano (balsamico-styptico-acido-dulce.) *Ad fauces excoriatas sanandas.* Lohoch Peruvianum (mucoso-aromaticum.) Lohoch Pleuriticum (opiato-oleoso-aromaticum.) *Dolorem lenit, expecterat.* Lohoch Puerperarum (oleoso-balsamico-aromatico-mucosum.) Lohoch ad Raucedinem (oleoso-balsamico-dulce.) Lohoch Rubrum (acido-aromatico-oleosum.) *Fauces aridas lenit.* Lohoch de Spermate Ceti (mucoso-oleoso-acidum) *Ad Tussim ubi excoriatio inducitur, quæ per pectoris teneritudinem noscitur.* Lohoch Stypticum (mucoso-oleoso-styptico-dulce.) *Ad vomitum & sputum sanguineum.* Lohoch Viride (oleoso-salino-mucosum.) *Incidit, extergit; inde est, quod tussi viscidâ, firmiter bronchiis hærenti, opem ferat.* Lotio Camphorata (ferudo-acido-vinosa.) *Ad faciei maculas dissipandas, partes & tubulos capillares constringendos, ne exillet materia, quæ faciei tubulis insideat.* Lotio de Cerasâ (terreo-acido-aromatica.) *Ad Inflammationes, Erysipelas, Pruritus.* Lotio ad Erysipelas (spirituoso-styptica.) *Dissipat & constringit.* Lotio Pedalis (opiato-mucoso-salia.) *In febre ubi astus, impetus, deliria, ac insomnia, non in Febre mali moris.* Mel Pectorale (aromatico-mucoso-dulce) \frac{ss} . Mîstura Ammoniaca (fœtido-dulce-aromatico-amaro-acida) \frac{ss} . *In difficultate spirandi.* Pen vero potest, cui orthopnoeæ opem ferat? respondemus, tunc usurpanda est, quum bronchiæ pituitâ crassâ opplentur, quum utique firmiter trachææ hæret: Nam incidit, perinde atque vomitionem ciet, ac proinde utramque facit paginam, tam pulmones ir-

ritando quam eos quatiendo. Mistura ad Arenulas $\text{ʒi}\beta$. (mucofo-oleofo-fpirituofa-acris.) Mistura Affhmatica (opiato-dulc.-acido-naufeofa) ʒiv . *Affhmati ftomachali (quod ab acido ventriculum, ac per confenfum diaphragma & mufculos expiratorios, vellicante oritur) fubvenit: Pituitam educit, fpafmodicam contractionem alleviat* Mistura Balsamica (balsamico-mucofo-vinofo.) *Muraticum delet, ulcera sanat, Gonorrhœa confert, urinam ciet, tubercula diffipat, tuffes periculofas curat, &c.* Mistura Balsamica Gileadentis (balsamico-aromatico-fpirituofa-mucofo) $\text{ʒ}\beta$. *In Phthifi.* Mistura Balsamica Nephritica (balsamico-aromatico-mucofo-acris.) *Ulcerata sanat, Fluorem album & Gonorrhœam; Diuretica eft; calculos ex veficâ felleâ, renibus pellit.* Mistura Balsamica Pectoralis (balsamico-aromatico mucofo) ʒiv . Mistura Balsamica Peruviana, $\text{ʒ}\beta$. (balsamico-aromatico-mucofo.) *Expeâtorat, sanat.* Mistura Bechica (opiato-flyptico-mucofo-aromatica.) *Ad catarrhum tenuem, increffat, irritationes placat, Diaphoresin provocat.* Mistura de Bolo (aromatico-flyptico-opiata) ʒiij . *In Diarrhœâ Symptomaticâ.* Mistura Carminativa Anodyna (mucofo-aromatico-opiata) ʒiv . *vj. Ad colicam, calculum.* Mistura ad Concretiones $\text{ʒ}\beta$. (aromatico-acido-fpirituofa-terreo-oleofo-opiata) *In pleuritide incipiente, Diaphoresin accerfit, effufiones præpedit, craffitiem incidit,* Mistura Corollata ʒj . (terreo-alkalino-acido-aromatica.) *Vomitiones fedat, humores immutando.* Mistura Diafulphuris (opiato-oleofo-acris.) *Ad Tuffim acrem.* Mistura de Glycyrrhizâ (dulc.-aromatico-opiata) $\text{ʒ}\beta$. *In Catarrho tenui* Mistura ex Oculis Cancrorum (acido-terreo-balsamica) ʒiij . *In Febre intermittente, vagâ, in conturbationibus Hypochondriacis.* Mistura Pacifica (opiato-aromatica.) *Ad Diarrhœam.* Mistura Papaverina (aromatico-opiata.) Mistura Pleuritica (aromatico-terreo-acri-opiata) $\text{ʒ}\beta$. *Dolores fopit, tuffim aufert, humores impacâos rursum fanguini committit.* Mistura Puerperarum (oleofo-balsamico-aromatico-acri-opiata.) Mistura Saturnina (acri-flyptico-fcetida) gr^{ss} . xv. xxx. *In Gonorrhœâ (à turgente geniturâ) pollutione nocturnâ.* Mistura de Spermate Ceti (fpirituofa-oleofo-acri-terreo-dulcis) ʒvj . *In Contufis, quia fanguinem concretum folvit.* Mi-
ftura

Mistura Stomachica (aromatico-acida) gtt. xl. *Appetitum prostratum restituit, vomitum sedat.* *Mistura Terebinthinacea* (amaro-acri-oleoso-mucoso-vinosa) ʒiʒ. *Urinam ciet, & arenulas deturbat, ulcera sanat.* *Mistura Thebaica* (opiato-spirituoso-acris.) *Mistura ad Tormina* (aromatico-opiato-mucoso-acri-alkalina.) *Ad Colicam, Tormina flatuosa.* *Oxymel Asthmaticum* (acri-fœtido-acido-dulce) ʒiʒ. *Ad Asthma, Orthopnœam humidam.* *Oxymel Chalybeatum* (vid. *Oxymel simplex*.) *Oxymel de Peto* (amaro-nauseoso-dulc-acido-aromaticum.) *Ad Asthma, Tussim à viscido, tenaci.* *Pasta Gallica* (styptico-cathæretico-terreo-dulcis.) *Ad Dentes expurgandos à lapide dentali, & dealbandos.* *Pilulæ Antemeticeæ* (aromatico-alkalino-styptico-opiatæ.) *Pilulæ Antiphthificæ* (styptico-balsamicæ) n° iv. vid. *Tinctura Antiphthifica.* *Pilulæ Camphoratæ* (fœtido-dulc.-balsamicæ.) *Pil. Chalybeatæ Balsamicæ* (styptico-balsamico-amaro-fœtidæ) n°. v. *Pil. Crocæ* (fœtido-aromatico-acri-dulces) n°. ij. *Ad Pituitam educendam, Bronchias irritando.* *Pil. Diacurcumæ* (amaro-fœtido-acri-alkalino-aromatico-opiatæ) ʒj. ʒʒ. *In Ictero, Cachexiâ.* *Pilulæ Ictericæ*, n°. vj. (falso-acido-amaro-oleosæ.) *In Ictero, nisi adsit tumor vel obstructio invincibilis.* *Pil. Nephriticæ* ʒʒ. (acri-amaro-falso-oleoso-balsamicæ.) *Ad sabulum, mucumque expellendum.* *Pil. Poterii* (mucoso-dulc.-balsamicæ.) *Ad tussim catarrhalem, ubi pituita salsa, at tenax.* *Pil. Resinosæ* (oleoso-styptico-fœtido-balsamicæ) ʒj. ʒʒ. *In urinæ ardore, fluore albo, Gonorrhœâ.* *Pil. è Sale Chalybis minores* (styptico-fœtidæ.) *Pil. ad Scrophulas* (terreo-alkalino-styptico-fœtido-balsamicæ) n° v. *Pil. Smegmaticæ* ʒj. (oleoso-salino-aromaticæ.) *In Ictero, Dysuriâ, Calculo.* *Pil. Sulphuræ* (amaro-balsamico-dulces.) *Ad affectus Pectorales.* *Pil. è Terebinthinâ* (styptico-terreæ) n° vi. *Styptica sũnt.* *Potio Colica* (aromatico-opiato-acri-salino-mucosa.) *Potio Vulneraria Arcæi* (amaro-nauseoso-styptica.) *Potus Vinosus refrigerans* (vinoso-aqueo-spirituoso-acidus.) *In Siti.* *Pulvis Anthelminticus* (terreo-falso-mercurialis) gr. xv. *Ad vermes necandos.* *Pulvis ad Casum* (styptico-falso-acris.) vid. *Decoctum Traumaticum* *Pulvis Cephalicus* (terreo-aromaticus ʒj. *Ad capitis dolo-*

res, *ad Rabiem.* Pulv. Colicus (oleoso-fœtidus.) Pulvis Dentifricius (terreo-salsus.) *Ad lapidem dentalem, dentes albandos.* Pulv. Diasulphuris ℥ij. (oleoso-salfo-aromatico-dulcis.) Pulv. Halosanthinus ℥j. (oleoso-terreo-acri-salfo-opiato-dulcis.) *Pro Contusis & Puerperis.* Pulv. Montagnanæ ℥j. (salfo-styptico-amarus.) *Ad Incontinentiam urinæ in lecto.* Pulv. Nephriticus ℥j. ℥j. (acri-aromatico-fœtidus.) *Urinam, calculum, menses pellit.* Pulv. Nitrosus (salfo-terreo-mercurialis) ℥j. *Urinam ciet, in Febribus.* Pulv. Oc. Cancror. comp. (terreo-acido-salino-alcalinus) ℥j. *Materiæ febrilis secretionem promovet.* Pulv. Pectoralis (oleoso-aromatico-dulcis.) Pulvis Puerperarum ℥ij. (salfo-oleoso-amaro-fœtidus.) Pulv. Salinus major ℥ss. (salfo-acido-terreo-aromaticus.) *Diureticus.* Pulv. Salivam movens (acido-salsus.) Pulv. Tartari comp. (salfo-acido-stypticus.) *In anorexiâ biliosa.* Pulv. Theriacalis (styptico-aromatico-amaro-fœtido-opiatus.) *Vid. Theriac. Androm.* Pulv. Tilingii (salfo-acido-terreus) ℥ss. ℥j. *Ad nephritidem, calculum.* Pulv. Uvularis (styptico-acris.) *In Uvulâ laxatâ.* Succus Hydropicus (styptico-amaro-acris) ℥iij. Suffitus ad ani procidentiam (aromatico-salfo-stypticus) utrum particulæ stypticæ per ignem exhalant, opportunior dabitur dicendi locus. Suffitus ad Tenesmum (opiato-mucoso-amaro-stypticus.) Syr. Boyleanus (mucoso-stypticus.) *In Hemoptœ.* Syr. è Sale Chalybis (styptico-aromaticus.) Syr. è Sal. Chalyb. Hystericus (fœtido-stypticus.) Syr. Theriacalis (amaro-acri-opiato-acido-aromatico-stypticus) ℥j. *Alexipharmacus.* Syr. ad Tussim convulsivam (styptico-amaro-mucosus) ℥ss. j. Tinctura dulcis (dulc.-amaro-vinos.) *Pectoralis in tussi acri.* Tinctura Japonica (styptico-amaro-spirituosa.) Tinctura Laccæ (amaro-septico-acris.) *Ad Gingivas corruptas.* Troch. Balsamici (styptico-aromatico-balsamici.) Troch. Catarrhales (dulc.-opiato-mucosi.) Troch. Pectorales nigri (balsamico-dulces.) Ung. ad Atrophiam (oleoso-acri-stypticum.) Ung. de Bismuth (oleoso-terreum.) *Ad faciei ruborem variolosum.* Ung. ad Calculum (oleoso.-acre v. Emp. Pectorale. Ung. Pleuriticum (oleoso-fœtido-acre.) *Inflammationes dissipat.* Ung. Podagricum (oleoso-acri-refinoso-mucosum.) v. Emp. Arthriticum.

ticum. Ung. Puerperarum (oleoso-aromaticum.) *Ad rugas abdominis post partum.* Ung. Renale. (oleoso-acido-opiato-foetidum.) *Ad dolores Nephriticos.* Ung. Saponaceum (oleoso - salino - terreo - acri-aromaticum.) *Ad faciei maculas, pustulas, scabiem.*

Corollarium.

Electuarium Phthisicum.

R. Conf. Rosar. Rub. ℥ij. Chel. Cancror. pp. Corall. r. pp. Pulv. Haly ana ℥j. cum s. q. Syr. Capill. Vener. m. f. Electuarium, de quo capiat quantitatem castaneæ mane horâ undecimâ, & vesperi septimâ, & horâ decubitûs, superbibendo, &c.

OBSERVATIONES.

Electuarium hocce constat particulis stypticis, absorbentibus, necnon mucosis ac opiatis; hinc fit, ut tussibus, quæ continuò irritant, opem ferat, acres humores bronchiis insidentes obtundat, necnon extillationem anteriorem præripiat: Hoc autem jugiter advertendum est, quòd prius evacuationes debitæ præmittendæ ac evulsoria prius adhibenda sint, quam alterantia in u-um trahantur; ex eo, quòd vasa humoribus expedienda sunt, antequam exudatio humorum tuto præveniri poterit; quoniam, his non præmissis, vasa sanguinea paulò turgidiora ita stypticis ac opiatis suffercirentur, notu anomalo præsupposito ac permanente, ut asthma, hæmoptyses atque alia symptomata dira certò subsequerentur, uti medico, vel parum exercitato, liquidò constat.

Pilula Alliotica.

Chel. Cancror. pp. oc. Cancror. pp. ana ℥j. Pulv. Haly ℥β. cum s. q. Syr. de Althæâ, m. f. Pilulæ minores (obruantur pulvere oc. Cancror.) quarum sex capiat mane quotidie & vesperi in Cochl. Julap. &c.

OBSERVATIONES.

Cum sint absorbentes, molles ac opiatae, acido advertuntur, humores acres obvolvunt, tussibus continuò ti-

tillantibus necnon irritantibus opitulantur; dysuriis subsidio sunt; ac demum humores acidos adeò præcipitant, ut eæ per urinam decidant.

Siquidem Anglia nostra salibus vitriolicis, metallo deciduis ferreo, maximè scatet; plerunque idcirco fit, ut calculi renum vel è vesicâ execti, & ustulati, necnon in pollinem pistillo redacti, magneti admoto morem gerant, eumque insectentur: Hinc concludere liceat, particulas metallicas cum edulio nostro commistas acidique ope in lapillos congelaturas, istis alcalinis exhibitis posthac ita parum concrefcere, ut per anum ferantur, ac proinde calculorum germen præcidetur exindè.

Mixtura Expectorans.

℞ Syr. de Heder. terrestr. Capillor. Vener. ana ℥iij. Oxymel. Scillitic. ℥ss. m. capiat cochl. j. vel duo, subindè, urgente Dyspnœâ.

OBSERVATIONES.

Bechica mollia in usum trahuntur, quoties tussis sicæ ægrotos infestant; vel quoties materia bronchiarum parietibus ac glandularum orificiis firmitè adnascitur; mistura vero hujusmodi pituitæ inertis asperæ arteriæ uspiam insidenti quam optimè accommodatur, quòd per particulas acres salinasque sanguinem acuit, qui inter circulandum partes has, in bronchiarum orificia, latè dehiscentia, facile deponit, fibrasque earum adeò tutillat, ut eæ fluida concreta expeditè excutiant; hinc est, quòd *tussi humida, asthmata, raucedinem, sibilumque introducenti* opem ferat; quæ crocum, flores benzoini, sal succini, syrupum tabaci, ac his consimilia adjiciendo multo fiet efficacior: Quoties verò *temperies adest febrilis, vel irritatio jugis* ægrotos infestat, adeò parum conferet mistura hæc, vel incidentia, ut opiatas, mollibus, ac oleosis solis fidendum sit: Nam quotiescunque *tussis à pituitâ oritur inertis*, quæ bronchiis ita segniter insidet, ut immota perstet, ibidem moram trahat, nec sursum commigret, quæque laxiùs bronchiis adhærescit; toties salia volatilia, amara, ac incidentia in usum trahenda sunt; quoties ita *firmitè bronchiarum parietibus adhæret*, ut nisu vel maximo excuti nequeat,

oleosa

oleosa usurpentur; cum irritatio molesta ac inanis sit, catarrhus tenuis sit & acris, tum mucosa, oleosa, ac opiata introsumentur; ubi materia purulenta pulmonum vesiculis altius infigitur, ibi balsamica exhibeantur; quando excoriatio tussi superinjicitur, mollia unâ cum stypticis propinentur: Ubi tussis mixta est ex horum aliquibus, bechica ita commisceantur, ut utrique indicato repugnent; sit, verbi causâ, pituitosa ac simul irritans incidentia unâ cum opiatis misceantur. Hinc erit, quod tussi tenui opem ferant, Syrupus Dialthææ, Jujubinus, Violarum, Gummi Arabicum, Tragacanthum, Syrupus de Meconio, Pil. è Styrace, Laudanum, Oleum Amygdalarum dulcium, Lini recens extractum, Butyrum infusum, Sperma Ceti, Lactea ac similia; quod tussi humida, pituitosa, non irritanti, sibilum introducenti & Dyspnœam, conferant Salia Volatilia Spiritus Cornu Cervini, Salis Armoniaci, Sal Volatile Oleosum, Sal Salis Armoniaci, Oleum Cornu Cervini, Oleum Guaiaci (vocaturn vulgo Balsamum Fratrum) Balsama Peruvianum, Copaibæ, Opo-Balsamum, Syr. Terebinthinæ, Hederæ terrestres, de Erysimò, Oxymel Scilliticum, de Præssio, Pilulæ è fuligine, Pilulæ Balsamicæ, Flores Benzoini, Sal Succini & alia ejusdem farinæ; quod Tussi à materiâ glutinosâ ac firmiter fibrarum oribus adherenti subsidio veniant oleosa, ut Balsamum Lucatelli, Lac Sulphuris, floresque ejusdem, Balsamum Sulphuris Anisatum, ex Oleo Lini factum ac alia; quod Tussi cui excoriatio adjecta est, mucosa & styptica conducunt, qualia sunt Conserva Rosarum, Terra Japonica, ac alia; quod Tussis irritans opiata præcipuè requiratur, qualia sunt opium ipsummet, Laudanum, Syrupus de Meconio & alia; quod Tussis Sicca Convulsiva, seu Asthma convulsivum, cum sit contractionis ac spasmus species, opiata propter irritationem, ac corticem, ob periodum, postulet; quod Tussis puerorum convulsiva, mucosa, alcalina, opiata requiratur: Quod Tussis mixta varia medicamenta pro re natâ postulet; hinc si sit pituitosa ac simul irritans, uti frequentius, apud Anglos obvenire solet, salia volatilia unâ cum opiatis commisceantur; hinc fit, ut Tusses Pleuriticæ, Cysticæ, à Pure extraneo ortæ, ut Scorbuticæ, Asthmaticæ, Rheumaticæ,

maticæ, Venereæ, Empyematicæ, Hypochondriacæ, Arthriticæ, Ictericæ, ulceribus internis ortæ, Phthisi originariæ supervenientes, vel aliæ quævis remediis suprà nominatis cedere, si tamen, advertantur, præmissis evacuationibus indicatis; uti libri hujus partem primam consulentibus faciliè elucescet.

In asthmatis paroxysmo suffocativo, *Riverii* mistura perquam utilis reperitur; quæ fit, nimirum, ex Aquâ Cinnamomi cum Oxymelite Scillitico mistâ; nam ista spuito suppresso exhinc fugam parat, quòd vomitionem cieat, necnon quòd, cùm ipsius portiuncula cum sanguine confundatur, expectorationem urgeat.

Pilula Anticolica.

R Extract. Rudii ʒj. Extract. Opii Thebaici gr. j. Ol. Carvi gr̃. j. m. f. Pilul. nò. iv. fumendæ quamprimum; repetantur urgente Tussi.

OBSERVATIONES.

Doloribus, qui adeò nusquam diversantur, ut nunc huc, nunc illuc desultent, profunt pilulæ hæ; non tantum quia dolores compescunt, verum etiam quoniam humores, flatus generantes, deorsum pellunt, foras eliminant, eorumque regerminationem præcidunt. Quibus *Riverius* olim mercurium dulcem consultò adjecit: Qui medicamenti viribus multa adjungit.

Commentum, quo purgantia unà cum opiatibus admiscemus, propterea utile est, quòd inversus intestinorum motus ac proinde vomitiones diræ colicis continuò comitentur; interea autem cathartica irritant, vellicant, stimulant, fibrasque intestinales ad evacuationes laceffunt, ac materiem noxiam eliminant, dum opiata statim contorsiones compescunt, earumque sequelas prævertunt. Non colicæ modo, verum iliacæ etiam, flatu pertinaci oriundæ, opem ferent; quippe quæ est tantum colica paulò contumacior: Quod si iliaca exordium sumat ab intestinis tenuibus in scrotum illapsis, methodus hæc, catharsis nimirum, adeò parum proderit, ut multum nocumenti ægrotis illaturum sit.

Quamquam *Pilule* audiunt *Anticolica*; nihilo secius aliis morbis quampluribus accommodantur; si igitur laboret quis dolore musculorum spasmodico unà cum vi-

illis pertinacibus adjunctis; pilulis his, horâ somni decoratis, somnum accersimus, dolores sopimus, simulque humores nocuos deorsum ferimus; ita ut foris audentur, corpusque istis expediamus.

Pilula Hypochondriaca.

Rhabarb. opt. Pulv. P. Rud. ana ʒj. Chalyb. cum Sulph. pp. ʒj. Croc. ʒβ. G. Ammon. ʒj. Tart. Vitriol. gr. iij. cum s. q. Elix. Prop. m. f. Pil. Min. quarum tres capr. h. somn. & tot mane quotidie.

OBSERVATIONES.

Quales effectus alterantiâ, nisi notæ volatilioris sint, cum purgantibus admista fortiuntur, nos certè prætest; quippe cum irritatio humores tam festinanter deorsum ferat, ut moles unicè citra commodum adjiciatur; demptis autem particulis catharticoꝝ acrimoniam obtundentibus, necnon gummositatem, ac proinde adhæsiōem, alterantibus. Pilulæ hæ hypochondriacis ideo incommodantur, quia saburram in intestinoꝝ plicis diversantem lenitè exhauriunt; quæ, cum idem diutius aliquanto moram traxerit, succum venalem acido extraneo inquinavit, ac proinde sanguis magis in horas usque contaminatur, donec massa effœta, spirituum, motûs ac tandem vitæ expers evadat.

Quoties particulæ lentæ cerebri substantiæ cineritiæ ut callosæ ita infederunt, ut spirituum secretio ac motus eadem exinde stiterint, ac proinde morbos soporosos, semper, lethargos & similia introduxerint; pilulæ hæ eratò exhibitæ materiam crudam, morborum hujusmodi fomitem, subtrahunt: Quippe cum & *cruditatis* & *coctionis* idea in se plenitudinem complectatur, aphorismus hic, (πέποινα φαρμακείαν κ' αινέειν μὴ ὄμα) in morbis chronicis quam acutis aptari potest; quemadmodum enim de acutis hoc verum est, quòd *cocta, non cruda medicanda*; ita de chronicis plerunque affirmamus, quòd *cocta non, cruda medicanda* sint.

Quando sanguis sero redundat, uti combibonibus passim obvium est; partes membranosæ adeo flaccescunt, ut humorum copiæ aditum præbeant, quibus tamen nullus datur regressui locus; hinc fiet, ut spiritus parcius

cuius aliquanto fecernantur, ut cerebro ac proinde functionibus ejus damnum inferatur, ut memoriæ læsio pone subeat; hoc in casu, cathartica interea sarcinam exhauriunt, dum aromatica, chalybeata, ac styptica massam effœtam invigorant, spiritus de novo generant, ac fibras laxatas nimis constringunt; atque his confectis, juniores nonnulli memoriam vegetam recolligunt.

Quamquam nervorum poruli, nobis adhuc delitefcant, tamen dehiscunt certè; ac proinde humores lenti tam intra eos quam arterias gradum ita sistunt, ut aliquoties non ultra trudent qui paralyses introducant; nam uti per nervos stat, quod motus ac sensatio ritè perficiantur; ita ipsorum causâ fit, ut utervis lædatur: Læsionis gradum ex motûs ac sensûs privatione metimur, cum totalis fere sit, vel puncti haud sentiunt, ac arida tandem coram adest; cum cathartica tam motum progressivum quam intestinum adurgeant, humoresque rarefaciant; exindè fiet, ut nervorum tubulos penetrent, eosque nonnihil aperiant referentque; cæterum quâ fiet, ut paralysis citra remedia volatilia introsumpta, necnon epispastica admota evanescat?

Uti hypochondriacos colliquationes assiduè infestant, ita affectionis hypochondriacæ sudores nocturni sunt comites fidi: Quemadmodum enim lac seu emulsionem in coagulum abeunt, sic, præ acido in serum & crassamentum abit sanguis, ac proindè particulas tenuiores ac serosas passim deponit: Inde est, quod fluxus urinæ fere diabeticus, quando eæ renibus infiguntur, eveniat; quod, ubi poros invisunt, sudores effluant nocturni: Quibus tandem atrophia comitem se adjungit: Si igitur chylum coctum crudo vel nimium evecto componamus, moles indigesta per poros extrusa chylo non cocto longè major erit: Ac proinde ut coagulum visceribus non infideat, sudores nocturni nihilo secius istiusmodi perimerent. Hippocratem rectè quidem æmulamur, quum cathartica ideo exhibemus, ut humorum cumulum paulum subtrahamus; etiam extra evacuantia, alcalina eò exhibenda sunt; ut concretiones generaturas antevertamus, aut genitas solvamus; demum styptica propterea propinanda sunt, quod pori
exinde

exindè claudantur, hoc autem vobis suggerere liceat, quòd chalybeata sulphurea in cacochymis frigidioribus, evacuantibus præmissis, omnem impleant paginam; cum acidum immutent, grumos solvant, sanguinis gyrum in orbem instaurant, ac tandem uno eodemque momento poros constringant.

Variis de causis spirituum tumultus ac *Ἀταξία* ærotantes infestant; speciatim autem propter pituitæ acidæ, sanguini præsidentis, redundantiam: Materia isthæc vitiosa sanguinem ac reliqua fluida tantoperè inficit, ut ductus secretorii, ut cerebrum exindè lædantur: Saburra hæc, quæ *copula explosiva*, à *Willisio*, titulo insignitur, convulsiones omnigenas modo ita ineffabili introducit, ut medicos etiamnum lateat, quæ natura res quas tunc temporis gerat: Hoc autem constat, quod, instantibus epilepsiis, paroxysmis hystericeis, trismis, tremoribus, ac cæteris symptomatis convulsivis, nervi ac proinde muscoli ad istos appensi, contrahantur, decurrentur, contractiores ac minùs longi evadant; num vero hoc fiat, quoniam spiritus nervorum tubulos ita ampliunt ac inflant, ut curtiores ideo sint, an quoniam nervi funis instar retrahantur, medicos fugit: quanquam sententiam priorem nosmet amplectamur. Cathartica materiam vitiosam eliminando, ac humorum affluxum inferiorem retrahendo, alterantibus aditum præstant; quæ sunt alcalina, testacea, nimirum, salia fixa ac volatilia, cortex peruvianus, ac opiata. Quoties autem causa convulsionum conjuncta ventriculo insidet, toties emetica ac cathartica mitiora istis finem dabunt.

Nonnullorum pori ita formas mutant, ut diametrorum pro aëris contactu ac statu vel contrahantur vel ampliuntur; hujus causâ fit, ut effluviis exhalantium copia pororum mensuræ congruat; quando igitur pori coarctantur, eâ ratione retinentur halitus, qui sanguinem particulis serosis, salinis ac sulphureis adeò corumpunt, ut luctæ, tumultus, effervescentiæ ac æstus febiles idcirco in medium prodeant, ut humores coacti ac malitiâ peccantes pulmonibus vel alicubi insident; ut viscerum infarctus, obstructions, inflammationes tandem se comites præbeant. Nam ubi fluidorum retentorum sarcinâ dispenduntur vasa, vel illa organis

ganis incumbunt, vel hiatum, ac proinde sibimet exitum parant; hinc fit, ut pulmones non humores tantum sibi asciscant, verum etiam istos copiosius fecerant, ac proinde irritationi, tussi, catarrho, & similibus ansam præbeant. Vasorum repletio cathartica ostendit; cum pilulæ autem hæ chalybem ac tartarum vitriolatum contineant, haud ideo conveniunt, qui propter stypticitatem ac irritationem, tam respirationem introducerent anhelam, quam tussim vehementiorem. Adhæc epispastica, setacea, epispastica perpetua, fonticuli, venæ sectio necnon aliæ evacuationes in usum trahantur; irritatio deinceps continua ac defluxio opiata ac incrassantia requirunt; cæterum ubi tussis asthmatica est, nec irritatione magnâ slipatur, evacuantibus præmissis, incidentia exhibenda sunt.

Perspirabili aliquandiu retento, vasa non possunt non pleniora fieri; ex quo fiet, ut particulæ tenuiores extra vasa diffluant, quæ partes sensiles ac membranosas tantoperè fodicant, ut capitis, maxillarum, dentiumve dolores introducant: Quando vasorum hiatus exiguus est ac modicè dehiscit arteria; demptâ per catharticum repletionem meatus apertus statim, imo ultro, occluditur; ac dolor mox filet: Hinc erit, quòd dolor ischiadicus cathartico haud raro cedat.

Lumbrici adeò à catharticeis abhorrent, ut iis exhibitis semet in muco contegant, ac vel ipsa intestina citius erodent, quam extrudentur: Prius igitur amarum, mercurialibus, corallina ac consimilibus enecentur, quàm catharticeis expellantur, uti fusius alibi explicuimus.

Arnoldus Bootius in libello observationum de affectibus omissis, cap. 10. p. m. 30. De labro-sulcio (seu potius sulcato) seu cheilocace (à χεῖλος κακόν) olim meminit, hoc in morbo, uti ipse regerit, “ Labra admodum tumescunt, tumore duro & nonnihil rubicundo, sed nequaquam fervido aut inflammatorio, & qui nunquam suppuretur aut caput fœdet; vergit autem aliquanto magis introrsum, quam ad exteriorem partem: Unde labia à gingivis & dentibus abscedunt longius & foras aliquatenus replicantur, magnâ cum deformitate. Eam etiamnum conspectiorem reddunt foveolæ binæ in utroque labio, unæ

unæ in latere oris dextro, alteræ in sinistro quæ ipsum labii corpus angusto quidem, sed profundo sulco dividunt, in parte solum interiore, inde à gingivis aut gingivarum confinio, ad usque extimam labii oram; ulterius tamen non procedunt, nec exteriorem partem unquam invadunt. Hi sulci semper aut sanie madent, aut crasso pure obfiti sunt; interdum quoque crustulæ in iis succrescunt. Malum hoc quandoque utrumque labium incescit, ut plurimum tamen superius duntaxat eo afficitur; & quando ambo simul hæc labes obsidet, longè tamen deterior semper est superioris quam inferioris labii conditio. Ut plurimum, ac fere semper hunc morbum comitantur aphthæ i. e. ulcuscula oris, in palato, linguâ, buccis, labiis, gingivis; quanquam infinitus est infantium numerus, qui aphthas patiuntur, absque eò ut in cheilocacen incidant; sicuti rursus non raro accidit, ut idoneis remediis adhibitis aphthæ aboleantur, cheilocace superstitæ. Morbus hic satis est frequens, & ad scrophulam referri debet; victus crassior ac coctu difficilis morbo huic ansam præbet, qui idcirco citra evacuationes, catharsin, nimirum, humorum attenuationem, necnon topica dissipantia non satisfiatur; quamobrem author catharticum tertio vel quarto quoque die aliquandiu exhibet, fontanellas secatur, & decoctum styptico-attenuans adhibet, quibus *Cheilocace* locum dabit.

Quoties igitur humorum plenitudo intestinis, sanguini vel nervis incumbit, evacuationi eò usque immorandum est, donec humores satis eliminantur; quocirca vobis, uti opinamur, elucescit, quòd *morbus gravis nunquam aliquem aggrediatur, quin PLENITUDO pura vel cacoehymica istum infestet*; hinc fit, ut cathartica semper ferè præmittenda sint, quam alterantia inoffenscant: Cavendum autem est nobis, ne evacuantia inconsultò exhibeamus; quocirca libri hujus partem primam consulatis. Sententia hæc ita vero consentanea est, ut febres citra evacuantia vix aut ne vix deelli poterint, sive in initio, augmento, sive declinationis stadio; hinc est, quod *Riverius Obs. 87. Cent. 2.* Cathartica mitiora in febris malignæ declinatione præ-

conii efferat; nam ineunte febre, vasa propter luctam intumescunt, quæ in horas ad augmentum usque invalescit; conquiescente luctâ verò, & inclinante febre, materia putrida ad imum fertur; ex quibus fit, ut evacuationes nunquam non febricitantibus, modò res nostras prudenter geramus, conveniant.

Gargarisma.

℞ Decoct. Pectoral. ℥ij. Syr. Diamor. ʒj. m. f. Gargarisma sæpiùs syringâ injiciendum.

OBSERVATIONES.

Quandoquidem gargarismata causæ accommodari debent; idcirco faucibus, gurguleone, glandulis tumefactis aut inflammatis, ac adeo tensis, ut inflexilia exinde fiant, emollientia tum ideo requiruntur, quia fibras rigidas retendunt; discutientia eò admoveantur, ut humores infixi evaporentur, vel sanguini denuò committantur; demum hoc *in partibus laxis* notandum est, quòd *styptica cum cæteris jugiter admiscenda sint*; exhinc nimirum, quòd citra styptica tonus partis primævus raro revertatur.

Quoties itaque pustulæ, in variolis, faucibus incommodant, ita ut deglutitioni impedimento sint, tantisper dum inflammantur, gargarisma hoc perutile erit, propterea quod fibras emolliat, & quòd eas relaxatas constringat: quæ verò, cùm maturantur, alia requirunt.

Mistura Balsamica.

℞ Syr. de Symphyto. Syr. Capillor. Vener. ana ʒij. Syr. de Mecon. ʒiv. Syr. Balsam. Tolutan. ʒj. Aq. Lact. Alexiter. Ceras. nigror. ana ʒiβ. Aq. Cinnam. hordeat. ʒβ. m. f. mixtura de qua capiat cochl. unum vel duo, urgente tussi.

OBSERVATIONES.

Mistura hæc medicamenta excipit inter se longè dissidentia; quùm alia expuitionem proritent, alia illam præpediant: Siquidem autem variis intentionibus faciet satis, perutilis erit. Nam ut ad rem propius accedamus nec longè abeamus, tussium curatio causarum indagini prorsus innititur: Quoties igitur catarrho mix-

to laborat quis, mistura hæc in usum trahi poterit; verbi causâ, nonnullorum sanguis, qui victu vescuntur crasso ac salino, *pituitâ* scatet *salsâ*, uti *Galeno* videtur; hujusmodi sanguis pulmonum glandulas, propter lentorem ac pondus, tantoperè oppilat, ut *tubercula* generet: Quodcumque alicubi subsistit, ut faciliè fieri potest, particulæ salinæ & aculeatæ bronchiarum fibras membranaceas, ac proindè sensiles valdè, iteratò fodicant, ac tantoperè percellunt, ut identidem eò tussiant, ut materiam sibi molestam excutiant: Hinc fit, ut humores hùc tam ubertim accersantur; ut, materiâ falsâ continuò affluente, irritatio tamdiu duret; neque prius conquiesceret, quàm opiata eò ingererentur, ut acrimonia obtundatur, ut irritatio compescatur, ac tussis pacetur; ita ut interea particulæ misturæ hujus volatiles lentorem incîdant, sanguinem & reliqua fluida in orbem pellant, vel saltem expuitionem proritent, dum particulæ ejus ramosæ ac opiatæ molestiam præscindant, tussionem inaniter iteratam præripiant, ac proindè tam affluxum quam effluxum prævertant; ex his fiet, ut irritationi inani finis adfuerit, ut expectorationi autem indulserimus. Hâc ipsâ misturâ tussi, ulcere pulmonum ortæ, ideo occurretur; quia, cùm ulcus sanari recuset, expuitioni à nobis favendum est, ac sub idem tempus somno & titillationi jugi finem statuamus, oportet; ast consulatis, quæ observavimus, p. 316.

Bolus Febrifugus.

℞ Cort. Peruvian. subtilissim. Pulveris. ðij. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Bolus, tertiâ vel quartâ quâque horâ sumendus, ad decem vices.

OBSERVATIONES.

Mistura hæc est *amaro-sleepico-opiata*; quæ cùm confiat ex cortice unâ cum Theriacâ Andromachi misto eisdem cum præsentî sortitur effectus: Cortex equidem in pulverem redactus seu decoctus ac introsumptus maximè erit efficacissimus. Quando itaque nonnullorum alvum subducere comperitur, cum opiato commiscendus est; hâc igitur de causâ est, quòd mistura hæc tum erit utilis. Quoties igitur diarrhœa feбри comi-

tatur remittenti, toties cortex periodo, opiata vero fluxui finem imponunt. Notandum autem est, quòd, si corpus sit humoribus refertum, viribus valeat, & vigeat, necnon diarrhœa laboret ægrotans biliosa, nobis paulisper cunctandum sit; exhinc enim fiet, ut unico naturæ molimine plenitudo ista subtrahatur; quæ cæteroquin evacuantibus tentanda esset: Videmus igitur, ut vel naturâ vel arte plenitudo exhauriatur; quâ haud demptâ, cortex vix tutò exhiberi potest.

Quanquam experientiâ unicè erudiamur, corticem periodos auferre, istius tamen phænomeni causa nos ferè præterit, propterea quòd corticis cum sanguine commissionem medici hæctenus oscitantèr nimis exprobraverunt: Siquidem verò sanguinem, super tincturam ex cortice conflatam, emissum adeò parum concreescere patet, ut fluidus aliquandiu permaneat, affirmare licet, quòd particulas putridas simul sanguini adunet, & præcipitet, adeo ut sanguis more solito in posterum, citra exacerbationum periculum, in gyrum flectatur: Hincque forsan erit, quòd morbi periodicè recurrentes, hæmoptyses, nimirum, epilepsiæ, paroxysmi hysterici ac consimilia, ex *periodo* pendentes, corticis ope certò depellantur: Quando igitur morbi infestant periodici, sedulò inquirendum est, utrum *periodus* à sanguinis vitio in vasa conclusi, an extra effusi oritur: His enim perpenfis, conjecturam certiore de corticis efficaciâ faciemus: Nam si periodi causa sit intra vasa posita, cortici *periodus* facillimè, si temporiùs exhibeatur, cedit; quod si extra vasa delitescat paroxysmi causa, quæ tamen propterea exacerbationem introducit, quòd in vasa se denuò recipiat, quod plerunque fit in ulcere pulmonum febrim hæcticam invehente; non majus emolumenti laborantes accipiunt, quam ut periodum tantisper alleviet, dum ulceris particulæ putridæ de novo sanguini affunduntur; cum ulcus autem sit insanabile, periodi continuò revertentur.

Egrègius vir *Fullerus* alicubi corticis exhibitionem, Lochiis fluentibus, absolutè vituperat; corticem particulas in se continere stypticas libentèr annuimus, nosmet autem ab usu ejus tunc, modò requiratur, non magis contineamus, quàm ipsemet ab opiatis, inter lochiorum

lochiorum fluxum, abhorrebat : Nam quoties febris remittens, lochiorum profluvio perstante, affligit, toties cortex remissionem auferet, quinimo propterea requiritur, quòd febris alioquin in malignam transfret. Particulas terrestres præ fixis tam parcè cortex in se continet, ut eæ fixarum non sint centesima pars, quocirca non mirum est, si opiata cum cortice in diarrhœâ febrili commisceantur ; ni enim ita esset, febris adeo parùm cortici cederet, ut unà cum bile ac humoribus acris per anum deturbaretur, spiritus exhaurirentur, & symptomata propter inscitiam accersiremus dira : Quo igitur pacto in stypticorum censum cortex ita redigeretur, ut hæmoptysi frænum injicere, præ stypticitate unâ, reputetur ? Cùm verendum est, ne diarrhœam magis urgeret. Quando verò litem hanc fusiùs jam composuimus, manum de tabulâ subtrahamus. Cæterùm ut nòdum hunc clariùs adhuc expediamus, quando cortex ita exhiberi potest, ut nullas in se particulas amplectatur stypticas, tunc lochiorum profluvio moras haud injiciet, proinde febrim remittentem auferet, nec tamen lochiis oberit : Siqui igitur morbo laborent ullo, cui cortex præ stypticitate perniciosus erit ; necesse non est, nosmet ab ejus usu temperemus, propterea quòd ita per infusionem parari possit, ut impunè vel in asthma humido propinari queat : Nam sicuti asthma laborantes humido à corticis in pollinem redacti exhibitione magis idcirco fiunt anhelii ; quòd, glandularum orificiis, citra humorum ubertim affluentium antispasini, contractis, affluxus effluxum longè præeat, atque id propter vasa distenduntur, nec tamen exinaniuntur, per exspuitionem solitam ; ita quando infusione partes amaræ in liquorem unicè erogantur, febris remittens seu morbus quivis periodicus unà cum asthma junctus facilè depelli potest, nec asthmatis tamen medeicæ vel impedimento vel incommodo ullatenùs erit.

Ex Dni *Tauvry* sententiâ corticis exhibitionem hydrops à tergo propterea sequitur, quòd sanguis corticis ope tenuatus, ad exudationem seu extillationem magis præceps evadat ; non videmus autem, ut attenuantia hydropi sint incommodo, cùm omnis ævi medici uno

ore jugiter exclamâint, attenuantia hypropi quam optimè ideo accommodari, quia serum in sanguine redundans per urinam foris amandant, quia fluidis principia activa passivorum vice suppeditant, ac hydropis causæ adversantur: Quando igitur corticem, non ptisanas suas gulosè devoratas, probri hujus arguunt; *non causam pro causâ*, uti philosophi aiunt, nobis reverà obtrudunt. Argumentum hoc memoriam hydropicæ cujusdam refricat, quæ febre laborabat; aquam hordei avidè exhaustit, hydrops ascites à tergo secutus est.

Cautelæ sequentes observandæ sunt circa corticis exhibitionem, nimirum, neque lecto interim affigantur, dum assumitur, neque in paroxysmo exhibeatur, neque in febris ardentis vigore; nam quando effectus suos salium fixorum vel volatilium ope sortitur, quando periodi ab humore aliquatenus lento oriuntur; quid est, cur motui jam nimirum intenso motum superinjiceremus? Hinc enim fieret, ut particulæ lentiores in arteriolas ita truderentur, ut nullus eis daretur regressui locus: Inde est igitur, quòd in febre continuâ & malignâ cortex evitandus sit; neque porrò rheumatismo nec doloribus rheumaticis omnino confert; quoniam sanguinis compage nimium laxâ, massâ ejus nimium tenuatâ, perspirabilium copia nimia excluditur, ac proinde particulis magis aqueis privatur sanguis: exhinc fit, ut lentior evadat, ut dolores initium faciant. Cortex insuper, corpore non depleto, nec plenitudine deptâ, non est ideo exhibendus, quia vel particulæ ejus terrestres materiam noxiam visceribus insidentem figunt, vel particulæ ejus activæ tantoperè fluidorum molem adaugent, ut vasorum disruptionem introducant; quamobrem in deliriis, peripneumoniis, pleuritidibus, aliisque ejusmodi morbis, à cortice nosmet ideo contineamus, quia istis adeo non finem imponit, ut ii magis exindè ferociant.

Nonnulli, *Jones* nimirum & *Dekkers*, corticem unâ cum catharticis commistum exhibere solent; nulli enim dubitamus, quin possint aliquandò, rarò autem, costendi; Quisquis autem secum perpendet, ut fermentum febrile, corticis ope devictum, denuò, cathartico propinato,

propinato, in medium prodeat, ac proinde febrim rursus accersat; nobiscum profitebitur, corticem cum cathartico commiscere, esset incomptè præscribere.

Febribus eruptivis, variolis, nempe, morbillis, scarlatinis, laborantibus corticem ideo perperam exhibent medici; quia licet materiam noxiam paulisper reprimamus, non magis tamen istiusmodi emolumento sumus, quam elephantiasis utilitati consulimus, cum istam repellamus; quoniam uti elephantiasis retropulsâ visceribus materia incumbet noxia, quæ diaphoreticorum & alexipharmacorum ope rursus extrudenda est; ita eruptione, corticis ope repressâ, deliria & symptomata dira ponè subeunt.

Sydenhamius ac Mortonus corticem in doloribus rheumaticis vituperant; quod si dolores unâ cum febre remittente quosvis affligant; tamen si dolores exinde increbrescerent, febris tamen ideo abigenda est; quia febres dolores periculo longè præcedunt: Febre enim depulsâ, sat vacui temporis habemus, ut materiam morbidam, dolores introducentem, posthac eliminemus: Nam si febris tantoperè posthabeatur, ut in continuam transeat, conquiescant dolores, febri laborantes nihilo-fecius peribunt; primum igitur in febris, quam dolorum depulsione excubandum est: Quando igitur cortex periodo soli accommodatur; perpendendum est nobis, utrum remedia, simul ostensa, interim exhiberi possint, necne; nam quoties alterantia requisita corticis exhibitioni non repugnant, toties alterantia unâ cum cortice introsumentur; cum vero remedia cortici repugnent, Galeni normam imitemur, qui ait, *precedat sanatio ejus, quod magis urget.*

Nulli ambigimus, quin cortex olim magis fuerit genuinus, quam est nunc dierum; quoniam usus ipsius frequentior interpolationem incitat; cum porro non febribus modò, sed morbis periodicis etiam conferre reperiatur, minùs adhuc genuinus erit; quamobrem in corticis electione cauti admodum simus, oportet; color igitur sit cinnamomi instar; sapor ipsius sit grâtè amarus & stypticus; odoris sit mucidi; sit recens, non annosus; striæ argenteæ, cortice in longum fracto,

fili

fili serici instar appareant. Rami etiam minores optimi feruntur.

Nuperrima de cortice experientia isti superioris ævi longè præit, hinc erit, quod citra *Barbetti* contumeliam carthartica, ante vel post corticis exhibitionem, repudianda sint: Quippe cum catharsis à cortice febrim reduplicet; quando cortice eliminato, febris typus revertitur: Quod si febris per dies quatuordecim evanuerit, ac idcirco metus recidivæ præterit, porro ubi ructus, nausæ, borborygmi infestant, cathartica necessariò idè ostenduntur, quia febre depulsâ plenitudo de facili auferri potest, quinimò debet.

Nosmet frequentius experti sumus, corticis repetitionem inutilem fore; dummodò ubertim exhibeatur, quùm febris conflictat; si igitur corticis uncia febrim depelleret; qui quâque syzygiâ eò repetendus foret, ut recidivam præcideremus; ita ut febris citra uncias tres partitim exhibitas, reverteretur; necesse non est, aliud agamus, quam ut corticis uncias duas vel tres alternis & partitis vicibus exhibeamus; ac proinde febris sine magno labore citra recidivæ discrimen abigetur. Quando itaque ex *Hippocratis Epidem l. 6. §. 3. Qua facta sunt liberant; si ante fiant prohibent*; exhinc patet, ut cortex parcius aliquantò exhibitus febrim in valetudinem nonnihil adversam transformet, ut recidiva iisdem præcidatur remediis, quibus febris sanatur: Anticipatio enim & morbi medela, sunt individua diversa sub eadem specie comprehensa.

In adultis methodus *Helvetii* parum equidem confert; quando infantes verò febre laborant remittente, ad enemata cum cortice conflata tanquam ad anchoram facram confugiendum est; verum equidem est *Baglivium, Fullorumque cum Helvetio* hâc de re consentire, ex eò, quod, cùm nonnulla adsint in intestino colo lactea, liquor tam propter nutritionem quam fluidorum immutationem in ista penetrare possit; quocirca ubi adsunt nausæ, & vomitiones, nec id propter assumpta retineri queunt, corticis injectio per anum febrim, licet lentius aliquantò, domabit.

Quoties febris est lenta ac simul remittens, cortex ostenditur,

tenditur, unâ cum serpentariæ virginianæ radice; inc fit, ut D. *Wainwright* hanc radicem, *Bateum* sectus, ubi cortex cum radice hâc mistus vocatur *Pulvis febrifugus certus*, valdè deprædicet.

Quando hemicranie periodicæ tam à sanguinis statu er bilem vel salia acuta vitiato, quam effervescentiam ebrialem oriuntur; per spatium breve cerebri membranis vel pericranio insident, morbisque membranosis anam præbent; ex eo, nimirum, quòd particulæ biliosæ repenumberò effervescent, atque adeò vasa dilatent, ut nec pro more solito in gyrum flectantur, neque idcirco ad cor reditum maturent; quin alicubi paulisper defixis, ex improvisò particulæ subsistentes, sui juris factæ, inter se prælium committant ac contendunt; deindè foris mandantur, ac proinde paroxysmus evanescit: Nam cum, quod immotum persisterat, moveatur; ab impulsu externo hoc fiat, oportet: quando verò fluida ultrò edunt; propterea locum dant, quòd motûs resistentiæ ab appulsûs momentis prosternantur; pari quidem ritu res, naturæ vestigia æmulans, humores prius attenuandos esse edocet, quàm foras eliminentur, quam ij deinde in orbem pellantur: Cæterum ineptiunt sanè, qui corticem hoc in casu, nec venæ sectione nec catharsis præmissis, exhibent, quippe quòd humores impacti prius parti affectæ firmiter insidebunt, deindè quòd sanguis in orbem flexus tantoperè turgescet, atque ita partem intra vasorum parietes coerceri poterit, ut extra vasa profilierit, ut hæmorrhagias, ut enchymoses & alia amplurima introduxerit. Jampridem dolore inter capulas periodico quàm atrocissimo laboravimus, qui ab horâ quartâ matutinâ ad octavam usque tam immaniter ferociit, ut vix deliria contineremus: Catharsin & venæ sectionem præmisimus, ac deinceps spem omnem in cortice collocavimus, incassum verò; nam audano liquido, unâ cum sale volatili oleoso, horâ primâ nocturnâ sumpto, intra tres septimanas tantummodo cessit: Dolorem hunc eximius Dñus *Pitts* in actis philosophicis n° 208. p. m. 58. *Rheumatismi convulsivi* titulo insignivit, quem Dñus *Michael Flatum furiosum* appellat.

Morbi nonnulli, propterea quòd in singulos annos revertantur, annui vocantur; ii sunt catarrhi, defluxiones, elephantiasès, arthritides, & similia; quoties res nonnaturales vel non-necessariæ ita parum nobis fuerunt sollicitudini, ut vitam temerè ac inconsultò traduxerimus, sanguinis massa tantoperè particulis scater heterogeneis, ut irritationes, obstructions, inflammationes, acrimoniæ omnigenæ, introducantur: Ex quo fit, ut, ex *Hippocrate*, ritè res nostras gerere censeamur, si evacuationes pro quantitatis offendentis modulo instituamus; hisce assatim celebratis, corticis exhibitio *Periodo* emolumento erit: Hoc autem advertendum est, quòd nec elephantiasès nec arthritides à corticis usu omninò adjuvantur: Quantum ad *elephantiasin*, eximius vir *Carolus Leigh M. D.* In *Historiâ Lancastriæ naturali*, jampridem asseruit, elephantiacos à remediis parum allevamenti recepturos fore, nisi à carnibus se contineant, ac sub idem tempus acidulas ubertim hauriant, necnon *ψυχρολυσίαν* (seu immersionem in aquâ frigidâ) adhibeant: Nam quando salium assatim septi-corum sanguini præsunt, diluatur massa, salia ab invicem sejungantur, necesse erit; quòd si lepra ipsa homines infestaret, quam sanguinis indolem eximius *Waldschmidius cancrösam* jure merito indigitavit, ista neutiquam remediis vel maximè pomposis omnino cedit, quin mox revertatur: Quoties enim catharticiis exhibitis sarcina intus reprimitur, *colica*, *peripneumonia*, *symptomata nervosa* pressius à tergo sequuntur: Neque quicquid remedii, usque adhuc orbi literario patefacti, hilum istiusmodi prodesse reperitur. Nec aliquid pro certo de transfusione proferre possumus.

Mistura Antemetica.

℞ Sal Absinth. ʒj. Succi Limonum ʒj. m. f. Haustus hodiè, vesperi sumendus.

OBSERVATIONES.

Mistura hæc à *Riverio* desumitur, quam ipse contra vomitionem maximè deprædicat: Quandò verò variæ existunt vomitionis causæ, non alienum erit, si paululùm de circumstantiis, in quibus mistura hæc utilis erit, verba faciamus.

Stomachi parietes interdum excoriantur, quod plerumque combibonibus obtingere solet: Quoniam, quæ fibras inflammant, ea etiam cuticulam tandem abradere possunt; hoc in casu, cum salia ulcuscula eroderent, doloresque concitarent, vomitionem immaniter urgent, hæc de causâ erit, quod mistura hæcce adeò non utilis esset, ut vomentes in salebras conjiceret. Quantum ad vomitionem ab hysteriarum, hypochondriacorum, ac scorbuticorum massâ, ex eo quod acida sit valdè, prognatam; cum liquores secreti sanguinis indolem sapiant; necesse erit, ventriculi fermentum sit exinde acutatum, quod sanguis ipse sit acido-acris: Hinc certè fiet, ut ventriculi parietes fodiantur, ut muscoli abdominales convellantur, ut ingesta, quinimò mucus ipse, egerantur, ut vomitus ponè subeat: hic advertendum est, quod saburra in sanguinis sinu diversans tam sursum quam deorsum primum eliminetur; deinde *martiatâ* eò introsumentur, ut acidum immutetur, ut sanguis ad statum naturalem ac primævum reducatur, *armoniacalem* nempe; hinc eveniet, ut vomitio conquiescat: quod si *Antemetica* præproperè nimis exhibeantur in hujusmodi, ita parum emolumenti istis conferrent, ut vel Diarrhœæ, vel colicæ, vel similia symptomata dira introducerentur. De vomitione eventuali, itinerando productâ; mos invaluit, ut remedia istiusmodi lenientia eò porrigantur, ut humores succussando refixi, ventriculique parietes fodientes, per anum deturbentur; hinc *Schola Salernitana p. m. 147.* hæc habet.

Nausea non poterit hæc quem vexare marina,
Undam cum vino mixtam, qui sumpserit ante.

Cum per *undam*, salum subaudiamus; quando porrò muria hæc humores sursum ac deorsum efferre comperitur; ab re non erit, si vomentibus, ex eo quod per mare vel per terram iter faciant, *unda* porrigatur. Vomitiones frequenter à spirituum *'Αταξία* seu tumultu exoriuntur, exhinc, nempe, quod nervis contractis, muscoli appensi contrahantur, ac, proinde vomitiones pressio insequantur pede, necesse erit: Quum igitur spirituum tumultus enormes quenquam infestant,

ii sunt vomitiones, convulsiones, epilepsiæ & similia; tum symptomata hæc citra opiata compesci nequeunt. Demum, ut alia multa silentio prætereamus, vomitiones febre malignâ oriundæ, seu à sale alcalino excitatæ, misturam hanc vel aliam sibi consimilem propterea requirunt, quòd salia, ex acidi quantitate magnâ alcalini verò pauxillo conflata, sint *acido-salsa*; ac proinde sali alcalico repugnant, adeò ut ista vomitio quiescat, necesse sit: Mistura autem hæc causæ ultimæ, ex *Riverio*, unicè accommodari videtur.

Partis alterius finis.



ACCES-




ACCESSORIUM.

DE

*Opiatis, Lacte, Aquis Chalybeatis,
Thermis, Immersione, & Infu-
sione.*

ART. I.

De Opiatis.



UUM de *flexilibus* supra verba fecimus, de opiatis clanculùm ac tacitè etiam tractavimus; nam opiata sunt maximam partem ex *flexilibus* conflata particulis; quì verò opii granum, vel oleorum uncias viribus longè præpolleret; alibi dabitur opportunior differendi, locus. Opiatorum idcirco virtutes paulò fufius hìc perpendamus.

Corollarium.

Hæustus Paregoricus.

℞ Aq. Cerafor. nig. $\frac{3}{4}$ ℔. Pæon. compos. 3i℔. Extract.
Opii Thebaic. gr. j℔. Sacchari parum; m. f. Hæu-
stus sumend. horâ decubitûs.

OBSERVATIONES. —

Extractum Opii Thebaici fit, solvendo opium in quantitate sufficienti Aquæ Papaveris, filtretur solutio, evaporetur ad extracti consistentiam.

Opiatorum vires vel à tironibus manifestò deprehensæ sunt; nam liquidò constat, ea dolores placare, somnum accersere, convulsionem compescere, flatum reprimere, fluxum frænare, irritationes alleviâre; hincque fit, ut *Ἀλαξίαν* hystericeis supremas adjiciant manus: è contrariò autem nunquam omninò impunè exhibentur, quoties propinantur in languidis, in frigidiori temperamento, in doloribus criticis (partu, arthritide, &c.) in orthopnœis, seu asthmaibus humidis, ubi pituita bronchias opplet, in phthiseos stadio ultimo (ulcerationis, z.) ubi bronchiæ pure extraneo gravantur; in febribus malignis, in pleuritidis crisi, ubi sputum copiosè, bene coloratum, facillè ejicitur; in capitis doloribus chronicis, neque in satyriasi (uti *Sachio Ephem. German. Ann. 2. Obs. 69.* videtur) propinantur; nam quâ spirituum turbas ac motus efferos compescunt, eatenus morbis hujusmodi adversantur: Quantum verò ad satyriasin, quatenus consequentia à chronologiâ unâ petitur, non adeò firmo stat argumentum talo, ut, opiatis introsumptis, *hæstæ* jugiter erigantur exindè: Quando enim *Priapismus* variis pendet à causis; non est quòd opiata adeò severè prohibeantur, ut nunquam in isto exhibeantur: Juvenis quidam jamdudum, anno nimirum 1700. ad Novicæ portum *Londino* appulit, qui, spiritu vini gallici inebriatus priapismo dolorifico conflictatus expergiscebatur; Quamplurimos eò consuluit medicos, tam seorsim quam conjunctim, ut morbum hunc insuetum ac rarum depellerent. Quisque pro suo ingenio, ac methodo propriâ, laborant

opem

opem ferre molitus est: Cæterùm tantum abfuit, ut vel minimum indè emolumenti receperit, ut morbus indies invaluerit ac gravior factus fuerit; hic enim morbum convulsionem fuisse autumans, antispasmodica calidiora ipsi porrexit; ille seminis redundantiam, manuſtuprationem, juvenculæ cujuſdam ope perpetranda, parum chriſtianè, at perfrictâ fronte, juſſit; alius luem ſuſpicatus, ipſi cathartica, ac aphrodiſiaca exhibuit: Alius prælii turcarum ad *Leventz* commiſſi memor, opiata, propter inſomnia propinata, quam maximè defamavit: Chirurghi balnea parant: Quid de miſero fit? Propterea medicis, chirurgis, ac *oppido* valedixit, quòd paulo poſt è vitâ migraturus cenſeretur; rhedam conſcendit, ut domum iret, ut iſtic dulcem redderet animam; nos cum eo in curru eodem iter facientes ex eo præcipuè conſuluit, quòd ſubaudiviſſet, nos anatomiæ prælectiones in Chirurgorum Theatro publicè non ita pridem habuiſſe: Pene nudato, & probè luſtrato, proſtatarum tumor inflammatorius ſe in conſpectum dedit, qui cepis ſub cineribus toſtis cum ſpiritu vini rectificato miſtis & ſub cataplaſmatis formâ admotis, biſque quotidie renovatis, ſine magno labore intra dies ſex ceſſit, ac hunc in modum priapiſmus ad diem trigeſimum & tertium uſque permanens evanuit: Obſervationem hanc paulò accuratiùs ideo illuſtraviſſimus, quia unus è medicis, *Jabez Cay M. D.* in *Aſtis Philoſophicis* rêm alitèr longè, quinimò perfidè, exhibuit.

Porro opiata non exhibentur in ipſius criſeos ſtadio; hinc eſt, quòd in variolarum apparatu prohibeantur, ex eo quòd eruptionem, morbo à naturâ inſitam, præpediant; cum quietem luſtæ vice concilient: Inde fit, ut *Winclerus* iſta in vigiliis criticis, ſeu criſin præcedentibus vetet. Ineptè præſcribuntur in tuſſi humidâ, ubi irritatio exigua eſt, quoniam expuitionem præpedient utilem: Infantes ea frequentius iterata haud idcirco ferunt, quòd ingenia eorum hebetent nimis, uti jamdudum probè advertit *Mercurialis*: Opium vires ſuas per horas ſex exerere experimur; in infantibus autem opiatorum doſis per horas duodecim valet: Opii verò effectus in temperamentis variis ita diſcrepat, ut

praxi solâ hæc ipsius indoles detegi possit : Nam nobis compertum est, opium à tussî irritante per horas viginti quatuor inducias dare ; quo temporis spatio percurso, redit tussis vehementer ac constantè irritans. Ubi passio iliaca adest, dolore fixo stipata, opiata adeò parum conferunt, ut noxam idcirco inferant, quòd, cum dolor iste ab inflammatione exordium sumat, in gangrænam statim abeat. Affectione hypochondriacâ vel hystericâ laborantes opiata malè tulisse jamdudum advertimus, nisi cum medicamentis volatilibus, vel fœtidis commisceantur ; hoc forsitan exinde fit, quia ventriculi acido non retuso, pylori sphincter adeo constipatur, ut ne vel remedii tantillum in sanguinem iter instituat, saltem ita propter acidum vires ipsius infringuntur, ut opium eâ de causâ energiâ suâ cadat ; vel demum acido propter opium paulo diutius in ventriculo incarcerato tumultus, inquietudines ac insomnia insequuntur : Volatilibus autem unâ cum opiatis exhibitis acidum tantoperè castratur, ut opium quàm maximè valeat, viresque suas plenè exerat. Phrenitidi damno sunt, nisi cum evacuationes, plenitudini accommodatæ, præcesserint ; febrisque aliquatenus deferbuerit : quoniam quies stationi æquiparatur, ex eo quòd, ubi vasa fluidis suffercuntur, opiata lentorem ac proinde obstructionem, quinimo aliquoties inflammationem introducant.

Sudores cæterasque evacuationes, à sanguinis motu ortas, proritant ; è contrario verò evacuationes cunctas, irritatione cretas, diarrhœas nimirum, tusses, & similia, efficaciter alleviant.

Ubi in variolarum apparatu sanguis tam immaniter effervesceat, ut vigiliæ, deliria, subsultus ac alia symptomata mali moris superinjiciantur ; opiata, cautè exhibitâ, ideo ægrotis commodo sunt, quia affectuum istorum ferias paciscuntur. Asthmâti conducunt sicco, proptereâ quòd nervis, tensis nimis, subsidio sint ; istis laxati, inspiratio ritè peragetur ; quando asthma autem hoc non ex simplici pendeat causâ, verum *nervorum tensioni plenitudo* necnon *periodus* simul adjiciuntur, opiata non adeo omnem implent paginam, quin venæ sectiones, cathartica leniora, necnon epispastica requirantur,

quirantur, quin corticis exhibitio etiam istiusmodi opem ferat, quæ, pro re natâ, largâ distribuenda sunt manu. In dysenteriis laudani grana tria, quinimo quinque, propterea exhibenda sunt, quòd dolorum atrocitas, quòd irritatio immanis, quòd evacuationes sanguinis profusæ opiata ubertim introsumenda ostendat.

Catarrhis itaque, tussibus acribus, irritantibus, titillantibus, tenuibus, ficcis, phthysicos stadio primo, tenesimis, diarrhœis, dysenteriis, tussibus gravidarum ficcis, phrenitidi, mania, epilepsiæ, palpitationi, singultibus, pustulis variolarum inflammatis & dolentibus, vigiliis; quinimo doloribus quibuscvis immanibus (vel pleuritidis initio) profluviis, spirituum *Αλαξίας* (vel vertigini) quam maximè auxilio sunt; ex hoc, nimirum, quòd, spirituum furore pacato, irritationi cuiusvis finis adfuerit.

Num camphorâ exhibitâ quicquid ab opii dosi propterea subtrahendum est, quòd camphora vices ipsius gerat, quam maximè animo vacillamus? cum camphora sit sal volatile oleosum, opium non item, uti liquidò posthac demonstrabimus, neque concludendum est, opium idcirco calidum esse, quòd *in regione calidiori, opii dosis parte dimidiâ minor sat sit*: De his vero dabitur in *Pharmacomachia* opportunior disputandi locus.

Hauſtus Hypnoticus.

℞ Aq. Lactis Alex. ζ ijβ. Cinnam. hord. Mirab. ana ζ ijj. Confect. Fracastor. sine Melle ζ j. m. f. Hauſtus sumendus horâ somni post purgationem.

OBSERVATIONES.

Hauſtus hic æque spiritus erigit, ac hypercatharsin reprimat, quoties itaque catharticum tumultus cievit, spiritus exinanivit, ac vigilias introducturum est, toties hauſtus hic vel alius sibi consimilis propinetur.

Pilule Catarrhales.

℞ M. Pilul. de Styrac. Gum. Arabic. ana ζ j. cum q. f. Syr. Balsam. Tolutan. m. f. Pilul. n^o. xvijj. quarum duas vel tres capiat horâ decubitûs, quotidie, &c.

OBSER-

OBSERVATIONES.

Suprà advertimus, quòd, uti repellentia evacuationibus posthabitis non admovenda sunt, ita nec opiata prius exhibenda sunt, quam plethorâ generali ac individuâ antè exhauriantur: Nam quicquid sit opiatorum energiæ immediatæ aut proximæ, nihilo minus quotidianâ evincimur experientiâ, remotos ipsorum effectus istius esse generis, ut *humores inspissent, ut eos in organis defigant, ac proinde morbos, lentore, ac subsistentiâ prognatos, jugiter introducant*. Quos eò certiùs anticipamus, quò evacuationes ostensæ constantiùs ipsorum exhibitioni præmittuntur: Cæterùm, ut argumentum hoc meliusculè capiatur, sequentia acriùs expendamus. Est, medicum ptyalismum instituisse, qui eo mensuræ, quinimo mantissæ, pervenerit, ut amygdalæ aliæque glandulæ laryngem vel pharyngem circumdantes tantoperè inflentur ac intumescant, ut inflammatione phlegmonode vel œdematode decumbentes, suffocationis periculum inferente, conflictentur: In phlegmone genuinâ venæ sectiones reiteratæ priùs celebrandæ sunt, in phlegmone vero œdematode cathartica necnon enemata priùs exhibenda sunt, quam gargarismata styptica in usum trahantur, quam sulphuris flores introsumentur: Nam ausis hujusmodi omnino posthabitis, repellentia vel intercipientia, quæ humorum influxum præscindunt uberiores, adedò parùm conferrent, ut nos in vitæ discrimen compingerent: Quòd, cum il alibi devocentur, partesque in tonum primævum redigantur, tùm remedia styptica fibras laxatas nimis constringant, particulæ sulphureæ mercurium figant, ac ptyalismus tandem aliquando tutò conquiescit. Chirurgi artis suæ periti, non ulcera cicatrice priùs obducunt, quam labia probè digesta fuerint, quam carne sanâ ita repleta fuerint, ut ulcerum labia cuti ferè complanentur: Ni hæc ita essent, quid fieret de ulcere. non dubiùm est, quin repullularet. Denique in *catarrho*, humorum affluxus in pulmones immanis, eos ultra tonum stativum longè ampliat; quâ de causâ fit, ut in morbis pulmonicis venæ sectiones, cathartica, epispastica, setacea, fontanellæ & similia necessariò requirantur.

rantur, non solum eò ut pulmonum parenchyma farcinâ hâc molestâ expediatur, sed insuper etiam ut motus vitiosus aliò trahatur: Quando itaque tam humorum redundantia demitur, quam ab impetu eorum quicquid alieni subtrahitur; prope adest, quum opiata eò exhibenda sunt, ut affluxus uberior præcidatur, ut irritatio molesta pacetur, ut *Ἀλαξίαι* compescantur, ut tussis demum abigatur: Opiatis aliquandiu exhibitis, astringentia deinceps propterea in usum trahantur, quòd affluxu præciso, irritatione sedatâ, meatus apertus occludendus sit, cæteroquin humores pro appulsûs more etiamnum exudarent.

Gummi arabicum præscripto adjecit vir eximius, ex eo quòd acrimoniam emendet obtundatque; irritatione enim solâ sedatâ, acrimonia nihilominus fibras insidiosè eroderet.

Quoties opiata requiruntur, hæc à lectoribus adverti volumus, quòd *Opium dosi instituti adeo compos fiat, ut nil ultra desideretur; quòd, si ista opii dosi quæ scopo proposito summum imposuit fastigium, offissio paulò post defuerit suo, propterea quòd isti insuevimus, opiatum in auctiori dosi usque exhibeatur, quoad metam attingamus propositam.* Quorsum enim remedia introsumentur, nisi, ut opus cœptum ad extremum prosequamur?

Laudani compositiones apud authores variæ sunt; nos cuius suum velle haud invidemus: Siquidem vero opiatum sequens prospero pater meus eventu quamplurimis in morbis usurpavit, quod à Dni Dris Pippi Professoris Pataviensis dictaminibus mutuò accepit, istud divulgare non gravamur.

Rx Tintura di opium (cavata primo con Aceto destillato, & quale Aceto si evapora, & poi si getta sopra lo Spirito di vino, & così se ne cava la Tintura perfetta) estratto di Zefferano fatto con Spirito di vino ana un oncia, Magisterio di Sal di Perle & di Coralli ana mezz' oncia; Tintura di Spezie di Diambra drachm. Sette; Ambra grysea drachm. una. meschi & coagola, con calor lento di Bagno, & Serba per serve Pilule. Dos. gr. tre, &c.

Pilulis hîc hunc in modum confectis medicamenta aliquot adjecit paulò selectiora, & massam in formam lapidis compegit: Quæ in pulverem redacta *pulveris Comitæ de Derwentwater* titulo insigniebatur; ex eo, nimirum, quòd Comiti isti, Comitæ securi, eheu! percussi, avo, quam maximè subsidio venerit.

Pilula Sedativa.

R. M. P. è Styrac. ʒij. Marg. pp̄. ʒj. Ol. Cinnam. q. s. m. f. Pilul. n°. xii. quarum duas capiat horâ somni, bis vel ter in septimanâ, si fuerit inquietus.

OBSERVATIONES.

Pilulæ styracinæ tussibus ideo allevamento sunt, quia irritationem molestam, comitem plerunque earum assiduum, comescunt: Quoties autem pituita tenax bronchias ita suffercit, ut ægroti in suffocationis discrimen exinde conjiciantur; toties *Balsamica*, *Salia Volatilia*, *Sal Succini Volatile*, *Flores Benzoini*, *Syrupus è succo Hederae terrestris*, *Oxymel Scilliticum* & similia propterea exhibenda sunt, quòd fibras pituitâ redundante expellant, quam opiata defigunt.

Ubi diarrhœa asthma excipit, bechica incidentia asthmatis causâ unâ cum opiatis ob diarrhœam propterea usui sunt, quòd persistente diarrhœâ expuitio deficit; incidentibus posthabitis, spiratio invalescit anghela; utrobique igitur in mortis discrimen conjicimur, quâ de causâ opiata ac incidentia non seorsim, sed conjunctim exhibenda sunt. Pari etiam ritu colica unâ cum asthma concurrere potest; tùm opiata cum pectoralibus eò commiscenda sunt, ut comescatur dolor, & pituita sursum pellatur.

Quamquam pilulæ hæ pleuritidi sub initium, vel ubi primùm in medium pleuritis se confert, commodo sint; sunt tamen inutiles, quinimo perniciosæ, simul ut expectoratio in conspectum exierit: Quoniam pleuritide incipiente motum anticipant intestinum & tumultus; hinc fieret, ut, venæ sectionibus debitè præmissis, inflammatio non ultra increbresceret, propterea quòd ipsius subtraheretur pabulum: Quod si ista usque

que eò invaluerit, ut anacatharsis liberalitèr progredia-
ur; opiata ideo damno erunt, quia cum evacuatio
hæc critica sit, atque adeo materia ejiciatur noxia,
morbi causa proxima exhauritur; ac proinde quicun-
que hosti huic commeatum intercluderet, is planè de-
speret.

Asthmata hysterica citra opiatorum usum rarò felici-
tèr ad exitum perducuntur; cæterum, evacuationi-
bus requisitis non præmissis, necnon alterantibus reme-
diis posthabitis, venæ sectione, nimirum, uberiori, ca-
harticis, epispasticis, enematibus, cortice, anti-acidis
non usurpatis nec in usum tractis, fit *metastasis*; nam
morbo *αμεθόδως* sublato, organum, cui infestus fuerit,
esto expeditur, cum causa ipsius autem etiamnum intus
delitescat, neque resecetur, aliò se conferunt particulæ
noxia & morbificæ, tum symptomata longè alia atque
alia se in aspectum dant & inolescunt; ptyalismus su-
dorum profusorum vices gerit, diabetes! ptyalismum à
tergo excipit; quinimo non evanescit morbus, verùm
à symptomate in symptomata usque commeatur; ne-
que priùs morbo, quam vitæ finis adest.

Dolores nocturni, venerei, atrocissimi ex *Dekkero*,
practico felici, misturæ ex gummi guaiacino, antimo-
nio diaphoretico & diascordio seu opio mox cedere
observantur; quinimo emplastrum cinnabarinum, parti
dolenti admotum, necnon opium introsumptum dolo-
ribus istiusmodi maximopere profunt: Quoniam vel
modicum materiæ extruditur, vel dissipatur, cujus re-
siduum ita parùm incommodat, ut opiatis cedat: No-
tandum autem est, nos hic de doloribus, carie vel spi-
ritu ventosâ ortis, omnino reticere; qui non possunt,
apertione non factâ, auferri; quinimò quoties caries
articulos obsidet, toties vel ipsa apertio modicum as-
fert emolumenti; quoniam ad os pertingere nequimus
tendinibus non penitus scissis; porrò quemadmodum
articulorum ossa sunt porosa ac cellulis plena, vix vel
ne vix caries talis citra unctionem evanescet; spiritus
autem, ut hæc agimus, tantoperè exhaurientur, ut la-
borantes paulo post, quinimò postridie aliquoties,
quam atrocia id genus perpetrata sunt, extremam a-
gant

gant animam, ac proinde istis antè cum prognostico diro valedicendum est.

Hauftus Anodynus.

℞ Aq. Lact. Alex. ℥ij. Pæon. comp. ℥ss. Syr. de Mecon. ℥j. Extract. Opii Thebaic. gr. i℔. m. f. Hauſtus horâ somni ſumendus.

OBSERVATIONES.

Cùm hauſtus hicce ſit paulo fortior, valet in doloribus vehementibus uſquam ſitis, & etiam in fluxu ſanguinis vel humorum quovis. Cavendum autem eſt, ne in colicis inflammatoriis exhibeatur unquam: Quoniam opiata, humores in partibus deſigendo, iſtorum motui circulari obſtaculo ſunt: Quod ſi venam tundamus, oleoſa ac flexilia per os exhibeamus, enemata emollientia injiciamus, fotus emollientes ac diſſipantes adhibeamus, colicæ fixæ ac inflammatoriæ finem imponemus.

Chordapſo ſeu *paſſione iliaca* laborantes cautè remediis fatigandi ſunt ambiguſ; quoniam, hiſce exhibitis, factum poſtmodo aliquoties dolemus: Inde eſt, quòd opiatorum energiam aliquandiu veris attentius rationibus priùs expendamus, oportebit, quam iſta in iliaca exhibeamus: Quippe quæ non modo humores organis deſigunt, ſed motui etiam periltaltico tantoperè officiunt, ut fæcum excluſioni adeò impedimento ſint, quo minus ejiciantur, ut inteſtiniſ firmiter adnaſcantur: Nam ſi ad rationem revocemus, quàm valdè fæcum, in ſtatu naturali, decenſui motus antiperiltalticus ſeſe opponit, cui moræ etiam inteſtinorum conſtrictio, necnon motus, præ opiatſ, reſſus accedunt; quî fiet, ut itineri fæcum intercluſo, ut impedimento ac remoræ huic, vel remediorum fortiffimorum ope efficacitèr occurratur? Adhæc cùm fæces inteſtini� paulò preſſius adhæreſcant, gangrænâ ex improviſo, in ætate proſectis, citra ullius inflammationis veſtigium, pone ſubiſſe meminimus: Uti plerunque ſenio conſectis evenire ſolet: Hi enim leviffimâ de cauſâ, quemadmodum authores necnon experientia teſtantur quotidiana, gangræna,

grænâ, in partibus externis, membrorumque extremis corripuntur; nec mirum, fonte deficcato rivulos deesse, spiritibus exinanitis gangrænas adesse.

Hoc à vobis seriò adverti volumus, opiata, nimirum dolores omnimodos ita compescere, ut mox paulisper evanescant; verum enimvero doloris amotionem aliquoties adeo parum conferre experimur, ut humores partibus insidentes ibidem defigant, ut moram trahendo, tandem humores isti in pus & abscessum abeant, ut mortem ideo præproperè accersant.

Quoties necesse est, humores in pus evehantur; uti in morbis quibusdam debent: Toties opiata luctam huic instituto pernecessariam adeo præpediunt, ut nequaquam vel tardius solito fiat.

Cephalalgiae rarò opiatas cedunt; eorum enim usui comata, lethargi, & his similia fermè comitantur: Hoc autem solummodo de dolore, ab humorum lentore orto, à solidisque partibus valdè læsis prognato, affirmamus: Hisce enim in casibus, cùm humores magis ab opiatorum assumptione in dies figantur; necesse est, fiat accumulatio tanta, ut ibidem jam inde & in perpetuum cursum sustineant: Quocircà satius esse ducimus, plenitudinem propemodum demere; quantulum enim hic agendum superest?

Opiata feбри variolarum secundariæ & putridæ propterea subsidio veniunt, quòd inquietudinibus, anxietatibus, vigiliis, commotioni, cæterisque luctam nimis evectam commonstrantibus per ista ex facili occurratur: Quòd si dira hæc symptomata à spirituum penuriâ aut motu sanguinis retardato vel debilitèr propulso initium facerent; tantum abest, ut ægrotis emolumento sint, ut ipsorum vitas exinde convellamus: Nam hoc in rerum statu tam alexipharmaca generosiora exhibenda, quàm epispastica eò adhibenda sunt, ut spiritus exhausti, ac inaniti quamprimùm renoventur. *Sydenhamius*, vir iste egregius, opiatorum exhibitioni venæ sectionem præmittere jubet, nec immeritò; quoniam aliàs evacuatione non celebratâ, modò requiratur, ægroti ex opiatorum usu valdè hebetantur.

Revulsionum normæ ita sunt à nobis advertendæ, ut istis probè vel malè institutis, salus vel interitus pressò insequatur

insequatur pede: Nam plenitudine nullatenus demptâ, five ex naturæ molimine five ex artis regulis; emeticis, nimirum, catharticis, diaphoreticis, diureticis, venæ sectione, & similibus haud præmissis; saltem sudoribus, sedibus aliisque à naturâ attentatis non prægressis; opiata ineptè exhibentur: Hinc fit, ut phrenitidi non sint prius auxilio, quàm febris paulum deferbuerit; quàm inflammationis vigor imminuta fuerit, quàm ipsa demùm nonnihil inveteraverit, ac diuturnior fuerit.

Maniæ impetum furibundum & audaciam domant & compescunt opiata hora somni propinata; si tamen venæ sectio primum satis celebretur, emetica & cathartica eò exhibeantur, ut tam humores exhauriantur, quam spiritus inaniantur: Citra ista enim, remedia nitrosa vel serum lactis parum valent; quinimo flagellatio, juscula avenacea, lectus stramineus, nec camera obscura, opio posthabito, hilum proderunt.

Nonnulli opiata jampridem in hydropse deprædicaverunt; ast immerito: Nam cum laxent, ac proinde vasa rupta magis reddant flexilia ac mollia; ista id propter fluidorum momento facilius deinceps cedent: Quoties autem hydropibus dolores atrociores comitantur, uti videre est in *Horstio*, opiata omninò eò requiruntur, ut dolores isti compescantur; alioquin è vitâ quamprimum migrandum est hydropicis.

Apud Turcas & Indos invaluit mos, ut opiata eò introsumant, ut coitum protrahant; ut *Ettmullerus* his verbis nobis jampridem indigitavit, “ Mulieres sanè
“ Indæ sunt admodum voluptuosæ, & quæ non tam
“ sæpius repetitum, quam unâ vice longius continua-
“ tum optant actum venereum: Cui desiderio ut me-
“ lius satisfiat, opio prius se muniunt mariti, utpote
“ quorum impetus, alias in citâ seminis spirituosus &
“ fervidi, in calidioribus istis climatibus, eruptione præ-
“ curritur seu retardatur.

Enema Quietans.

R Decoct. alb. lbß. Theriac. Androm. ʒß. ovi vitellum unum. m. f. Enema statim injiciendum.

OBSER-

OBSERVATIONES.

Quotiescunque *Diarrhœa* humorum acrium, in intestinis defixorum, irritationem exceperit, toties cathartica, ex rhei drachmâ cum Syrupo è Rosis solutivis in Bolum confectâ, quoque diluculo alterno sumenda, ad tres usque vices, propinentur; hoc confecto, hauriant ad libitum Tincturam Rosarum vel Decoctum album; demûmque haultus hypnoticos, ex Aquæ Lactucæ ℥ij. Fl. Paralyf. ℥j. Fl. Papav. ℥β. Syr. de Mecon. ℥vi. conflatos, sumant; quos horâ somni præcipuè devorent: Et enema hoc subinde repetatur.

In *Dysenteria*, quando gradu solûm à *Diarrhœa* diffidet; remedia majori in dosi, vel magis efficacia, exhibenda sunt: Hinc est, quòd cathartica ex rheo, vel etiam, ex nobili *Boylao*, ex mercurio dulci cum gummi tragacantho misto, propinanda sint, quòd tam sanguinis profluvium quam tormina opiata auctiori in dosi requirant, quòd enemata cum opii quantitate sat magnâ prius injicienda sint, quam dysenteria de viâ decesserit: Huic autem morbo atrocissimo finem imponit lignum (an radix?) ab insulâ *Cayenne* dictâ per R. P. *Montigny* anno 1710. asportatum quàm ocysimè & felicissimè, uti sæpius experti sumus, & uti jampridem orbi literario patefecimus.

Emplastrum Anodynum.

℞ Theriac. Venet. partes duas, Mithridatii partem unam. m. f. Emplastrum parti dolenti applicandum.

OBSERVATIONES.

Quanquam eximius vir *Fullerus* sub *Emplastro Anodyno* subdubitet, utrum opium externè applicatum, sit verè anodynum necne, namque, inquit, sale abundat volatili igne & sulphure graviter foetido: Inflammabile est, amarum, acre, & eo usque calidum, ut vel in primâ discutientium classe meritò ponatur, & fermè causticum existimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad constituendum anodynum: Sed cùm istud particulis oleosis scateat, volatilium autem copia isti defit; necesse est, magis emolliat, quam dissipet; magis

mitiget, dulcificet, leniat, relaxet, discingat, quàm fervorem concitet, ac proinde inter anodynorum censum meritò ordinandum est: Litis cardo, quæ nobis manifestanda superest, in hoc versatur; quî, nempè, fieri potest, ut unum olei granum, in opio residentis, unciam olei alterius cujuscvis, nobis adhuc patefacti, virtute longè præiret: Operæ certè pretium esset, hâc super re longè latèque expatiari, quum verò scribendi finem facturi sumus, non par arbitramur, neque convenit nobis, ultrâ hic profati; in aliud igitur tempus hunc laborem rejiciemus, eoque impræsentiarum supersedebimus: Cum itaque praxi quotidianâ ratum sit, opiata dolores, vel externè admota, compescere, non potest indè non consequi, *anodyna* tam intus quam foris usurpata, opiata jure nuncupanda esse. Hinc spirituum furores passim pacant, nervos, ob humorum affluxum uberiores, tensos nimis laxant, musculorum, nervis appensorum, fibras retendunt, ac proinde tumores producturos sanguinis residentia, fibrarumque crispatione orituros, præscindunt, doloresque quamprimum exindè subsécuturos anteverunt. Emplastris hujusmodi admotis, mox somnum placidum obrepisse advertimus, ac proinde phrenitides, venæ sectione debite præmissâ, abstulimus: Quî hoc fieret, paucis expediemus verbis: Quando opiata sunt ex particulis oleosis potissimum conflatâ, fibras laxant, easque longiores & latiores conficiunt; his undiquaque ampliatis, longè magis flexiles evadunt, adeò ut sanguinis momento faciliè cedant, fluida ad partes, quibus opiata admoventur, appellentia, istas nullo cum negotio introeunt, subeuntque; eâ autem ratione, quâ partes flexiles factas fluida subintran, revulsio, aversio, diversio, derivatio, fieri solent; indè erit, quòd spiritus ferocientes aliò devocentur, quòd ii sopiantur, quòd demùm phrenitides, sanguinis cursum velociorem ad cerebrum usque commoustrantes, auferantur. In opiat's autem solis, externè admotis, fiduciam omnem reponere, tam eorum interno usu posthabito, quam aliis, febris stadio idoneis, ineptum esset. In odontalgis, usus inolevit opiata prope partem affectam, quinimo super istam, admoveere; hinc fit, ut opium in pillulam

redactum, syndonique inclusum denti cavo & dolenti intrudamus: Exhinc, nempè, quòd, cùm doloris causa sit nervorum tensio, particulis aculeatis nervos stimulantibus orta, opii particulæ oleosæ nervos retendant, tensionem compescant molestam, ac dolori finem imponant: Nam causâ doloris conjunctâ amotâ, auferitur dolor; Qui denuò tamen sine dubio, nisi causæ remotæ rationem diligenter habeamus, pedem referet. Suprà notavimus *Horstium de morb. mulier. observ.* 23. Historiam, de muliere hydropicâ insignem, narrâsse; cujus hydropi dolores abdominis atrociores comitabantur, qui catharticis nequaquam omnino cesserunt: In *Actis Philosophicis* n° 157. p. 537. sermo fit de hydrope tunicæ uteri externi doloribus stipato: *Aicholtzius* itidem de peritonæi hydrope verba facit, qui propter dolores atrocissimos vigilias pertinacissimas introduxit. Quemadmodum autem *Horstius* cataplasma admovit anodynum; ita nec aliud remedium cæteris emolumento esse poterit; nam aperto cadavere, vesiculæ, *Hydatides* dictæ, integram peritonæi membranam undequaque obsedisse visæ sunt. Dolores brachii ex *Baltonii cons.* 41. l. 1. opiatas etiam cedunt; nam ipse *Aquam vitæ* cum *Theriaca vetere* hoc in dolore eò miscet, ut dolore sopito, parte affectâ retensâ, humoris residuum dissipetur: Quibus posthabitis dolores hujusmodi in abscessus abirent. Eximius *Nic. Chesneau* opiatâ admoveri jubet, quoties convulsiones, ab humoribus acribus valdè, in partibus extremis fitis, initium faciunt: Quoniam hunc in modum nervo ibidem tenso, semel relaxato, convulsioni finis aderit. Quoties sterni dolores, ex eo quòd ligno, mensæ, vel duro cuivis inter scribendum incubuerint, uti à studiosis fieri solet, quosvis adoriuntur; toties venæ sectione ac catharsi miti præmissis, emplastra opiata eò admoventur, ut fibræ compressæ, semel retensæ, in primæyum revertantur tonum. Opiata tandem profluvio omni, colliquationibusque (ea sunt diarrhœæ, vomitus, &c.) ac irritationibus cunctis prosunt. Quando verò sputi expectorationem reprimunt, & partes dolore tensas retendunt; non videmus, ut neoterici quidam opium

particularum volatiliū ope tantū operari, etiam-
num affirmare persistant.

Huic Classi sequentia referuntur.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Aqua Papaveris albi. Aqua Papaveris Rhœados. Aqua Papaveris composita. Aqua Paralyseos. Aqua Theriacalis. Aqua Theriacalis per infusionem. Diacodium. Diacodium tabulatum. Diascordium. Laudanum. Lohoch de Papavere. Mithridatium. Nepenthes opiatum. Oleum Hyoscyami. Oleum Papaveris. Philonium Magistrale. Philonium Persicum. Philonium Romanum. Pilulæ de Cynoglossō. Pilulæ de Styrace. Pulvis Haly. Species Diatrachacanthi frigidi. Syrupus de Meconio. *vid. Diacodium.* Syrupus de Payavere Erratico. Theriaca Andromachi. Theriaca Londinensis.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Extractum Paregoricum. *In catarrhis, doloribus, vigiliis.* Laudanum liquidum cydoniatum. *Dolores sedat, Phrenitides compefcit, odontalgiam tollit.* Laudanum liquidum Tartarifatum. *v. Laud. liq. Cydon.* Laudanum sine Opio, an eadem, atque opiata perficit, subdubitamus. Laudanum Starkii. *v. Pil. Matthæi.* Pilulæ Matthæi (five Starkii) ℞ss. ℞j. *In catarrhis, doloribus, profluviis, &c.* Pilulæ Pacificæ. *v. Pil. Matthæi.* Syr. de Croco ℥j. iij. & ultra. Tinctura Bezoartica ℥iij. ℥j. (*est etiam Cardiaca*) Extractum Hypnoticum. D. G. Syr. Hypnoticus D. G. Syr. Hypnotic. Balsam. D. G. Tinctur. Opii D. G. Ung. Hæmorrhoidale D. G.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Externa, Cataplasma Papaverinum. *Restringit, dolores sedat.* Lintea Somnifera. *Somnum accersunt.* Decoctum Pacificum ℥iij. iv. *Somnum urget.* Emulsio Pacifica ℥iv. *Spiritus compefcit, somnum urget.* Enema Somniferum. *In Phrenitide, vigiliis; caute injiciatur.*

ART. II.

De Lacte.

Quantum ad lac, in *mollium* censum ascribi debet; verum quoniam *lac*, præcipue *asininum*, aliquandiu exhibemus, id propter *regimen* ipsi idoneum mox delineabimus.

Atrophix essentiali primariæ, temperamentis salinis, hæcticis ideo usui est, quia salium quorumvis aculeos efficaciter obvolvit, ac proinde morbis sale cujusvis speciei ortis subsidio erit. Empyemati præsto est, quippe quod hæcticam alleviet: *Prækelius* jampridem advertit *Rutenos & Scythas* nunquam propterea leprâ conflictari, quod lacte fere solo vescantur. *Hippocrates Aphor. 64. Sect. 5.* Lactis usum in *febre lentâ hæcticâ*, & *emaciatâ depradicat*, ex eo quod tam refrigeret, quam nutrimentum suppeditet.

Non autem tantopere proderit *lac*, ut non subinde ægrotis incommodo sit: Nam ex *Luca Tozzi* observatione, ubi pulmones pituitæ vel puris sarcinâ gravantur, ubi ventriculi adest aciditas, ubi vasorum chyloforum obturatione affliguntur laborantes, tantum abest, ut profit, ut istos anhelos reddat, ut in ventriculo in grumos caseosos abeat, ut demum vasa magis sufferat: Lac, asininum præcipue, diarrhœis nocumento est, ex eo quod, cum acidum diarrhœæ fermè causa sit; lacte coagulato, serum motui intestinorum peristaltico concitatori obedit, ac deorsum fertur: Hinc fit, ut hypochondriacis, ac Phthisi, acido vel pituitâ oriundæ, noxæ sit; etiam ob eandem rationem nempe, quia sedes movet ex *Hippocratis Aphor. 64. Sect. 5.* ^a Lac dare capite dolentibus, malum; malum verò etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt murmu-

• Ταλα δίδναι κεφαλῆγῃσι, κακόν. κακόν ὃ ἔστι πνευμονοσπασμοί, ἔστι δὲ καὶ σπασμὸς μετὰ διαφθορὰν, ἔστι δὲ καὶ διφθῆσις. κακόν ὃ ἔστι χαλῶδες αἷμα σπασμὸς, ἔστι δὲ καὶ οὗτοι πνευμονοσπασμοί.

rantia & sticulis. Malum autem & quibus dejectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus.

Propinandum est lac asinum horis medicis, ventriculo jejuno, nempe vel vacuo; neque comedere usque eò licet, dum ventriculū tranaverit: Ab uncis octo inchoandum est, & quantitas in dies usque augeatur, quoad heminam unam & alterius dimidium devorent: Tepidiusculum sumatur, sive id ab afinā ipsamet aliquantō antè emulgeatur, sive in *Balneo Maria* tepefactum sit: Per mensis vel sex hebdomadarum spatium hauriatur: Quòd si in ventriculo acescat, uti ex *rustibus acidis* vel *diarrhœa* palam fit, cum sacchari paulillo, vel cum pulveribus testaceis exhibeatur; vel in ejus vicem serum lactis vel chinæ decoctum substituatur: Inter ejus usum vina & acida evitanda sunt: Exercitium, pro euphorix modulo, vel sit modicum vel nullum: Hinc ei vel superdormiendum vel nobis à motu interim abstinendum est: ab omnibus remediis, testaceis & opiatis demptis, nos interea dum contineamus: Prandendum est, at parcè ab eo cœnandum est.

ART. III.

De Aquis Chalybeatis.

SECT. I.

De Acidulis.

Discrimen inter Acidulas seu Spadanas, & Aquas atramentosas hoc est; cùm ambæ nempe sale martis scaturiant; atramentosæ tamen non salis istius tantum copiam fruuntur uberiori, verum particulis quamplurimis metalli ipsius redundant; cùm Acidulæ sale gaudeant esurino extra martis sal, quod *vitriolum* est ipsum *martis*, modicum etiam *metalli* comprehendunt eæ. His præibatis ad *Acidularum* vires properandum est nobis.

Acidulæ igitur ex particulis aqueis, acidis, & vitriolicis præcipuè constant; ea propter fit, ut *appetitum prostratum* rursus acuant; quoniam acidum esurinum fluidis

fluidis suppeditant; *vomitioni* ideo auxilio sunt, quia particulas alcalino-acres immutant: *Hæticis* adfunt, ex hoc quòd salium aculeos retundant, quod ista disgregando diluant; hincque est, quòd *scorbuto*, *malo hypochondriaco*, fervidis subsidio sint; *arenulas* foris amandant, quippe cùm levitèr irritent, serumque sanguini suppeditent; *ulceribus renum* opitulantur, ex *Hildani* sententiâ, nam quando particulæ vitriolicæ sunt stypticæ, meatus ulcerum apertos occludunt; verum non usque in ulceribus conducunt, quoad pus excretum sit laudabile, & quàm maximè puris excreti minuat quantitas; huic sententiæ *N. Tulpus* l. 2. *Obs.* 53. astipulatur, nam hæc habet, *quibus (in sordido vesicæ ulcere, terebinthinâ, ligno nephritico, chalybe, aquâ mulsâ, &c.) tamen omnibus, parum aut nihil proficientibus, confugit tandem ad aquam fontis spadani: Cujus certè continuo usu, debellavit tam feliciter deploratum illud vesicæ ulcus: Ut summè obstupuerint, quibus id videbatur, habere certam desperationem. Cephalalgis profunt biliosis, quippe quæ salia ferocia obvolvunt, diluant, eaque foris per urinam eliminant; ex quo fiet, ut aculei, longis spatiis interjectis, segregati & divulsi non ultra irritare, vellicare, stimulare, organis insidere, insigive queant. Eximius vir Baglivius omnem ex medicorum animis scrupulum sustulit, quo pacto obstructions à fibris crispatis, corrugatis, distortis initium faciunt: quandò itaque fibras humectant, easque discingunt; abesse non potest, quin sanguis, qui ad tempus substiterat, denuò pergat ac more solito in orbem pellatur: Hinc erit, quòd hydropi anasarcae subindè & in quibusdam circumstantiis opem ferant Acidulæ. Siquidem flatus sunt materiæ cujusvis colluctantis soboles, fieri non potest, quin *carminantia* magnoperè inter se discrepent; nam flatus exordium sumentes à saburræ pituitosæ, serosæ, vel tartareæ luscâ, sunt frigidi; hi autem à carminantibus aromaticis, amaris, fœtidis, acris sublevantur: Flatus verò, qui propter certamen, inter particulas biliosas, acres, fixas, volatiles, aromaticas, amaras, acidasque volatiles, factum, laborantes immaniter discruciare solent, carminantibus aqueis, tartareis*

tareis plerunque cedunt; nam, ut *seni* divino morem geramus, *contrarietas remedio est*.

Cùm secundum adagium, *nil prodest, quod non ledere possit idem*; Acidulæ non adeò sunt emolumento, quin subinde improbentur: Quinimo pulmonum ulceribus ita sunt damno, ut ulcerum labia propter copiam distrahant, ut sudores accersant colliquativos, ut diarrhœas introducant, ut crura mox advocent œdematosa, ut demum extremum phthiseos actum peragant. *Cholera* sunt incommodo, quoniam sal vitriolicum nauseam accersit, nauseâ autem vomitioni atroci adjectâ, laborantes in discrimen conjicimus extremum. *Asthmati humido* exitio ideò sunt, quia styptica expuitioni criticæ impedimento sunt, & aquea pituitam augent; hinc fit, ut, cacochymiâ per aquea auctâ, expuitione per styptica repressâ, causæ tam remotæ quam proximæ immane quantum adjiciatur. *Profluvio mulierum menstruo* perniciiei sunt, quia, cùm astringant ac simul refrigerent, periodum retardant: Quod si gravidæ morbo laborarent bilioso, non dubium est, quin istiusmodi prodesse, quando salium ferociam retunderent, ea sejungerent, fervorem reprimerent, iisque id propter subsidio essent. *Chlorosi* cladi sunt, quoniam uti chloroticarum sanguis serosis retundat particulis, ita aquea hauriendo morbo fomitem superinjiceremus. *Balloonius l. 3. annot. 1. conf. 82.* Aquarum chalybeatarum usum in iis, qui ptyalismum experti sunt, vituperat, his in verbis, “ Iis, qui hydrargyrosin passi sunt, “ nocet aquarum naturalium usus; ratio est, quod o- “ dium intervenit calcantho, quo illæ aquæ imbuun- “ tur, & argento vivo, quod à calcantho dicunt cogi, “ coërceri & colligi, unde postea id argentum vivum “ magis vires exercet in partes & eas corrumpit. Num verò inter calcanthum vel vitriolum ullum & hydrargyrum sit aliqua dissensio, in *Pharmacomathiâ* erit opportunior dicendi locus.

Nobilis *Boylaus* in *observ. medicis & chymicis*, methodum nobis delineat, quâ *aquas Tunbrigenses* exactè imitemur; nempe limaturæ martis unam accipit partem, aceti destillati decem partes; misturam in Balneo Mariæ

Mariæ aliquandiù, usque nimirum, quoad colorem acquirit aureum, digerit; decapulat; dein unciis aquæ fontanæ octo, tincturæ hujus guttas quatuor affundit; tum habetis, inquit, aquam chalybeatam, acidulam, aquas *Tunbrigenses* sapore & viribus exactè æmulantem. *Schroderus* autem aquam chalybeatam hunc in modum per artis normas conficit; sumit, nempè, limaturam martis, cui affundit *Clyffum Antimonii*, & Balnei Mariæ ope fit tinctura, aquæ fontanæ injicienda: *Clyffus Antimonii* ex *Libavii* & *Tenzilii* sententiis fit, hunc in modum, & *Antimonii crudi*, *Salis Nitri*, *Sulphuris ana p. æ. pulverisuntur*, detonentur, & in aquam recipiantur; quam evaporate, & habetis SPIRITUM ANTIMONII ACIDUM. *F. Platerus l. 3. obs. p. 610. Tincturam Martis*, ex *Limaturâ Martis* & *Aceto* conficit.

Quandoquidem hydropotas erudire nobis superest, quî aquas minerales haurire debent; rem hanc paucis expediemus. 1. Alvus semel in die respondeat, saltem *pilulis mastichinis* aliisve lenibus proritetur. 2. Quoties in corpore moram trahunt; vel enemata vel cathartica, vel diuretica exhibeantur, nam evacuantia pro re natâ varianda sunt. 3. Alterantia per totum potationis tempus propinanda sunt. 4. Caveant, ne nimium genio inter usum indulgeant. 5. Hemina una primùm haurienda est, deinde sensim ad heminas sex usque ascendant; demum sensim ad heminam unam denuò descendant. 6. Cathartica priùs exhibeantur, quam earum aggrediamur usum. 7. Inter potandum spatia eò conficiamus, ut per renes foris amendantur. 8. Cœna prandio, ex *Loffii Conf.* 5. lautior sit. 9. Providendum est, ne inter usum frigus suscipiant potatores. 10. Diarrhœæ necnon cæteris symptomatis per remedia idonea occurrendum est.

Spadana insigniores hæ sunt; *Geronster*, *Pauhont*, *Savinir*, *Tonnelet* (prope *Leodium*.) *Greisbach*, *Petrin*, *Antegast*, *Ribelsaw*, *Geberswel*, *Schwalbach*, *Egran*, *Niderac*, *Deinach*, *Federan*, *Trevirenses*, *Hornhausen*, *Pyrmont*. In *Angliâ*, *Islingtonienses*, *Tunbrigenses*, *Ipsvicenses*, &c.

SECT. II.

De Aquis Atramentosis.

Quandò tam metallo, scaturiunt Aquæ Martiatæ fortiores, quam vitriolo, id propter sanguinem calefaciunt, appetitum prostratum rursus instaurant, propter sal, quo gaudent, esurinum; quatenus diluunt, particulas visceribus infidentes noxias abstergunt, calculumque per renes foris eliminant: Nervorum obstructions reserant, ex eo quòd eæ particulis ponderosis optimè cedere soleant. Ulceribus vesicæ, renum & oris operferunt, propterea quòd particulis abundant stypticis ulcerum labia ocludentibus. Quoniam sanguinis motum invigorant, necnon particulas illi adjiciunt agiles, chlorosi subsidio veniunt. Anasarcis & fluori opitulantur albo, exhinc, nempe, quòd fibras laxas nimis tendant, necnon massam exagitent sanguineam.

Arthritidi autem incommodo sunt, & asthmatis; ex hoc quòd in primo casu fluxum humorum criticum aliò devocent; deinde quod stypticitate suâ sputum reprimant.

Eodem hauriuntur modo, quo suprà in Acidulis delineatum est à nobis.

ART. III.

De Thermis.

De Thermis eruditè scripserunt *Blondel, Guido, Pierce, Listerus, & Oliver.* *Listerus* asserit Thermas nostrates aquas, nempe, *Bathoniensis*, continere *Sal Calcareum, Sal Commune, Ochram, & Lapidem Calcareum.* Quì verò continuò fervidæ sunt, alibi dicendum est; nos enim hic præcipuè earum energias explicaturi sumus.

Prosumt igitur externè, conceptionem promovendo; nam quando propter calorem earum actualem vasa maximè afficiunt, obstructions efficaciter reserant, præcipue

quæ si statim à mensium periodo emensâ Balneo huic
 latent. *Morbis frigidis* opem ferunt, *Paralysi*, nem-
 , *doloribus fixis*, *colicis flatulentis*, *articulis contractis*,
 tibus, *ventriculis* à computatione *laxatis*, *chlorosi*,
 ori albo, abortuque; quoniam particulas viscidas in
 guine, succo nervoso, vel uspiam latitantes attenu-
 t, inciduntque. *Calculo* opitulantur, ex eo quod per-
 de calor atque aquæ bituminosæ quantitas ureteres
 ant, ampliantque. *Thermarum lutum*, ex *Riverio*,
morbis propterea aderit, quod æquè dissipet ac emol-
 t. *Sennertus* *Thermarum* aquas per enematis modum
 anum injectas in *dysenteriiis* deprædicat; ex hoc,
 mpè, quod & particulæ ipsarum molles salia septica
 luant, & leniant, & particulæ ipsarum deterisivæ hu-
 orum descensum leniter proritent. Membra dolore
 o laborantia antliæ ope vigesies, centies vel millies
 irrigant, ut & caloris & percussione vi humores im-
 cti denuò in motum urgeantur; hincque fiet, ut
 usa ipsorum proxima amoveatur.

Prosunt internè, in *morbis frigidis* & *chronicis* quibus-
 que, *colicis*, nempe, *Paralysibus*, *fluore albo*, *men-
 m* *suppressione*, *obstructionibus*, *Hydropibus recentibus*,
chexiis, *sterilitate* & similibus quæ initium faciunt ab
 moribus viscidis, & acido-salinis, ex eo quod *acri-
 oniam* diluant *frigidam*, ut *Sylvius* advertit; hincque
 t, quod scorbuto frigido, passioni hysteriæ, malo
 ypochondriaco, arthritidi, phthisi frigidæ, colicis, &
 uptionibus quibusdam ac subinde siti subsidio veniant.
Verzasch in observationum libro, *Thermas*, ad pul-
 onum vomicam maturandam ac proindè-rumpen-
 am, deprædicat. *Scholtizius* eas in vesicæ ulceribus
 æconiis effert: *Ettmullerus* eas in diarrhœis diuturnis
 udat; *Riverius* etiam illas in diarrhœis ab intestino-
 um ulceribus ortis commendatas habet; *Guaynerius*
 eas in calculo elogiis celebrât. Quando enim diluunt,
 etergent, luctam cient, motumque invigorant, quan-
 o etiam meatus lenitèr occludunt; nil mirum, si in-
 tionibus variis faciunt satis.

Noceant externè, in *Hæmoptysi*, *Asthmatis paroxysmo*,
phthisibus humoribus acris ortis, albo propter hu-
 iores acres *constipatâ*; neque *renum ulceribus* ante
 conferunt,

conferunt, quàm ea probè detergeantur; homines eis diutius aliquantò innatantibus torpidos reddunt: Nam uti tenuant, calefaciunt, evaporant, motumque instaurant, quinimò nimis urgent; vasa disrumpunt, sanguinem, pro usûs modulo, vel tenuem vel lentum efficiunt.

Noceat internè, in Hemoptysi, vel quovis sanguinis fluxu, Epilepsiis, Convulsionibus cunctis, sanguine servidiori, spiritibus mobilibus nimis; in omni evacuatione per per anum, vomitum, urinam vel sudorem: In pulmonum morbis frigidiuscula hauriantur.

Hunc in modum hauriantur: 1. Ab horâ sextâ matutinâ ad nonam vel decimam antepomeridianam usque bibantur. 2. Heminæ dimidium primùm hauriant; sensimque ad tres sextarios usque ascendant. 3. Potatio per hebdomadas sex duret. 4. Cyathos aliquot in pastu cum vino ebibant. 5. Ab eorum usu paulisper circumambulent, præcipuè ubi torpidi vel somnolenti fiunt. 6. Præmittantur cathartica vel venæ sectio, priusquam in usum trahantur. 7. Alterantia idonea per totum potationis tempus sedulò exhibeantur. 8. Cibus non est usque sumendus, dum urinæ color redeat naturalis citrina, dumque foris per urinam amandentur. 9. Cœna prandio multò sit lautior. 10. Quoties retinentur & in intestinorum ductu moras trahunt, toties per enemata foris eliminantur. 11. Alvus vel sponte vel stimulantibus semel in die, præcipuè diluculo, respondeat. 12. Quo temperatiores sunt, eò diutius in earum persistendum est usu. 13. Vomitionibus indè natis enematum, catharticorum lenium opiatorumque usu opem ferimus, vel parumper eis defuescamus. 14. *Appetitui prostrato* inde prognato, *Hypercatharsi, Ægritudini*, vel alteri *cuiusvis symptomati*, non aliis methodis, atque eis, quibus aliis temporibus utimur, obviâ imus. 15. *Somnolentia* frictionum ope, ambulando, ex *Loffio*, occurritur.

Quantum ad *Thermolusian*, seu Balneationem hæc advertenda sunt. 1. Prius venæ sectio & cathartica in usum trahantur, quam laventur. 2. Inter balneandum, frigus vel error quivis in sex rebus non-naturalibus vel etiam in non-necessariis sedulò evitetur. 3. Balneum jejuni

jejuni intremus. Cœna prandio sit largior. 4. Bâneatione finitâ, psychrolusian usurpent. 5. Sanguinem incrassant, refrigerantque, dummodo paulò diutius eis immoremur; ex eo quòd fluida tenuando & evaporando, residuum erit lentius. 6. Sanguinem calefaciunt, si tamen per tempus brevè (minuta duo, tria) eis immoremur & à pastu balneemur. 7. Inter balneandum cyathum unum vel alterum hauriant. 8. Se in Thermis magis temperatis primum balneent; deinde calidissimas introeant.

ART. V.

De Psychrolusiâ.

Immersionem in aquâ frigidâ primus commemoravit *Corn. Celsus* l. 5. c. 27. quam denuò *Floyerus* & *Baynard* in usum receperunt.

Morbis variis, iisque à causis contrariis initium facientibus opem feret: Nam pro eo ac usurpatur, vel refrigerat vel calefacit: Ut paradoxon hoc melius capiatur, paulisper attendite.

Quatenus fibras contrahit fluidorum propulsio eò vehementius peragetur; quando fibræ igitur magis in directum exinde ponuntur, etiam quando magis in angustum coguntur; fieri non potest, ut, cum fibrarum diametri minuantur, & vasa fluidis turgescant, liquores non multò ocys circumPELLANTUR; motu invigorato, & accelerato, augefcit calor, sanguis tenuatur, secretionum ductus referantur, primævum & nativum demum redit fluidorum & solidorum temperamentum. Quoties è contrariò aquæ frigidæ paulò diutius immoramur, toties fibris, præ fontis frigiditate, nimium compressis, & sanguine, præ aquæ contactu, densato, morbi frigidi mox exordium exinde sumunt: Quocirca pro eo ut usurpatur immersio, quod demonstrandum erat, sanguis vel friget, vel calet: Hinc si ante pastum aquam ingrediamur, & ad brevè tempus ei immoremur, ibi calefaciet, è contrariò vero, si à pastu & diutius usurpetur, corpus refrigerat. Tam hæcticis itaque, &

statui sanguinis præfervido, quam melancholiæ aderit frigida; obstructionibus finem imponit; cephalalgias, ophthalmiis in declinatione, melancholiæ, ex *Lucâ Tozzi*, pervigiliis, ex *Dolao* mania, *hydrophobia*, eruptionibus leprosis, stuporibus, epilepsiis, colicis, vigiliis & quamplurimis aliis morbis opem feret; hoc tamen obiter notandum est, quod inflammationibus, languentibus, morbis contumacibus nimis, schirris, nempe, phthisi, cæterisque ubi fibrarum tonus ultra modum læditur, nocumento est: De cæteris *Floyeri* librum consulatis.

Quando *variola* per annos aliquot præteritos magis malignæ & lethiferæ, quàm antehac fuerunt, in mentem venit, psychrolusian aliquâ ex parte huic cædi ansam præbuisse; nam, uti frequentius nunc quàm antè immersioni consulunt medici, ac uti cutis fibras passim aqua indurat, sic si quis mox ab immersione variolis corripere, fieri vix poterit, ut iste non morte præmaturâ intercipiatur: Exemplum nobis propè instat, amici, nempe cujusdam filioli natum ibant, eorum alter submersus est, alter variolis è vestigio correptus est, quibus ἀνομάλως erumpentibus, pustulæ maturationi nequaquam omnino pares erant, cæterum mictus sanguineus se in conspectum dedit, deliria infestabant, pulsus myurus & formicans erat, symptomatis variis lethaliibus ita premebatur ægrotulus, ut quasi præfocatus extremam emisisset animam. Exhinc inferre licet, variolas nunquam passos caute immergendos esse.

ART. VI.

De Infusione.

Medicamenta subinde vasis infunduntur, uti ab authoribus traditum est; ex quo fit, ut effectus suos paulò maturius edant. In *Actis Philosophicis* n.º 459. Sermo fit de milite, cui medicamentum catharticum venis infundebatur, quod pro voto operabatur, nodumque auferbat; *Etmullerus* ait catharticum *Dantisci* injectum fuisse, quod ex scammonii granis septem so-

luti

luti in essentiæ guaiaci drachmis tribus constabat; idem ibidem asserit diætetica voto non cedere, cæterum cathartica raro spem fallere; ipse quoque jubet, ut medicamenta injecta affectui ex diametro contrariantur, p. 236. In *Chirurg. Infusor.* Joh. Dolaus laudat opiata in pervigilio injecta, p. 68. Salium volatiliū in catalepsi injectionem, p. 75. Salium volatiliū opio maritatorum in epilepsiâ injectionem, p. 101. Tincturam martis rustici cujusdam venis cum eventu prospero in melancholiâ immisit, p. 40. Antiparalytica in paralyfi foelici injecit exitū, p. 126.

Quando verò hæc de re non experti loquimur, cuique integrum sit, quod ipsi videbitur, de infusione proferre.

Num variolarum immissio seu inoculatio perinde nobis atque Turcis adesset, nos fugit; timendum autem est, ne calor climatis nostri sit impedimento, quo minus vota cedere, at consulatis *Act. Phil.* à Dno *Pilarino* communicata.

ART. VII.

Axiomata de Monitis Localibus 'Aφo- ευσινά.

Sat abundè de evacuationum, alterantium, infusionis methodis egimus; nunc superest, ut de *monitis localibus* etiam in posterum agamus. *Contrarietas & mediocritas* medicis cordi sint; his enim posthabitis, strages, non salus petitur. Quocirca sequentia observentur,

In Capite.

Topica medullæ spinali admoveantur.

Remedia cephalica ex vegetabilium regno plerunque petuntur.

Somnambuli dormiant in cubiculo probè clauso; cœna paucior sit; non somno statim à cœnâ indulgeant. *H. Regius.* non tam medicamentis quam mentis informatione sanantur; nec diutius objecto uni mens affigatur, verum omnia ritè examinent. *F. Sylvius, p. 477.*

In *incubo*, vitetur somnus statim à cibo. *Nic. Piso.*

In *capitis laxitate* vocis conducit exercitatio. *Eaglivius.*

Capiti confert equitatio. *Eaglivius.*

In *spasmo cynico* sternutatoria valent. *N. Piso. Valesc. de Tarenta.*

In *motus impotentiâ* à frigore, aquâ frigidâ laventur, & igni non appropinquent. *R. Boyle.*

In *melancholiâ hypochondriacâ* venus modica prodest. *Hejr. Mercuriat. consult. 22. p. 55.*

In *pervigilio* usque vigilent, quoad stare nequeunt. *Galenus.* Coitus prodest modicus, ex *Paulo.* Vigiliæ & coitus. *Th. Craanen.*

In *epilepsia* & *motibus convulsivis*, membra non sunt coercenda tempore paroxysmi; quia hæc cohibitio est violenta, unde major muscoli contentio erit. *N. Chesneau l. obs. c. 2. de epilepsiâ.*

In *hydrope cerebri*, postura eò sit prona, ut lymphæ in infundibulum ruat; alioqui si sit supina in medullam spinalem profluet. *Lower de corde.*

In Oculis.

Repellentia potissimum in usu sint.

Maturationem promoventia evitanda sunt.

Mucilaginosa quàm optime conducunt.

Perspicilla citra urgentem necessitatem non sunt usurpanda. *Ex Duditio.*

Post medicamentorum instillationem supini jaceant.

Postquam collyria instillantur, circumrotentur oculi.

Remedia oculis spongiæ ope optimè admoventur. *H. Ridley.*

In Auribus.

Roborantia plerunquæ admovenda sunt, ex eo quòd eæ quàm sæpissimè relaxantur.

Topica tepidè instillantur, postquam meatum à forde seu cerumine mundavistis.

Guttæ tres vel quatuor pro unicâ vice sufficiunt.

In aurem contrariam aliquandiu à remedii usu jaceant.

Quoties pus extrahendum est, auris ulcerata prona sit.

Medicamento instillato, obturentur aures.

In Ore.

Tumor in ore *schirrhosus*, ligaturâ, si possit, curatur. *Baldvinus Ronsæus Epist. 7. Miscellan. Medicinal.*

In *Odontalgia* à dente cavo, adeò tegatur terebinthinâ coctâ, vel plumbo laminato, ut aër non ingrediatur.

Dentes sine ferro extrahere. *Pastinacâ marinâ. Matthiolus.* Capsulis ex gumm. arboris mori oculis vitis albæ. *Montuus.* Radice asparagi ficcata *Mizaldus.* *Colocynthide sylvestri coctâ. Bayrus.* *Helleborastro.* ast fides sit penes authores. Oleo vitrioli subindè instillato & iterato.

In *Siti*, masticatoria salivam evocant. *Sitim* cohibet, os claudere, tacere, ventum cum potu frigido inspirando fortiter trahere. *Hippoc. l. Epid. 6. Sect. 3.*

Oscitationes assiduas, longa inspiratio sanat. *Hippocrat. Epidem. l. 2. Sect. 3. Aph. 9.*

In Larynge.

In *Deglutitione lasâ*, clysteribus nutritivis utantur, cucurbitula colli vertebrae admoveatur. *G. Harris de Anginâ.* Injiciatur nutrimentum per gutturnium cum *fyringâ. T. Willis.* *Laryngotomia seu bronchotomia celebretur. La Charriere, &c.*

In Naso.

In *Sternutatione*, attractione & retractione validâ spiritûs. *Sennert. de Sternutatione.* Frictione oculi juvatur. *Dekkers p. 38. & 42. ex Cassio.*

In *Hæmorrhagiâ*, cucurbitulæ admoveantur nuchæ; epithemata cordi, fronti, testibus, mammis, nuchæ; turundæ intrudantur naribus; acetum destillatum auri instilletur; cucurbitulæ hypochondriis applicentur; à lecto se contineant, nisi languidi valdè sint. *Willis.*

In Gulâ.

In *Paralyfi Gule*, instrumentum ex pinnâ cetacæ cum spongiâ (fibulâ apici hujus virgulæ affixâ) cibum detrudit. *Willis de Paralyfi.*

In Sinu frontali.

Medicamenta illuc suffiundo convèhuntur; quando autem sanies ad nares descenderit, ste nutatoria foris illud amandant.

In Capillis.

Ut *Crispi* fiant, laventur in decocto, radicum ebuli, vel cornu cervini, cum oleo olivarum primùm inuncti.

A. Schmitzius.

Capillos Aureos facere, coquatur radix alcanuæ in vino; capilli cum hoc liquore laventur; tum utamini pectine eburneo; *A. Lusitan. c. 3. curat. 59. Ballon. l. 2. c. 74.* vel lupinis cum nitro & aquâ tritis fricentur. *Hollerius.*

Capillos rufos facere, decocto buxi laventur.

Crines nigrore tinguntur, caustico lunari in aquâ soluto; fuligine è fumo candelæ, cereæ præcipuè, in patinâ chinenfi receptâ, & affricâ; cum aquâ capitelli lythargyri, & calce vivâ, ut formam luti mollis recipiat, fricentur; cutis non tangenda verum capilli tantum.

Cardanus de sanitatē tuendâ, c. 15. l. 4. Pice liquidâ oleo mistâ. *Hollerius in Perioch.*

In Collo.

Struma, si non possint discuti, maturari, detergeri, vel extirpari, tactu curentur regio. *Barbette. Wiseman.*

In Ventriculo.

Relaxantia non nimium in usum trahantur.

Pulveres citra diluentium vel salium fixorum usum non in usum nimis vocentur.

Medicamentorum farrago evitanda est.

Roborantia vacuo ventriculo exhibeantur.

Lenis deambulatio ventriculo convenit. *Baglivius.*

Quando adsunt *flatus melancholici*, stricte ligetur ventriculus, ut impediantur ii, & melius fiat concoctio. *N. Piso de melancholiâ.* Compressio igitur coctionem uti neoterici affirmant, juvat.

In *Vomitu*, adhibeantur clysteres, cucurbitulæ super ventriculum; solida potius quam liquida exhibeantur.

J. Wald.

J. Waldschmidt. p. 205. Tegumentorum ope & pondere usque utantur, dum sudor promanet, in *peste* ubi adest vomitus. *T. Sydenham.* In infantibus ubi lac evomunt, mulieres Hispanicæ hydrargyri grana tria vel quatuor exhibent. *Joh. Baptista Zapata Secret. Med. c. 5.* Ubi *Pylori* adest *Schirrhus*, liquida sola propinanda sunt. *Vomentes*, in balneo sedeant, interea dum medicamenta sumunt; immergantur manus ex improvise in aquam frigidam; clysteres injiciantur opii; parum comedant unicâ vice.

In *Singultu*, ligatura dolorosa partium extremarum, spiritus compressio, vociferatio, deambulatio, gestatio, equitatio, conducunt; venter, abdomen nempe, comprimatur. *N. Piso, l. 3. c. 7.* Sternutatio convenit, *Riverius.* Terror, gaudium, *Sennertus, c. 10.* Sternutamenta profunt. *Duret. in Holler. p. 256. ab Hippoc. Aph. 19. l. 6.*

In *Fasidio*, cogendi sunt minis & omnibus quæ valere possunt. *Ferdinand. Mena c. 15. de medendâ febre.*

In *Colicâ*, cingulo constringantur laborantes.

In Intestinis.

In *Colicâ*, itineratio convenit. *Baglivius.*

In *Vermibus*, spongia lacte dulci illita, est glans optima. *Fred. Dekkers.*

In *Diarrhœâ*, tegumentorum pondere usque onerentur ægroti in *peste*, donec sudor profluat. *T. Sydenham.* Cibos assos potius quam elixos usurpent. *J. Dolæus p. 299.* Saltatio nocet. *J. Dolæus p. 300.* Scortatio impudens valet. *L. Riverius.*

In *Vermibus*, remedia jejuni capiant; non statim ab usu cibandum est, sæpius pro aliis mutantur; vehementiora evitanda sunt.

In *Herniâ Intestinali* chalybem internè, & magnetem pulverisatum, cum unguento apostolorum mistum, externè inguini illitum deprædicavit olim *J. Riolanus*; hodiernâ autem experientiâ edocti sumus, magnetem pulverisatum non omnino chalybem ad se trahere.

J. Robault. Physique.

Morbi in *Intestinis Crassis*, cum remediis injectis sanantur. In *Tenuibus*, cum assumptis. *Valesc. de Taren-*

ta: Cùm ambo laborent, cum injectis & assumptis simul. *Id. Ibid.*

In alvo astrictâ, deambulent in pavimento. *Senner-tus*; frigido lapide insidentes vel pavimentum calcantes, Diarrhœa corripuntur. *J. Dolans, p. 299.*

In Ano.

Sanguis in *Hæmorrhoidibus* per sanguifugas extractus hoc modo promanare cogatur; sedeat, nempe, super folium aquæ tepidæ, fervidæ, cui vasculum subjiçiat pro sanguinis receptione. *J. Horne Microtechn.*

Ano remedia admoventur, per glandes, fatus, infessus, suffitus; alvo constipati non mingant nisi vesica sit plena, tumque simul irritabitur anus. *Ettmuller. p. 14. T. I. §. 7.*

Sanguinem sistit & dysenteriam sanat, si fæces purulentæ super alumen vitrioli rejiciantur. *Ettmuller. p. 51.*

In Liene.

Dulcia istis damno sunt. (τὰ ὃ γλυκέα βλαβερά.) Sed an quia acescunt, luctamque cient, an quia humorum viscidorum cumulo aliquid adjiciunt, non litem componimus.

Hypochondriacorum alvus semel quotidie respondeat. *Mercurial. p. 7. Consult. 12.*

In Mesenterio.

Equitatio morbis Mesenterii prodest. *Baglivius.*

In Renibus.

In Calculo, & Renibus laxis, globulorum usus prodest. *Baglivius.*

Nephritici non mingant super prunas. *Ettmuller. p. 51.*

Topica lumbis admovenda sunt.

In Utero.

In partu laborioso, coitus usurpetur. *Riverius reform. &c.*

Mensium

Mensium in vetulis fluxus deficiens, venæ sectione, catharsi, aliisque evacuationibus suppletur. *H. Ridley.*

In *Suffocatione Uteri*, evitanda dulcia, acida, frigida, suaveolentia, ira, terror. *J. Waldschmidt. p. 252.*

Ubi fœtus mortuus in utero fuit, pulmones eorum, quumprimum nati sunt, aquæ fundum petunt. *Etmuller. p. 42. T. I.*

Utero remedia per mentrenchyton, suffitus, &c. convehuntur.

Menses non sunt in gravidis, infantibus, vetulis, nuptis, lactantibus, emaciatissimis proritandi.

Menses promovendi non sunt; nisi recens & nuper suppressi, præter certè quam ubi periodus usitata instat.

Remedia conceptum roborantia non exhibenda sunt, nisi emenso secundo conceptionis mense.

Purgantia inter menstruandum, citra urgentiam, evitanda sunt.

Parturientes non somno prius indulgeant, quàm horæ aliquot elapsæ sunt.

Inter puerperium motus, frigus, terrores, ingluviess evitentur.

Fœtus non ante excludatur, quàm postura sit naturalis (z. caput vel pedes se in conspectum dant,) & quàm colliquamentum possiderit.

Carnes, quicquid obstetrices contrà garriunt, non antè comedendæ sunt, quam dies quintus vel septimus elapsus est.

In Hepate.

In Hepate obstructo, succussus, emetica conducunt.

In Vesicâ.

Ischuria à Calculo, insufflando in vesicam, & digitorum ope in anum intrusorum extrudi potest calculus. *Groenvelt. Mayerne.*

In *Delirio*, cimices in urethram intrudantur. *Riolanus.*

Ischuria à quâcunque causâ superabili, per pedum immersionem improvisam in aquam fervidam sanatur. *Etmuller. p. 383.*

Germanus quidam calculum instrumento quodam fregit, quod nulli impertivit. *N. Chesneau, p. 346.*

Injectiones optimè pelluntur in vesicam catheteris ope.

In *Calculo Vesicae*, ubi calculus non potest ullo modo excludi, vomitus, præcipuè in mulieribus, convenit. *Ettmuller. p. 376. Poterius c. 3. cap. 74.*

In Pulmonibus.

In *Pulmonum morbis*, evitemus venerem, iram, aërem austrinum, vespertinum, loca subterranea, templa, flumina. *J. Waldschmidt. de Phthisi.*

Sagittatio pulmonibus & thoraci prodest. *Baglivius.*

In *Pulmonum morbis à laxitate, pituitâ*, vocis exercitatio prodest. *Georg. Baglivius.*

In *Pulmonibus infarctis*, emetica prosunt.

In *Asthmate*, caput sublime sit; exiguum potûs exhibeatur; unicâ vice paululum hauriatur; fugiant cœnam. *Nic. Piso.* Pectus sit nudum, vel leviter tectum, aër ad frigiditatem vergat. *Sennert.* Iracundia evitetur. *Hippoc. Epidem. 6. §. 4. (In Anhelis z.)* Evitentur loca fumo repleta, situs sit erectus, domus in aprico sita sit. *J. Floyer.*

In *Tussi Convulsivâ*, ponatur infans in frumenti receptaculum. *Th. Willis.*

In *Tussi Infantum*, penna vel digitus oleo illita & faucibus intrusa expectorationem provocant. *Ettmuller. p. 637.*

In *Pleuritide rupturâ*, sternutatio, vomitus, loquela intenta, tussitio, volutatio de latere in latus conducunt. *Sennertus, c. 16. l. 2.* Consanguineus noster *Johannes Strother*, Vir qui tam *Polyphemo* staturâ, quam *Atlanti* viribus haud impar forsan erat, perpotationi deditus, in pleuritidem incidit, quæ malè, propter venæ sectionis omissionem, judicata fuit; cùm per annum ferè tussi siccâ, respiratione anhelâ à motu, cruribus œdematosi laborasset, & per totum tempus strenuè cyathis, vino, vel spiritu vini Gallici diffluentibus, incubuisset, tandem famuli ipsius jucunditate, qui heri sui animum, tam morionem quam cybisteres agendo, recreare conatus omnes adhibuit, propter risum vomica disrupta est,

st, pus uberrimè non sine suffocationis discrimine pro-
iliit, &, à methodis alibi inculcandis, in pristinam vale-
udinem ex morbo hoc gravi assurrexit.

Pulmones à frigore tueri, fumigent petum, masticen-
ur volatilia, uvis passulis in spiritu anisi maceratis ve-
cantur. *Ettmuller*, p. 402.

In *Tussi Siccâ*, ab aëre vel potu frigidis, expiratione
compressâ juvatur. *F. Sylvius*. l. 1. c. 23.

In *Phthisi*, tria vitam conservant, legitimus, nempe,
usus lactis, usus traumaticorum, & mutatio aëris. *Ett-
muller*. p. 283.

Medicus nequaquam tussim excitet, sed eam tantum
promoveat. *J. Wallaus Method. medend.* p. 243.

In Pene.

In *Pollutione nocturnâ*, dormitum iturus liget flum
ad collum & virgæ collum strictè; erecto membro
dolor virgæ istum expergefaiet. *Pet. Forest.* l. 26.
obs. 17.

In Corde.

In *Syncope*, 1^o. Nares & os comprimantur; fricetur
os ventriculi & jubetè ut evomant; aspergantur aquâ
rosarum, &c. 2^o. Decubitus supinus, sternutantia, na-
so admovendo panem calidum; vociferatio, concussio,
contorsio digitorum, crinium vulsio, frictio, ligatura,
cucurbitulæ. *N. Piso. Riverius*. Lingua fricetur aquâ
cinnamomi, *Sennertus*. Si à genu flexione, ubi intesti-
na, præ posturâ, arteriam premunt aortam ac motui
circulari ad partes inferiores moras injiciunt; ex quo
fit, ut cor sanguine superfluo redundet, postura mox
mutetur, &c.

In Cute.

In *Scabie retropulsâ*, contagium renovetur per con-
tubernalem scabiosum. *Ettmuller*. urticentur.

Fotus cuti in vesicâ bubulâ semiplenâ admoveantur,
F. Sylvius. l. 1. c. 40.

In *Ulceribus suppressis*, vel *parcè fluentibus*, fontanel-
læ prope locum aperiantur, vesicatoria admoveantur.
Morton. Phthistolog.

In Variolis & Morbillis.

Ad preveniendas variolas, vel morbillos malignos, se-
ca venam umbilicalem, & sinatur sanguis effluere pro
viribus, & postea non tentabitur homo vel puellus va-
riolis nisi salubribus. Nic. Chesneau. J. Riolan. l. 4. c. 5.
De Variolis & Morbillis.

In Mammis.

Lac attrahunt ad Mammæ cucurbitulæ, caniculus
nondum dentatus. Ettmullerus.

In Idiosyncrasia.

Vini odium insert, rana viridis in eo infusa inquit
Gesner. l. 4. Histor. Animal. Aquatic. p. 953.

In Peste.

Bombardarum explosiones frequentes, utiles sunt;
Joh. Dolens, p. 549. Saliva non deglutienda est. Id.
p. 558.

De Oeconomia ægotantium.

Sudores provocantur, si corio insuantur ægroti u-
trinque aperto, & ad summitatem infundatur aqua ca-
lida; item folli, in quo globulus ignitus figatur, exuf-
fla, sudores invitantur. Joh. Horne Microtechn. p. 164.

In imbecillitate à febre &c. inductâ, nutriantur ex cy-
atho cum siphone annexâ, mingant ex matula vitreâ.
D. G.

In Longis Morbis, terram mutare confert. Hippoc.
Epidem. l. 6. Sect. 5. §. 19.

Si mulier elaterium aut cucumerem sylvestrem co-
mederit, etiam puer purgatur. Hippoc. l. Epid. 6. Sect. 5.
§. 33.

Increfcentes morbos, coitus exasperat. Hippoc. l. E-
pid. 6. Sect. 5. §. 25.

Articulis & Carnibus labor confert; visceribus verò,
cibus & somnus; Animæ, deambulatio; cogitatio, Ho-
minibus. Hippoc. l. Epid. 6. Sect. 5. §. 9.

Is, qui non bibunt, vel ne, vix quidem, brevis spira-
tio plurimum confert. Hippoc. l. Epid. 2. Sect. 3.

In difficultate clysterem injiciendi in hæmorrhoidibus dolentibus vel ulceratis, obvolvatur fistula pulli intestinulo. River. Reformat.

De Partium Consensu.

Pedes cum alvo consentiunt; quia deambulatio in pavimento laxat eam; mammæ cum utero; quia titillatis uterus prurit; caput cum utero, quia dolor frigidus capitis exinde sæpè nascitur. *Ettmuller. T. I. p. 8. §. 24.*

De Methodo Remedia ad partes convehendi.

Suffituum ope, naso, utero, ori, sinui frontali, pulmonibus, uvulæ, auribus, ano advehuntur.

Injectionum ope, naso, utero, ori, peni, ano, auribus.

Turundarum ope, naso, ano; *Candelarum* ope, peni.

Pulverum insufflatorum ope, naso, ori.

Epithemata, cordi, fronti, nuchæ, testibus, mammis admota, hæmorrhagiæ profunt.

Pessorum ope, uteri vaginæ; *Nastalium* vero ope, si virgines sint.

In suppressâ urinâ, catheter, candela cerea, haustus largiores profunt si sit à *Calculo Renum*; prorum caput sit aliquandiu, ubi sit à *Calculo Vesicæ*; ubi autem ab inflammatione & ischuria sit vera, puncturâ in perinæo & cannulâ educitur urina. *Le Crerc.*

De Mortuis Renunciatio.

An submersi sunt, & an vivi in aquas precipitabantur; tum tota alvus aquâ intumescit; à naribus mucosa, ex ore spumosa defluunt; extremi digiti excoriari censentur. *A. Schmitz.*

An infans suffocatus est, antea perbellè se habuit; os, nares, spumâ madent; pulmones secti spumosi sunt. *A. Schmitz.*

An quis vulneratus, mortuus an vivus fuit, quando vulnera recepit; si vivus, labra vulneris rubra, cruenta, tumida & in ambitu livida sunt. *A. Schmitz.*

An mortui fulmine icti fuerunt; sulphureum spirat corpus odorem; canes illud tangere recusant; ossa sunt contrita sub parte integrâ & vulneratâ; vulnus est

nigrum; in partem iſtam cadit corpus; ſi vigilans iſtus fuit, oculi clauduntur; ſi verò dormiens, aperiuntur.
A. Schmitz. Bohnius.

*Num infans recens enixus mortuus fuit in utero, an poſt partum occiſus; ſi natus mortuus ſit, pulmones e-
 xecti & in aquam immerſi ad imum ſubſident; ſi oc-
 ciſus, emergunt.*

Quamquam axiomatum horum ætiologia in promptu ſit, ſed lectoribus noſtris labore nimio tædium non afferemus; quocirca hic plura deſint.

A P P E N D I X.



Tiſtutum hoc ſit omnibus numeris abſolutum, nobis animus eſt, emetica, cathartica enemata & ſuppoſitoria in parte hujus libri primâ omiſſa hic ſubjungere: Quocirca emeticis, &c. adjiciantur ſequentia.

EMETICA.

Mitiora.

Ex Pharmacopœiâ Londinenſi. Acetum Scillitic. Aq. Jugland compoſit. Aq. Nicotian. Mel Scillitic. Oxy-
 mel. Scillitic. Mel Scillitic. comp. Vitriol. alb.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Decoct. Digital. Pilulæ Vomitoriæ Div. v. Serum Aluminatum.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. v. p. 79, 80.

Fortiora.

Ex Pharmacopœiâ Londinenſi. Croc. Metallor. Merc. Vitæ, Oleum Nicotianæ, Turpethum Minerale. Vinum Antimoniale. Vinum Benedictum.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Antimon. refuscitat. A-
pozem. potenter expectorans cochl. iij. vij. Aq. For-
nicar. cochl. j. Decoct. Reguli. Extract. Petic. ðij.
Magister. Git. gr. x. ʒß. Merc. præcip. per se gr. iij.
vj. Merc. præcip. rub. Oxyſacchar. Emetic. ʒj. &
ultra. Panacea aurea. Pilul. Antimonial. ʒß. ʒj. Sp.
Tabac. ʒj. iij. Sulph. Antimon. gr. v. x. Sulph. An-
im. combuſtible, gr. v. x. Tabul. Emetic. gr. xvj. lx.
Tartar. Antimon. ʒj. ʒß. Tart. Emetic. gr. iij. Tin-
tur. Antimon, Emetic. gtt. x.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri, v. Edition. quintæ p. 80.
31. ubi jubet tirones, ut adeò famæ ſuæ conſulant, ut
fortiora jugiter evitent Emetica.

CATHARTICA.

Mitiora.

Ex Pharmacopœiâ Londinenſi. Caſſia extra ſine ſennâ.
Caſſia extract. cum Senn. Catholicon. Decoct. Amar.
Decoct. Senn. Gereon. Diacaſſia cum Mannâ. Dia-
prun. Laxativ. Diaprun. Solutiv. Elect. de Citro So-
lutiv. Elect. Lenitiv. Elect. è Succ. Roſar. Elix.
Prop. Hier. cum Agaric. Hier. Picra ſimp. Mel
Roſar. Solutiv. Pilul. de Aloe lotâ, Aloephang. de
Cret. Palmarii, Diambæ, de Eupator. maj. Hieræ cum
Agaric. Imperiales. Macri. Maſtichin. Ruſſi. Sto-
machic. Stomachic. cum Gummi. de Succino. Tartar.
ex Tribus. Vaticanæ. Pulv. Senn. comp. maj. & min.
Syr. de Cichor. cum Rheo de Rhabarb. Roſac. Solu-
tiv. Solutiv. cum agaric. Syr. Roſ. Sol. cum Senn.
Troch. de Rhabarb.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Dec. Amar. ʒiv. Dec.
Polychreſt. ʒiv. viii. Dec. ad Strum. ʒiij. iv. Inſuſ.
Benedict. ʒiv. vj. Mixtur. Anticolic. ʒiijß. Nit. Ca-
thart. ʒj. ʒß. Pil. de Ammon. Magiſt. ʒj. ʒß. P. Angel.
ʒß. P. Marocoſtin. ʒj. ʒj. P. Pavii. n°. x. xx. P. Tar-
tar. Bontii. ʒß ʒß. Potio alb. Ptiſan. Cathart. ʒviij.
Sal. Mart. Cathart. gr. xii. Tinct. Aſthmatic. coch. ij.

h. f. iij. m. Tinct. Cathart. Ridgleii. cochl. ij. iij. iv. Tinct. Scorbut. ʒij. ij. Vin. Arthrit. purg. ʒiv.

Bals. Tartar. ʒβ. Dec. Rhabarb. ʒiv. Elix. Salut. coch. j. ij. h. f. & iij. iv. m. Ol. Aloetic. *externè umbilico illinatur.* Passul. Laxativ. Sacch. Persicor. Sal. Polychrest. ʒj. iij. Tart. Laxativ. gr. xv. ʒβ. Tinct. Hier. ʒj. iv. Tinct. Propriet. v. Elix. Prop. Tinct. Rhabarb. cochl. ij. iij. iv. Tinct. Stomachic. cochl. j. ij. iij. ante pastum, ʒiij. mane.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Bol. de Cassiâ. Bol. Luteus. Cerevis. purg. Itj. Cerevis. scorb. cal. Dec. Agaric. Dec. Cachect. ʒv. Decoct. Copragog. Dec. Cathart. Dec. Cort. Jugland. purg. Dec. purg. com. Dec. Sanct. purg. Dec. Tart. purg. Elect. Corinth. El. Laxans. El. de Mannâ. E. de Rhab. E. Tamarind. E. Tartar. Infus. Purg. Inf. Rhab. c. Mistur. Tereb. Ol. Rhabarb. Passul. Antihelmin. P. Laxativ. P. Purg. Pil. Ammon. Stom. P. Benedict. P. Cachect. P. Cephalic. P. Chal. purg. P. de Guaia-co. P. de Rheo. P. Sanctæ. P. Stom. purg. Potio de Ammon. P. Lenitiv. P. Purg. Nephrit. P. de Rhabarb. Pulv. Laxans. P. Rhab. Serum Deoppil. Tinct. Purg. Cephal. T. Rhab. Vin. Amar. Cathart. Vin. Cathartic. *Quantum ad doses authorem consulte.*

Fortiora.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Benedicta Laxativa. Caryocostinum. Confect. Hamech. Decoct. Epithymi. Diacartham. Diagrydium. Diaphœnic. Diaturb. cum Rhab. Elaterium. Elect. Amar. minus. Elect. Magistral. majus. Ellebor. Nig. pp. Esul. pp. Fæcul. Ari Bryon. Irid. Hier. Diacolocynthid. Hier. Logad. Lap. Lazul. Laureol. Mel Elleborat. Merc. sublim. dulc. Mezereon. Pil. de Agaric. Aggregativ. Aureæ. coch. maj. coch. min. ex duobus Foetidæ. de Gutt. Gamand. de Hermodact. de Lap. Lazuli Mechoacann. de opoponac. Rudii. sine quibus. Pulvis Diasennæ. Hollandicus. Warwicens. Resin. Jalap. Syr. de Pom. Magistral. de Spin. Cervin. (Rhamno.) Syr. Rosac. cum Ellebor. Troch. Alhand. Tryphera solutiva. Ung. de Anthanit.

Ex

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Cathart. Cæsar. ℥j. ij. Cerevis. Cataplor. ℥j. Cerevis. Vernal. Diatartar. ℥j. iv. Emuls. Cathartic. Ext. Alhand. gr. v. xv. Ext. Drastrict. ℥℥. ℥℥. Ext. Fell. ℥j. ℥℥. Ext. Melampod. ℥℥j. Lac Scammon. ℥℥℥. Mag. Tartar. ℥℥. j. Merc. præc. alb. Merc. vitæ purg. gr. vj. xij. Panacea Cathartic. gr. v. viii. &c. Pil. Balsamic. P. Crapular. ℥j. P. Hydropic. ℥ij. P. Melanogog. ℥℥ j. P. de Sagapen. ℥℥. P. Vatican. ℥j. ℥℥. Potio Hydropic. ℥vj. ℥j. Pulv. Arthritic. Tartar. ℥j. ℥j. Pulv. Asthmatic. ℥j. Pulv. Basilic. ℥j. ℥j. Pulv. Cornachin. ℥℥. ℥ij. P. Coronat. Div. P. Hermodact. comp. ℥j. Scammon. Cydon. ℥j. ℥j. gr. v. Scam. Limon. & Scam. Rosat. ℥j. Syr. Benedict. cochl. j. ij. Syr. de Scammon. ℥℥. ℥i℥. Tab. Cathartic. Tinct. Antim. purg. gr. ix. x. Tinct. Aurea ℥ij. ℥i℥. Vin. Hydropic. ℥iij. Ung. ad Lumbricos.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Bol. purg. comm. Cerevis. purg. Hydrop. Decoct. Cort. Jugland. purg. Elect. Hydrop. Elect. purg. Elix. Cathart. Emuls. Cathart. Essent. Citrin. Haust. è Diagryd. H. Hydragog. Oxymel de Peto. Pil. Cathol. P. Colic. P. Hydragog. P. Luteæ. P. de Merc. d. P. de Scammon. Potio purg. Hydrop. P. Sancta. Potio Warwicens. Pulv. Cathartic. Pulv. Catholic. Pulv. Panchymagog. Syr. Diagryd. Tinct. Purg. Vin. Hydrop. ij. Quod ad doses authorem consulatis, oportet.

E N E M A T A.

Mitiora.

Ex Pharmacopœiâ Londinensi. Nulla.

Ex Pharmacopœiâ Bateanâ. Enema Urinosum.

Ex Pharmacopœiâ Fulleri. Enema Amar. ℥vi℥. Enema Commun. ℥j. Enem. Emolliens ℥j. Enem. pro infantibus ℥iv. Enem. Laxans ℥j.

*Fortiora.**Ex Pharmacopœiâ Londinensi.* Nulla.*Ex Pharmacopœiâ Bateanâ.* Enema Colicum. Enema Terebinthinatum.*Ex Pharmacopœiâ Fulleri.* Enem. Apoplectic. ℥j. Enem. Apoplectic. ℥j. Enem. Oleosum Amarum. Enem. Purg. ℥j. Enem. Terebinthinat.*SUPPOSITORIA.**Mitiora.**Ex Pharmacopœiâ Londinensi.* Nulla.*Ex Pharmacopœiâ Bateanâ.* Suppositoria Aluminosa.*Ex Pharmacopœiâ Fulleri.* Suppositoria.*Fortiora.**Ex Pharmacepœiâ Londinensi.* Nulla.*Ex Pharmacopœiâ Bateanâ.* Nulla.*Ex Pharmacopœiâ Fulleri.* Nulla.

Tandem, lectores benevoli, aliquando opusculum hocce exegimus; erroribus Typographicis veniam date: Ecquid incomptè protulimus? cæcuite: Mentis nostræ lapsus & vitia æquo fertote animo: In medendi scientiâ pergite: Atque de labore nostro vobis ex imo pectore & animo gratulamur.

F I N I S.



Index CAPITUM.

PARS PRIMA.

P <i>Rocemium.</i>		Cap. X. <i>Scabra, Sinapismi,</i>	
Cap. I. <i>Emetica.</i>	Pag. 1	<i>Psilothra, Detersiva, Ve-</i>	
Cap. II. <i>Cathar-</i>		<i>sicatoria, Caustica,</i>	169
<i>rica,</i>	24	Cap. XI. <i>De Aquis Pur-</i>	
Cap. III. <i>Enemata,</i>	83	<i>gantibus,</i>	182
Cap. IV. <i>Glandes,</i>	100	Cap. XII. <i>De Vena Sectione,</i>	
Cap. V. <i>Diaphoretica,</i>	104	<i>Arteriotomia, Sanguisug-</i>	
Cap. VI. <i>Diuretica,</i>	125	<i>gis, Cucurbitulis, Transfu-</i>	
Cap. VII. <i>Masticatoria,</i>	149	<i>sione,</i>	186
Cap. VIII. <i>Errhina,</i>	160	Cap. XIII. <i>De Paracentesi,</i>	
Cap. IX. <i>Pessaria,</i>	168	<i>Abcessuum Apertione, Se-</i>	
		<i>taceis, Fontanellis,</i>	196

Index CAPITUM.


PARS ALTERA.

P <i>Rocemium,</i>	201	Art. II. <i>De Lacte,</i>	425
Cap. I. <i>Restaurantia,</i>	207	Art. III. <i>De Aquis Chaly-</i>	
Cap. II. <i>Attenuantia,</i>	221	<i>beatis,</i>	426.
Cap. III. <i>Refrigerantia, In-</i>		Sect. 1. <i>De Acidulis,</i>	ibid.
<i>crassantia,</i>	297	Sect. 2. <i>De Aquis Atra-</i>	
Cap. IV. <i>Media,</i>	318	<i>mentosis,</i>	430
Cap. V. <i>Ramosa, Flexilia,</i>		Art. IV. <i>De Thermis,</i>	430
<i>molliā,</i>	321	Art. V. <i>De Psychrolusia,</i>	
Cap. VI. <i>Remedia composi-</i>			433
<i>ta, mixta,</i>	341	Art. VI. <i>De Infusione,</i>	
ACCESSORIUM.			434
Art. I. <i>De Opiatis,</i>	409	Art. VII. <i>Axiomata de mo-</i>	
		<i>nitibus localibus,</i>	435
		Appendix,	446
		Index	

INDEX Rerum,

IN PARTE PRIMA.

A.

	Bortus, Pag. 134,
	138
	Abscessus, 199
	Critici, 90
	Sinusfrontalis, 162
	Abscessuum apertio, 199
	Acidum, 117
	Alvi obstructio, 17, 18,
	36
	Anasarca, 141
	Angina notha, 39, 160
	Vera, 160, 162, 167
	Anorexia, 34
	Antimonialia, 20
	Anus fissa, 102
	Aphtha, 162
	Apoplexia, 114
	Aqua medicata, purgantes,
	81, 82, 182, 183, 184,
	185
	Arteriotomia, 192, 193
	Arthritis, 12, 34, 130,
	134
	Anomala, 116, 173
	Ascarides, 102
	Ascites, 7, 8, 52, 53, 61,
	66, 67, 113
	Asthma, 5, 23, 33, 37,
	47, 77, 114, 119, 160
	Astrictio, 50, 89,
	102, 103
	Atrophia, 112

Attenuantia, Pag. 27, 28

B.

Biliofi,	113
Bubones,	177, 180

C.

Cachexia,	68
Cecitas,	157, 177, 179
Calculus,	82, 89, 97,
	129, 137, 144
Callositas,	173, 180
Cardialgia,	122
Caries,	180
Catarrhi,	51
Ferini,	159
Suffocativi,	19
Cathartica, Cautela de eis,	78
an electiva,	62
in febre lenia,	46
Dosis quando minor,	51,
	52
Dosis qua,	81
Castrata,	51
Promota,	51, 52
male prescripta,	52
nutrici quando danda,	53
Regimen cum eis,	53, 55
fortiora mitioribus minus	
efficacia,	54
Quando danda,	55,
	56,

I N D E X.

56, 59, 60, 62, 63

<i>Caustica noxia,</i>	181
<i>quomodo admovenda,</i>	182
<i>Cephalalgia biliosa,</i>	10
<i>Cholera,</i>	9
<i>Circulationem promovent,</i>	3
<i>Colica</i>	98, 120
<i>diuturna,</i>	7
<i>Hysterica,</i>	120
<i>Inflammatoria,</i>	45
<i>Consuetudo in Catharsi,</i>	28
<i>Contraindicantia,</i>	46
<i>Costa fracta,</i>	169
<i>Convulsiones,</i>	38, 180
<i>Coryza,</i>	159
<i>Crisis,</i>	121
<i>Catachrestica,</i>	132
<i>Cucurbitula,</i>	194, 195

D.

<i>Decolores,</i>	69
<i>Deglutitio difficilis,</i>	18
<i>Deliquia,</i>	158
<i>Deliria,</i>	9. 158
<i>Dentifricia,</i>	172
<i>Diabetes,</i>	134
<i>Diaphoretica, Cautela de eis,</i>	
<i>III, III2, III3, III4, III5</i>	
<i>an electiva,</i>	117
<i>quibus prosunt,</i>	ib.
<i>quomodo agunt,</i>	107,
<i>108, 110, 122, 157</i>	
<i>Diarrhoea diuturna,</i>	44
<i>Diuretica, quomodo agunt,</i>	
	144
<i>que sunt,</i>	128
<i>quibus prosunt,</i>	128
<i>quando danda,</i>	132, 135,
	136
<i>externa,</i>	136
<i>Dolores Capitis,</i>	129, 159,
	163

infra Diaphragma, Pag.

	79
<i>externi,</i>	176
<i>Hamorrhoidum,</i>	98
<i>Intestinorum,</i>	88
<i>Ischiadici,</i>	89, 180
<i>Nephritici,</i>	45, 162
<i>Rodentes,</i>	110
<i>Scapularum,</i>	157
<i>Veneriei,</i>	154, 169
<i>Ventriculi,</i>	92
<i>Dysenteria,</i>	36, 37, 93, 133
<i>Dysuria,</i>	134

E.

<i>Emaciati,</i>	142
<i>Emetica, eis 2. assueti,</i>	11
<i>quando indicantur,</i>	13, 14
<i>quando non</i>	15, 21
<i>quando non conducunt,</i>	
<i>quid agendum</i>	21
<i>Tempus exhibendi</i>	ib.
<i>parcius data quid agunt,</i>	ib.
<i>non respondentia voto,</i>	
<i>quid agendum,</i>	21, 52
<i>Qui illa tolerant</i>	21
<i>Diuretica sunt</i>	22
<i>Emplastrum Epispasticum</i>	
<i>perpetuum,</i>	178
<i>Empyema,</i>	149, 198
<i>Enemata, Cautela de eis,</i>	
<i>88, 89, 94, 95. 96, 99</i>	
<i>febrifuga,</i>	96
<i>nutrientia,</i>	95
<i>Epilepsia,</i>	71, 89, 159, 162
<i>Errhina,</i>	162, 163
<i>Eruptiones,</i>	29, 77, 82, 111
<i>Evacuationes quando indi-</i>	
<i>cantur,</i>	32, 40, 41
<i>gemina,</i>	79

F. Fa-

INDEX.

F.	
<i>Famuli agroti,</i>	Pag. 70
<i>Faces adhaerentes,</i>	94
<i>duriores,</i>	90
<i>Febres,</i>	88, 93, III, 129, 155
<i>ardentes,</i>	133, 177
<i>castrenses,</i>	112
<i>catarrhales,</i>	166
<i>Hæmorrhagica,</i>	177
<i>Intermittentes,</i>	5, 30, 48, 78
<i>Lymphatica,</i>	162
<i>maligna,</i>	39, 44, 119
<i>Syncopales,</i>	11, 13, 38, 72
<i>Fluor albus,</i>	140
<i>Fluxus,</i>	II
<i>Hepaticus,</i>	III, 141
<i>Sanguinis,</i>	130
<i>Fœtus mortuus,</i>	162
<i>Fontanella,</i>	200
<i>Fungi Dentium,</i>	172

G.	
<i>Gangrena,</i>	210
<i>Glandes quid valent,</i>	102, 103
<i>Glandularum Tumor inter salivandum,</i>	158
<i>Gonorrhœa virulenta,</i>	146, 147, 148
<i>Graciles,</i>	19
<i>Gravida quomodo regenda,</i>	19, 103, 154, 162
<i>Grumi,</i>	124

H.	
<i>Hæmorrhagia,</i>	76, 113, 122, 162, 163, 166, 181

<i>Hæmoptoë,</i>	Pag. 82, 98, 159
<i>Hæmorrhoides,</i>	92
<i>Hæmorrhoidum fluxus,</i>	102, 103
<i>Suppressio,</i>	47
<i>Hæctica,</i>	19, 113, 130, 131, 169
<i>Hemiplegia,</i>	152
<i>Hernia Intestinalis,</i>	16, 47, 71, 92, 162, 167
<i>Hirudines,</i>	193, 194
<i>Humores variegati à Catharticiis,</i>	55
<i>Hydrocephalus,</i>	130
<i>Hydrops,</i>	38, 48, 162
<i>Pectoris,</i>	71
<i>Hypersarcosis,</i>	173
<i>Hypochondriaca,</i>	87, 109
<i>Hysterica,</i>	17, 43, 87, 109, 144

I.	
<i>Idiosyncrasia,</i>	48
<i>Iliaca,</i>	94
<i>Imbecilles quid postulant,</i>	41, 94
<i>Incubus,</i>	76
<i>Infantuli,</i>	69, 100, 144
<i>convulsivi,</i>	57
<i>Inflammatio viarum urinarum,</i>	132
<i>vesicæ,</i>	176
<i>viscerum,</i>	98
<i>Intestina aquâ onerata,</i>	87
<i>Introductio,</i>	2, 3
<i>Inutilia rejicienda,</i>	58

L.	
<i>Lapis Lazuli,</i>	55
<i>Laxantia,</i>	50
<i>Lentor,</i>	122, 131
<i>Lienteria,</i>	4
	<i>Lingue</i>

INDEX.

Lingua Paralysis, 15
Lochia, 42, 118
Lues, 110, 151, 159
Lues & Scorbutus quomodo differunt, 33
Lumborum dolor, 57
Lumbrii, 77, 90, 95

M.

Macilenti, 43, 69, 160
Mania, 154
Masticatoria, 159, 160
Melancholia, 39, 129
Memoria perdita, 123
immodici, 44, 132
Menses decolores, 31
Suppressi, 34, 88, 109, 138
Mercurialium usus, 64, 153
Mercurius dulcis, 65
precip. alb. 65
Mesenterii obstructio; 39
Mola, 100
Morbi annui, 64

catarrhales, 151
cephalici, 88, 97
chronici, 4, 115
contumaces, 64
convulsiui, 120
hypochondriaci, 6
hysterici, 119
inflammatorii, 39
nephritici, 132
oculorum, 18
pituitosi, 108, 161, 163, 176
pulmonum, 162
purulenti, 70
renum inflammatorii & ulcerosi, 137
serosi, 108
soporosi, 4, 28, 99, 118, 161, 163

Morborum initia, 49
omnium causa interna, 165
præcisio, 87
Morsus venenatus, 109

N.

Nauta difficulter purgantur, 55, 59
Nodi venerei, 154, 181

O.

Obesi, 79
Obstructiones, 78
hepatis, 32, 45, 143
Oculorum excrescentia, 172
Odontalgia, 159
Odoratus abolitus, 159
Ophthalmia, 51, 162, 166
sicca, 162
Opiata cum Catharticis, 50
Ozena, 167

P.

Paracentesis, 196, 197, 198
Paralysis, 110, 112
lingue, 159
Partus difficilis, 10, 90, 162
Partum promovent, 165
Pectus male formatum, 19
Peripneumonia, 167
Pessaria quid agunt, 169
quomodo, ib.
Pestis, 80
Phthisis, 19, 133, 159
Phrenitis, 174
Pilos auferunt, 173
Plenitudo evacuanda, 27
humorum, 131
Pleuritis, 76, 79
ruptura, 3, 14

Pneumo-

I N D E X.

<i>Pneumo-Pleuritis</i> ,	Page 43
<i>Polypus</i> ,	162
<i>Pylori</i> ,	17
<i>Prægnantes</i> ,	90
<i>Præparantia quæ</i> ,	139
<i>catharticis præmittantur</i> ,	46
<i>Puerpera</i> ,	80
<i>Pulmones laxi, teneri</i> ,	16
<i>Pulsus intermittentes in</i>	
<i>principio morborum</i> ,	68
<i>Purgandi occasio</i> ,	30
<i>Pus in Bronchiis</i> ,	12
<i>impedientia</i> ,	ib.
<i>Pustule variolarum anomala</i> ,	118

Q.

<i>Quartana</i> ,	153
-------------------	-----

R.

<i>Ranula</i> ,	159
<i>Resine purgantes quid faciunt</i> ,	63
<i>Rheumatismus</i> ,	112
<i>Robusti quid ferunt</i> ,	30

S.

<i>Salia evacuantia</i> ,	32
<i>Volatilia quando inoluerunt</i> ,	123, 124
<i>Salivatio quibus obest</i> ,	155
<i>quomodo fit</i> ,	156, 157,
	159
<i>quoties instituenda</i> ,	158
<i>quid interim agendum</i> ,	158, 159
<i>Scabies</i> ,	154
<i>Scorbutus</i> ,	130, 142, 143,
	159
<i>Scirrhus pylori</i> ,	17

<i>Secretio ventralis</i> ,	Page 86
<i>Secundina retenta</i> ,	6, 100,
	162
<i>Senes</i> ,	69
<i>Setacea</i> ,	200
<i>Sinapismi</i> ,	173
<i>Singultus</i> ,	45, 163
<i>Spasmi</i> ,	6
<i>v. Convuls. Epileps.</i>	
<i>Spirituum inopia</i> ,	17, 116
<i>Stagnatio</i> ,	109
<i>Stamina tenera</i> ,	47
<i>Stimuli</i> ,	176
<i>Succus depravatus</i> ,	70
<i>Sudores nocturni</i> ,	29
<i>Symptomatici</i> ,	117
<i>Surditas</i> ,	159, 166

T.

<i>Temperamenta pingua</i> ,	11
<i>Tenesmus</i> ,	47
<i>Testacea utilia</i> ,	121
<i>Thermarum potatio</i> ,	72, 73,
	74, 75, 76
<i>Transfusio</i> ,	195
<i>Tremor</i> ,	155
<i>Tussis humida</i> ,	175
<i>Sicca</i> ,	44
<i>vehemens ab acri in ventriculo</i> ,	11

V.

<i>V^e s^o</i>	186 ad 192
<i>Venena sumpta</i> ,	3
<i>Ventriculus aquâ plenus</i> ,	4
<i>humorum plenus</i> ,	111
<i>Verruce</i> ,	181
<i>Vertigo</i> ,	37, 162
<i>Vesicatoria</i> ,	177, 178
<i>Virium prostratio</i> ,	68
<i>Ulcera viscerum</i> ,	42
	<i>viarum</i>

INDEX.

- Ructus*, Pag. 248, 250
Ruga abdominis à partu, 389
Rugitus, 375
Ruptura vulva, 300, 303

S.
Sabulum, 387
Salia telluris perquirenda, 262
Sal acido-muriaticum, 380, 383
Salivatio in variolis suppressa, 381
Salivationem impediencia, 303
Sanantia, 374, 375
Sanguinis fluxui nocent, 432
Sanguis biliosus, 302
crassus, 242, 243, 250
falsus, 246
vapidus, *ibid*
Sarcocoele, 344
Sarcotica, 357
Scabies, 222, 238, 241, 243, 302, 319, 349, 365, 368, 369
venerea, 349
Scirrhus, 323, 431
hepatis, 324, 345, 346
Lienis, 324
Scorbutus, 363, 367, 371, 372, 380, 427
acidus, 240
calidus, 302, 319, 365, 368, 376, 380
frigidus, 234 ad 249, 260, 292, 431
Scorzonera, 374
Scrophula, 222, 235, 241, 242, 243, 245, 319, 323, 365, 369
Scroti tumor aqueus, 233
Secundina retenta, 234, 248, 292
Sedes moventia, 236
Seminis defectus, 208, 209
Serpigo, 238, 349
Siccantia, 373, 375
Singultus, 224, 246, 349, 413
Sitis, 302, 303, 304, 305, 319, 327, 328, 329, 336, 338, 364, 365, 367, 377, 381, 387
Somnifera, 410
Spasmus, 237, 367, 395
Spasmi epigastrii, 351
Spirandi difficultas, 385
Spiritus deprimunt, 339
reficiunt, 210, 211, 212, 239, 240, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 283, 319
Spirituum Tumultus, 372, 375, 413
Splanchnica, 243
Splenitica, 239, 240, 241, 243, 365
Sputum sanguinis, 385
Sputi suppressio, 353
Steatoma, 225, &c.
Sterilitas, 224, 240, 241, 282, 283, 431
Stillicidium, 382
Stomachica, 235, 237, 238, 239, 241, 243, 245, 246, 247, 249, 261, 288
Stranguria, 321, 336
Strume, 365
Stupor, 233, 235, 238
St *Dentium*

INDEX.

Dentium, Pag. 227, 228
Styptica, 387, 398
Sudores matutini, 383
nocturni, 241, 300, 328, 394
Sudorifera, 412
Suffocatio uteri, 235, 236
asthmatica, 244
Suffusio, 237, 364 v. *Caracta*.
Suppurantia, 322, 323, 324, 325, 327
Surditas, 225, 227, 237, 239, 241, 246, 247, 249
Sydenhamij Sententia de passione hysterica, 274
Syncope, 210 ad 212, 233, 234, 248
Synovia, 300

T.

Tabes, 303, 327, 328
Talpa, 229
Tartarus pulmonum ac renum, 234
uspian, 237, 245
Tenesmus, 323
Tentigo venerea, ibid
Tenuantia, 373
Terebinthina cocta, 311
Tertiana, 235, 239, 302, 303, 364
Testacea, 320
Theriaca quando evitanda, 371
Therma earum usus, noxe, 430, &c.
Thoracica calida, 377
Tinea, 238, 349, 367
Tinea vestium, 238
Tinnitus, 227, 246, 247

Tormina, 236, 245, 309, 310, 368, 387
infantum, 230, 293, 379
à partu, 347, 384
ventriculi, 238, 327, 368, 373
Torpor, 242, 244
Traumatica, 240
Tremor, 240, 319
cordis, 238, 245, 249
Senilis, 228
Tubercula pulmonum, 243, 319, 372, 378, 385, 386
scrophulosa, 236, 247, 248
Tumores, 235, 250, 257, 364
abdominis, 250
aquei, 227
duri, 230, 235, 244, 257, 366
genuum, tibiæ, 233
molles, 384
testium, 242
Tussis, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 245, 246, 364, 367, 369, 375, 390
acris, 303, 304, 305, 317, 323, 327, 376, 383, 386, 388, 389, 390, 391, 412, 416
asthmatica, 383
catarrhalis, 376, 413
chronica, 247
contumax, 222, 230, 249, 370
excorians, 385, 391
gutturalis, 385
Infantum, 222, 245, 303, 391
irritans, 328, 339, 382 v. *acris mixta*,

INDEX.

<i>viarum urine</i> , Page 132	<i>tër</i> , Page 13
<i>Ulcera</i> , 31, 131, 151, 173, 174	<i>Vomitio</i> , 9, 19, 87, 95
<i>faucium</i> , 159	<i>critica</i> , 10
<i>gingivarum</i> , 154	<i>quomodo promovetur</i> , 20
<i>nasi</i> , 162	<i>sanguinis</i> , 17
<i>palati</i> , 155	<i>symptomatica</i> , 46
<i>pulmonum</i> , 149	<i>Urina ardor</i> , 176
<i>sinus frontalis</i> , 164	<i>Incontinentia</i> , ibid
<i>Vesica</i> , 176	<i>Utero gerentes</i> , 16, 40
<i>Vomentes facile vel difficul-</i>	<i>Uvula laxata</i> , 159

INDEX, Partis alterius.

A.	<i>Agglutinantia</i> , 374
A <i>Bortum pravavent</i> , 233, 298, 303, 304, 305, 308, 309, 314, 327, 365, 366, 369, 431	<i>Agrypnia</i> , ibid
<i>Acerba</i> , 306	<i>Alexipharmaca</i> , 239, 241, 247, 319, 374, 388
<i>Achores</i> , 349	<i>Algor</i> , 382
<i>Acidula</i> , 426 ad 430	<i>Dentium</i> , 228
<i>ex quibus fiunt</i> , 426	<i>Alopecia</i> , 225, 237, 238, 367
<i>conficiendi modus</i> , 428	<i>Alterantia</i> , 295
<i>potandi methodus</i> , 429	<i>Alteratio</i> , 205, 206
<i>Acidum</i> , 233, 234, 238, 240, 241, 242, 244, 304, 305, 319, 321, 368, 371, 374, 375, 379	<i>Alvum constipant</i> , 431
<i>Acre</i> , 328, 332, 340, 374, 375, 376, 389	<i>Amara</i> , 250
<i>Adhesio</i> , 340, 341	<i>Ambustio</i> , 223, 234, 297, 302, 325, 327, 366, 369
<i>Ægrotudo</i> , 375. v. <i>Languor</i>	<i>Anasarca</i> , 240, 242, 246, 287, 296, 373, 378, 427, 430
<i>Æstus febrilis</i> , 302, 303, 304, 305, 329, 339	<i>Aneurisma</i> , 298, 307
<i>Affectus catarrhales</i> , 373	<i>Angina</i> , 222, 243, 249, 298, 328, 357, 366, 370, 377, 378
<i>Affectio hypochondriaca, hysterica</i> , 225	<i>rupta</i> , 298
<i>Nervina frigida</i> , 234, 296	<i>Anhelitus foetidus</i> , 249
	<i>Ani dolor à Dysenteria</i> , 346
	R r
	proxi-

I N D E X.

- procidentia*, Page 388
v. Procidentia. 235, 236, 237, 241, 355, 376
- Anodyna*, 234, 235, 236, 238, 239, 327, 328, 421, 422
- Anorexia*, 214, 222, 223, 235, 244, 259, 260, 263, 287, 302, 366, 376, 377, 387, 426, 430
- biliosa*, 388
- Anum irritant*, 302
- Apepsia*, 226, 242, 244
- Aperientia*, 238, 239, 240, 246
- Aphrodisiaca*, 207, &c.
- Aptha*, 226, 298, 303, 307, 325, 328, 350, 365, 366, 368, 376
- Apophlegmatismi*, 246
- Apoplexia*, 226, 234, 237, 239, 241, 242, 247, 249, 254, 319
- Apostema*, 234
- Appendix*, 446
- Appetitui nocent*, 336
- Aqua Calcis quibus prodest*, 373
- Aqueorum vires*, 307
- Ardor ventriculi*, 319
- Arenule*, 239, 242, 245, 246, 364, 371, 372, 373, 379, 387, 427
- Aridura*, 394
- Arthritis*, 288, 369, 373, 378, 380, 382, 389, 431
- anomala*, 221
- frigida*, 226, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 242, 243, 245, 248, 319
- waga*, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 355, 376
- Arthritidi nocent*, 430
- Ascarides*, 245
- Asthma*, 223, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 244, 245, 247, 249, 271, 284, 291, 298, 302, 327, 340, 352, 364, 365, 367, 369, 382, 383, 387
- paroxysmus ejus*, 392
- hystericum, siccum*, 227, 266, 352, 412, 416
- stomachale*, 386
- à spirituum inopia & variolis declinantibus*, 285
- Asthmati nocent*, 428, 430, 431
- Astrictio*, 234, 379
- Astringentia*, 302, 303, 304, 305, 306, 365, 368, 372, 375
- an salivam proritant*, 303
- Atra Bilis*, 242, 304
- Atrophia*, 210, 228, 324, 326, 328, 425
- infantum*, 352, 388
- Attenuantia*, 221 ad 297
- Aura pestilentialis*, 237
- Aures humide*, 299
- Austera*, 306

B.

- Balbuties*, 246
- Balsamica*, 383, &c. 386
- Bechica*, 236
- Bezoardica*, 240
- Biliosi*, 304. *v. Sang. biliosus.*

Bilis

INDEX.

<i>Bilis deficit,</i>	Pag. 208,	<i>Carbunculus,</i>	Pag. 354
	215	<i>Cardiaca,</i>	236, 238, 239,
<i>Brachii Dolores,</i>	259		240, 241, 243, 246, 249,
<i>Bradypepsia,</i>	236, 247		261, 383
<i>Bronchocele,</i>	228, &c. 348	<i>Cardialgia,</i>	259, 319,
<i>Bubonoccele,</i>	298		326, 351, 375, 379, 386.
<i>Bubones rumpentia,</i>	234,		387, 388
	354	<i>Carminantia,</i>	239, 240,
<i>Bulimia,</i>	318, 344		241, 242, 243, 245, 247,
			259, 263
	C.	<i>Casus,</i>	383
<i>Cachexia,</i>	228, 236,	<i>Cataracta,</i>	227
	237, 238, 239, 240,	<i>Catarrhi,</i>	224, 234, 235,
	242, 243, 248, 249,		236, 237, 238, 240, 241,
	250, 260, 277, 302, 319,		244, 247, 294, 302, 303,
	367, 369, 379, 387,		304, 305, 328, 364, 366,
	431		368, 369, 372, 373, 375,
<i>Cachexiam qua sequuntur,</i>	277		386, 393, 398, 414
	248	<i>febriles,</i>	383, 386
<i>Cacitas,</i>	248	<i>suffocativi,</i>	237, 271,
<i>Calculus,</i>	237, 238,		356, 365, 367, 369
	239, 240, 243, 245,	<i>Caustica,</i>	301, 302
	302, 323, 324, 325,	<i>Cautela de Remediis intro-</i>	
	328, 329, 333, 336,	<i>sumptis,</i>	203 ad 206
	350, 359, 364, 366, 367,	<i>Cephalalgia,</i>	224, 233, 234,
	369, 370, 371, 374,		235, 237, 238, 243, 244,
	379, 386, 387, 388, 430,		245, 302, 367
	431	<i>biliosa,</i>	427
<i>Calculi, execti, magnetem</i>		<i>calida,</i>	298, 317, 319
<i>sequuntur,</i>	390	<i>hysterica,</i>	318
<i>Callum suppeditant,</i>	209.	<i>Cephalæa,</i>	228
	226, 230, 234	<i>Cephalica,</i>	238, 239, 241,
<i>Calor nativus suppletur,</i>			245, 246, 249, 367
	211, 375, 378, 433	<i>Cerebrum confortantia,</i>	
<i>Camphora an opiata,</i>	413		240
<i>Cancer non ulceratus,</i>	241,	<i>Chalybeata,</i>	265, 266, 280,
	242, 245, 319, 326, 361,		281, 296, 370
	366	<i>Chlorosis,</i>	230, 236, 237,
<i>ulceratus,</i>	351, 364		240, 241, 242, 243, 250,
<i>Capitis morbi frigidi,</i>	249.		291, 368, 428, 430, 431
<i>v. morbi frigidi.</i>		<i>Cholera,</i>	318, 326, 428
		<i>Rr 2</i>	<i>ei</i>

I N D E X.

<i>ei nocent,</i>	Pag. 428	<i>Cortex peruvianus,</i>	Pag.
<i>Chordapsus,</i>	418	260, 261, 400, 401, 402,	
<i>Chronici morbi,</i>	368, 431	403, 404	
<i>Chyli inopia,</i>	208, 210,	<i>Cosmetica,</i>	[365, 366, 368,
<i>Cicatrisantia,</i>	303, 368		369
<i>v. ulcera, vulnera.</i>		<i>Costa luxata,</i>	370
<i>Circulationem juvant,</i>	374	<i>Crepatura Tendinum,</i>	225
<i>Clavi,</i>	226, 230, 235	<i>Crines regenerare (v. alo-</i>	
<i>Coagulatio</i>	} 243, 244, 387	<i>pecia)</i>	364
<i>Coagulum</i>		<i>Crocus,</i>	285, 286
<i>Cocta quæ,</i>	393	<i>Cruditæ,</i>	235, 236, 238.
<i>Coctio debilis laesa,</i>	234, 238.	240, 244, 246	
246, 248, 289, 368, 377,		<i>acida,</i>	227
378		<i>nidorosa,</i>	298
<i>Colica,</i>	224, 230, 233, 234,	<i>ventriculi,</i>	378
235, 236, 237, 238, 240,		<i>Crurum dolor,</i>	359
241, 243, 245, 247, 248,		<i>Cutanei affectus,</i>	242,
249, 293, 340, 364, 366,		302, 304, 319, 327	
367, 368, 377, 378, 379,		328	
386, 387, 392, 431.		<i>Cutim detergent,</i>	67
<i>acida,</i>	358		
<i>biliosa,</i>	326		
<i>hysterica,</i>	358, 377		
<i>infantum,</i>	245		
<i>nephritica,</i>	376		
<i>Colliquamentum effluens,</i>			
	314		
<i>Columella tumor,</i>	243		
<i>Conceptum juvantia,</i>	430		
<i>Concussio,</i>	228		
<i>Consopientia,</i>	375		
<i>Contractura,</i>	322, 324, 431		
<i>Contusio,</i>	234, 241, 366		
367, 370, 383, 386			
<i>Convulsiones,</i>	220, 239,		
241, 242, 243, 244, 245,			
246, 247, 248, 293, 317,			
319, 356, 358, 367, 369,			
377, 410, 423, 432			
<i>Cornua pedum,</i>	325		
<i>Corroborant fibras,</i>	251		

D.

<i>Debilitas ventriculi,</i>	378
<i>visus,</i>	225
<i>Defluxiones in oculos, den-</i>	
<i>tes, &c.</i>	235, 237, 370
<i>Deliquia,</i>	217, 233, 239
<i>in febre,</i>	218
<i>Deliria,</i>	244, 328, 370, 380,
	381, 385
<i>Dens sanguinem effundens,</i>	
	298
<i>Dentitionem facilitantia,</i>	
	241, 369, 379
<i>Dentes firmare,</i>	363, 365
<i>Dentifricia,</i>	319, 365, 387,
	388
<i>Dentilavia,</i>	349
<i>Detersiva,</i>	240
<i>Diabetes,</i>	233, 297. 305
	373
<i>Diapho-</i>	

I N D E X.

Diaphoretica, Pag. 235,
 236, 237, 238, 239, 240,
 241, 248, 249, 251, 318,
 319, 367, 368, 373, 374,
 382, 386
Diarrhœa, 247, 261,
 298, 302, 304, 305, 309,
 310, 315, 318, 319, 327,
 368, 371, 373, 374, 375,
 376, 378, 380, 382, 383,
 386, 388, 413, 421
ab ulcere intestinorum,
 431
diuturna, ibid
cum Febre, 399
cum Astmate, 416
Diarrhœa nocent, 303
Diascordium cum Syr. de
Mecon. 304
Digestiva, 234, 323, 325,
 329, 357
Discutientia, 244, 249, 365,
 366, 369, 379
Distensio ventriculi, 378
Diuretica, 234, 235, 236,
 237, 238, 239, 241, 242,
 243, 245, 246, 247, 249,
 251, 301, 302, 303, 374,
 380, 383, 386
Dolores, 233, 258, 325, 326,
 328, 365, 366, 368, 370,
 371, 377, 378, 381, 383,
 384, 413, 418, 419, 423
ardentes, 380, 384
arthritici, 244, 364, 366,
 376, 377, 380
articulorum, 319
auris frigidi, 228, 234,
 235, 324, 326, 366, 370
brachii, 423
calenti, 380

calidi, Pag. 305
capitis, 234, 378, 387,
 419
hysterici, 229
crurum scorbutici, 241
dentium, 378, 396
diuturni, 242
dorsi, 377, 378
duro innitentium, 423
fixi, 431
flatuosi, 234
frigidi, 234, 245
hemorrhoidum, 369, 370
hydropis, 423
intestinorum, 379
lateris, 385
externi, 370, 381
flatuosi, 247
musculorum, 392, 393
nephritici, 389
nervorum & ossium, 234
oculorum, 271, 298, 347,
 381
à partu, 324
pectoris, 322, 332, 333
penis, 240
pleuritici, 235, 382
profundi, 244
renum, 369, 370, 378
rheumatici, 223
scapularum, 405
scorbutici, 236, 367
splenis, 234
sterni, 326
temporum, 369
vagi, 241, 242, 328
 392
venerei, 417
ventriculi, 228, 234,
 235, 369, 375, 377
virge, 324

R r 3 *Dysen-*

I N D E X.

<i>Dysenteria</i> , 233, 301, 302, 303, 305, 309, 310, 318, 325, 326, 328, 366, 370, 371, 376, 379, 412, 413, 421, 431 à vermicibus, 293	<i>Evacuantibus non præmissis</i> <i>alterantia non profunt</i> , Pag. 389 <i>Evacuantia in febre bona</i> , 397 ante opiata, 419
<i>Dyspnœa</i> , 234, 236, 237, 367	<i>Excoriatio oris, gutturis</i> vel alibi, 305, 328, 356, 376 intestinorum, 366
<i>Dysuria</i> , 322, 334, 379, 387	<i>Expectorationem reprimunt</i> , 423
E.	
<i>Elephantiasis</i> , 228, 349, 365	<i>Expectorantia</i> , 237, 238, 246, 247, 249, 250, 327, 364, 366, 367, 368, 369, 370 ad 375, 383, 385, 386
<i>Emmenagoga</i> , 239, 240, 247, 249, 369 v. Mens. suppress.	<i>Extillationem & effluxum</i> humorum præcavent, 373
<i>Emollientia</i> , 328, 365, 369	<i>Extractum opii</i> , 410
<i>Emplastra non semper utilia</i> , 216 volatilia quibus profunt, 217, 377 deliriis profunt, 219	F.
<i>Empyema</i> , 233, 249, 318, 326, 345, 364, 369, 373, 425	<i>Faciei asperitas</i> , 227, 233 colorem venustantia, 319 pustula, 233, 235, 250, 301, 304, 389
<i>Enchymosis</i> , 228	<i>scabies</i> , 389
<i>Ephelides</i> , 227, 233	<i>Rubor</i> , 233, 235, 241, 301, 304, 327, 388
<i>Epilepsia</i> , 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 261, 266, 302, 318, 319, 367, 368, 413	<i>Faces emolliunt</i> , 372, 379 arida, 385
<i>Epilepsia nosent</i> , 432	<i>Fauces excoriata</i> , ibid.
<i>Epiphora</i> , 297, 363	<i>Favus</i> , 227, 349
<i>Epulotica, in ulcere</i> , 357	<i>Febres</i> , 301, 302, 318, 319, 370, 388
<i>Erosio Pulmonum, &c.</i> 315, 328	ardentes, 302 continua (maligna) 225, 235, 237, 241, 244, 247, 248, 249, 319, 366, 371
<i>Eruptiones</i> , 319, 385, 431	erratica (scorbutica) 241, 321, 344 hectica
<i>Erysipelas</i> , 228, 327, 356, 366, 370, 381, 385 ulceratum, 297	

I N D E X.

<i>hectica,</i>	Pag. 425	<i>Fœtor oris,</i>	Pag. 245, 303
<i>infantum,</i>	318	<i>Fœtus mortuus,</i>	228, 234, 240
<i>inflammatoria,</i>	328, 382	<i>Fœtum roborant,</i>	369
<i>intermittentes, remittentes,</i>	224, 225, 236, 238, 239, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 260, 266, 290, 303, 367, 370, 376, 379, 382, 386	<i>Fontanella,</i>	203, 235
<i>pestilenciales,</i>	241	<i>Fractura;</i>	299
<i>variolarum secundaria,</i>	419	<i>Fumigare cubicula,</i>	249
<i>verminosa,</i>	289	<i>Furfures,</i>	301
<i>Fermenti stomachici inopia,</i>	208, 212	<i>Furor uterinus,</i>	299
<i>Fervor,</i>	377	G.	
<i>Fissura mammarum,</i>	324, 327, 328	<i>Ganglion,</i>	230, 359
<i>manuum, labiorum,</i>	327	<i>Gangrana,</i>	229, 233, 241, 384
<i>Fistula,</i>	234, 301, 319, 364	<i>Gingiva dura,</i>	324
<i>Flatus,</i>	235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 260, 346, 367, 368, 372, 374, 377, 378, 379, 410, 427, 431	<i>flaccida,</i>	229
<i>Flatus splenicus,</i>	343	<i>fungosa,</i>	384
<i>ventriculi,</i>	229, 233, 248	<i>putrida,</i>	236, 304, 350, 356, 388
<i>uteri,</i>	226	<i>à Dentis carie,</i>	384
<i>Flexilia,</i>	329, 330, 331	<i>sanguinolenta,</i>	299, 304, 381
<i>Fluor albus,</i>	233, 299, 303, 304, 305, 310, 327, 355, 367, 375, 377, 386, 387, 430, 431	<i>ulcerata,</i>	356, 384
<i>Fluxus Hepaticus,</i>	360, 365, 368, 379	<i>Glottidis Constrictio,</i>	324
<i>omnis,</i>	305, 309, 310, 384	<i>Glutinantium vires,</i>	301
<i>Fluxiones,</i>	383	<i>Gonorrhœa virulenta,</i>	229, 249, 299, 310, 311, 323
<i>oculorum,</i>	364	<i>Gonorrhœa,</i>	302, 303, 310, 311, 327, 328, 367, 379, 386, 387
		<i>Gravida,</i>	239
		<i>Gravedo,</i>	241, 243, 245
		<i>Grumi,</i>	360, 368, 370, 374
		<i>Gula inflammatio,</i>	382
		<i>Gum. Arabicum cui prodest,</i>	415
		<i>Gutta Rosacea,</i>	299, 369
		<i>Serena,</i>	235, &c.
		H.	
		<i>Hæmoptoë,</i>	266, 299, 303, 304,

INDEX.

- 304, 305, 370, 375, 376, 388
Hamoptoi nocent, 431, 432
Hamorrhagia, 234, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 380, 382, 383
è Dente evulso, 301, 375
Hamorrhagia nocent, 292
Hamorrhoides, 381
caca, 339, 384
dolentes, 322, 328, 360, 380, 384
nimia, 299, 303, 305
tumida, 340
Hæctica, 249, 302, 321, 322, 328, 335, 376, 427
ab hpdrope, 295
Hemicrania, 236
periodica, 405
Hepar obstructum, 221
Hepatica, 239, 365
Hernia, 299, 304
Herpes, 233, 301, 327, 349, 367
Horror, 229
Humores crassi tartarei, 237
Hydatis oculi, 229
Hydrocele, 229
Hydrocephalus, 228, ibid.
Hydrophobia, 222, 229, 255, 359
Hydrops, 229, 235, ad 346, 250, 280, 295, 319, 367, 373, 379, 431
cum scorbuto, 240
uteri, 359
Hypercatbarfis, 413
Hypochondriaca, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 248, 277, 287, 344, 368, 371, 386, 412, 427
Hysterica, Pag. 219, 220, 229, 230, 236, ad 249, 253, 259, 272, 273, 277, 301, 319, 366, 367, 370, 373, 374, 375, 385, 388, 410
 I.
Icterus, 229, 235, 236, 238 ad 245, 248, 250, 279, 283, 289, 319, 369, 378, 382, 387
Ignis sacer, 363, v. *Erysipelas*.
Iliaca, 245, 322, 366, 392
à vermibus, 293
Impetigo, 237, 301, 302, 327, 367
Impotentia virilis, 214
Inappetentia, 234, 375
Incidentia, 239, 243, 250, 371, 385
Incontinentia urina, 299, 342, 365, 388
Incrassantia, 328, 329, 375
Incubus, 229
Infantum convulsiones, 286
Inflammatio, 229, 234, 302, 303, 304, 322, 366, 378, 381, 385, 388
amygdalarum, 248
gingivarum, 366
glandularum pulmonum, 270
musculorum pectoris, 268
oculorum, 370
oris, 304
tonsillarum, 382
Uvula, 244, 398
Inflammationi nocent, 304
Inflationes, 239
hypochondriorum, 295
Infusio

I N D E X.

<i>Infusio quid valet,</i>	434	<i>Lienteria,</i>	308, 347
<i>Intemperies sine materia,</i>	290	<i>Lienis affectus,</i>	301
<i>Intercipientia,</i>	304	<i>Lien obstruēt.</i>	228
<i>Intestina ab acribus humo-</i>		<i>Ligamenta uteri laxa,</i>	239
<i>ribus, vexata,</i>	379	<i>Lingua ardor, &c.</i>	305, 327,
<i>à flatibus,</i>	ibid		328
<i>Irritationem sedant,</i>	373,	<i>Lithonriptica,</i>	239
	375, 410	<i>Lochia suppressa,</i>	240, 248,
<i>Ischias,</i>	233, 322		292, 360
<i>Ischuria,</i>	222, 239, 342	<i>nimia,</i>	299, 305
L.		<i>Lubricantia meatus,</i>	371,
<i>Labiorum pustula,</i>	367		379
<i>Labrisulcium,</i>	299, 396, 397	<i>Lues venerea,</i>	234, 236,
<i>Lactis defectus,</i>	230		237, 240, 248, 301, 302,
<i>Thrombosis,</i>	346, 366		319, 367
<i>commoda & noxa & regi-</i>		<i>Lumbrici,</i>	228, 396
<i>men,</i>	425, 426	<i>Luxatio,</i>	299
<i>Languor spirituum,</i>	207,	M.	
	209, 210, 211, 212, 214,	<i>Macies,</i>	327
	233, 234, 235, 236, 239,	<i>à verme</i>	343
	241, 245, 246, 375	<i>Macula faciei,</i>	352
<i>Langmor, febrilis,</i>	247	<i>Malacia,</i>	223
<i>Lapides solventia,</i>	301, 363	<i>Mamma cancroſa,</i>	367
<i>Lapis dentalis,</i>	387, 388	<i>ſcirrhoſa,</i>	344, 366
<i>Laudani compositio,</i>	415	<i>Mania,</i>	302, 359, 360, 413,
<i>Laxantia,</i>	238, 303, 304,		420
	328	<i>Marasmus,</i>	241, 258
<i>Laxitas fibrarum,</i>	246, 265,	<i>Marisca,</i>	365
	304	<i>Maturationem impediunt,</i>	
<i>glandularum oris,</i>	305		419
<i>gingivarum,</i>	366	<i>Meatus glabros reddunt,</i>	374
<i>nervorum,</i>	243	<i>Medicamentorum farrago</i>	
<i>ventriculi,</i>	244, 378	<i>quid valet,</i>	373
<i>v. ventriculi laxitas.</i>		<i>Melancholia,</i>	230, 235, 238
<i>Lenientia,</i>	365, 366, 374,	<i>hypochondriaca,</i>	237,
	378, 381		240, 281, 284, 355, 431
<i>Lentigines,</i>	227, 367	<i>Memoria perdita,</i>	237, 238,
<i>Lepra,</i>	237, 301, 367, 425		368, 393, 394
<i>Græcorum,</i>	241	<i>Menses quomodo provocan-</i>	
<i>Lethargus,</i>	224, 245, 254	<i>di,</i>	264
<i>Lichen,</i>	302	<i>difficulter fluentes,</i>	228
		<i>doloroſi,</i>	

dolorosi,	Pag. 335	243, 244, 245, 254,	
emanfi,	291	381, 393	
nimii,	299, 302, 304;	spasmodici,	244
305, 354, 383, 428		splenitici,	243
parci,	247	tartarei,	236, 239
suppressi,	230, 233, 236,	v. acidi morbi.	
237, 238, 239, 240,		tenues (acres)	328
241, 243, 247, 264,		viscidi,	241, ad 245
280, 292, 384, 388, 431		Morbi causa privativa,	213
Mercurii noxa,	375	Morphæa,	364
Mesenterii tumores,	226	Morsus venenatus,	229,
Mictio puris,	240	236, 242, 243, 249	
sanguinis,	297, 298	Motus inordinatus,	201
Mictus lecti involuntarius,		Mucum expellunt per uri-	
	372	nam,	387
Millipedes pp. quid valent,		supplent,	372
	283	Mydriasis,	297
Mola,	223, 224, 229	N.	
Monita Localia, à 435 ad		Navi,	227
446		Nausea,	221, 242, 299,
Morbilli,	319	304, 370, 375, 378	
Morbi acidi,	240, 241	Nephritis,	230, 236, 249,
Annui,	406	322, 327, 328, 347, 376,	
anomali,	257	388	
capitis,	301	Nervina,	240, 241, 253
chronici,	234, 235, 236,	Nervus contusus,	361
238, 240, 247		Nervi laxi, oppilati,	379
frigidi,	234, 235, 238,	Nervos roborant,	35
241, 247, 248, 249,		Nodi,	221, 235, 302
260, 373, 431		Nutrientia qua,	328
maligni,	319	Nutrimenti defectus,	208,
muriatici,	304	210, 215, 233	
nervini,	241, 248	O.	
pectoris ex minera,	302	Obstructiones,	236, 237,
peroidici,	246, v. Feb.	238, 240, 241, 242, 243,	
interm.		244, 245, 246, 248, 263,	
pituitosi,	242, 243, 246,	267, 319.	
247, 248, 262		hepatis,	243, 283. v.
Salsi,	304	icterus.	
Serosi,	245, 262	lacteorum,	260
somnolenti,	226, 242,	nervorum,	430
			pancre-

INDEX.

- pancreatis Asellii.* 291
Odontalgia, 237, 240, 244, 247, 303, 325, 381, 422
Odorifera, 234
Oedema, 354, 366
Ophthalmia, 235, 239, 244, 284, 299, 312, 213, 314, 315, 336, 363.
Opium quomodo agit, 255, 410, ad 424.
quando dandum, 414, 415
Oris affectus calidi 365
inflammatio, 382
mucus, 381
ulcera, ibid.
Orthopnœa à pituita, 248, 249, 385, 387
Otalgia, 237, 240, 244, 247, 303, 325
Ozana gallica, 350, 381
- P
- Palpitatio,* 225, 230, 238, 241, 245, 246, 249, 413
Papilla fissæ excoriata, 297, 299
Paralysis, 230, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 270, 271, 343, 367, 373, 394, 431
Lingua, 382
Paralyfi nocent, 319
Paraphymosis, 221
Paronychia, 327
Paroxysmi febriles, 365
hysterici, 347, 368
Partus difficilis, 223, 224, 228, 230, 238, 240, 248, 364
Passio hysterica, 216, 242, 296
- Pectoris dolor à tussi,* 323, 324
morbi ab acri, 328
pituitosi, 363, 370
Pectoralia, 239, 240, 241, 243, 244, 247, 328, 329, 380
Pediculi omnes passim, 221
Pedum inflatio, 222
Peptica, 247, 248, 249
Pericranii affectus frigidi, 380
Periodus extra & intra va-
sa, 400
Perniones, 345, 369
Peripneumonia notha, 271
vera, 382
Perspiratio lasa; 372, 395
Pertussis, 222
Pestifera, 363
Pestis, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 301, 319
Pharynx inflammata in va-
riolis, 322
Philtrea, 230
Phrenitis, 322, 371, 412, 413
Phthisis, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 245, 247, 349, 302, 303, 305, 319, 327, 328, 364, 367, 369, 371, 372, 374, 375, 378, 379, 413
Phthisi nocent, ib.
Phthisis frigida, ib.
Phymosis, 221
Pica, 222
Pituita, 242, 253
Pituitam expectorantia, 236, 363, 374, 377, 383, 387
Plenitudo,

INDEX.

- | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| <i>Plenitudo evacuanda,</i> | 397 | <i>oculorum,</i> | 364 |
| <i>nosceda,</i> | ibid. | <i>oris muturanda,</i> | 382 |
| <i>Pleuritis,</i> | 233, 234, 236, | <i>variolarum inflammata,</i> | 413 |
| 327, 328, 353, 354, 364, | | | |
| 378, 380, 382, 386 | | <i>Putredini contraria,</i> | 236, |
| <i>decrescens,</i> | 245, 247, 249 | 238, 239, 363, 366, 378 | |
| <i>externa;</i> | 384 | | |
| <i>incipiens,</i> | 386 | Q | |
| <i>instante crisi,</i> | 374, 416 | <i>Quartana,</i> | 235, 236, 237, |
| <i>Pneumatocoele,</i> | 221 | 238, 239, 240, 241, 302. | |
| <i>Podagra,</i> | 221, 234, 235, | <i>v. Feb. intermittentes.</i> | |
| 237, 238, 245, 301, 303, | | | |
| 319, 388 | | R | |
| <i>Podagrica,</i> | 365, 366, 367, | <i>Rabies,</i> | 235, 388 |
| 368 | | <i>Rachitis,</i> | 222, 234, 235, |
| <i>Polypus cancrifus,</i> | 351 | 236, 239, 286, 378, 384 | |
| <i>Ponderosa,</i> | 253 | <i>Ranula Lingua,</i> | 222 |
| <i>Porrigo capitis.</i> | 355 | <i>Raucedo à pituita,</i> | 222 |
| <i>Priapismus,</i> | 367, 410 | 226, 256, 375, 376, | |
| <i>Procidentie (ani, uteri, u-</i> | | <i>à tenui, acri,</i> | 300, 328 |
| <i>vule)</i> | 300 | <i>Recidiva,</i> | 228 |
| <i>Profluvium album, v. Fluor</i> | | <i>Refocillantia intestinorum,</i> | 379 |
| <i>albus.</i> | | | |
| <i>Proœmium,</i> | 201 | <i>Refrigerantia,</i> | 304, 305, |
| <i>Prolifica</i> | 239 | 365, 368, 374, 383, 433 | |
| <i>Pruritus,</i> | 241, 301, 305, | <i>Remedia convehuntur ad</i> | 445 |
| 321, 335, 369 | | <i>partes,</i> | |
| <i>Pfora,</i> | 374 | <i>Renunciatio de mortuis,</i> | ibid |
| <i>Psyehrolusia,</i> | 433 | | |
| <i>Ptyalismus,</i> | 149 | <i>Repellentia,</i> | 303, 305 |
| <i>Puerpera contusa,</i> | 329, 388 | <i>Respiratio quid sit,</i> | 268 |
| <i>Pulmones infarcti,</i> | 270 | <i>Restaurantia,</i> | 207, 210, |
| <i>Pulmonica;</i> | 235, 237, 240, | 212 | |
| 268, 369, 370, 372, 387 | | <i>Revulsionum Regula,</i> | 389 |
| <i>Purgantia cum alteranti-</i> | | <i>Rheumatismus,</i> | 233, 234. |
| <i>bis mista,</i> | 393 | 322, 328 | |
| <i>Purulenta excreatio,</i> | 237 | <i>Spurius,</i> | 248 |
| <i>Pus expectorantia,</i> | 367, 377 | <i>Roborantia,</i> | 301, 302 |
| <i>Pustula,</i> | 302 | <i>dentium,</i> | 303 |
| <i>rubra infantum,</i> | 228 | <i>fibrarum,</i> | 365, 374, 378 |
| <i>Faciei,</i> | 349, 364 | <i>Rubor faciei,</i> | 369 |
| | | <i>Ructus,</i> | |

INDEX.

- Mixta*, Pag. 353, 385, 387, 389, 391
periculosa, 386
phthifica, 316
pleuritica, 391, 392
profunda, 383
secca, 248, 328, 374, 391
tenuis, 391
cum teneritudine, 378
viscida, 239, 240, 248, 249, 324, 385, 387, 390, 391
ulcerosa, 323, 391, 399
Tympanitis, 363, 364, 381
- V. U.
- Vapores*, 235, 239, 246
Variolæ, 236, 237, 303, 319, 322, 327, 328, 336, 365, 378, 398
Vasa rupta, 372, 375
Venenati, 230, 236
Venerem stimulantia, 237, 241
refranantia, 365
Ventriculus debilis, 247
dolens, 246, 260, 289, 381
frigidus, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 263
inflammatus, 325
laxus, 247, 295, 297, 304, 366, 371, 376, 381, 431
pituitosus, 248
tener, 288
ulceratus, 334
Ventris fluxus, 304
Vermes, 229, 230, 234, 236, 237, 240, 241, 244, 245, 249, 251, 286, 294, 302, 318, 364, 366, 368, 372, 374, 379, 387
- Verruca*, 226, 230, 235, 301
Vertigo, 228, 235, 236, 238, 242, 243, 245, 248, 292, 368, 377, 413
Vigilia, 322, 325, 378, 380, 381, 413
Vinum rhenanum cum chalybe, 282
Vires prostrata, 207, 210, 211, 243, 364
Viscera roborant, 365
Visciditas, 233, 234
Visus hebetudo, 235, 345, 369
- Ulcera*, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 243, 251, 292, 301, 302, 303, 319, 328, 365, 369, 381, 387
antiqua, 301, 364, 366
externa, 345, 363, 364, 381, 414
ichorosa, 304, 373
interna, 375, 386
gingivarum, 304, 366
oculorum, 364
oris, 364, 365, 366, 369
pulmonum benigna, 383
pedum, 327, 369
renum, 234, 323, 348, 379, 383, 427, 430
ventriculi, 358
vesica, 304, 323, 379, 383, 430
virga, 366
uteri, 323, 379
colli, 358
Ulcerebus nocent, 304, 428, 431
Vomit, 242, 244, 247, 304

INDEX.

364, 310, 343, 370, 375,	<i>Uterina</i> , Pag. 235, 239, 240,
376, 377, 378, 380, 383,	365
386, 387, 406, 407, 408,	<i>Uteri laxitas</i> 304
427	<i>rheumatismus</i> , ibid
<i>sanguinis</i> , 300, 305, 385	v. <i>Fluor albus</i> .
<i>Vomitoria</i> , 363	<i>strangulatio</i> , 238, 240,
<i>Urine ardor</i> , 302, 303, 305,	319
323, 324, 327, 328, 368,	<i>Vulnera</i> , 234, 235, 241,
382, 387	301, 302, 364
<i>mictus sanguineus</i> , 365,	<i>interna</i> , 234
383	<i>pulmonum</i> , 239
<i>suppressio</i> , 234, 246, 249,	<i>sclopetaria</i> , 364
370, 371, 372, 373, 374,	<i>venenosa</i> , 223
377, 379, 387, 388	<i>Uvula laxata</i> , 361, 368,
	388

F I N I S.



